

קומבינטוריקה 1040286
גליון 5

יונתן אבידור - 214269565

רותם עשת - 212674683

9 ביוני 2026

שאלה 1

הוכיחו כי אם m, n זרים אזי

$$\varphi(nm) = \varphi(n) \varphi(m)$$

פתרון 1

יהיו m, n זרים
לפי הגדרת פונקציית אוילר

$$\varphi(nm) = nm \cdot \prod_{p|nm} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

n ו- m זרים, לכן $\Phi(n) \cap \Phi(m) = \{1\}$ מכאן ש

$$\prod_{p|nm} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \cdot \prod_{p|m} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

לכן

$$\begin{aligned} \varphi(nm) &= nm \cdot \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \cdot \prod_{p|m} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \\ &= \underbrace{\left(n \cdot \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)\right)}_{\varphi(n)} \cdot \underbrace{\left(m \cdot \prod_{p|m} \left(1 - \frac{1}{p}\right)\right)}_{\varphi(m)} \\ &= \varphi(n) \varphi(m) \\ &\Rightarrow \boxed{\varphi(nm) = \varphi(n) \varphi(m)} \end{aligned}$$

■

שאלה 2

מהו מספר הסדרות

$$(x_1, \dots, x_7) \quad x_i \in \{0, 1, 2\}$$

שאינן מכילות באף שלושה מקומות עוקבים את הרצף 010?

פתרון 2

נשתמש בעיקרון ההכלה וההדחה על מנת לגלות את כמות הסדרות בהן הרצף מופיע פעם אחת, פעמיים ושלוש פעמים, ואז נחסר את זה מכמות הסדרות הכוללת. נסמן

$$\begin{aligned} S &= \{(x_1, \dots, x_7) \mid \forall i \in [7] : x_i \in \{0, 1, 2\}\} \\ S_1 &= \{s \in S \mid \text{הרצף } (1, 0, 1) \text{ מופיע לפחות פעם אחת}\} \\ S_0 &= \{s \in S \mid s \notin S_1\} \end{aligned}$$

בכל סדרה, או שהרצף מופיע לפחות פעם אחת, או שהוא לא מופיע כלל, כלומר הקבוצות S_1 ו- S_0 זרות ומכסות את S , לכן

$$|S_0| = |S| - |S_1|$$

נחשב את גודלה של S על מנת לבנות סדרה בעלת שבעה איברים מעל $\{0, 1, 2\}$ יש לבחור 7 פעמים מבין האפשרויות, כאשר יש חשיבות לסדר ומותר חזרות ולכן

$$|S| = 3^7 = 2187$$

נחשב את גודלה של S_1 "נקבץ" שלושה איברים שיהיו 010 ונתייחס אליהם כאיבר אחד ואז נשאר לנו למלא את שאר 4 המקומות בסדרה, יש 3 אפשרויות, יש משמעות לסדר ומותר חזרות ולכן הכמות היא 3^4 את זה יש להכפיל באפשרויות למקם את ה010 שזה 5, לכן סה"כ

$$|S_1| = 5 \cdot 3^4 = 5 \cdot 81 = 405$$

לכן

$$|S_0| = 2187 - 405 = \boxed{1782}$$

שאלה 3

נתעניין בסידורים של 8 צריחים על לוח שחמט רגיל 8×8 .

סעיף א'

בכמה דרכים ניתן למקם את שמונת הצריחים על הלוח כך שאף אחד מהם לא יאיים על אף צריח אחר?

סעיף ב'

בכמה דרכים ניתן למקם את הצריחים על הלוח, כך שאף אחד מהם לא יאיים על אף צריח אחר ואף צריח לא ממוקם על האלכסון של המשבצות הלבנות?

פתרון 3

סעיף א'

נשים לב שלא יכולים להיות שני צריחים באותה שורה, ומכיוון שעלינו לסדר 8 צריחים על לוח בעל 8 שורות, בכל שורה צריך להיות צריח יחיד. אם כן, נתאר סידור כלשהו של צריחים כפונקציה

$$\pi : [8] \rightarrow [8]$$

הפונקציה מקבלת מספר שורה, ומחזירה את העמודה שבה הצריח מאותה ממוקם בסידור.

לא יכולים להיות שני צריחים באותה עמודה, כלומר לא יכולים להיות שני $i \neq j \in [8]$ כך ש- $\pi(i) = \pi(j)$, כלומר הפונקציה חח"ע. הפונקציה חד-חד-ערכית מקבוצה סופית לעצמה ולכן על, מכאן שהיא פרמוטציה.

לכן, כמות הסידורים החוקיים לצריחים היא כמות הפרמוטציות על $[8]$, כלומר $8!$

סעיף ב'

הכלל הנוסף מגביל אותנו לפרמוטציות בהן

$$\nexists x \in [8] : \pi(x) = x$$

כלומר בלבולים בלבד, בכיתה ראינו כי כמות הבלבולים על n היא

$$\left[\frac{n!}{e} \right]$$

כשכאן $\lfloor \cdot \rfloor$ הוא הקירוב למספר שלם הגדול ביותר

שאלה 4

n אנשים מגיעים לבית האופרה ביום גשום, ותולים בכניסתם מעיל וכובע. בסיום המופע, כל אחד מהצופים לוקח מעיל וכובע כלשהם ושב לביתו. בכמה דרכים יכולים האנשים לשוב לביתם, כך שאף אדם אינו אחוז במעיל ובכובע איתם הגיע להופעה?

פתרון 4

$$\sigma : (x, x) \rightarrow (x, x)$$

שאלה 5

יהא $1 \leq i \leq n-1$.
נסמן ב- P_i את אוסף התמורות באורך n שבהן $i+1$ מופיע מיד אחרי i .

סעיף א'

חשבו את $|P_i|$.

סעיף ב'

יהא $n \geq 6$. חשבו את גדלי החיתוכים

$$|P_1 \cap P_2 \cap P_3| \quad |P_1 \cap P_2 \cap P_4| \quad |P_1 \cap P_3 \cap P_5|$$

סעיף ג'

תהא $I \subseteq [n]$ קבוצה מגודל k .
חשבו את גודל החיתוך

$$\left| \bigcap_{i \in I} P_i \right|$$

סעיף ד'

חשבו את מספר התמורות באורך n בהן לכל $1 \leq i \leq n-1$ מתקיים ש- $i+1$ אינו מופיע מיד אחרי i .

פתרון 5

שאלה 6

בפקולטה למתמטיקה ישנם n גברים ו- $m-1$ נשים

סעיף א'

בכמה דרכים ניתן לבחור ועדה, שתכיל m חברי סגל, אבל לא תכיל את כל n הגברים?

סעיף ב'

חשבו את הסכום:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{m+n-k-1}{m}$$

פתרון 6

שאלה 7

במתנ"ס השכונתי יש שלושה קורסי שפה ושבעה חוגי ספורט:
למתנ"ס רשומים 11 ילדים, כל ילד נרשם לשני קורסי שפה ולשלושה חוגי ספורט.
הוכיחו כי קיימים ארבעה ילדים הלומדים אותו קורס שפה, והולכים לאוו חוג ספורט.


פתרון 7

שאלה 8


נתונות חמש נקודות בתוך משולש שווה-צלעות שאורך צלעו 2 הוכיחו כי קיימות שתי נקודות שהמרחק ביניהן לכל היותר 1

פתרון 8

נחלק את המשולש לארבעה משולשים בשיטת הטרייפורס



נשים לב שאפשר לחסום כל אחד מהמשולשים במעגל עם קוטר 1



מכאן שהמרחק בין כל שתי נקודות בתוך אחד מהמשולשים הוא לכל היותר 1
יש לנו 5 נקודות שנמצאות ב- $5 - 1 = 4$ משולשים
מעיקרון שובך היונים, יש (לפחות) שתי נקודות שנמצאות על אותו המשולש
לכן, המרחק בין אותן שתי נקודות קטן מ-1
כנדרש



בדיחת קרש