

개념원리(2025) - 공통수학2 (증명,산술,코시부등식)

192~203p

대수를 이용한 증명법과 귀류법 ~ 절대부등식

실시일자	-
25문제 / DRE수학	

유형별 학습

이름

- 01** 다음은 $a > 0, b > 0$ 일 때, $\sqrt{a} + \sqrt{b} > \sqrt{a+b}$ 임을 증명하는 과정이다. 빈칸에 들어갈 식 또는 기호를 차례대로 나열한 것은?

$a > 0, b > 0$ 일 때,
 $\boxed{\text{(가)}} - \boxed{\text{(나)}}$
 $= (a + 2\sqrt{ab} + b) - (a + b) = 2\sqrt{ab} > 0$
 $\therefore (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 > (\sqrt{a+b})^2$
 그런데 $\sqrt{a} + \sqrt{b} \boxed{\text{(다)}}$ 0이므로
 $\sqrt{a} + \sqrt{b} > \sqrt{a+b}$

- | | (가) | (나) | (다) |
|---|---------------------------|---------------------------|-----|
| ① | $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ | $\sqrt{a+b}$ | < |
| ② | $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ | $\sqrt{a+b}$ | > |
| ③ | $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$ | $(\sqrt{a+b})^2$ | < |
| ④ | $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$ | $(\sqrt{a+b})^2$ | > |
| ⑤ | $(\sqrt{a+b})^2$ | $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$ | > |

- 02** $x > 0, y > 0$ 일 때, $\frac{y}{4x} + \frac{9x}{y}$ 의 최솟값은?

- ① 2 ② 3 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 9

- 03** 양수 x, y 에 대하여 $x + \frac{y}{4} = 3$ 일 때, xy 의 최댓값은?

- ① 3 ② 6 ③ 9
 ④ 12 ⑤ 15

- 04** $x \geq 1$ 일 때, $3x + 6 + \frac{1}{3x-2}$ 의 최솟값을 m , 그때의 x 의 값을 n 이라 하자. 상수 m, n 의 합 $m+n$ 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
 ④ 11 ⑤ 12

- 05** 실수 x, y 에 대하여 $x + y = 2$ 일 때, $x^2 + y^2$ 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5



06 실수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2 = 1$ 일 때, $2a + 3b$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. 이때 $M^2 + m^2$ 의 값은?

- ① 24
- ② 26
- ③ 28
- ④ 30
- ⑤ 32

07 둘레의 길이가 20인 직사각형의 가로, 세로의 길이를 각각 x, y 라 하자. $\sqrt{5x} + \sqrt{10y}$ 의 최댓값을 M 이라 할 때, $\sqrt{6}M$ 의 값을 구하시오.

08 다음은 명제 ‘세 자연수 a, b, c 에 대하여 $a^2 + b^2 = c^2$ 이면 a, b, c 중 적어도 하나는 3의 배수이다.’의 참, 거짓을 대우를 이용하여 증명하는 과정이다.

주어진 명제의 대우는
‘세 자연수 a, b, c 에 대하여 모두 3의 배수가 아니면 $a^2 + b^2 \neq c^2$ 이다.’이므로
 $a^2 + b^2 = 3m + \boxed{\text{가}}$, $c^2 = 3n + \boxed{\text{나}}$
 $\therefore a^2 + b^2 \neq c^2$ (단, m, n 은 음이 아닌 정수)
따라서 대우가 $\boxed{\text{다}}$ 이므로 주어진 명제도 $\boxed{\text{다}}$ 이다.

위 과정에서 (가) ~ (다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	1	0	참
②	1	2	거짓
③	2	1	참
④	2	0	참
⑤	2	1	거짓

- 09 다음은 자연수 n 에 대하여 명제 ‘ n^2 이 6의 배수이면 n 도 6의 배수이다.’가 참임을 그 대수를 이용하여 증명하는 과정이다.

주어진 명제의 대우는 ‘ n 이 6의 배수가 아니면 n^2 도 6의 배수가 아니다.’이다.

k 가 자연수일 때 n 을 (가) 또는 $6k-2$ 또는 $6k-3$ 또는 $6k-4$ 또는 $6k-5$ 라 하면

(i) $n =$ (가) 일 때,

$$n^2 = 6(6k^2 - 2k) + \text{(나)}$$

(ii) $n = 6k-2$ 일 때,

$$n^2 = 6(6k^2 - 4k) + 4$$

(iii) $n = 6k-3$ 일 때,

$$n^2 = 6(\text{(다)}) + 3$$

(iv) $n = 6k-4$ 일 때,

$$n^2 = 6(6k^2 - 8k + 2) + 4$$

(v) $n = 6k-5$ 일 때,

$$n^2 = 6(6k^2 - 10k + 4) + \text{(나)}$$

즉, n^2 은 6으로 나누면 나머지가 (나) 또는 3 또는 4인 자연수가 되므로 n 이 6의 배수가 아니면 n^2 도 6의 배수가 아니다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

위의 과정에서 (가), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$, (나)에 알맞은 수를 a 라 할 때, $f(a) + g(a)$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

- 10 다음은 자연수 m, n 에 대하여 명제 ‘ $m^2 + n^2$ 이 홀수이면 mn 은 짝수이다.’가 참임을 증명하는 과정이다.

주어진 명제의 대우 ‘ mn 이 (가) 이면 $m^2 + n^2$ 은 (나) 이다.’가 참임을 보이면 된다.

mn 이 (가) 이면 m, n 이 모두 (가) 이므로 $m = 2k-1, n = 2l-1$ (k, l 은 자연수)로 나타낼 수 있다.

이때 $m^2 + n^2 =$ (다) 이므로 $m^2 + n^2$ 은

(나) 이다.

따라서 대우가 참이므로 주어진 명제는 참이다.

위의 증명 과정에서 (가), (나), (다)에 들어갈 알맞은 것을 차례대로 적은 것은?

- ① 홀수, 짝수, $2(2k^2 - 2k + 2l^2 - 2l)$
② 짝수, 홀수, $2(2k^2 - 2k + 2l^2 - 2l)$
③ 홀수, 짝수, $2(2k^2 - 2k + 2l^2 - 2l + 1)$
④ 짝수, 홀수, $2(2k^2 - 2k + 2l^2 - 2l + 1)$
⑤ 홀수, 짝수, $2(2k^2 - 2k + 2l^2 - 2l + 1) + 1$

11 다음은 $\sqrt{2}$ 가 유리수가 아님을 증명한 것이다.

[증 명]

$\sqrt{2}$ 를 유리수라고 가정하면
 $\sqrt{2} = \frac{q}{p}$ (p, q 는 (가) 인 정수이다.)
 $\therefore \sqrt{2}p = q$
양변을 제곱하면 $2p^2 = q^2$ 이므로
 q 는 (나) 이다.
따라서 p 는 (다) 이므로 (가) 에
모순이다.
즉, $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아니다.

위 증명에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 순서대로
적은 것은?

- ① 양수, 3의 배수, 짝수
- ② 음수, 짝수, 홀수
- ③ 서로소, 홀수, 3의 배수
- ④ 서로소, 홀수, 홀수
- ⑤ 서로소, 짝수, 짝수

12 다음은 $\sqrt{5}$ 가 유리수가 아님을 증명한 것이다.

$\sqrt{5}$ 를 유리수라고 가정하면
 $\sqrt{5} = \frac{q}{p}$ (p, q 는 (가) 인 정수이다.)
 $\therefore \sqrt{5}p = q$
양변을 제곱하면 $5p^2 = q^2$ 이므로
 q 는 (나) 이다.
따라서 p 는 (다) 이므로 (가) 에
모순이다.
즉, $\sqrt{5}$ 는 유리수가 아니다.

위 증명에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	양수	5의 배수	짝수
②	음수	짝수	홀수
③	서로소	홀수	5의 배수
④	서로소	5의 배수	짝수
⑤	서로소	5의 배수	5의 배수

- 13** 다음은 명제 ‘실수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2 = 0$ 이면 $a = 0$ 이고 $b = 0$ 이다.’가 참임을 귀류법을 이용하여 증명하는 과정이다.

<증명>

주어진 명제의 결론을 부정하여

(가) 이라 가정하면 $a^2 > 0$ 이거나

$b^2 > 0$ 이므로 $a^2 + b^2$ (나) 0 이다.

그런데 이것은 $a^2 + b^2$ (다) 0이라는 가정에 모순되므로 $a = 0$ 이고 $b = 0$ 이다.

따라서 실수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2 = 0$ 이면 $a = 0$ 이고 $b = 0$ 이다.

위의 증명 과정에서 (가), (나), (다)에 들어갈 알맞은 것을 차례대로 적은 것은?

- ① $a = 0$ 이고 $b = 0$, =, >
- ② $a = 0$ 이고 $b = 0$, >, =
- ③ $a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$, =, =
- ④ $a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$, =, >
- ⑤ $a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$, >, =

- 14** 다음은 자연수 n 에 대하여 $\sqrt{n^2 + 1}$ 이 무리수임을 증명한 것이다.

$\sqrt{n^2 + 1}$ 이 유리수라고 가정하면

$$\sqrt{n^2 + 1} = \frac{q}{p} \quad (p, q \text{는 서로소인 자연수})$$

로 놓을 수 있다.

이 식의 양변을 제곱하여 정리하면

$$p^2(n^2 + 1) = q^2 \text{이다.}$$

p 는 q^2 의 약수이고 p, q 는 서로소인 자연수이므로

$$n^2 = \frac{q^2}{p^2} \text{이다.}$$

자연수 k 에 대하여

(i) $q = 2k$ 일 때

$$(2k - 1)^2 < n^2 < \frac{(2k)^2}{p^2} \text{인 자연수 } n \text{이}$$

존재하지 않는다.

(ii) $q = 2k + 1$ 일 때

$$\frac{(2k + 1)^2}{p^2} < n^2 < (2k + 1)^2 \text{인 자연수 } n \text{이}$$

존재하지 않는다.

(i), (ii)에 의하여

$$\sqrt{n^2 + 1} = \frac{q}{p} \quad (p, q \text{는 서로소인 자연수})$$

를 만족하는 자연수 n 은 존재하지 않는다.

따라서 $\sqrt{n^2 + 1}$ 은 무리수이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(q), g(k)$ 라 할 때, $f(4) + g(2)$ 의 값은?

- ① 30 ② 31 ③ 32
- ④ 33 ⑤ 34

- 15** 다음은 실수 x, y 에 대하여
부등식 $|x| + |y| \geq |x - y|$ 가 성립함을 증명하는
과정이다.

$$\begin{aligned} & (|x| + |y|)^2 - |x - y|^2 \\ &= (|x|^2 + 2|x||y| + |y|^2) - (x - y)^2 \\ &= (x^2 + 2|xy| + y^2) - (x^2 - 2xy + y^2) \\ &= 2(\boxed{\text{가}}) \geq 0 \quad (\because |xy| \geq -xy) \\ &\therefore (|x| + |y|)^2 \geq |x - y|^2 \\ &\text{그런데 } |x| + |y| \geq 0, |x - y| \geq 0 \text{이므로} \\ &|x| + |y| \geq |x - y| \\ &(\text{단, 등호는 } \boxed{\text{나}} \text{ 일 때 성립}) \end{aligned}$$

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 차례대로 나열한
것은?

- ① $|xy| + xy, xy \leq 0$
② $|xy| + xy, xy \geq 0$
③ $|xy| - xy, xy \leq 0$
④ $|xy| - xy, xy \geq 0$
⑤ $|xy| - xy, xy = 0$

- 16** 두 실수 a, b 에 대하여 $ab < 0, a - 3b = 8$ 일 때,
 $\frac{3}{a} - \frac{1}{b}$ 의 최솟값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

- 17** 양수 x, y 에 대하여 $5x^2 + 125y^2 = 2$ 일 때,
 xy 는 $x = \alpha, y = \beta$ 에서 최댓값 γ 를 갖는다.
이때 $\alpha\beta + \gamma$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{25}$ ② $\frac{2}{25}$ ③ $\frac{3}{25}$
④ $\frac{4}{25}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

- 18** 이차방정식 $x^2 + 4x + a = 0$ (단, a 는 실수)이 허근을
가질 때, $a + \frac{1}{a-4}$ 의 최솟값을 구하시오.

- 19** $x > 0, y > 0$ 일 때, $\left(2y + \frac{1}{4x}\right)\left(8x + \frac{12}{y}\right)$ 의 최솟값은?

- ① $26 + 4\sqrt{3}$ ② $26 + 8\sqrt{3}$
③ $28 + 2\sqrt{3}$ ④ $28 + 4\sqrt{3}$
⑤ $28 + 8\sqrt{3}$

20 두 양수 a, b 에 대하여 $(a+2b)\left(\frac{2}{a} + \frac{9}{b}\right)$ 의


최솟값은?

- ① 8 ② 16
③ 24 ④ 32
⑤ 40


21 세 양수 a, b, c 에 대하여 $\frac{2a+2b}{c} + \frac{2b+2c}{a} + \frac{2c+2a}{b}$ 의 최솟값은?

- ① 10 ② 12
③ 14 ④ 16
⑤ 18

22 다음 그림과 같이 수직인 두 울타리 사이를 길이가 10m인 막대로 막은 삼각형 모양의 땅이 있다. 이 땅의 넓이의 최댓값이 $k\text{m}^2$ 일 때, k 의 값을 구하시오.



23 다음 그림과 같이 단면의 반지름의 길이가 4인 통나무를 가지고 밑면이 직사각형인 사각기둥을 만들려고 한다. 그 밑면의 넓이가 최대가 될 때, 밑면의 넓이를 구하시오.



24 네 실수 a, b, c, d 에 대하여 $a^2 + b^2 = 56, c^2 + d^2 = 126$ 일 때, $ab + cd$ 의 최댓값 p 와 $ac + bd$ 의 최솟값 q 의 합 $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, $abcd \neq 0$)

25 원 $x^2 + y^2 = 50$ 위를 움직이는 점 $P(a, b)$ 에서의 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 OAB의 넓이의 최솟값을 구하시오. (단, O는 원점이고, $a > 0, b > 0$)

개념원리(2025) - 공통수학2 (증명,산술,코시부등식)

192~203p

대우를 이용한 증명법과 귀류법 ~ 절대부등식

실시일자	-
25문제 / DRE수학	

유형별 학습

이름

빠른정답

01 ④	02 ②	03 ③
04 ④	05 ②	06 ②
07 30	08 ③	09 ③
10 ③	11 ⑤	12 ⑤
13 ⑤	14 ②	15 ①
16 ②	17 ②	18 6
19 ②	20 ④	21 ②
22 25	23 32	24 7
25 50		

개념원리(2025) - 공통수학2 (증명, 산술, 코시부등식)

192~203p

대우를 이용한 증명법과 귀류법 ~ 절대부등식

실시일자	-
25문제 / DRE수학	

유형별 학습

이름

01 정답 ④

해설 $a > 0, b > 0$ 일 때,

$$\begin{aligned} & \left[(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 \right] - \left[(\sqrt{a+b})^2 \right] \\ &= (a + 2\sqrt{ab} + b) - (a + b) = 2\sqrt{ab} > 0 \\ &\therefore (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 > (\sqrt{a+b})^2 \\ &\text{그런데 } \sqrt{a} + \sqrt{b} \boxed{>} 0 \text{이므로} \\ &\sqrt{a} + \sqrt{b} > \sqrt{a+b} \end{aligned}$$

02 정답 ②

해설 $x > 0, y > 0$ 에서 $\frac{y}{4x} > 0, \frac{9x}{y} > 0$ 이므로

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\begin{aligned} \frac{y}{4x} + \frac{9x}{y} &\geq 2\sqrt{\frac{y}{4x} \cdot \frac{9x}{y}} \\ &\left(\text{단, 등호는 } \frac{y}{4x} = \frac{9x}{y}, \text{ 즉 } y = 6x \text{일 때 성립한다.} \right) \\ &= 2\sqrt{\frac{9}{4}} = 2 \cdot \frac{3}{2} = 3 \end{aligned}$$

따라서 $\frac{y}{4x} + \frac{9x}{y}$ 의 최솟값은 3이다.

03 정답 ③

해설 $x > 0, y > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에

$$\text{의하여 } x + \frac{y}{4} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{y}{4}}$$

(단, 등호는 $x = \frac{y}{4}$ 일 때 성립한다.)

$$3 \geq 2 \cdot \frac{1}{2} \sqrt{xy} \left(\because x + \frac{y}{4} = 3 \right)$$

$$3 \geq \sqrt{xy}$$

$$\therefore xy \leq 9$$

따라서 xy 의 최댓값은 9이다.

04 정답 ④

해설 $x \geq 1$ 에서 $3x - 2 > 0$ 이므로

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\begin{aligned} 3x + 6 + \frac{1}{3x-2} &= 3x - 2 + \frac{1}{3x-2} + 8 \\ &\geq 2\sqrt{(3x-2) \cdot \frac{1}{3x-2}} + 8 \\ &= 10 \end{aligned}$$

(단, 등호는 $3x - 2 = \frac{1}{3x-2}$, 즉 $x = 1$ 일 때 성립)

따라서 $x \geq 1$ 일 때, $3x + 6 + \frac{1}{3x-2}$ 은 $x = 1$ 에서

최솟값 10을 가지므로 $m = 10, n = 1$

$$\therefore m + n = 10 + 1 = 11$$

05 정답 ②

해설 x, y 가 실수이므로 코시-슈바르츠의 부등식에 의하여

$$(1^2 + 1^2)(x^2 + y^2) \geq (x + y)^2$$

그런데 $x + y = 2$ 이므로

$$2(x^2 + y^2) \geq 4$$

$$\therefore x^2 + y^2 \geq 2 \text{ (단, 등호는 } x = y \text{일 때 성립)}$$

따라서 $x^2 + y^2$ 의 최솟값은 2

06 정답 ②

해설 코시-슈바르츠의 부등식에 의하여

$$(2^2 + 3^2)(a^2 + b^2) \geq (2a + 3b)^2$$

(단, 등호는 $\frac{a}{2} = \frac{b}{3}$ 일 때 성립한다.)

$$13 \geq (2a + 3b)^2 \left(\because a^2 + b^2 = 1 \right)$$

$$\therefore -\sqrt{13} \leq 2a + 3b \leq \sqrt{13}$$

따라서 $2a + 3b$ 의 최댓값은 $\sqrt{13}$,

최솟값은 $-\sqrt{13}$ 이다.

$$\begin{aligned} \therefore M^2 + m^2 &= (\sqrt{13})^2 + (-\sqrt{13})^2 \\ &= 13 + 13 = 26 \end{aligned}$$

07 정답 30

해설 직사각형의 둘레의 길이가 20이므로
 $2x + 2y = 20 \quad \therefore x + y = 10$
 코시-슈바르츠의 부등식에 의하여

$$\{(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{10})^2\} \{(\sqrt{x})^2 + (\sqrt{y})^2\} \geq (\sqrt{5x} + \sqrt{10y})^2$$

 $15(x+y) \geq (\sqrt{5x} + \sqrt{10y})^2$
 그런데 $x+y=10$ 이므로
 $150 \geq (\sqrt{5x} + \sqrt{10y})^2$
 $\therefore -5\sqrt{6} \leq \sqrt{5x} + \sqrt{10y} \leq 5\sqrt{6}$
 $\left(\text{단, 등호는 } \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{10}} \text{ 일 때 성립} \right)$
 이때 $\sqrt{5x} > 0, \sqrt{10y} > 0$ 이므로
 $0 < \sqrt{5x} + \sqrt{10y} \leq 5\sqrt{6}$
 따라서 $\sqrt{5x} + \sqrt{10y}$ 의 최댓값은 $5\sqrt{6}$ 이므로
 $M = 5\sqrt{6}$
 $\therefore \sqrt{6}M = \sqrt{6} \cdot 5\sqrt{6} = 30$

08 정답 ③

해설 '세 자연수 a, b, c 에 대하여 모두 3의 배수가 아니면 $a^2 + b^2 \neq c^2$ 이다.'의 참, 거짓을 증명하기 위해
 $a = 3p \pm 1, b = 3q \pm 1, c = 3r \pm 1$ 이면
 $a^2 = 3(3p^2 \pm 2p) + 1, b^2 = 3(3q^2 \pm 2q) + 1$ 이므로
 $a^2 + b^2 = 3m + \boxed{2}$ (m 은 음이 아닌 정수)의 꼴이다.
 또, $c^2 = 3(3r^2 \pm 2r) + 1$ 이므로
 $c^2 = 3n + \boxed{1}$ (n 은 음이 아닌 정수)의 꼴이다.
 $\therefore a^2 + b^2 \neq c^2$
 따라서 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

09 정답 ③

해설 주어진 명제의 대우는
 'n이 6의 배수가 아니면 n^2 도 6의 배수가 아니다.'이다.
 k 가 자연수일 때 n 을 $6k-1$ 또는 $6k-2$ 또는 $6k-3$ 또는 $6k-4$ 또는 $6k-5$ 라 하면
 (i) $n = 6k-1$ 일 때, $n^2 = 6(6k^2 - 2k) + \boxed{1}$
 (ii) $n = 6k-2$ 일 때, $n^2 = 6(6k^2 - 4k) + 4$
 (iii) $n = 6k-3$ 일 때, $n^2 = 6(6k^2 - 6k + 1) + 3$
 (iv) $n = 6k-4$ 일 때, $n^2 = 6(6k^2 - 8k + 2) + 4$
 (v) $n = 6k-5$ 일 때,
 $n^2 = 6(6k^2 - 10k + 4) + \boxed{1}$
 즉, n^2 은 6으로 나누면 나머지가 1 또는 3 또는 4인 자연수가 되므로 n 이 6의 배수가 아니면 n^2 도 6의 배수가 아니다.
 따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.
 $f(k) = 6k-1, g(k) = 6k^2 - 6k + 1, a = 1$ 이므로
 $f(a) + g(a) = f(1) + g(1) = 5 + 1 = 6$

10 정답 ③

해설 주어진 명제의 대우 'mn이 홀수이면 $m^2 + n^2$ 은 짝수이다.'가 참임을 보이면 된다.
 mn 이 홀수이면 m, n 이 모두 홀수이므로
 $m = 2k-1, n = 2l-1$ (k, l 은 자연수)로 나타낼 수 있다.
 이때 $m^2 + n^2 = 2(2k^2 - 2k + 2l^2 - 2l + 1)$ 이므로
 $m^2 + n^2$ 은 짝수이다.
 따라서 대우가 참이므로 주어진 명제는 참이다.

11 정답 ⑤

해설 $\sqrt{2}$ 를 유리수라고 가정하면 $\sqrt{2} = \frac{q}{p}$ (p, q 는 서로소인 정수이다.)
 $\therefore \sqrt{2}p = q \quad \therefore 2p^2 = q^2$
 q^2 은 2의 배수이므로 q 도 2의 배수
 $q = 2k$ (k 는 정수)라 하면 $2p^2 = 4k^2$
 $\therefore p^2 = 2k^2$
 따라서 p 도 2의 배수
 이는 p, q 가 서로소인 조건에 모순
 따라서 $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아니다.
 (내서로소 내짝수 대짝수)

12 정답 ⑤

해설 $\sqrt{5}$ 를 유리수라고 가정하면

$$\sqrt{5} = \frac{q}{p} \quad (p, q \text{는 서로소인 정수이다.})$$

$$\therefore \sqrt{5}p = q$$

양변을 제곱하면 $5p^2 = q^2$ 이고

q^2 은 5의 배수이므로 q 는 5의 배수이다.

$q = 5k$ (k 는 정수)라 하면

$$5p^2 = 25k^2$$

$$\therefore p^2 = 5k^2$$

따라서 p 도 5의 배수이므로

이는 p, q 가 서로소인 조건에 모순이다.

즉, $\sqrt{5}$ 는 유리수가 아니다.

(가) 서로소 (나) 5의 배수 (다) 5의 배수

13 정답 ⑤

해설 주어진 명제의 결론을 부정하여

$a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$ 라 가정하면 $a^2 > 0$ 이거나

$b^2 > 0$ 이므로 $a^2 + b^2 > 0$ 이다.

그런데 이것은 $a^2 + b^2 = 0$ 이라는 가정에

모순되므로 $a = 0$ 이고 $b = 0$ 이다.

따라서 실수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2 = 0$ 이면

$a = 0$ 이고 $b = 0$ 이다.

14 정답 ②

해설 $\sqrt{n^2 + 1}$ 이 유리수라고 가정하면

$$\sqrt{n^2 + 1} = \frac{q}{p} \quad (p, q \text{는 서로소인 자연수})$$

로 놓을 수 있다.

이 식의 양변을 제곱하여 정리하면 $p^2(n^2 + 1) = q^2$ 이다.

p 는 q^2 의 약수이고 p, q 는 서로소인 자연수이므로

$p = 1$ 이 되어야 한다.

따라서 $n^2 = q^2 - 1$ 이다.

자연수 k 에 대하여

(i) $q = 2k$ 일 때

$$n^2 = (2k)^2 - 1 = 4k^2 - 1 \text{이고}$$

$$(2k-1)^2 < 4k^2 - 1 < (2k)^2 \text{이므로}$$

$$(2k-1)^2 < n^2 < (2k)^2$$

$$2k-1 < n < 2k$$

그러나 $2k-1, 2k$ 는 연속하는 두 자연수이므로

부등식을 만족시키는 자연수 n 은 존재하지 않는다.

(ii) $q = 2k+1$ 일 때

$$n^2 = (2k+1)^2 - 1 = 4k^2 + 4k \text{이고}$$

$$(2k)^2 < 4k^2 + 4k < (2k+1)^2 \text{이므로}$$

$$(2k)^2 < n^2 < (2k+1)^2$$

$$2k < n < 2k+1$$

그러나 $2k, 2k+1$ 는 연속하는 두 자연수이므로

부등식을 만족시키는 자연수 n 은 존재하지 않는다.

(i), (ii)에 의하여

$$\sqrt{n^2 + 1} = \frac{q}{p} \quad (p, q \text{는 서로소인 자연수})$$

를 만족하는 자연수 n 은 존재하지 않는다.

따라서 $\sqrt{n^2 + 1}$ 은 무리수이다.

$$f(q) = q^2 - 1, g(k) = (2k)^2 \text{이므로}$$

$$f(4) + g(2) = 16 - 1 + 16 = 31$$

15 정답 ①

해설 $(|x| + |y|)^2 - |x - y|^2$

$$= (|x|^2 + 2|x||y| + |y|^2) - (x - y)^2$$

$$= (x^2 + 2|xy| + y^2) - (x^2 - 2xy + y^2)$$

$$= 2(|xy| + xy) \geq 0 \quad (\because |xy| \geq -xy)$$

$$\therefore (|x| + |y|)^2 \geq |x - y|^2$$

그런데 $|x| + |y| \geq 0, |x - y| \geq 0$ 이므로

$$|x| + |y| \geq |x - y|$$

(단, 등호는 $|xy| = -xy$, 즉 $xy \leq 0$ 일 때 성립)

16 정답 ②

해설 $a - 3b = 8$ 이므로

$$\frac{3}{a} - \frac{1}{b} = \frac{3b - a}{ab} = -\frac{8}{ab}$$
 $ab < 0$ 이므로
 $a > 0, b < 0$ 또는 $a < 0, b > 0$
 이때 $a - 3b = 8$ 이므로
 $a > 0, b < 0$
 $a > 0, -3b > 0$ 이므로
 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
 $a + (-3b) \geq 2\sqrt{a \cdot (-3b)}$
 $8 \geq 2\sqrt{-3ab}$
 $-ab \leq \frac{16}{3}$
 (단, 등호는 $a = -3b$, 즉 $a = 4, b = -\frac{4}{3}$ 일 때 성립한다.)
 따라서

$$\frac{3}{a} - \frac{1}{b} = \frac{8}{-ab}$$

$$\geq \frac{8}{\frac{16}{3}} = \frac{3}{2}$$
 이므로 $\frac{3}{a} - \frac{1}{b}$ 의 최솟값은 $\frac{3}{2}$ 이다.

17 정답 ②

해설 $x > 0, y > 0$ 에서 $x^2 > 0, y^2 > 0$ 이므로
 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
 $5x^2 + 125y^2 \geq 2\sqrt{5x^2 \cdot 125y^2} = 50xy$
 그런데 $5x^2 + 125y^2 = 2$ 이므로
 $2 \geq 50xy$
 $\therefore xy \leq \frac{1}{25}$
 이때 등호는 $5x^2 = 125y^2$, 즉 $x = 5y$ 일 때 성립하므로
 $xy = \frac{1}{25}$ 에서 $5y \cdot y = \frac{1}{25}, y^2 = \frac{1}{125}$
 $\therefore x = \frac{\sqrt{5}}{5}, y = \frac{\sqrt{5}}{25}$
 따라서 xy 는 $x = \frac{\sqrt{5}}{5}, y = \frac{\sqrt{5}}{25}$ 일 때
 최댓값 $\frac{1}{25}$ 을 가지므로
 $\alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}, \beta = \frac{\sqrt{5}}{25}, \gamma = \frac{1}{25}$
 $\therefore \alpha\beta + \gamma = \frac{2}{25}$

18 정답 6

해설 주어진 이차방정식이 허근을 가지므로
 $D = 16 - 4a < 0$ 에서 $a - 4 > 0$

$$a - 4 + \frac{1}{a - 4} \geq 2\sqrt{(a - 4) \cdot \frac{1}{a - 4}}$$

$$= 2$$

$$a + \frac{1}{a - 4} = a - 4 + \frac{1}{a - 4} + 4$$

$$\geq 2 + 4 = 6$$
 (단, 등호는 $a - 4 = \frac{1}{a - 4}$ 일 때 성립한다.)
 따라서 $a = 5$ 일 때 최솟값 6을 갖는다.

19 정답 ②

해설 $x > 0, y > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에
 의하여

$$\left(2y + \frac{1}{4x}\right)\left(8x + \frac{12}{y}\right) = 16xy + 2 + 24 + \frac{3}{xy}$$

$$\geq 26 + 2\sqrt{16xy \cdot \frac{3}{xy}}$$

$$= 26 + 8\sqrt{3}$$
 (단, 등호는 $16xy = \frac{3}{xy}$, 즉 $xy = \frac{\sqrt{3}}{4}$ 일 때 성립)
 따라서 $\left(2y + \frac{1}{4x}\right)\left(8x + \frac{12}{y}\right)$ 의 최솟값은
 $26 + 8\sqrt{3}$

20 정답 ④

해설 $a > 0, b > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에
 의하여

$$(a + 2b)\left(\frac{2}{a} + \frac{9}{b}\right) = \frac{4b}{a} + \frac{9a}{b} + 20$$

$$\geq 2\sqrt{\frac{4b}{a} \cdot \frac{9a}{b}} + 20$$

$$= 32$$
 (단, 등호는 $\frac{4b}{a} = \frac{9a}{b}$, 즉 $3a = 2b$ 일 때
 성립한다.)
 따라서 $(a + 2b)\left(\frac{2}{a} + \frac{9}{b}\right)$ 의 최솟값은 32이다.

21 정답 ②

해설 $a > 0, b > 0, c > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\frac{2a+2b}{c} + \frac{2b+2c}{a} + \frac{2c+2a}{b}$$

$$= \frac{2a}{c} + \frac{2b}{c} + \frac{2b}{a} + \frac{2c}{a} + \frac{2c}{b} + \frac{2a}{b}$$

$$= \left(\frac{2a}{c} + \frac{2c}{a}\right) + \left(\frac{2b}{c} + \frac{2c}{b}\right) + \left(\frac{2b}{a} + \frac{2a}{b}\right)$$

$$\geq 2\sqrt{\frac{2a}{c} \cdot \frac{2c}{a}} + 2\sqrt{\frac{2b}{c} \cdot \frac{2c}{b}} + 2\sqrt{\frac{2b}{a} \cdot \frac{2a}{b}}$$

$$= 4 + 4 + 4$$

$$= 12$$

(단, 등호는

$$\frac{2a}{c} = \frac{2c}{a}, \frac{2b}{c} = \frac{2c}{b}, \frac{2b}{a} = \frac{2a}{b},$$

즉 $a = b = c$ 일 때 성립한다.)

따라서 $\frac{2a+2b}{c} + \frac{2b+2c}{a} + \frac{2c+2a}{b}$ 의 최솟값은 12이다.

22 정답 25

해설 직각을 낀 두 윗타리의 길이를 각각 x m, y m라 하면

$$x^2 + y^2 = 10^2 = 100$$

$x^2 > 0, y^2 > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$x^2 + y^2 \geq 2\sqrt{x^2 y^2} = 2xy$$

그런데 $x^2 + y^2 = 100$ 이므로

$$100 \geq 2xy$$

$$\therefore xy \leq 50 \text{ (단, 등호는 } x = y \text{일 때 성립)}$$

따라서 땅의 넓이는 $\frac{1}{2}xy$ 이므로

$$\frac{1}{2}xy \leq \frac{1}{2} \cdot 50 = 25$$

따라서 땅의 넓이의 최댓값은 25 m²이다.

$$\therefore k = 25$$

23 정답 32

해설 직사각형의 가로, 세로의 길이를 각각 x, y 라 하면 넓이 S 는

$$S = xy$$

또, 통나무의 단면의 지름의 길이가 8이므로

$$x^2 + y^2 = 8^2 = 64$$

이때 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$x^2 + y^2 \geq 2\sqrt{x^2 y^2} = 2xy$$

$$64 \geq 2xy$$

$$\therefore xy \leq 32$$

따라서 S 는 $x^2 = y^2$ 일 때, 즉 $x = y = 4\sqrt{2}$ 일 때, 최댓값 32를 갖는다.

24 정답 7

해설 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$a^2 + b^2 \geq 2\sqrt{a^2 b^2}$$

$$= 2|ab| \text{ (단, 등호는 } |a| = |b| \text{일 때 성립)}$$

$$c^2 + d^2 \geq 2\sqrt{c^2 d^2}$$

$$= 2|cd| \text{ (단, 등호는 } |c| = |d| \text{일 때 성립)}$$

$$a^2 + b^2 = 56, c^2 + d^2 = 126 \text{이므로}$$

$$56 \geq 2|ab|, 126 \geq 2|cd|$$

$$\therefore -28 \leq ab \leq 28, -63 \leq cd \leq 63$$

(단, 등호는 $|a| = |b| = 2\sqrt{7}, |c| = |d| = 3\sqrt{7}$ 일 때 성립)

$$-28 + (-63) \leq ab + cd \leq 28 + 63$$

$$\therefore -91 \leq ab + cd \leq 91$$

즉, $ab + cd$ 의 최댓값은 91

a, b, c, d 가 실수이므로 코시-슈바르츠의 부등식에 의하여

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2 \text{이므로}$$

$$56 \cdot 126 \geq (ac + bd)^2$$

$$\therefore -84 \leq ac + bd \leq 84$$

(단, 등호는 $\frac{c}{a} = \frac{d}{b}$ 일 때 성립)

즉, $ac + bd$ 의 최솟값은 -84


$$p = 91, q = -84 \text{이므로 } p + q = 7$$

25 정답 50

해설 원 $x^2 + y^2 = 50$ 위의 점 $P(a, b)$ 에서의 접선의 방정식은 $ax + by = 50$

이 접선이 x 축, y 축과 만나는 점은 각각

$$A\left(\frac{50}{a}, 0\right), B\left(0, \frac{50}{b}\right)$$



이때 $\triangle OAB$ 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{50}{a} \cdot \frac{50}{b} = \frac{50^2}{2ab}$$

점 $P(a, b)$ 는 원 $x^2 + y^2 = 50$ 위의 점이므로

$$a^2 + b^2 = 50$$

$a > 0, b > 0$ 이므로

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$a^2 + b^2 \geq 2\sqrt{a^2b^2} = 2ab$$

$\therefore 50 \geq 2ab$ (단, 등호는 $a = b$ 일 때 성립)

$$\frac{1}{2ab} \geq \frac{1}{50}$$

$$\therefore \frac{50^2}{2ab} \geq 50$$

따라서 $\triangle OAB$ 의 넓이의 최솟값은 50이다.