

# 개념원리(2025) - 공통수학2 (무리함수)277~291p

무리함수의 그래프

실시일자	-
45문제 / DRE수학	

## 유형별 학습

이름

01

[2008년 3월 고2 1번]

$\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1} + \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$ 의 값은?

- ① 3                      ② 4                      ③  $2(\sqrt{2}+1)$   
 ④  $4\sqrt{2}$               ⑤ 6


02

함수  $y = -\sqrt{x+a} - a + 6$ 의 그래프가 점  $(-a, a)$ 를 지날 때, 이 함수의 치역은?

- ①  $\{y|y \leq -3\}$     ②  $\{y|y \geq -3\}$     ③  $\{y|y \leq 3\}$   
 ④  $\{y|y \geq 3\}$     ⑤  $\{y|y \leq 9\}$

03

함수  $y = 2\sqrt{-3x+6} + 1$ 의 그래프는?



04

$2 \leq x \leq 7$ 에서 함수  $y = \sqrt{x+2} - 2$ 의 최댓값을  $M$ , 최솟값을  $m$ 이라 할 때,  $M+m$ 의 값은?

- ① -1                      ② 0                      ③ 1  
 ④ 2                      ⑤ 3

05 무리식  $\frac{\sqrt{5-x}}{\sqrt{x+2}}$ 의 값이 실수가 되도록 하는 모든  
정수  $x$ 의 값의 합을 구하시오.

06  $\sqrt{x+4} + \frac{1}{\sqrt{5-2x}}$ 의 값이 실수가 되도록 하는 정수  
 $x$ 의 개수는?  
① 1                      ② 3                      ③ 5  
④ 7                      ⑤ 9

07 함수  $y = \sqrt{5x+2}$ 의 정의역을  $A$ , 함수  
 $y = \sqrt{16-4x}$ 의 정의역을  $B$ 라 할 때,  $A \cap B$ 에  
속하는 정수의 개수는?  
① 4                      ② 5  
③ 6                      ④ 7  
⑤ 8

08 함수  $y = \sqrt{-3x+2a+b}$ 의 정의역이  $\{x \mid x \leq 2\}$ ,  
치역이  $\{y \mid y \geq 3\}$ 일 때, 상수  $a, b$ 의 곱  $ab$ 의  
값은?  
① 5                      ② 6  
③ 7                      ④ 8  
⑤ 9

09 무리함수  $y = -\sqrt{1-x} - 2$ 의 정의역이  $\{x \mid x \leq a\}$ ,  
치역이  $\{y \mid y \leq b\}$ 일 때,  $ab$ 의 값을 구하시오.

10 [2017년 11월 고1 4번 변형]  
무리함수  $f(x) = \sqrt{2x+k}$ 에 대하여  $f(-2) = 3$ 일 때,  
상수  $k$ 의 값은?  
① 11                      ② 12                      ③ 13  
④ 14                      ⑤ 15

11 함수  $y = -\sqrt{4-x} + 1$ 에 대하여 다음 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>
 

ㄱ. 정의역은  $\{x|x \leq 4\}$ 이다.  
 ㄴ. 치역은  $\{y|y \leq 1\}$ 이다.  
 ㄷ. 그래프는 제2사분면을 지난다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 [2017년 11월 고1 4번/3점]  
무리함수  $f(x) = \sqrt{x+k}$ 에 대하여  $f(-1) = 2$ 일 때, 상수  $k$ 의 값은?

- ① 5                      ② 6                      ③ 7  
 ④ 8                      ⑤ 9

13 [2014년 3월 고2 이과 3번/2점]  
무리함수  $f(x) = \sqrt{ax+3}$ 에 대하여  $f(2) = 5$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 11                      ② 12                      ③ 13  
 ④ 14                      ⑤ 15

14 함수  $y = \sqrt{6-3x} + 1$ 에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 정의역은  $\{x|x \leq 2\}$ 이다.  
 ② 치역은  $\{y|y \geq 1\}$ 이다.  
 ③ 그래프는 점  $(2, 0)$ 을 지난다.  
 ④ 그래프는  $y = \sqrt{-3x}$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.  
 ⑤ 그래프는 제2사분면을 지난다.

15 함수  $y = \sqrt{3x-2} - 6$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프가 점  $(-6, k)$ 를 지날 때, 상수  $k$ 의 값은?

- ① -2                      ② -1                      ③ 0  
 ④ 1                        ⑤ 2

16 무리함수  $y = \sqrt{2-x}$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로 -4만큼,  $y$ 축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 후  $y$ 축에 대하여 대칭이동하면  $y = \sqrt{ax+b} + c$ 의 그래프와 일치한다. 이때 상수  $a, b, c$ 에 대하여  $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

- 17** 점  $(-1, -2)$ 를 지나는 함수  $y = \sqrt{ax+1}+b$ 의 그래프는 함수  $y = \sqrt{-3x}$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로  $c$ 만큼,  $y$ 축의 방향으로  $d$ 만큼 평행이동한 것이다. 이때, 상수  $a, b, c, d$ 의 곱  $abcd$ 의 값은?


- ①  $-20$       ②  $-16$       ③  $-12$   
④  $-8$       ⑤  $-4$

- 18** 함수  $y = \sqrt{8-4x}$ 의 정의역을  $A$ , 함수  $y = \sqrt{3x+9}$ 의 정의역을  $B$ 라 할 때,  $A \cap B$ 의 원소 중에서 정수의 개수는?

- ① 2      ② 3      ③ 4  
④ 5      ⑤ 6


- 19**  $0 \leq x \leq 3$ 일 때, 함수  $y = 4\sqrt{x+1}+k$ 의 최댓값을  $M$ , 최솟값을  $m$ 이라 하자.  $M+m=30$ 일 때, 상수  $k$ 의 값을 구하시오.

- 20** 무리함수  $y = -\sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때  $abc$ 의 값은?



- ①  $-8$       ②  $-4$       ③ 0  
④ 4      ⑤ 8

- 21** [2013년 3월 고2 문과 23번/3점]  
무리함수  $f(x) = \sqrt{4x+a}+b$ 의 그래프가 그림과 같다.



이때  $a+b$ 의 값을 구하시오. (단,  $a, b$ 는 실수이다.)

- 22 함수  $y = \sqrt{3x+b}-4$ 의 정의역이  $\{x|x \geq a\}$ 이고 그래프가 점  $(4, -1)$ 을 지날 때  $a+b$ 의 값을 구하시오. (단,  $a, b$ 는 상수이다.)

- 23 두 함수  $y = \sqrt{x+1}+2$ ,  $y = mx$ 의 그래프가 서로 만나지 않도록 하는 실수  $m$ 의 값의 범위는  $a < m \leq b$ 이다. 이때  $a+b$ 의 값은?

- ①  $-4$                       ②  $-3$                       ③  $-2$   
④  $-1$                       ⑤  $0$

- 24 이차함수  $y = ax^2 - bx + 7$  ( $x \geq 2$ )의 역함수가  $y = \sqrt{x-3}+2$ 일 때, 두 상수  $a, b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값을 구하시오.

- 25 두 함수  $f(x) = x^2 + 1$ ,  $g(x) = \sqrt{x-1}+2$ 에 대하여  $(f \circ g)(2) + (g \circ f)(2)$ 의 값은?

- ① 11                      ② 12                      ③ 13  
④ 14                      ⑤ 15

- 26 무리함수  $y = -\sqrt{2x-4}+1$ 에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 정의역은  $\{x|x \geq 2\}$ 이다.  
② 치역은  $\{y|y \leq 1\}$ 이다.  
③ 그래프는  $y = -\sqrt{2x}$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로 2만큼,  $y$ 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.  
④ 그래프는 제1, 4사분면을 지난다.  
⑤ 역함수는  $y = \frac{1}{2}x^2 - x + 5$  ( $x \leq 1$ )이다.

- 27 함수  $y = \sqrt{x-3}+a$ 의 정의역이  $\{x|x \geq b\}$ , 치역이  $\{y|y \geq 2\}$ 일 때, 상수  $a, b$ 에 대하여  $ab$ 의 값은?

- ①  $-6$                       ②  $-2$                       ③ 1  
④ 2                      ⑤ 6

- 28** 함수  $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프와 직선  $y = x$ 의 교점 중 한 점의  $x$ 좌표가 8이다. 함수  $y = \sqrt{ax+b}$ 의 그래프가 직선  $y = x$ 에 접할 때, 상수  $a, b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값을 구하시오.

- 29** 함수  $y = a\sqrt{x}$  ( $a < 0$ )의 그래프를  $x$ 축의 방향으로  $-1$ 만큼,  $y$ 축의 방향으로  $2$ 만큼 평행이동한 그래프가 함수  $y = \frac{2x-3}{x-1}$ 의 그래프와 제4사분면에서 만날 때, 상수  $a$ 의 값의 범위는?

- ①  $a < -2$                       ②  $a < -\frac{2\sqrt{10}}{5}$   
 ③  $a < -\frac{\sqrt{10}}{5}$                       ④  $-2 < a < -\frac{2\sqrt{10}}{5}$   
 ⑤  $-2 < a < -\frac{\sqrt{10}}{5}$

- 30**  $f(x) = \sqrt{x-1} + 1$ 과 그 역함수를  $g(x)$ 라 할 때,  $g(x)$ 와  $f(x)$ 와  $g(x)$ 의 교점 사이의 거리를 각각 옳게 구한 것은?

- ①  $g(x) = x^2 - 2x + 2$  ( $x \geq 1$ ),  $\sqrt{3}$   
 ②  $g(x) = x^2 - 2x + 2$  ( $x \geq 1$ ),  $\sqrt{2}$   
 ③  $g(x) = x^2 - 2x + 1$  ( $x \geq 1$ ),  $\sqrt{2}$   
 ④  $g(x) = x^2 - 2x + 1$  ( $x \geq 1$ ),  $\sqrt{3}$   
 ⑤  $g(x) = x^2 - 2x + 1$  ( $x \geq 1$ ),  $\sqrt{5}$

- 31** 함수  $f(x) = \sqrt{10x-21}$ 의 그래프와 그 역함수  $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프는 서로 다른 두 점에서 만난다. 이 두 교점 사이의 거리는?

- ① 1                      ②  $2\sqrt{3}$                       ③ 3  
 ④  $4\sqrt{2}$                       ⑤ 5

- 32** 함수  $f(x) = \sqrt{2x-2} + 1$ 에 대하여  $y = f(x)$ 의 그래프와 그 역함수  $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점 P, Q에서 만날 때 선분 PQ의 길이는?

- ①  $\sqrt{2}$                       ②  $\sqrt{5}$                       ③  $2\sqrt{2}$   
 ④ 3                      ⑤  $4\sqrt{2}$

- 33** 함수  $y = -\sqrt{x-a} + a + 4$ 의 그래프가 점  $(a, -a)$ 를 지날 때, 이 함수의 치역은? (단,  $a$ 는 상수이다.)

- ①  $\{y|y \leq -2\}$     ②  $\{y|y \geq -2\}$     ③  $\{y|y \leq 1\}$   
 ④  $\{y|y \geq 2\}$     ⑤  $\{y|y \leq 2\}$


- 34** 두 함수  $y = \sqrt{4x+16}$ ,  $y = \sqrt{4x-8}$ 의 그래프와  $x$ 축 및 직선  $y=4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

- 35** 두 함수  $f(x) = \frac{3x-1}{x-3}$ ,  $g(x) = \sqrt{2x-1} + 4$ 에 대하여  $(g^{-1} \circ f)(4)$ 의 값은?

- ① 24                      ② 25                      ③ 26  
④ 27                      ⑤ 28

- 36** 정의역이  $\{x \mid x \geq -k^2\}$ 인 함수  $y = \sqrt{x+k^2} - k^2 + 6$ 의 그래프가 제4사분면만 지나지 않도록 하는 실수  $k$ 의 값의 범위가  $a < k < b$  또는  $c < k < d$ 일 때,  $(ad+bc)^2$ 의 값을 구하시오. (단,  $b < c$ )

- 37** 이차함수  $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음 중 무리함수  $y = \sqrt{ax+b} + c$ 의 그래프의 개형으로 적당한 것은?



- ①      ②   
③      ④   
⑤

- 38** [2019년 11월 고3 문과 10번/3점]  
함수  $y = \sqrt{4-2x} + 3$ 의 역함수의 그래프와 직선  $y = -x + k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수  $k$ 의 최솟값은?

- ① 1                      ② 3                      ③ 5  
④ 7                      ⑤ 9

**39** 함수  $y = \sqrt{ax+b}$ 의 그래프가 점  $(3, 5)$ 를 지나고, 그 역함수의 그래프가 점  $(3, -1)$ 을 지날 때, 상수  $a, b$ 에 대하여  $ab$ 의 값을 구하시오.

**40** 함수  $f(x) = \sqrt{a-x}+b$ 의 역함수를  $g(x)$ 라 할 때,  $f(x)$ 의 정의역은  $\{x|x \leq -3\}$ 이고,  $g(x)$ 의 정의역은  $\{x|x \geq -7\}$ 이다. 상수  $a, b$ 에 대하여  $ab$ 의 값을 구하시오.

**41** 무리함수  $f(x) = \sqrt{ax+b}$ 와 그 역함수  $f^{-1}(x)$ 에 대하여  $f(1)=4$ ,  $f^{-1}(3)=2$ 일 때,  $a-b$ 의 값을 구하시오. (단,  $a, b$ 는 상수)

**42** 무리함수  $y = 2\sqrt{|2x-1|}$ 의 그래프가 직선  $y=kx$ 와 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 정수  $k$ 의 개수는?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤ 5

**43** 두 함수  $y = \sqrt{x+2}$ 와  $x = \sqrt{y+2}$ 의 그래프의 교점의 좌표를  $(a, b)$ 라 할 때,  $a+b$ 의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤  $\frac{7}{5}$

**44** 두 함수  $f(x) = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}k$  ( $x \geq 0$ ),  $g(x) = \sqrt{4x-2k}$ 에 대하여  $y=f(x)$ ,  $y=g(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 모든 정수  $k$ 의 개수는?

- ① 2                      ② 3                      ③ 4  
④ 5                      ⑤ 6



45

함수  $f(x)=\sqrt{\frac{1}{2}x+3}$ 에 대하여

함수  $y=f(x)$ 의 그래프가  $y$ 축과 만나는 점을 A,

함수  $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가  $x$ 축과 만나는 점을 B,

두 함수  $y=f(x)$ ,  $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점을 C라

할 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ①  $3\sqrt{2}-\frac{1}{2}$       ②  $2\sqrt{3}-1$       ③  $3\sqrt{2}-1$   
④  $2\sqrt{3}-\frac{3}{2}$       ⑤  $3\sqrt{2}-\frac{3}{2}$

# 개념원리(2025) - 공통수학2 (무리함수)277~291p

무리함수의 그래프

실시일자	-
45문제 / DRE수학	

유형별 학습

이름

빠른정답

01 ⑤	02 ③	03 ①
04 ③	05 14	06 ④
07 ②	08 ⑤	09 -2
10 ③	11 ③	12 ①
13 ①	14 ③	15 ⑤
16 -4	17 ②	18 ⑤
19 9	20 ⑤	21 11
22 -2	23 ③	24 5
25 ④	26 ⑤	27 ⑤
28 -8	29 ②	30 ②
31 ④	32 ③	33 ⑤
34 24	35 ②	36 225
37 ②	38 ③	39 52
40 21	41 -30	42 ①
43 ④	44 ①	45 ④

# 개념원리(2025) - 공통수학2 (무리함수)277~291p

무리함수의 그래프

실시일자	-
45문제 / DRE수학	

## 유형별 학습

이름

### 01 정답 ⑤

**해설** 무리식을 계산할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$$\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1} + \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} = \frac{(\sqrt{2}-1)^2 + (\sqrt{2}+1)^2}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)}$$

$$= (3-2\sqrt{2}) + (3+2\sqrt{2}) = 6$$

### 02 정답 ③

**해설** 함수  $y = -\sqrt{x+a} - a + 6$ 의 그래프가 점  $(-a, a)$ 를 지나므로

$$a = -\sqrt{-a+a} - a + 6, 2a = 6$$

$$\therefore a = 3$$

따라서  $y = -\sqrt{x+3} - 3 + 6$ , 즉

$y = -\sqrt{x+3} + 3$ 이므로 이 함수의 치역은  $\{y | y \leq 3\}$ 이다.

### 03 정답 ①

**해설**  $y = 2\sqrt{-3x+6} + 1$


$$= 2\sqrt{-3(x-2)} + 1$$

주어진 함수는 점  $(2, 1)$ 에서 시작하여

정의역이  $x \leq 2$ 이고 치역이  $y \geq 1$ 이므로 그래프는 ①이다.

### 04 정답 ③

**해설** 함수  $y = \sqrt{x+2} - 2$ 의 그래프는  $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로  $-2$ 만큼,  $y$ 축의 방향으로  $-2$ 만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



따라서  $2 \leq x \leq 7$ 에서 이 함수는  $x = 2$ 일 때 최솟값 0,  $x = 7$ 일 때 최댓값 1을 가지므로  $M = 1, m = 0$ 이다.

$$\therefore M + m = 1 + 0 = 1$$

### 05 정답 14

**해설**  $5 - x \geq 0$ 이므로

$$x \leq 5 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$x + 2 > 0 \text{이므로 } x > -2 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } -2 < x \leq 5$$

따라서 정수  $x$ 는  $-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 이므로 구하는 합은  $-1 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 14$

### 06 정답 ④

**해설**  $x + 4 \geq 0$ 에서  $x \geq -4$

$$5 - 2x > 0 \text{에서 } x < \frac{5}{2}$$

$$\therefore -4 \leq x < \frac{5}{2} \text{를 만족시키는 정수 } x \text{는}$$

$-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2$ 의 7개이다.

### 07 정답 ②

**해설** 함수  $y = \sqrt{5x+2}$ 의 정의역은

$$5x + 2 \geq 0 \text{에서 } x \geq -\frac{2}{5} \text{이므로}$$

$$\left\{x \mid x \geq -\frac{2}{5}\right\} \text{이다.}$$

$$\therefore A = \left\{x \mid x \geq -\frac{2}{5}\right\}$$

함수  $y = \sqrt{16-4x}$ 의 정의역은

$$16 - 4x \geq 0 \text{에서 } x \leq 4 \text{이므로 } \{x \mid x \leq 4\} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } A \cap B = \left\{x \mid -\frac{2}{5} \leq x \leq 4\right\} \text{이므로 } A \cap B \text{에}$$

속하는 정수는  $0, 1, 2, 3, 4$ 의 5개이다.

## 08 정답 ⑤

**해설** 함수  $y = \sqrt{-3x+2a} + b$ 의 정의역은

$$-3x+2a \geq 0 \text{에서 } x \leq \frac{2a}{3} \text{ 이므로}$$

$$\left\{x \mid x \leq \frac{2a}{3}\right\} \text{ 이다.}$$

이때, 이 함수의 정의역이  $\{x \mid x \leq 2\}$  이므로

$$\frac{2a}{3} = 2 \quad \therefore a = 3$$

또한 이 함수의 치역은

$$\sqrt{-3x+2a} \geq 0 \text{에서}$$

$$y = \sqrt{-3x+2a} + b \geq 0 + b = b, \text{ 즉 } y \geq b \text{ 이므로}$$

$$\{y \mid y \geq b\} \text{ 이다.}$$

이때, 이 함수의 치역이  $\{y \mid y \geq 3\}$  이므로  $b = 3$

$$\therefore ab = 3 \cdot 3 = 9$$

## 09 정답 -2

**해설** 주어진 무리함수의 정의역은  $1-x \geq 0$ 에서

$$x \leq 1 \text{ 이므로 } \{x \mid x \leq 1\}$$

$$\therefore a = 1$$

이때  $-\sqrt{1-x} \leq 0$ 이므로 치역은  $\{y \mid y \leq -2\}$

$$\therefore b = -2$$

$$\therefore ab = -2$$

## 10 정답 ③


**해설**  $f(-2) = 3$ 이므로  $f(x) = \sqrt{2x+k}$ 에서

$$\sqrt{-4+k} = 3$$

$$\therefore k = 13$$

## 11 정답 ③

**해설** 함수  $y = -\sqrt{4-x} + 1$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



ㄱ. 정의역은  $\{x \mid x \leq 4\}$ 이다. (참)

ㄴ. 치역은  $\{y \mid y \leq 1\}$ 이다. (참)

ㄷ. 그래프는 제2사분면을 지나지 않는다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

## 12 정답 ①

**해설** 무리함수 이해하기

$$f(-1) = 2 \text{ 이므로}$$

$$f(x) = \sqrt{x+k} \text{에서 } \sqrt{-1+k} = 2$$

$$\text{따라서 } k = 5$$

## 13 정답 ①

**해설** 함수값을 이용하여 무리함수를 구한다.

$$f(2) = 5 \text{ 이므로}$$

$$\sqrt{2a+3} = 5$$

$$\text{양변을 제곱하면 } 2a+3 = 25$$


$$2a = 22$$

$$\therefore a = 11$$

## 14 정답 ③

**해설**  $y = \sqrt{6-3x} + 1 = \sqrt{-3(x-2)} + 1$ 이므로

함수  $y = \sqrt{6-3x} + 1$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



그래프는 점 (2, 1)을 지난다.

따라서 옳지 않은 것은 ③

## 15 정답 ⑤

**해설**  $y = \sqrt{3x-2} - 6$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$$-y = \sqrt{3(-x)-2} - 6$$

$$\therefore y = -\sqrt{-3x-2} + 6$$

이 함수의 그래프가 점  $(-6, k)$ 를 지나므로

$$k = -\sqrt{-3 \cdot (-6)-2} + 6$$

$$= -4 + 6 = 2$$

## 16 정답 -4

**해설**  $y = \sqrt{2-x}$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로  $-4$ 만큼,  
 $y$ 축의 방향으로  $-3$ 만큼 평행이동한 그래프의 식은  
 $y+3 = \sqrt{2-(x+4)}$   
 $\therefore y = \sqrt{-x-2}-3$   
 이 그래프를  $y$ 축에 대하여 대칭 이동한 그래프의 식은  
 $y = \sqrt{-(-x)-2}-3$   
 $\therefore y = \sqrt{x-2}-3$   
 따라서  $\sqrt{x-2}-3 = \sqrt{ax+b}+c$ 이므로  
 $a=1, b=-2, c=-3$   
 $\therefore a+b+c=-4$

## 17 정답 ②


**해설** 함수  $y = \sqrt{-3x}$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로  
 $c$ 만큼,  $y$ 축의 방향으로  $d$ 만큼 평행이동하면  
 $y = \sqrt{-3(x-c)}+d = \sqrt{-3x+3c+d}$   
 즉,  $y = \sqrt{ax+1}+b = \sqrt{-3x+3c+d}$ 이므로  
 $a=-3, 3c=1, d=b$   
 $\therefore a=-3, c=\frac{1}{3}, d=b$   
 $\therefore y = \sqrt{-3x+1}+b$   
 이 함수의 그래프가 점  $(-1, -2)$ 를 지나므로  
 $-2 = \sqrt{3+1}+b, 2+b=-2$   
 $\therefore b=d=-4$   
 $\therefore abcd = (-3) \cdot (-4) \cdot \frac{1}{3} \cdot (-4) = -16$

## 18 정답 ⑤

**해설**  $8-4x \geq 0$ 이므로  $4x \leq 8 \therefore x \leq 2$   
 $\therefore A = \{x | x \leq 2\}$   
 $3x+9 \geq 0$ 이므로  $3x \geq -9 \therefore x \geq -3$   
 $\therefore B = \{x | x \geq -3\}$   
 따라서  $A \cap B = \{x | -3 \leq x \leq 2\}$ 이므로  
 집합  $A \cap B$ 의 원소 중에서 정수는  
 $-3, -2, -1, 0, 1, 2$ 의 6개이다.

## 19 정답 9

**해설**  $y = 4\sqrt{x+1}+k$ 의 그래프는  $y = 4\sqrt{x}$ 의 그래프를  
 $x$ 축의 방향으로  $-1$ 만큼,  $y$ 축의 방향으로  $k$ 만큼  
 평행이동한 것이다.  
 따라서  $0 \leq x \leq 3$ 에서  $y = 4\sqrt{x+1}+k$ 의 그래프는  
 다음 그림과 같으므로



$x=3$ 일 때 최댓값  $4\sqrt{3+1}+k=8+k$ ,

$x=0$ 일 때 최솟값  $4\sqrt{0+1}+k=4+k$

를 갖는다.

즉,  $M=8+k, m=4+k$ 이므로  $M+m=30$ 에서

$(8+k)+(4+k)=30$

$2k=18 \therefore k=9$

## 20 정답 ⑤

**해설** 주어진 그래프는 시작점이  $(-2, 1)$ 이고,  
 정의역이  $\{x | x \geq -2\}$ , 치역이  $\{y | y \leq 1\}$ 이므로  
 구하는 식은  $y = -\sqrt{a(x+2)}+1 \cdots \cdots ㉞$ 의  
 꼴이다.  
 그래프가 점  $(0, -1)$ 을 지나므로 ㉞에 대입하면  
 $-1 = -\sqrt{2a}+1 \therefore a=2$   
 $\therefore y = -\sqrt{2(x+2)}+1 = -\sqrt{2x+4}+1$   
 $y = -\sqrt{ax+b}+c$ 와 비교하면  
 $b=4, c=1 \therefore abc=8$

## 21 정답 11

**해설** 무리함수 이해하기

$$f(x) = \sqrt{4(x+3)}-1$$

$$= \sqrt{4x+12}-1$$


$$a=12, b=-1 \text{ 이므로 } a+b=11$$

## 22 정답 -2

**해설**  $y = \sqrt{3x+b}-4$ 의 그래프가 점  $(4, -1)$ 을 지나므로  
 $-1 = \sqrt{b+12}-4, \sqrt{b+12}=3$   
 $\therefore b=-3$   
 즉, 함수  $y = \sqrt{3(x-1)}-4$ 의 정의역은  $\{x|x \geq 1\}$   
 따라서  $a=1, b=-3$   
 $\therefore a+b=-2$

## 23 정답 ③

**해설** 다음 그림에서 두 함수의 그래프가 만나지 않으려면  
 $m$ 의 값의 범위는  $-2 < m \leq 0$ 이어야 한다.



따라서  $a=-2, b=0$ 이므로  
 $a+b=-2$

## 24 정답 5


**해설** 이차함수  $y = ax^2 - bx + 7$  ( $x \geq 2$ )의 역함수가  
 $y = \sqrt{x-3}+2$ 일 때, 함수  $y = \sqrt{x-3}+2$ 의 역함수도  
 $y = ax^2 - bx + 7$  ( $x \geq 2$ )이다.  
 따라서  $y = \sqrt{x-3}+2$ 에서  
 $y-2 = \sqrt{x-3}, x-3 = (y-2)^2$   
 $x = y^2 - 4y + 7$   
 이때  $x, y$ 를 서로 바꾸면 역함수는  
 $y = x^2 - 4x + 7$  ( $x \geq 2$ )  
 따라서  $a=1, b=4$ 이므로  
 $a+b=5$

## 25 정답 ④

**해설**  $(f \circ g)(2) = f(g(2)) = f(3) = 10$   
 $(g \circ f)(2) = g(f(2)) = g(5) = 4$   
 $\therefore (f \circ g)(2) + (g \circ f)(2) = 10 + 4 = 14$

## 26 정답 ⑤

**해설**  $y = -\sqrt{2x-4}+1 = -\sqrt{2(x-2)}+1$   
 이므로 이 함수의 그래프는 다음 그림과 같다.



- ① 정의역은  $\{x|x \geq 2\}$ 이다. (참)
- ② 치역은  $\{y|y \leq 1\}$ 이다. (참)
- ③  $y = -\sqrt{2x-4}+1$ 의 그래프는  
 $y = -\sqrt{2x}$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로 2만큼,  
 $y$ 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다. (참)
- ④ 그래프는 제1, 4사분면을 지난다. (참)
- ⑤  $y = -\sqrt{2x-4}+1$ 에서  
 $y-1 = -\sqrt{2x-4}$   
 양변을 제곱하면  $(y-1)^2 = 2x-4$   
 $\therefore x = \frac{1}{2}(y-1)^2 + 2 = \frac{1}{2}y^2 - y + \frac{5}{2}$   
 따라서 역함수는  $y = \frac{1}{2}x^2 - x + \frac{5}{2}$  ( $x \leq 1$ )  
 (거짓)

## 27 정답 ⑤

**해설**  $x-3 \geq 0$ 이므로  $x \geq 3$   
 즉, 주어진 함수의 정의역이  $\{x|x \geq 3\}$ 이므로  
 $b=3$   
 또, 함수  $y = \sqrt{x-3}+a$ 에서  $\sqrt{x-3} \geq 0$ 이므로  
 치역은  $\{y|y \geq a\}$   
 $\therefore a=2$   
 $\therefore ab=6$

## 28 정답 -8


**해설** 함수  $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프와 직선  $y = x$ 의 교점 중 한  
 점의  $x$ 좌표가 8이므로  
 $\sqrt{8a} = 8, 8a = 64 \therefore a = 8$   
 따라서 함수  $y = \sqrt{ax+b} = \sqrt{8x+b}$ 의 그래프가  
 직선  $y = x$ 에 접하므로  $\sqrt{8x+b} = x$ 의 양변을 제곱하면  
 $8x+b = x^2 \therefore x^2 - 8x - b = 0$   
 이 이차방정식의 판별식을  $D$ 라 하면  
 $\frac{D}{4} = (-4)^2 - 1 \cdot (-b) = 0$   
 $16+b=0 \therefore b=-16$   
 $\therefore a+b=-8$

## 29 정답 ②

**해설** 함수  $y = a\sqrt{x}$  ( $a < 0$ )의 그래프를  $x$ 축의 방향으로 -1만큼,  $y$ 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프의 식은  $y = a\sqrt{x+1}+2$

$$y = \frac{2x-3}{x-1} = 2 - \frac{1}{x-1} \text{ 이므로}$$

$$y = \frac{2x-3}{x-1} \text{의 그래프는 다음 그림과 같다.}$$



함수  $y = a\sqrt{x+1}+2$ 의 그래프가

함수  $y = \frac{2x-3}{x-1}$ 의 그래프와 제4사분면에서 만나려면

$$x = \frac{3}{2} \text{ 일 때 } y = a\sqrt{x+1}+2 < 0 \text{ 이어야 하므로}$$

$$a\sqrt{\frac{3}{2}+1}+2 < 0, a\sqrt{\frac{5}{2}} < -2$$

$$\therefore a < -\frac{2\sqrt{10}}{5}$$

## 30 정답 ②

**해설**  $f(x) = \sqrt{x-1}+1$ 에 대하여

$y = \sqrt{x-1}+1$ 로 놓고 역함수를 구하면

$$y-1 = \sqrt{x-1} \quad \dots \textcircled{1}$$

①을 제곱하면

$$(y-1)^2 = x-1$$

$$y^2 - 2y + 1 = x - 1$$

$$x = y^2 - 2y + 2$$

$$\therefore g(x) = x^2 - 2x + 2 \ (x \geq 1)$$

이때  $f(x)$ 와 역함수  $g(x)$ 의 교점은

$f(x)$ 와  $y=x$  또는  $g(x)$ 와  $y=x$ 의 교점을 구하면 된다.

$$g(x) = x \text{에서 } x^2 - 2x + 2 = x$$

$$x^2 - 3x + 2 = 0, (x-2)(x-1) = 0$$

$$\therefore x = 2 \text{ 또는 } x = 1$$


즉,  $x=2$ 일 때,  $y=2$ 이고,  $x=1$ 일 때,  $y=1$ 이다.

따라서 두 점  $(1, 1)$ ,  $(2, 2)$  사이의 거리는

$$\sqrt{(2-1)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{2}$$

## 31 정답 ④

**해설** 함수  $f(x) = \sqrt{10x-21}$ 에 대하여 함수  $y=f(x)$ 와 그 역함수  $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로 두 함수의 그래프의 교점은 함수  $f(x) = \sqrt{10x-21}$ 의 그래프와 직선  $y=x$ 의 교점과 같다.



$y = \sqrt{10x-21}$ 과  $y=x$ 를 연립하면

$$\sqrt{10x-21} = x$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$x^2 - 10x + 21 = 0, (x-3)(x-7) = 0$$

$$\therefore x = 3 \text{ 또는 } x = 7$$

따라서 두 교점은  $(3, 3)$ ,  $(7, 7)$ 이고,

두 교점 사이의 거리는

$$\sqrt{(7-3)^2 + (7-3)^2} = 4\sqrt{2}$$

## 32 정답 ③

**해설** 두 함수  $y=f(x)$ 와  $f^{-1}(x)$ 는 서로 역함수 관계에 있으므로 두 함수의 그래프는 직선  $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

따라서 두 함수  $y=f(x)$ ,  $y=f^{-1}(x)$ 의

그래프의 교점은 함수  $y = \sqrt{2x-2}+1$ 의

그래프와 직선  $y=x$ 의 교점과 같으므로

$$\sqrt{2x-2}+1 = x, \sqrt{2x-2} = x-1$$

양변을 제곱하면

$$2x-2 = x^2 - 2x + 1$$

$$x^2 - 4x + 3 = 0, (x-3)(x-1) = 0$$

$$\therefore x = 1 \text{ 또는 } x = 3$$

따라서 두 교점 P, Q의 좌표는  $(1, 1)$ ,  $(3, 3)$

$$\therefore PQ = \sqrt{(3-1)^2 + (3-1)^2} = 2\sqrt{2}$$

## 33 정답 ⑤

**해설**  $y = -\sqrt{x-a}+a+4$ 의 그래프가 점  $(a, -a)$ 를 지나므로  $-a = a+4$


$$\therefore a = -2$$

따라서 함수  $y = -\sqrt{x+2}+2$ 의 치역은

$$\{y | y \leq 2\} \text{이다.}$$

### 34 정답 24

**해설**  $y = \sqrt{4x-8} = \sqrt{4(x-6)+16}$  이므로  
 $y = \sqrt{4x-8}$ 의 그래프는  $y = \sqrt{4x+16}$ 의 그래프를  
 $x$ 축의 방향으로 6만큼 평행이동한 것이다.  
 즉, 두 함수  $y = \sqrt{4x+16}$ ,  $y = \sqrt{4x-8}$ 의 그래프와  
 직선  $y=4$ 는 다음 그림과 같다.




이때 빗금친 두 부분의 넓이는 서로 같으므로 구하는  
 넓이는 직사각형 OABC의 넓이와 같다.  
 따라서 구하는 넓이는  
 $6 \cdot 4 = 24$

### 35 정답 ㉔

**해설**  $f(4) = \frac{3 \cdot 4 - 1}{4 - 3} = 11$ 이므로  
 $(g^{-1} \circ f)(4) = g^{-1}(f(4)) = g^{-1}(11)$   
 이때  $g^{-1}(11) = a$  ( $a$ 는 상수)라 하면  $g(a) = 11$ 이므로  
 $g(a) = \sqrt{2a-1} + 4 = 11$   
 $\sqrt{2a-1} = 7, 2a-1 = 49$   
 $\therefore a = 25$   
 $\therefore (g^{-1} \circ f)(4) = g^{-1}(f(4)) = g^{-1}(11) = a = 25$

### 36 정답 225

**해설** 정의역이  $\{x \mid x \geq -k^2\}$ 인  
 함수  $y = \sqrt{x+k^2} - k^2 + 6$ 의 그래프가 제4사분면만  
 지나지 않으려면 그래프의 개형은 다음 그림과 같아야  
 한다.




$k=0$ 일 때  $y = \sqrt{x} + 6$ 으로 제1사분면만 지난다.  
 $k \neq 0$ 일 때 꼭짓점  $(-k^2, -k^2+6)$ 은 제3사분면에  
 위치해야 하므로  
 $-k^2+6 < 0$   
 $\therefore k < -\sqrt{6}$  또는  $k > \sqrt{6}$  ... ㉓  
 함수  $y = \sqrt{x+k^2} - k^2 + 6$ 의 그래프가 제4사분면만  
 지나지 않으려면  $y$ 절편이 0보다 커야 하므로  
 $|k| - k^2 + 6 > 0$   
 $(|k|-3)(|k|+2) < 0$   
 $\therefore -3 < k < 3$  ... ㉔  
 ㉓, ㉔에 의하여  
 $-3 < k < -\sqrt{6}$  또는  $\sqrt{6} < k < 3$   
 $a = -3, b = -\sqrt{6}, c = \sqrt{6}, d = 3$   
 $ad + bc = -9 - 6 = -15$   
 $\therefore (ad + bc)^2 = 225$




### 37 정답 ②

**해설** 이차함수  $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프의 모양이 위로 볼록하므로  $a < 0$ 이고, 축의 방정식  $x = -\frac{b}{2a}$ 에서 축이  $y$ 축의 오른쪽에 있으므로  $-\frac{b}{2a} > 0$ ,  $\frac{b}{a} < 0$   
 $\therefore b > 0$  ( $\because a < 0$ )  
 또,  $y$ 절편이 양수이므로  $c > 0$   
 이때  $y = \sqrt{ax+b} + c = \sqrt{a\left(x + \frac{b}{a}\right)} + c$ 이므로 이 그래프는  $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로  $-\frac{b}{a}$ 만큼,  $y$ 축의 방향으로  $c$ 만큼 평행이동한 것이다.  
 따라서  $a < 0$ ,  $-\frac{b}{a} > 0$ ,  $c > 0$ 이므로 그래프의 개형은 다음 그림과 같고, 개형으로 적당한 것은 ②이다.



### 38 정답 ③

**해설** 무리함수의 그래프를 활용하여 문제를 해결할 수 있는가?  
 함수  $y = -x + k$ 의 역함수는  $y = -x + k$ 이므로  
 함수  $y = \sqrt{4-2x} + 3$ 의 역함수의 그래프와 직선  $y = -x + k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나기 위한 필요충분조건은 함수  $y = \sqrt{4-2x} + 3$ 의 그래프와 직선  $y = -x + k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나는 것이다.



위 그림과 같이 직선  $y = -x + k$ 가 점  $(2, 3)$ 을 지날 때, 조건을 만족시키면서  $k$ 의 값이 최소가 된다.  
 따라서 구하는  $k$ 의 최솟값은  
 $3 = -2 + k$   
 $\therefore k = 5$

### 39 정답 52

**해설**  $y = \sqrt{ax+b}$ 의 그래프가 점  $(3, 5)$ 를 지나므로  
 $\sqrt{3a+b} = 5$   
 $\therefore 3a+b = 25 \quad \dots \textcircled{1}$   
 역함수의 그래프가 점  $(3, -1)$ 을 지나므로  
 $y = \sqrt{ax+b}$ 의 그래프는 점  $(-1, 3)$ 을 지난다.  
 즉,  $\sqrt{-a+b} = 3$ 이므로  
 $-a+b = 9 \quad \dots \textcircled{2}$   
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면  $a = 4, b = 13$   
 $\therefore ab = 52$

### 40 정답 21

**해설**  $a-x \geq 0$ 이므로  $a \geq x$   
 즉,  $y = f(x)$ 의 정의역이  $\{x | x \leq a\}$ 이므로  $a = -3$   
 따라서  $f(x) = \sqrt{-3-x} + b$ 에서  
 $\sqrt{-3-x} \geq 0$ 이므로 치역은  $\{y | y \geq b\}$   
 한편,  $y = g(x)$ 의 정의역이  $\{x | x \geq -7\}$ 이므로  
 $y = f(x)$ 의 치역은  $\{x | x \geq -7\}$ 이다.  
 $\therefore b = -7$   
 $\therefore ab = -3 \cdot (-7) = 21$


### 41 정답 -30

**해설**  $f(1) = 4$ 이므로  $\sqrt{a+b} = 4$   
 $\therefore a+b = 16 \quad \dots \textcircled{1}$   
 $f^{-1}(3) = 2$ 에서  $f(2) = 3$ 이므로  
 $\sqrt{2a+b} = 3$   
 $\therefore 2a+b = 9 \quad \dots \textcircled{2}$   
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면  
 $a = -7, b = 23$   
 $\therefore a-b = -30$

## 42 정답 ①

**해설**  $y = 2\sqrt{|2x-1|} = \begin{cases} 2\sqrt{2x-1} & (x \geq \frac{1}{2}) \\ 2\sqrt{-2x+1} & (x < \frac{1}{2}) \end{cases}$  의

그래프는 아래와 같다.



먼저  $y = kx$ 와  $y = 2\sqrt{2x-1}$ 이 접할 때의  $k$ 의 값을 구하자.

$$kx = 2\sqrt{2x-1}$$

양변을 제곱하면

$$k^2x^2 = 4(2x-1), \quad k^2x^2 - 8x + 4 = 0$$

$$\frac{D}{4} = 16 - 4k^2 = 0, \quad \therefore k = \pm 2$$

(기울기)  $> 0$ 이므로  $k = 2$

$y = kx$ 와  $y = 2\sqrt{2x-1}$ 이 세 점에서 만나기 위해서는

$y = kx$ 가  $x$ 축과  $y = 2x$ 사이에 있어야 한다.

$$\therefore 0 < k < 2$$

따라서 부등식을 만족하는 정수  $k$ 의 개수는 1이다.

## 43 정답 ④

**해설** 두 함수  $y = \sqrt{x+2}$ 와  $x = \sqrt{y+2}$ 의 그래프는 직선  $y = x$ 에 대하여 대칭이므로 그 교점은 함수  $y = \sqrt{x+2}$ 의 그래프와 직선  $y = x$ 와의 교점이다.

$\sqrt{x+2} = x$ 에서 양변을 제곱하면

$$x+2 = x^2$$

$$x^2 - x - 2 = 0, \quad (x-2)(x+1) = 0$$

$$\therefore x = -1 \text{ 또는 } x = 2$$

이때  $x \geq 0$ 이므로  $a = 2, b = \sqrt{2+2} = 2$

$$\therefore a+b = 4$$

## 44 정답 ①

**해설** 함수  $y = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}k$  ( $x \geq 0$ )은 집합  $\{x | x \geq 0\}$ 에서

집합  $\left\{y \mid y \geq \frac{1}{2}k\right\}$ 로의 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.

$$y = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}k \text{라 하면}$$

$$\frac{1}{4}x^2 = y - \frac{1}{2}k$$

$$x^2 = 4y - 2k$$

$$\therefore x = \sqrt{4y-2k} \quad (\because x \geq 0)$$

$x$ 와  $y$ 를 서로 바꾸면  $y = \sqrt{4x-2k}$


즉, 함수  $g(x) = \sqrt{4x-2k}$ 는 함수  $f(x)$ 의 역함수이다.

따라서 함수  $y = f(x)$ 의 그래프와 그 역함수  $y = g(x)$ 의

그래프는 다음 그림과 같이  $y = x$ 에 대하여 대칭이므로

두 함수  $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프의 교점은

$y = f(x)$ 의 그래프와 직선  $y = x$ 의 교점과 같다.



$$\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}k = x \text{에서 } x^2 - 4x + 2k = 0$$

이 이차방정식이 음이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야

하므로 이 이차방정식의 판별식을  $D$ 라 하면

$$\frac{D}{4} = 2^2 - 2k > 0$$

또한 이차방정식의 두 실근의 곱은 음이 아닌 실수이므로


$$2k \geq 0$$

$$\therefore 0 \leq k < 2$$

따라서 정수  $k$ 의 개수는 0, 1로 2이다.

# 45 정답 ④

**해설** 함수  $f(x) = \sqrt{\frac{1}{2}x + 3}$ 의 그래프는 다음과 같다.



$x = 0$ 일 때 함수값이  $\sqrt{3}$ 이므로  $A(0, \sqrt{3})$ 이다.

함수  $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프는 함수  $y = f(x)$ 의 그래프와  $y = x$ 에 대하여 대칭이므로  $B(\sqrt{3}, 0)$ 이다.


함수  $y = f(x)$ 의 그래프가 증가하는 형태이므로 함수의 그래프가 역함수의 그래프와 만나는 교점은 직선  $y = x$ 와의 교점과 같다.

$$\sqrt{\frac{1}{2}x + 3} = x \text{에서 양변을 각각 제곱하면}$$

$$\frac{1}{2}x + 3 = x^2, 2x^2 - x - 6 = 0,$$

$$(2x + 3)(x - 2) = 0 \text{이므로 } x = -\frac{3}{2} \text{ 또는 } x = 2$$

이때 점  $(-\frac{3}{2}, -\frac{3}{2})$ 은  $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점이 아니므로  $C(2, 2)$ 이다.



한편, 삼각형 ABC는  $\overline{AC} = \overline{BC}$ 인 이등변삼각형이므로 점 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 H라 하면

점 H는 선분 AB의 중점이므로  $H(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 이다.

$$\overline{AB} = \sqrt{6}, \overline{CH} = \sqrt{2} \left( 2 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2\sqrt{2} - \frac{\sqrt{6}}{2}$$

이므로 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot \sqrt{6} \cdot \left( 2\sqrt{2} - \frac{\sqrt{6}}{2} \right) = 2\sqrt{3} - \frac{3}{2} \text{이다.}$$