

		유형별 학습	이름

09월 08일 (공통수학2)

선분의 내분, 내분점의 좌표 ~ 두 직선의 평행 조건과 수직 조건

- 01
- 점  $(3, 2)$ 를 지나고 직선  $x + 6y + 9 = 0$ 에 평행한 직선이 점  $(a, 3)$ 을 지날 때,  $a$ 의 값은?

①  $-5$

②  $-4$

③  $-3$

④  $-2$

⑤  $-1$

- 02
- [2010년 11월 고1 5번]

두 직선  $(2 + k)x - y - 10 = 0$ 과  $y = -\frac{1}{3}x + 1$ 이 서로 수직일 때, 상수  $k$ 의 값은?

①  $-5$

②  $-3$

③  $-1$


④  $1$

⑤  $3$

- 03
- 두 점  $A(-2, -1)$ ,  $B(4, 3)$ 에 대하여 선분  $AB$ 의 수직이등분선의 방정식을  $y = ax + b$ 라 할 때,  $a + b$ 의 값을 구하여라.

- 04
- 두 점  $A(-5, 4)$ ,  $B(3, -2)$ 에 대하여 선분  $AB$ 의 수직이등분선의 방정식이  $ax + by + 7 = 0$ 일 때,  $a + b$ 의 값을 구하시오. (단,  $a$ ,  $b$ 는 상수이다.)


- 05
- 다음 그림과 같은 정사각형  $ABCD$ 에 대하여  $A(0, 2)$ ,  $B(5, 0)$ 일 때, 직선  $CD$ 의  $y$ 절편을 구하시오. (단, 점  $C$ ,  $D$ 는 제 1사분면 위의 점이다.)



06 점  $(2, 3)$ 을 지나는 직선  $l$ 의  $x$ 절편과  $y$ 절편의 값이 같을 때, 직선  $l$ 의  $x$ 절편과  $y$ 절편의 곱은?  
(단,  $x$ 절편은 0이 아니다.)

- ①  $-25$                   ②  $-16$                   ③  $16$   
④  $25$                   ⑤  $36$


07 다음 그림과 같이 좌표평면 위에 있는 두 직사각형의 넓이를 동시에 이등분하는 직선의  $x$ 절편과  $y$ 절편의 곱을 구하시오.



08 [2004년 11월 고1 29번]  
좌표평면 위의 두 점  $A(1, 5)$ ,  $B(4, 2)$ 에 대하여 선분  $AB$ 를  $1:2$ 로 내분하는 점을 지나고, 직선  $AB$ 에 수직인 직선의 방정식을  $ax - y + b = 0$ 이라 할 때,  $a + b$ 의 값을 구하시오.

09 세 점  $A(0, 0)$ ,  $B(3, 0)$ ,  $C(1, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형  $ABC$ 에 대하여 각 꼭짓점에서 마주보는 대변에 내린 수선의 교점을  $(a, b)$ 라 할 때, 상수  $a, b$ 의 합  $a + b$ 의 값을 구하시오.

10 [2024년 9월 고1 20번/4점]  
그림과 같이 좌표평면 위에 세 점  $A(-8, a)$ ,  $B(7, 3)$ ,  $C(-6, 0)$ 이 있다. 선분  $AB$ 를  $2:1$ 로 내분하는 점을  $P$ 라 할 때, 직선  $PC$ 가 삼각형  $AOB$ 의 넓이를 이등분한다. 양수  $a$ 의 값은? (단,  $O$ 는 원점이다.)



- ①  $\frac{21}{2}$                   ②  $11$                   ③  $\frac{23}{2}$   
④  $12$                   ⑤  $\frac{25}{2}$


11 직선  $x + y - 6 = 0$ 과  $x$ 축 및  $y$ 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 두 직선  $y = mx$ ,  $y = nx$ 에 의하여 삼등분될 때,  $m + n$ 의 값은?

- ① 1                      ②  $\frac{3}{2}$                       ③ 2  
④  $\frac{5}{2}$                       ⑤ 4

12 좌표평면 위의 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하고, 변 AB, 변 BC, 변 CA의 중점의 좌표를 각각 L(2, 3), M(0, -1), N(a, b)라 하자. 직선 BN과 직선 LM이 서로 수직이고, 점 G에서 직선 LM까지의 거리가  $2\sqrt{5}$  일 때,  $ab$ 의 값은? (단, 무게중심 G는 제4사분면에 있다.)

- ① -70                      ② -65                      ③ -60  
④ -55                      ⑤ -50

13 [2018년 9월 고1 28번 변형]  
다음 그림과 같이 좌표평면에서 이차함수  $y = 2x^2$ 의 그래프 위의 점 P(1, 2)에서의 접선을  $l_1$ , 점 P를 지나고 직선  $l_1$ 과 수직인 직선을  $l_2$ 라 하자. 직선  $l_1$ 이  $y$ 축과 만나는 점을 Q, 직선  $l_2$ 가 이차함수  $y = 2x^2$ 의 그래프와 만나는 점 중 점 P가 아닌 점을 R라 하자. 삼각형 PRQ의 넓이를 S라 할 때,  $64S$ 의 값을 구하시오.




14 서로 다른 세 직선  $5x - y + 3 = 0$ ,  $ax + 2y - 2 = 0$ ,  $x + by + 8 = 0$ 에 의하여 좌표평면이 네 부분으로 나누어질 때, 상수  $a$ ,  $b$ 에 대하여  $ab$ 의 값을 구하시오.

- 15 세 직선  $x + 3y = 1$ ,  $x - 2y = 3$ ,  $x + ay = 2$ 가 좌표평면을 6개의 영역으로 나누도록 하는 모든 상수  $a$ 의 값의 곱을 구하시오.

- 16 [2018년 9월 고1 16번/4점]  
그림과 같이 좌표평면 위의 세 점  $A(3, 5)$ ,  $B(0, 1)$ ,  $C(6, -1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형  $ABC$ 에 대하여 선분  $AB$  위의 한 점  $D$ 와 선분  $AC$  위의 한 점  $E$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 선분  $DE$ 와 선분  $BC$ 는 평행하다.  
(나) 삼각형  $ADE$ 와 삼각형  $ABC$ 의 넓이의 비는  $1 : 9$ 이다.

직선  $BE$ 의 방정식이  $y = kx + 1$ 일 때, 상수  $k$ 의 값은?



- ①  $\frac{1}{8}$                       ②  $\frac{1}{4}$                       ③  $\frac{3}{8}$   
④  $\frac{1}{2}$                       ⑤  $\frac{5}{8}$

		유형별 학습	이름
09월 08일 (공통수학2) 선분의 내분, 내분점의 좌표 ~ 두 직선의 평행 조건과 수직 조건			

정답		
01 ③	02 ④	03 1
04 1	05 $\frac{39}{5}$	06 ④
07 $-\frac{49}{18}$	08 3	09 2
10 ④	11 ④	12 ②
13 289	14 2	15 $-3$
16 ④		

		유형별 학습	이름
09월 08일 (공통수학2) 선분의 내분, 내분점의 좌표 ~ 두 직선의 평행 조건과 수직 조건			

01    **정답 ③**

**해설** 직선  $x+6y+9=0$ , 즉  $y=-\frac{1}{6}x-\frac{3}{2}$ 에  
 평행한 직선의 기울기는  $-\frac{1}{6}$ 이다.  
 따라서 점  $(3, 2)$ 를 지나고 기울기가  $-\frac{1}{6}$ 인  
 직선의 방정식은  

$$y-2=-\frac{1}{6}(x-3)$$
  

$$\therefore y=-\frac{1}{6}x+\frac{5}{2}$$
  
 이 직선이 점  $(a, 3)$ 을 지나므로  

$$3=-\frac{1}{6}a+\frac{5}{2}$$
  

$$\therefore a=-3$$

02    **정답 ④**

**해설** 두 직선의 위치 관계를 이해하기  
 두 직선  $(2+k)x-y-10=0$ 과  $y=-\frac{1}{3}x+1$ 이 서로  
 수직이므로 두 직선의 기울기의 곱이  $-1$ 이어야 한다.  
 즉,  $(2+k)\times\left(-\frac{1}{3}\right)=-1$ 에서  

$$2+k=3$$
  

$$\therefore k=1$$

03    **정답 1**

**해설** 선분 AB의 중점의 좌표는  $(1, 1)$   
 선분 AB의 기울기는  $\frac{3-(-1)}{4-(-2)}=\frac{2}{3}$   
 따라서, 선분 AB의 수직이등분선은 점  $(1, 1)$ 을  
 지나고, 기울기가  $-\frac{3}{2}$ 인 직선이므로  
 구하는 직선의 방정식은  $y-1=-\frac{3}{2}(x-1)$   
 즉,  $y=-\frac{3}{2}x+\frac{5}{2}$   
 따라서,  $a+b=-\frac{3}{2}+\frac{5}{2}=1$

04    **정답 1**


**해설**  $\overline{AB}$ 의 중점의 좌표는  
 $\left(\frac{-5+3}{2}, \frac{4-2}{2}\right)$ , 즉  $(-1, 1)$   
 직선 AB의 기울기는  $\frac{-2-4}{3-(-5)}=-\frac{3}{4}$   
 따라서  $\overline{AB}$ 의 수직이등분선은 기울기가  $\frac{4}{3}$ 이고  
 점  $(-1, 1)$ 을 지나므로 그 방정식은  

$$y-1=\frac{4}{3}(x+1)$$
  

$$\therefore 4x-3y+7=0$$
  
 즉,  $a=4$ ,  $b=-3$ 이므로  $a+b=1$

## 05 정답 $\frac{39}{5}$

**해설** 점 C에서  $x$ 축에 내린 수선의 발을 E,  
점 D에서  $y$ 축에 내린 수선의 발을 F라 하면



$\triangle AOB \equiv \triangle BEC \equiv \triangle DFA$  (RHA 합동)이므로  
 $C(7, 5), D(2, 7)$

따라서 직선 CD의 방정식은

$$y - 5 = \frac{7 - 5}{2 - 7}(x - 7), \text{ 즉 } y = -\frac{2}{5}x + \frac{39}{5} \text{ 이므로}$$

구하는  $y$ 절편은  $\frac{39}{5}$

## 06 정답 ④

**해설** 직선  $l$ 의  $x$ 절편을  $a$ 라 하면  $y$ 절편은  $a$ 이므로

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{a} = 1 \quad \therefore x + y = a$$

점  $(2, 3)$ 을 지나므로  $2 + 3 = a$


$$\therefore a = 5$$

따라서 직선  $l$ 의 방정식은  $x - y = 5$ 이므로

$x$ 절편과  $y$ 절편의 곱  $5 \times 5 = 25$

## 07 정답 $-\frac{49}{18}$

**해설** 두 직사각형의 넓이를 동시에 이등분하는 직선은  
두 직사각형의 각 대각선의 교점을 지나야 한다.  
이때 다음 그림과 같이 두 직사각형의 대각선의 교점을  
각각 A, B라 하면



$$A\left(\frac{-8}{2}, \frac{-4}{2}\right), \text{ 즉 } A(-4, -2)$$

$$B\left(\frac{3+7}{2}, \frac{9+3}{2}\right), \text{ 즉 } B(5, 6)$$

두 점 A, B를 지나는 직선의 방정식은

$$y + 2 = \frac{6 - (-2)}{5 - (-4)}(x + 4)$$

$$\therefore y = \frac{8}{9}x + \frac{14}{9}$$

따라서 이 직선의  $x$ 절편은  $-\frac{7}{4}$ ,  $y$ 절편은  $\frac{14}{9}$  이므로

그 곱은  $-\frac{49}{18}$  이다.

## 08 정답 3

**해설** 직선의 방정식 구하기

$\overline{AB}$ 를 1:2로 내분하는 점을 C라고 하면

$$C\left(\frac{6}{3}, \frac{12}{3}\right) = C(2, 4) \text{ 이고 직선 AB의 기울기는}$$


-1이므로 직선 AB에 수직인 직선의 기울기는 1이다.

그러므로 직선의 방정식은  $y - 4 = (x - 2)$ 이다.

따라서  $a = 1, b = 2$ 이므로  $a + b = 3$ 이다.

## 09 정답 2

해설



위 그림과 같이 점 A에서 변 BC에 내린 수선의 발을

E라 하면 직선 BC의 기울기는  $\frac{0-2}{3-1} = -1$ 이므로

직선 AE의 방정식은  $y = x$

또, 점 B에서 변 AC에 내린 수선의 발을 D라 하면

직선 AC의 기울기는 2이므로 직선 BD의 기울기는  $-\frac{1}{2}$ 이다.

따라서 직선 BD의 방정식은

$$y = -\frac{1}{2}(x-3)$$

$$\therefore y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

따라서  $y = x$ 와  $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ 을 연립하여 풀면

$$x = 1, y = 1$$


따라서 수심의 좌표는 (1, 1)이므로

$$a = 1, b = 1$$

$$\therefore a + b = 2$$

## 10 정답 ④

해설 선분의 내분을 활용하여 문제 해결하기



직선 PC와 선분 AO가 만나는 점을 Q라 하고

삼각형 AOB의 넓이를 S라 하자.

두 삼각형 AOP, AQP의 넓이가 각각  $\frac{2}{3}S, \frac{1}{2}S$ 이므로

삼각형 QOP의 넓이는  $\frac{1}{6}S$ 이다.

두 삼각형 AQP와 QOP의 넓이의 비는 선분 AQ와 선분 QO의 길이의 비와 같다.

두 삼각형 AQP와 QOP의 넓이의 비가 3 : 1이므로

$$\overline{AQ} : \overline{QO} = 3 : 1$$

점 Q의 좌표는

$$\left( \frac{3 \cdot 0 + 1 \cdot (-8)}{3+1}, \frac{3 \cdot 0 + 1 \cdot a}{3+1} \right) = \left( -2, \frac{a}{4} \right)$$

점 P의 좌표는

$$\left( \frac{2 \cdot 7 + 1 \cdot (-8)}{2+1}, \frac{2 \cdot 3 + 1 \cdot a}{2+1} \right) = \left( 2, \frac{a+6}{3} \right)$$

직선 PC의 방정식은

$$y = \frac{\frac{a+6}{3}}{2-(-6)}(x+6) = \frac{a+6}{24}(x+6)$$

점 Q가 직선 PC 위의 점이므로


$$\frac{a}{4} = \frac{a+6}{24} \cdot (-2+6)$$

$$\therefore a = 12$$



## 11 정답 ④

**해설** 다음 그림과 같이 직선  $y = -x + 6$ 과 두 직선  $y = mx$ ,  $y = nx$ 의 교점을 각각 A, B라 하자.



두 점  $(6, 0)$ ,  $(0, 6)$ 을 잇는 선분을 2:1로 내분하는 점이 A이고, 1:2로 내분하는 점이 B이다.

이때 두 점 A, B의 좌표는

$$A\left(\frac{2 \cdot 0 + 1 \cdot 6}{2+1}, \frac{2 \cdot 6 + 1 \cdot 0}{2+1}\right),$$

$$B\left(\frac{1 \cdot 0 + 2 \cdot 6}{1+2}, \frac{1 \cdot 6 + 2 \cdot 0}{1+2}\right)$$

$$\therefore A(2, 4), B(4, 2)$$

따라서 직선  $y = mx$ 는 점  $(2, 4)$ 를 지나고,


직선  $y = nx$ 는 점  $(4, 2)$ 를 지나므로

$$m = 2, n = \frac{1}{2}$$

$$\therefore m + n = \frac{5}{2}$$

## 12 정답 ②

**해설** 삼각형 ABC에서 두 변 AB, BC의 중점이 각각 L, M이므로  $\overline{LM} \parallel \overline{AC}$ 이고, 직선 BN과 직선 LM이 서로 수직이므로  $\overline{BN} \perp \overline{AC}$ 이다.  
즉, 직선 BN은 선분 AC의 수직이등분선이므로 두 직선 BN, LM의 교점을 P라 하면 점 P는 선분 LM의 중점이다.



$L(2, 3)$ ,  $M(0, -1)$ 이므로 점 P의 좌표는

$$P\left(\frac{2+0}{2}, \frac{3-1}{2}\right), \text{ 즉 } P(1, 1)$$

삼각형 ABC의 무게중심 G에 대하여

$\overline{BG} : \overline{GN} = 2 : 1$ 이고,  $\overline{NP} = \overline{BP}$ ,  $\overline{PG} = 2\sqrt{5}$ 이므로

$$(\overline{BP} + \overline{PG}) : (\overline{NP} - \overline{PG}) = 2 : 1$$

$$(\overline{NP} + 2\sqrt{5}) : (\overline{NP} - 2\sqrt{5}) = 2 : 1$$

$$2(\overline{NP} - 2\sqrt{5}) = \overline{NP} + 2\sqrt{5}$$

$$\therefore \overline{NP} = 6\sqrt{5}$$

이때  $N(a, b)$ ,  $P(1, 1)$ 이므로

$$\overline{NP}^2 = (a-1)^2 + (b-1)^2 = (6\sqrt{5})^2 \quad \dots \textcircled{1}$$

한편, 직선 LM의 기울기는  $\frac{-1-3}{0-2} = 2$ ,

직선 NP의 기울기는  $\frac{1-b}{1-a}$ 이고

이 두 직선이 서로 수직이므로

$$2 \cdot \frac{1-b}{1-a} = -1$$

$$\therefore a = -2b + 3 \quad \dots \textcircled{2}$$

①을 ②에 대입하여 풀면

$$5(b-1)^2 = 180, (b-1)^2 = 36$$

무게중심  $G\left(\frac{a+2}{3}, \frac{b+2}{3}\right)$ 가 제4사분면에 있으므로

$$b < -2$$

$$\therefore b = -5$$

이것을 ②에 대입하면

$$a = 13$$

$$\therefore ab = -65$$



## 13 정답 289

**해설** 직선  $l_1$ 의 기울기를  $m$ 이라 하면 직선  $l_1$ 의 방정식은  $y-2=m(x-1)$   
 직선  $l_1$ 이 이차함수  $y=2x^2$ 의 그래프와 접하므로  
 이차방정식  $2x^2-mx+m-2=0$ 의 판별식을  $D$ 라 할 때  
 $D=(-m)^2-8(m-2)$   
 $= (m-4)^2=0$   
 $\therefore m=4$   
 따라서 직선  $l_1$ 의 방정식은  $y=4x-2$ 이므로  
 $Q(0, -2)$   
 또, 두 직선  $l_1, l_2$ 가 서로 수직이므로 직선  $l_2$ 의 기울기는  $-\frac{1}{4}$ 이므로 직선  $l_2$ 의 방정식은  $y=-\frac{1}{4}x+\frac{9}{4}$ 이고  
 $y=2x^2$ 과 연립하여 정리하면  
 $8x^2+x-9=0$   
 $(x-1)(8x+9)=0$   
 $\therefore x=-\frac{9}{8}$ , 즉  $R(-\frac{9}{8}, \frac{81}{32})$   
 따라서  $\triangle PRQ = \frac{1}{2} \cdot \overline{PQ} \cdot \overline{PR}$ 에서  
 $S = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{17} \cdot \frac{17\sqrt{17}}{32} = \frac{289}{64}$   
 $\therefore 64S=289$

## 14 정답 2

**해설** 서로 다른 세 직선이 좌표평면을 네 부분으로 나누려면  
 세 직선이 모두 평행해야 한다.  
 두 직선  $5x-y+3=0, ax+2y-2=0$ 이 평행하려면  
 $\frac{5}{a} = \frac{-1}{2} \neq \frac{3}{-2}$   
 $\therefore a=-10$   
 두 직선  $5x-y+3=0, x+by+8=0$ 이 평행하려면  
 $\frac{5}{1} = \frac{-1}{b} \neq \frac{3}{8}$   
 $\therefore b=-\frac{1}{5}$   
 $\therefore ab=2$

## 15 정답 -3

**해설** 주어진 세 직선이 좌표평면을 6개의 영역으로 나누는 경우는 다음과 같다.  
 (i) 직선  $x+ay=2$ 가 직선  $x+3y=1$  또는  $x-2y=3$ 과 평행할 때  
  
 $a=3$  또는  $a=-2$   
 (ii) 직선  $x+ay=2$ 가 두 직선  $x+3y=1, x-2y=3$ 의 교점을 지날 때  
  
 $x+3y=1, x-2y=3$ 을 연립하여 풀면  
 $x=\frac{11}{5}, y=-\frac{2}{5}$   
 따라서 직선  $x+ay=2$ 가 점  $(\frac{11}{5}, -\frac{2}{5})$ 를 지나려면  $\frac{11}{5}-\frac{2}{5}a=2$   
 $\therefore a=\frac{1}{2}$   
 (i), (ii)에 의하여 모든 상수  $a$ 의 값의 곱은  
 $3 \cdot (-2) \cdot \frac{1}{2} = -3$

## 16 정답 ④

**해설** 선분의 내분을 이용하여 수학 내적 문제 해결하기  
 조건 (가)에 의하여  $\triangle ADE \sim \triangle ABC$  (AA 닮음)  
 조건 (나)에 의하여 두 삼각형 ADE, ABC의 넓이의 비가 1:9이므로 두 삼각형의 닮음비는 1:3이다.  
 즉, 점 E는 선분 AC를 1:2로 내분하는 점이므로  
 $E\left(\frac{1 \cdot 6 + 2 \cdot 3}{1+2}, \frac{1 \cdot (-1) + 2 \cdot 5}{1+2}\right)$   
 $\therefore E(4, 3)$   
 따라서 직선 BE의 방정식은  $y=\frac{1}{2}x+1$ 이므로  
 $k=\frac{1}{2}$