

마플시너지(2025) - 공통수학2 (유리함수) 273~298p

유리함수의 그래프

실시일자	-
23문제 / DRE수학	

유형별 학습

이름

01 유리함수 $y = \frac{5}{x}$ ($x > 0$)의 그래프 위의 점 $P(a, b)$ 와 직선 $y = -x$ 사이의 거리가 6일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

02 [2023년 11월 고1 16번 변형]
유리함수 $f(x) = \frac{2}{x-a} - 6$ ($a > 1$)에 대하여 좌표평면에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 두 점근선이 만나는 점을 C라 하자. 사각형 OBCA의 넓이가 20일 때, 상수 a 의 값은? (단, O는 원점이다.)

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

03 [2018년 11월 고2 문과 13번 변형]
유리함수 $f(x) = \frac{2x+1}{x-k}$ 의 그래프의 두 점근선의 교점이 직선 $y = 2x$ 위에 있을 때, 상수 k 의 값은?
(단, $k \neq -\frac{1}{2}$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

04 함수 $f(x) = \frac{bx}{ax-1}$ 의 정의역과 치역이 같다. 곡선 $y = f(x)$ 의 두 점근선의 교점이 직선 $y = -3x + 5$ 위에 있을 때, $a+b$ 의 값은?
(단, a 와 b 는 0이 아닌 상수이다.)

- ① $\frac{5}{11}$ ② $\frac{5}{9}$ ③ 0
④ $\frac{9}{5}$ ⑤ $\frac{11}{5}$

05 함수 $f(x) = \frac{a}{2x+4} - b$ 에 대하여 함수 $y = \left| f(x+2a) - \frac{a}{2} \right|$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭일 때, $a + f(b)$ 의 값은?
(단, a, b 는 상수이고, $a \neq 0$ 이다.)

- ① $-\frac{11}{5}$ ② $-\frac{17}{10}$ ③ $-\frac{6}{5}$
④ $-\frac{7}{10}$ ⑤ $-\frac{1}{5}$

- 06** 분모, 분자가 일차식인 유리식 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 조건을 모두 만족한다. 이때 $0 \leq x \leq 2$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

(가) 점 $(-1, 3)$ 에 대하여 대칭이다.
(나) 점 $(-2, 6)$ 을 지난다.

- 07** 다음 보기 중 함수 $y = \frac{3x+7}{x+3}$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 치역은 $\{y | y \neq -3 \text{인 실수}\}$ 이다.
ㄴ. 그래프는 점 $(-3, 3)$ 에 대하여 대칭이다.
ㄷ. 그래프는 $y = -\frac{2}{x}$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

- 08** a, b 가 양수일 때, $2 \leq x \leq 3$ 을 만족하는 임의의 실수 x 에 대하여 $ax+2 \leq \frac{2x-1}{x-1} \leq bx+2$ 가 성립할 때, a 의 최댓값과 b 의 최솟값의 합은?

- ① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

- 09** [2017년 9월 고2 이과 27번 변형]
곡선 $y = \frac{1}{x}$ 와 직선 $y = -x + k$ 가 제1사분면에서 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 하자.
 $\angle ABC = 90^\circ$ 인 점 C가 곡선 $y = \frac{1}{x}$ 위에 있다.
 $\overline{AC} = 2\sqrt{3}$ 가 되도록 하는 상수 k 에 대하여 k^2 의 값을 구하시오. (단, $k > \sqrt{2}$)

- 10** 함수 $f(x) = \frac{3x+b}{x-a}$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 a 와 b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

〈조건〉

(가) 3이 아닌 모든 실수 x 에 대하여
 $f^{-1}(x) = f(x-6) - 6$ 이다.
(나) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 평행이동하면
함수 $y = -\frac{1}{x}$ 의 그래프와 일치한다.

- 11** 함수 $f(x) = \frac{x+a}{x-2}$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.


(가) $x \neq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여
 $f^{-1}(x) = f(x+1) + b$ 이다.
(나) 직선 $x = 5$ 는 함수 $y = (f \circ f)(x)$ 의 그래프의 한 점근선이다.

상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 4 ② 2 ③ 0
④ -2 ⑤ -4

- 12** 함수 $f(x) = \frac{x}{1+x}$ 에 대하여
 $f^1 = f, f^n = f \circ f \circ f \circ \dots \circ f$ ($n = 2, 3, 4, \dots$)
 로 정의한다. $f^{30}(x) = \frac{ax+b}{cx+1}$ 일 때,
 상수 a, b, c 에 대하여 $a-b+c$ 의 값을 구하시오.


- 13** 그림과 같이 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k > 0$)의 그래프가
 직선 $y = -x + 8$ 과 두 점 P, Q에서 만난다.
 삼각형 OPQ의 넓이가 26일 때, 상수 k 의 값은?
 (단, O는 원점이다.)



- ① $\frac{21}{4}$ ② $\frac{87}{16}$ ③ $\frac{45}{8}$
 ④ $\frac{93}{16}$ ⑤ 6

- 14** [2016년 4월 고3 문과 27번 변형]
 좌표평면 위에 함수 $f(x) = \begin{cases} -\frac{4}{x} & (x > 0) \\ -\frac{16}{x} & (x < 0) \end{cases}$ 의 그래프와
 직선 $y = x$ 가 있다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의
 점 P를 지나고 x 축에 수직인 직선이 직선 $y = x$ 와 만나는
 점을 Q, 점 Q를 지나고 y 축에 수직인 직선이 $y = f(x)$ 와
 만나는 점을 R라 할 때, 선분 PQ와 선분 QR의 길이의 곱
 $\overline{PQ} \cdot \overline{QR}$ 의 최솟값을 구하시오.

- 15** 곡선 $y = -\frac{2}{x} + 1$ 위의
 두 점 $A(1, -1), B(k, -\frac{2}{k} + 1)$ ($-2 < k < 0$)을
 지나는 직선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 P, Q라 하자.
 점 B에서 y 축에 내린 수선의 발을 B' 이라 할 때,
 두 삼각형 BQB', OPQ 의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 하자.
 $S_1 + S_2$ 의 최솟값을 m , 그 때의 k 값을 α 라 할 때,
 $m + \alpha$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)



- ① $\frac{\sqrt{5}}{5} - 1$ ② $\frac{2\sqrt{5}}{5} - 1$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{5} - 1$
 ④ $\frac{4\sqrt{5}}{5} - 1$ ⑤ $\sqrt{5} - 2$

- 16** 유리함수 $y = \frac{ax+7}{x+b}$ 의 역함수의 그래프가 두 직선 $x = -3$, $y = 1$ 과 만나지 않도록 하는 두 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

① -4 ② -2 ③ 0
 ④ 2 ⑤ 4

- 17** 양수 k 에 대하여 유리함수 $y = \frac{k}{x+4} + 2$ 의 그래프가 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 이 그래프의 두 점근선의 교점을 C라 하자. 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있을 때, $k \cdot \overline{AB}$ 의 값은?

① $28\sqrt{5}$ ② $30\sqrt{5}$ ③ $32\sqrt{5}$
 ④ $34\sqrt{5}$ ⑤ $36\sqrt{5}$


- 18** 양의 실수 전체의 집합 A 에서 A 로의 함수 f , h 를 $f(x) = x^2 + x$, $h(x) = \frac{x+2}{f(x)}$ 로 정의한다. 함수 g 가 f 의 역함수일 때, $h(g(6))$ 의 값을 구하시오.

- 19** 유리함수 $y = \frac{6}{2x-6}$ 의 그래프 위의 점 중 x 좌표, y 좌표가 모두 정수인 점의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

- 20** $f(x) - 2f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{2x-1}{x+1}$ 을 만족하는 함수 $f(x)$ 에 대하여 $y = f(x)$ 의 그래프의 점근선이 $x = a$, $y = b$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

- 21** 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, a, b, c, d 는 상수이다.)



〈보기〉

- ㉠. $ac < 0$ ㉡. $cd < 0$
㉢. $ad - bc < 0$ ㉣. $b > 0$ 이면 $d < 0$ 이다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉡, ㉣ ③ ㉠, ㉢, ㉣
④ ㉡, ㉢, ㉣ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

- 22** [2017년 9월 고2 이과 27번/4점]

곡선 $y = \frac{2}{x}$ 와 직선 $y = -x + k$ 가 제1사분면에서 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 하자.
 $\angle ABC = 90^\circ$ 인 점 C가 곡선 $y = \frac{2}{x}$ 위에 있다.
 $\overline{AC} = 2\sqrt{5}$ 가 되도록 하는 상수 k 에 대하여 k^2 의 값을 구하시오. (단, $k > 2\sqrt{2}$)

- 23** [2022년 3월 고2 18번 변형]

함수 $f(x) = \frac{a}{x} + b$ ($a \neq 0$)이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 곡선 $y = |f(x)|$ 는 직선 $y = 3$ 과 한 점에서만 만난다.
(나) $f^{-1}(3) = f(3) - 2$

$f(5)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

마플시너지(2025) - 공통수학2 (유리함수) 273~298p

유리함수의 그래프

실시일자	-
23문제 / DRE수학	

유형별 학습

이름

빠른정답

01 62	02 ①	03 ①
04 ④	05 ②	06 0
07 ⑤	08 ①	09 5
10 5	11 ②	12 31
13 ②	14 36	15 ③
16 ①	17 ③	18 $\frac{2}{3}$
19 ②	20 $a+b=-1$	21 ②
22 9	23 ④	



마플시너지(2025) - 공통수학2 (유리함수) 273~298p

유리함수의 그래프

실시일자	-
23문제 / DRE수학	

유형별 학습


이름

01 정답 62

해설 점 $P(a, b)$ 는 유리함수 $y = \frac{5}{x}$ ($x > 0$)의 그래프 위의 점이므로 $b = \frac{5}{a}$ 에서 $ab = 5$ ($a > 0, b > 0$)
 점 $P(a, b)$ 와 직선 $x + y = 0$ 사이의 거리가 6이므로
 $\frac{|a+b|}{\sqrt{1^2+1^2}} = 6$ 에서 $a+b = 6\sqrt{2}$
 $\therefore a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$
 $= (6\sqrt{2})^2 - 2 \cdot 5$
 $= 62$

02 정답 ①

해설 유리함수 $f(x) = \frac{2}{x-a} - 6$ ($a > 1$)의 그래프의 두 점근선은 $x = a, y = -6$ 이고,
 $A(a + \frac{1}{3}, 0), B(0, -\frac{2}{a} - 6), C(a, -6)$ 이다.
 유리함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 사각형 OBCA는 그림과 같다.



사각형 OBCA의 넓이를 S 라 하면 S 는 삼각형 OCA의 넓이와 삼각형 OBC의 넓이의 합과 같다.
 점 C에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하면
 $S = \frac{1}{2} \cdot \overline{OA} \cdot \overline{CD} + \frac{1}{2} \cdot \overline{OB} \cdot \overline{CE}$
 $= \frac{1}{2} \cdot (a + \frac{1}{3}) \cdot 6 + \frac{1}{2} \cdot (-\frac{2}{a} - 6) \cdot a$
 $= 6a + 2$
 $6a + 2 = 20$ 에서
 $a = 3$

03 정답 ①

해설 함수 $f(x) = \frac{2x+1}{x-k} = \frac{2k+1}{x-k} + 2$ 의 그래프의
 두 점근선의 방정식은 $x = k, y = 2$ 이고
 두 점근선의 교점 $(k, 2)$ 는 직선 $y = 2x$ 위의 점이다.
 따라서 $k = 1$

04 정답 ④

해설
 $y = \frac{bx}{ax-1} = \frac{\frac{b}{a}(ax-1) + \frac{b}{a}}{ax-1} = \frac{b}{a(ax-1)} + \frac{b}{a}$
 따라서 함수 $f(x)$ 의 정의역은 $\{x \mid x \neq \frac{1}{a} \text{인 실수}\}$,
 치역은 $\{y \mid y \neq \frac{b}{a} \text{인 실수}\}$ 이고 정의역과 치역이
 같으므로
 $\frac{1}{a} = \frac{b}{a} \quad \therefore b = 1$
 또 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 점근선의 방정식은
 $x = \frac{1}{a}, y = \frac{b}{a}$
 두 점근선의 교점 $(\frac{1}{a}, \frac{b}{a})$, 즉 $(\frac{1}{a}, \frac{1}{a})$ 이
 직선 $y = -3x + 5$ 위에 있으므로
 $\frac{1}{a} = -\frac{3}{a} + 5, \frac{4}{a} = 5 \quad \therefore a = \frac{4}{5}$
 $\therefore a + b = \frac{9}{5}$

05 정답 ②

해설 $y = f(x+2a) - \frac{a}{2}$ 의 그래프는 $y = f(x)$ 의 그래프를

x 축의 방향으로 $-2a$ 만큼, y 축의 방향으로 $-\frac{a}{2}$ 만큼

평행이동한 것이고, $y = \left| f(x+2a) - \frac{a}{2} \right|$ 의 그래프는

$y = f(x+2a) - \frac{a}{2}$ 의 그래프에서 $y < 0$ 인 부분을

x 축에 대하여 대칭이동한 것이다.

$y = \left| f(x+2a) - \frac{a}{2} \right|$ 의 그래프가 y 축에 대하여

대칭이라면 $y = f(x+2a) - \frac{a}{2}$ 의 그래프의

점근선의 방정식이 $x = 0, y = 0$ 이어야 한다.

이때 $f(x) = \frac{a}{2x+4} - b$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$x = -2, y = -b$ 이므로

$y = f(x+2a) - \frac{a}{2}$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$x = -2 - 2a, y = -b - \frac{a}{2}$

이 점근선의 방정식이 $x = 0, y = 0$ 이어야 하므로

$a = -1, b = \frac{1}{2}$

따라서 $f(x) = -\frac{1}{2x+4} - \frac{1}{2}$ 이므로

$f(b) = f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{5} - \frac{1}{2} = -\frac{7}{10}$

$\therefore a + f(b) = -1 + \left(-\frac{7}{10}\right) = -\frac{17}{10}$

06 정답 0

해설 조건 (가)에 의하여 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 점근선의 방정식은 $x = -1, y = 3$ 이므로


$f(x) = \frac{k}{x+1} + 3$ ($k \neq 0$)으로 놓을 수 있다.

조건 (나)에 의하여 $f(-2) = 6$ 이므로 $6 = -k + 3$

$\therefore k = -3$

$\therefore f(x) = -\frac{3}{x+1} + 3$

따라서 $0 \leq x \leq 2$ 에서 $y = -\frac{3}{x+1} + 3$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 $f(x)$ 는 $x = 2$ 일 때, 최댓값 $-\frac{3}{2+1} + 3 = 2$,

$x = 0$ 일 때, 최솟값 $-\frac{3}{0+1} + 3 = 0$ 을 갖는다.

따라서 구하는 최댓값과 최솟값의 곱은

$2 \cdot 0 = 0$

07 정답 ⑤

해설 $y = \frac{3x+7}{x+3} = \frac{3(x+3)-2}{x+3} = -\frac{2}{x+3} + 3$

ㄱ. 치역은 $\{y \mid y \neq 3 \text{인 실수}\}$ 이다. (거짓)

ㄴ. 그래프의 점근선의 방정식이 $x = -3, y = 3$ 이므로
그래프는 점 $(-3, 3)$ 에 대하여 대칭이다. (참)

ㄷ. $y = \frac{3x+7}{x+3}$ 의 그래프는 $y = -\frac{2}{x}$ 의 그래프를 x 축의

방향으로 -3 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 것이다. (참)


따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

08 정답 ①

해설 $\frac{2x-1}{x-1} = 2 + \frac{1}{x-1}$ ($2 \leq x \leq 3$)이므로

$$ax + 2 \leq 2 + \frac{1}{x-1} \leq bx + 2$$

$$ax \leq \frac{1}{x-1} \leq bx$$



위의 그래프에 의하여 $a \leq \frac{1}{6}$, $b \geq \frac{1}{2}$ 이다.

$$\therefore (a \text{의 최댓값}) + (b \text{의 최솟값}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{2}{3}$$

09 정답 5

해설 함수 $f(x) = \frac{1}{x}$ 라 하면 $f(x) = f^{-1}(x)$ 이므로

곡선 $y = \frac{1}{x}$ 은 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.

곡선 $y = \frac{1}{x}$ 과 직선 $y = -x + k$ 가 제1사분면에서

만나는 점 A의 좌표를 $A\left(a, \frac{1}{a}\right)$ ($a \neq 1$)라 하면

점 B의 좌표는 $B\left(\frac{1}{a}, a\right)$ 이다.

$\angle ABC = 90^\circ$ 이므로 점 C는 제3사분면 위에 있고

점 C의 좌표를 $C\left(c, \frac{1}{c}\right)$ 라 하면 직선 BC의 기울기는 1이다.

$$\frac{\frac{1}{c} - a}{c - \frac{1}{a}} = \frac{-a}{c} = 1, c = -a \text{이므로}$$

점 C의 좌표는 $C\left(-a, -\frac{1}{a}\right)$

$$\overline{AC}^2 = \left\{a - \left(-a\right)\right\}^2 + \left\{\frac{1}{a} - \left(-\frac{1}{a}\right)\right\}^2$$

$$= 4a^2 + \frac{4}{a^2} = 12$$

$$a^2 + \frac{1}{a^2} = 3$$

$$\text{따라서 } k^2 = \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = a^2 + \frac{1}{a^2} + 2 = 5$$

10 정답 5

$$\text{해설 } f(x) = \frac{3x+b}{x-a} = \frac{3(x-a)+3a+b}{x-a} = \frac{3a+b}{x-a} + 3$$

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 두 점근선의 교점의 좌표는 $(a, 3)$

이때 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프의 두 점근선의 교점은 점 $(a, 3)$ 을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점이므로 그 좌표는 $(3, a)$... ㉠

(가)에서 함수 $y = f(x-6) - 6$ 의 그래프는

함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 6만큼, y 축의 방향으로 -6만큼 평행이동한 그래프이므로

함수 $y = f(x-6) - 6$ 의 그래프의 두 점근선의 교점의 좌표는 $(a+6, -3)$... ㉡

㉠과 ㉡이 일치하므로 $a = -3$

$$a = -3 \text{을 } y = \frac{3a+b}{x-a} + 3 \text{에 대입하면}$$

$$y = \frac{b-9}{x+3} + 3$$

(나)에서 이 그래프를 평행이동하면 $y = -\frac{1}{x}$ 의 그래프와

일치하므로

$$b-9 = -1, b = 8$$

$$\therefore a+b = (-3)+8 = 5$$

11 정답 ②

해설 $f(x) = \frac{x+a}{x-2} = \frac{(x-2)+a+2}{x-2} = \frac{a+2}{x-2} + 1$

이므로 점근선의 방정식은 $x=2, y=1$

따라서 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 점근선의 방정식은 $x=1, y=2$ 이고, 조건 (가)에서

$$f^{-1}(x) = f(x+1) + b = \frac{x+1+a}{x+1-2} + b$$

$$= \frac{(x-1)+a+2}{x-1} + b$$

$$= \frac{a+2}{x-1} + b + 1$$

이므로 $b+1=2$

$$\therefore b=1$$

또, 조건 (나)에서

$$y = (f \circ f)(x) = f(f(x)) = f\left(\frac{x+a}{x-2}\right)$$

$$= \frac{\frac{x+a}{x-2} + a}{\frac{x+a}{x-2} - 2} = \frac{\frac{x+a+ax-2a}{x-2}}{\frac{x+a-2x+4}{x-2}}$$

$$= \frac{(a+1)x-a}{-x+a+4}$$

의 그래프의 한 점근선의 방정식이 $x=5$ 이므로

$$a+4=5$$

$$\therefore a=1$$

$$\therefore a+b=2$$

12 정답 31

해설 $f(x) = \frac{x}{1+x}$ 에서

$$f^2(x) = (f \circ f)(x) = f(f(x))$$

$$= \frac{\frac{x}{1+x}}{1+\frac{x}{1+x}}$$

$$= \frac{x}{1+2x}$$

$$f^3(x) = (f \circ f \circ f)(x) = f(f(f(x)))$$

$$= \frac{\frac{x}{1+2x}}{1+\frac{x}{1+2x}}$$

$$= \frac{x}{1+3x}$$

$$f^{30}(x) = \frac{x}{1+30x}$$

$$= \frac{x}{1+30x}$$

같은 방법으로 하면


$$f^{30}(x) = \frac{x}{1+30x}$$

따라서 $a=1, b=0, c=30$ 이므로

$$a-b+c=31$$

13 정답 ②

해설 직선 $y=-x+8$ 이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하면 A(8, 0), B(0, 8)



삼각형 OAB의 넓이는

$$\triangle OAB = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8 = 32$$

함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프와 직선 $y = -x + 8$ 은 모두

직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 삼각형 OAP와 삼각형 OQB의 넓이는 서로 같다. 삼각형 OPQ의 넓이가 26이므로

$$\triangle OAP = \triangle OQB = \frac{1}{2}(32 - 26) = 3$$

점 P의 좌표를 (a, b) 라 하면

$$\triangle OAP = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot b = 3 \text{에서 } b = \frac{3}{4} \text{이다.}$$

점 P는 직선 $y = -x + 8$ 위의 점이므로

$$b = -a + 8 = \frac{3}{4} \text{에서 } a = \frac{29}{4} \text{이다.}$$


또, 점 P는 함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프 위의 점이므로

$$k = ab = \frac{29}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{87}{16}$$

14 정답 36

해설 점 P의 x 좌표를 a라 하자.

(i) $a > 0$ 일 때



$P\left(a, -\frac{4}{a}\right), Q(a, a), R\left(-\frac{16}{a}, a\right)$ 이므로

$$\overline{PQ} = a + \frac{4}{a}, \overline{QR} = a + \frac{16}{a}$$

$$\begin{aligned} \therefore \overline{PQ} \cdot \overline{QR} &= \left(a + \frac{4}{a}\right)\left(a + \frac{16}{a}\right) \\ &= a^2 + \frac{64}{a^2} + 20 \\ &\geq 2\sqrt{a^2 \cdot \frac{64}{a^2}} + 20 \\ &= 36 \end{aligned}$$

등호가 성립하는 경우는

$$a^2 = \frac{64}{a^2}, \text{ 즉 } a = 2\sqrt{2} \text{ 일 때이다.}$$

그러므로 $a = 2\sqrt{2}$ 일 때,

$\overline{PQ} \cdot \overline{QR}$ 는 최솟값 36을 갖는다.

(ii) $a < 0$ 일 때

$P\left(a, -\frac{16}{a}\right), Q(a, a), R\left(-\frac{4}{a}, a\right)$ 이므로

(i)에서와 같이

$a = -2\sqrt{2}$ 일 때, $\overline{PQ} \cdot \overline{QR}$ 는 최솟값 36을 갖는다.

(i), (ii)에 의하여 $\overline{PQ} \cdot \overline{QR}$ 의 최솟값은 36이다.

15 정답 ③

해설 두 점 $A(1, -1), B\left(k, -\frac{2}{k}+1\right) (-2 < k < 0)$ 을

지나는 직선의 기울기가

$$-\frac{2}{k}+2 = \frac{-2+2k}{k(k-1)} = \frac{2}{k}$$

이므로 직선의 방정식은 $y = \frac{2}{k}(x-1)-1$,

즉 $y = \frac{2}{k}x - \frac{2}{k} - 1$ 이다.

이때 두 점 P, Q의 좌표는 각각 $P\left(\frac{k}{2}+1, 0\right)$,

$Q\left(0, -\frac{2}{k}-1\right)$ 이므로

$$\overline{OP} = \frac{k}{2}+1, \overline{OQ} = -\frac{2}{k}-1, \overline{B'Q} = 2, \overline{BB'} = -k$$

따라서 두 삼각형의 넓이 S_1, S_2 는

$$S_1 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (-k) = -k,$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{k}{2}+1\right)\left(-\frac{2}{k}-1\right) = -\left(1 + \frac{1}{k} + \frac{k}{4}\right)$$

이므로

$$S_1 + S_2 = -\frac{5}{4}k - \frac{1}{k} - 1$$

이때 두 수 $-\frac{5}{4}k, -\frac{1}{k}$ 이 모두 양수이므로,

($\because -2 < k < 0$)

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\begin{aligned} S_1 + S_2 &\geq 2\sqrt{\left(-\frac{5}{4}k\right) \cdot \left(-\frac{1}{k}\right)} - 1 \\ &= \sqrt{5} - 1 \end{aligned}$$

(단, 등호는 $k = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 일 때 성립)

$$\therefore m + \alpha = \frac{3\sqrt{5}}{5} - 1$$

16 정답 ①

해설 유리함수 $y = \frac{ax+7}{x+b}$ 의 역함수의 그래프가 두 직선

$x = -3, y = 1$ 과 만나지 않으므로

유리함수 $y = \frac{ax+7}{x+b}$ 의 그래프의 점근선은

$x = 1, y = -3$ 이다.

$$y = \frac{ax+7}{x+b} = \frac{a(x+b)-ab+7}{x+b} \\ = \frac{7-ab}{x+b} + a$$

이므로 유리함수 $y = \frac{ax+7}{x+b}$ 의 그래프의 점근선은

두 직선 $x = -b, y = a$ 이다.

따라서 $a = -3, b = -1$ 이므로


$$a+b = -4$$

17 정답 ③

해설 함수 $y = \frac{k}{x+4} + 2$ ($k > 0$)의 그래프의 두 점근선의

방정식은 $x = -4, y = 2$ 이므로 두 점근선의 교점은 $C(-4, 2)$

점 $C(-4, 2)$ 와 곡선 위의 두 점 A, B가 한 직선 위에
있으려면 두 점 A, B는 그림과 같이 점 C에 대하여
대칭이어야 한다.



두 점 A, B가 각각 x 축, y 축 위의 점이므로 두 점의
좌표를 각각 $(a, 0), (0, b)$ 라 하면

점 C가 선분 AB의 중점이므로

$$\frac{a+0}{2} = -4, \frac{0+b}{2} = 2$$

즉, $a = -8, b = 4$

그러므로 A(-8, 0), B(0, 4)에서

\overline{AB}

$$= \sqrt{\{0 - (-8)\}^2 + \{4 - 0\}^2} = \sqrt{64 + 16} = 4\sqrt{5}$$

또 함수 $y = \frac{k}{x+4} + 2$ 의 그래프가 점 B(0, 4)를

지나므로

$$4 = \frac{k}{0+4} + 2, k = 8$$

$$\therefore k \cdot \overline{AB} = 8 \cdot 4\sqrt{5} = 32\sqrt{5}$$

18 정답 $\frac{2}{3}$

해설 g 가 f 의 역함수이므로 $f(g(x)) = x$

$$\therefore h(g(6)) = \frac{g(6)+2}{f(g(6))} = \frac{g(6)+2}{6}$$

$$g(6) = f^{-1}(6) = a \text{라 하면 } f(a) = 6$$

$$a^2 + a = 6, a^2 + a - 6 = 0$$

$$(a-2)(a+3) = 0$$

$$\therefore a = 2 \text{ 또는 } a = -3$$

이때 $a > 0$ 이므로 $a = 2$

즉, $g(6) = 2$ 이므로

$$h(g(6)) = \frac{g(6)+2}{6} \\ = \frac{2+2}{6} = \frac{2}{3}$$

19 정답 ②

해설 $y = \frac{6}{2x-6} = \frac{3}{x-3}$ 이므로 주어진 유리함수의

그래프는 $y = \frac{3}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼

평행이동한 것이다.

즉, $x < 3$ 이면 $y < 0$ 이고, $x > 3$ 이면 $y > 0$ 이다.

$$x = -1 \text{ 일 때, } y = \frac{6}{2 \cdot (-1) - 6} = -\frac{3}{4} \text{ 에서 분모의}$$

절댓값이 분자의 절댓값보다 크므로 $x < -1$ 인 경우 y 의
값은 정수가 될 수 없다.

$$x = 0 \text{ 일 때, } y = \frac{6}{2 \cdot 0 - 6} = -1$$

$$x = 1 \text{ 일 때, } y = \frac{6}{2 \cdot 1 - 6} = -\frac{3}{2}$$

$$x = 2 \text{ 일 때, } y = \frac{6}{2 \cdot 2 - 6} = -3$$

$x = 3$ 일 때, 주어진 유리함수는 정의되지 않는다.

$$x = 4 \text{ 일 때, } y = \frac{6}{2 \cdot 4 - 6} = 3$$

$$x = 5 \text{ 일 때, } y = \frac{6}{2 \cdot 5 - 6} = \frac{3}{2}$$

$$x = 6 \text{ 일 때, } y = \frac{6}{2 \cdot 6 - 6} = 1$$

$$x = 7 \text{ 일 때, } y = \frac{6}{2 \cdot 7 - 6} = \frac{3}{4} < 1 \text{ 이므로}$$

$x > 7$ 인 경우 y 의 값은 정수가 될 수 없다.

따라서 유리함수 $y = \frac{6}{2x-6}$ 의 그래프 위의 점 중

x 좌표, y 좌표가 모두 정수인 점은

$(0, -1), (2, -3), (4, 3), (6, 1)$ 의 4개이다.

20 정답 $a+b=-1$

해설 $f(x)-2f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{2x-1}{x+1}\dots$ ①에서

x 대신 $\frac{1}{x}$ 을 대입하면

$$f\left(\frac{1}{x}\right)-2f(x)=\frac{-x+2}{x+1}\dots$$
 ②

$$\textcircled{1} + 2 \times \textcircled{2} \rightarrow -f(x) = \frac{1}{x+1}$$

$$\therefore f(x) = -\frac{1}{x+1}$$

점근선 $x=-1, y=0$

$$\therefore a+b=-1$$

21 정답 ②

해설 $\neg, \perp, y = \frac{ax+b}{cx+d} = \frac{c(ax+b)}{c(cx+d)}$

$$= \frac{a(cx+d)-ad+bc}{c(cx+d)} = \frac{a}{c} - \frac{ad-bc}{c^2\left(x+\frac{d}{c}\right)}$$

$$\therefore y = -\frac{ad-bc}{c^2\left(x+\frac{d}{c}\right)} + \frac{a}{c}$$

위의 함수의 그래프는 $y = -\frac{ad-bc}{c^2x}$ 의 그래프를

x 축의 방향으로 $-\frac{d}{c}$ 만큼, y 축의 방향으로

$\frac{a}{c}$ 만큼 평행이동한 것으로 점근선은

두 직선 $x = -\frac{d}{c}, y = \frac{a}{c}$ 이다.

따라서 주어진 그래프에서

$$-\frac{d}{c} > 0, \frac{a}{c} < 0 \text{이므로 } ac < 0, cd < 0 \text{ (참)}$$

ㄷ. 주어진 함수의 그래프에서 $y = -\frac{ad-bc}{c^2x}$ 의 그래프는

제2,4사분면을 지나야 하므로

$$-(ad-bc) < 0$$

$$\therefore ad-bc > 0 \text{ (거짓)}$$

ㄹ. 주어진 함수의 그래프의 y 절편이 음수이므로 $x=0$ 을

대입하면 $\frac{b}{d} < 0$ 이다.

즉, $b > 0$ 이면 $d < 0$ 이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

22 정답 9

해설 유리함수의 그래프를 활용하여 수학 내적 문제 해결하기

함수 $f(x) = \frac{2}{x}$ 라 하면 $f(x) = f^{-1}(x)$ 이므로

곡선 $y = \frac{2}{x}$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

곡선 $y = \frac{2}{x}$ 와 직선 $y=-x+k$ 가 제1사분면에서

만나는 점 A의 좌표를 $A\left(a, \frac{2}{a}\right)$ ($a \neq \sqrt{2}$)라 하면

점 B의 좌표는 $B\left(\frac{2}{a}, a\right)$ 이다.

$\angle ABC = 90^\circ$ 이므로 점 C는 제3사분면 위에 있고

점 C의 좌표를 $C\left(c, \frac{2}{c}\right)$ 라 하면

직선 BC의 기울기는 1이다.

$$\frac{\frac{2}{c}-a}{c-\frac{2}{a}} = \frac{-a}{c} = 1, c = -a \text{이므로}$$

점 C의 좌표는 $C\left(-a, -\frac{2}{a}\right)$

$$\begin{aligned} \overline{AC}^2 &= \{a-(-a)\}^2 + \left\{\frac{2}{a}-\left(-\frac{2}{a}\right)\right\}^2 \\ &= 4a^2 + \frac{16}{a^2} = 20 \end{aligned}$$

$$a^2 + \frac{4}{a^2} = 5$$

$$\text{따라서 } k^2 = \left(a + \frac{2}{a}\right)^2 = a^2 + \frac{4}{a^2} + 4 = 9$$

23 정답 ④

해설 조건 (가)에서 곡선 $y = f(x)$ 가 직선 $y = 3$ 과 만나는 점의 개수와 직선 $y = -3$ 과 만나는 점의 개수의 합은 1이다.

곡선 $y = f(x)$ 가 x 축과 평행한 직선과 만나는 점의 개수는 점근선을 제외하면 모두 1이므로 두 직선 $y = 3, y = -3$ 중 하나는 곡선 $y = f(x)$ 의 점근선이다.

이때 곡선 $y = f(x)$ 의 점근선이 직선 $y = b$ 이므로

$$b = 3 \text{ 또는 } b = -3 \quad \cdots \textcircled{㉠}$$

$$f(x) = \frac{a}{x} + b, \text{ 즉 } y = \frac{a}{x} + b \text{에서}$$

$$\frac{a}{x} = y - b, x = \frac{a}{y - b}$$

$$\text{이때 } x \text{와 } y \text{를 서로 바꾸면 } y = \frac{a}{x - b}$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \frac{a}{x - b}$$

조건 (나)에서 $f^{-1}(3) = f(3) - 2$ 이므로

$$\frac{a}{3 - b} = \frac{a}{3} + b - 2 \quad \cdots \textcircled{㉡}$$

㉠에서 $b \neq 3$ 이므로 ㉠에서 $b = -3$ 이다.

㉡에 $b = -3$ 을 대입하면

$$\frac{a}{6} = \frac{a}{3} - 5$$

$$\therefore a = 30$$

$$\text{따라서 } f(x) = \frac{30}{x} - 3 \text{이므로}$$

$$f(5) = \frac{30}{5} - 3 = 3$$