

마플시너지(2025) - 공통수학2 (집합)

123~124, 126~137p

집합의 개념과 표현 ~ 두 집합 사이의 포함관계

실시일자	-
26문제 / DRE수학	

유형별 학습

이름

01 두 집합 $A = \{x \mid x^2 - 2kx + 5k + 24 = 0, x \text{는 실수}\}$,
 $B = \{x \mid 6x^2 - 11x - 10 = 0\}$ 에 대하여
 $n(A) + n(B) = 2$ 를 만족시키는 정수 k 의 개수를
 구하시오.

02 자연수 전체의 집합의 부분집합 A 가
 ‘ $x \in A$ 이면 $\frac{36}{x} \in A$ ’를 만족한다. 집합 A 의 원소의
 개수의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의
 값을 구하시오. (단, $A \neq \emptyset$)

03 두 집합 $A = \{-2, 4\}$, $B = \{-2, 2, a-1, 3a-2\}$ 에
 대하여 $A \subset B$ 가 성립하도록 하는 모든 자연수 a 의 값의
 합은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

04 [2019년 3월 고2 이과 25번 변형]
 자연수 n 에 대하여 자연수 전체 집합의 부분집합 A_n 을
 다음과 같이 정의하자.
 $A_n = \{x \mid x \text{는 } \sqrt{n} \text{ 이하의 홀수}\}$
 $A_n \subset A_{49}$ 를 만족시키는 n 의 최댓값을 구하시오.

05 집합 $A = \{\emptyset, 1, 3, \{1, 3\}\}$ 에 대하여 다음
 중에서 옳지 않은 것은?

- ① $\emptyset \in A$ ② $\emptyset \subset A$
 ③ $1 \in A$ ④ $\{1, 3\} \in A$
 ⑤ $\{1, 3\} \not\subset A$

06 집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 의 부분집합 X 의 모든
 원소의 합을 $S(X)$ 라 하자. $2 \notin X$, $5 \in X$ 인 모든 X 에
 대하여 $S(X)$ 의 합은?

- ① 456 ② 466 ③ 476
 ④ 486 ⑤ 496



- 07** 집합 $A = \{x \mid x = 5n - 2, n \text{은 } 0 < n \leq 8 \text{인 정수}\}$ 의 부분집합 중 적어도 한 개의 3의 배수를 원소로 갖는 부분집합의 개수를 구하시오.

- 08** 집합 $X = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 원소 n 에 대하여 X 의 부분집합 중 n 을 최대의 원소로 갖는 모든 집합의 개수를 $f(n)$ 이라 하자. 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

- ㄱ. $f(4) = 8$
 ㄴ. $a \in X, b \in X$ 일 때, $a < b$ 이면 $f(a) < f(b)$ 이다.
 ㄷ. $f(2) + f(4) + f(6) + f(8) + f(10) = 682$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 09** 집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 100 \text{보다 작은 짝수}\}$ 의 부분집합 B 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

- (가) 집합 B 의 진부분집합의 개수는 31이다.
 (나) 집합 B 의 원소 중 가장 작은 원소는 12이다.

이때 집합 B 의 원소의 개수를 p , 집합 B 의 원소의 합을 q 라 할 때, $\frac{q}{p}$ 의 최솟값은?

- ① 16 ② 18 ③ 20
 ④ 22 ⑤ 24

- 10** [2016년 9월 고2 이과 13번/3점]
 집합 $A = \{3, 4, 5, 6, 7\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 A 의 모든 부분집합 X 의 개수는?

- (가) $n(X) \geq 2$
 (나) 집합 X 의 모든 원소의 곱은 6의 배수이다.

- ① 18 ② 19 ③ 20
 ④ 21 ⑤ 22

- 11** 집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 12 \text{의 약수}\}$ 일 때, 적어도 하나의 원소가 홀수인 집합 A 의 부분집합의 개수를 구하시오.

- 12** 집합 $A = \{1, 2, \dots, n\}$ 의 부분집합 중에서 원소 1, 2를 반드시 포함하고 n 을 포함하지 않는 부분집합의 개수가 16개일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

13 집합 $A = \{1, 2, 3\}$ 의 부분집합을 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_8$ 이라 하고, A_1 의 원소의 총합을 $S(A_1)$, A_2 의 원소의 총합을 $S(A_2)$, \dots , A_8 의 원소의 총합을 $S(A_8)$ 이라 할 때, $S(A_1) + S(A_2) + \dots + S(A_8)$ 의 값은?

- ① 20 ② 22 ③ 24
④ 26 ⑤ 28

14 집합 $U = \{1, 2, 3, x, 7, 9\}$ 의 부분집합 중 원소의 개수가 2개인 부분집합을 각각 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ 이라 하고, 집합 A_k ($k = 1, 2, 3, \dots, n$)의 모든 원소의 합을 s_k 라 하자.

$s_1 + s_2 + s_3 + \dots + s_n = 150$ 일 때, x 의 값을 구하시오.

15 집합 X 의 모든 원소의 곱을 $f(X)$ 라 하자.
집합 $A = \{1, 2, 4, 8, 16, 32\}$ 의 공집합이 아닌 모든 부분집합을 각각 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{63}$ 이라 할 때,
 $f(A_1) \times f(A_2) \times f(A_3) \times \dots \times f(A_{63}) = 2^k$ 을 만족시키는 상수 k 의 값을 구하시오.

16 집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 의 부분집합 중에서 원소의 개수가 2인 부분집합은 21개이다. 이 집합을 B_k ($k = 1, 2, 3, \dots, 21$)라 하고 집합 B_k 의 모든 원소의 합을 S_k 라 할 때, $S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_{21}$ 의 값은?

- ① 156 ② 160 ③ 164
④ 168 ⑤ 172

17 집합 $S = \{x | x \text{는 } 9 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 공집합이 아닌 부분집합 A 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 집합 A 의 모든 원소의 곱의 최솟값을 구하시오.

- (가) $a \in A$ 이면 $(10 - a) \in A$ 이다.
(나) 집합 A 의 모든 원소의 합은 3의 배수이다.

18 집합 $U = \{2, 3, 5, 7, 11\}$ 의 부분집합 중 2개의 원소로 이루어진 부분집합 전체를 각각 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{10}$ 이라 하고, 집합 A_k 의 원소의 합을 a_k ($k = 1, 2, 3, \dots, 10$)이라 할 때,
 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{10}$ 의 값은?

- ① 104 ② 106 ③ 108
④ 110 ⑤ 112

- 19** 집합 $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ 의 공집합이 아닌 서로 다른 부분집합을 각각 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{31}$ 이라 하고, 집합 A_k ($k = 1, 2, 3, \dots, 31$)의 원소 중에서 가장 작은 원소를 a_k 라 할 때, $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{31}$ 의 값은?

① 80 ② 81 ③ 82
④ 83 ⑤ 84

- 20** 집합 $A = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^3}, \dots, \frac{1}{2^8} \right\}$ 의 공집합이 아닌 모든 부분집합을 $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n$ 이라 할 때, 각 부분집합의 최소 원소들의 합을 구하시오.

- 21** 집합 $X = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 원소 n 에 대하여 X 의 부분집합 중 n 을 최소의 원소로 갖는 모든 집합의 개수를 $f(n)$ 이라 하자. 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $f(6) = 8$
ㄴ. $a \in X, b \in X$ 일 때, $a > b$ 이면 $f(a) < f(b)$
ㄷ. $f(2) + f(4) + f(6) + f(8) + f(10) = 341$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22** 집합 $A = \left\{ 4, 2, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2} \right\}$ 의 공집합이 아닌 서로 다른 부분집합을 각각 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{31}$ 이라 하자. 집합 A_k ($k = 1, 2, 3, \dots, 31$)의 원소 중에서 최소인 것을 a_k 라 할 때, $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{31}$ 의 값을 구하시오.

- 23** 집합 $A = \{1, 3, 5, 7, \dots, 2m-1\}$ 의 부분집합 중에서 원소 1과 3은 반드시 포함하고 5와 $2m-1$ 은 포함하지 않는 부분집합의 개수가 32일 때 자연수 m 의 값을 구하시오.

- 24** $M = \{1, 2, 3\}$ 일 때, $2^M = \{X \mid X \subset M\}$ 으로 정의한다. 이때 2^M 의 부분집합의 개수를 구하시오.

25 집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 27 \text{의 약수}\}$ 일 때, 다음을 만족하는 집합 B 의 개수를 구하시오.

$$\{1\} \subset B \subset A, n(B) = 3$$

26 두 집합
 $A = \{x \mid x^2 - 12x + 27 = 0\},$
 $B = \left\{x \mid x = \frac{36}{n}, x, n \text{은 자연수}\right\}$
에 대하여 $A \subset X \subset B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수를 구하시오.

마플시너지(2025) - 공통수학2 (집합)
123~124,126~137p

집합의 개념과 표현 ~ 두 집합 사이의 포함관계

실시일자	-	유형별 학습	이름
26문제 / DRE수학			

빠른정답

01 10	02 10	03 ③
04 80	05 ⑤	06 ⑤
07 224	08 ⑤	09 ①
10 ②	11 48	12 7
13 ③	14 8	15 480
16 ④	17 45	18 ⑤
19 ④	20 4	21 ③
22 20	23 9	24 256
25 3	26 128	



마플시너지(2025) - 공통수학2 (집합)

123~124, 126~137p

집합의 개념과 표현 ~ 두 집합 사이의 포함관계

실시일자	-
26문제 / DRE수학	

유형별 학습

이름

01 두 집합 $A = \{x \mid x^2 - 2kx + 5k + 24 = 0, x \text{는 실수}\}$,
 $B = \{x \mid 6x^2 - 11x - 10 = 0\}$ 에 대하여
 $n(A) + n(B) = 2$ 를 만족시키는 정수 k 의 개수를
 구하시오.

정답 10

해설 $6x^2 - 11x - 10 = 0$ 에서 $(3x+2)(2x-5) = 0$
 $\therefore x = -\frac{2}{3}$ 또는 $x = \frac{5}{2}$
 $\therefore B = \left\{-\frac{2}{3}, \frac{5}{2}\right\}$
 즉, $n(B) = 2$ 이므로 $n(A) + n(B) = 2$ 에서 $n(A) = 0$
 따라서 이차방정식 $x^2 - 2kx + 5k + 24 = 0$ 이 실근을
 갖지 않아야 하므로 판별식을 D 라 하면
 $\frac{D}{4} = (-k)^2 - (5k + 24) < 0$
 $k^2 - 5k - 24 < 0, (k+3)(k-8) < 0$
 $\therefore -3 < k < 8$
 따라서 구하는 정수는 $-2, -1, 0, \dots, 7$ 의 10개다.

02 자연수 전체의 집합의 부분집합 A 가
 ‘ $x \in A$ 이면 $\frac{36}{x} \in A$ ’를 만족한다. 집합 A 의 원소의
 개수의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의
 값을 구하시오. (단, $A \neq \emptyset$)

정답 10

해설 집합 A 의 원소는 자연수이고, $x \in A$ 이면 $\frac{36}{x} \in A$ 이므로
 x 가 될 수 있는 수는 36의 양의 약수인 1, 2, 3, 4, 6, 9,
 12, 18, 36이다.
 이때 1과 36, 2와 18, 3과 12, 4와 9는 둘 중 하나가 집합
 A 의 원소이면 나머지 하나도 반드시 집합 A 의 원소이다.
 또한, 6도 집합 A 의 원소가 될 수 있으므로
 집합 A 의 원소의 개수는
 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$ 일 때 최대이고,
 $A = \{6\}$ 일 때 최소이다.
 따라서 $M=9, m=1$ 이므로
 $M+m=9+1=10$

03 두 집합 $A = \{-2, 4\}$, $B = \{-2, 2, a-1, 3a-2\}$ 에
 대하여 $A \subset B$ 가 성립하도록 하는 모든 자연수 a 의 값의
 합은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

정답 ③

해설 $A \subset B$ 가 성립하려면 $4 \in B$ 이어야 하므로
 $a-1=4$ 또는 $3a-2=4$
 $\therefore a=5$ 또는 $a=2$
 따라서 구하는 a 의 값의 합은
 $5+2=7$

04 [2019년 3월 고2 이과 25번 변형]
 자연수 n 에 대하여 자연수 전체 집합의 부분집합 A_n 을
 다음과 같이 정의하자.

$A_n = \{x \mid x \text{는 } \sqrt{n} \text{ 이하의 홀수}\}$
 $A_n \subset A_{49}$ 를 만족시키는 n 의 최댓값을 구하시오.

정답 80

해설 $\sqrt{49}=7$ 이므로 $A_{49} = \{1, 3, 5, 7\}$
 $\sqrt{81}=9$ 이므로 $A_{81} = \{1, 3, 5, 7, 9\}$
 따라서 $1 \leq \sqrt{n} < 9$ 이면 $A_n \subset A_{49}$ 이므로
 $1 \leq n < 81$
 따라서 자연수 n 의 최댓값은 80이다.

05 집합 $A = \{\emptyset, 1, 3, \{1, 3\}\}$ 에 대하여 다음
 중에서 옳지 않은 것은?

- ① $\emptyset \in A$ ② $\emptyset \subset A$
 ③ $1 \in A$ ④ $\{1, 3\} \in A$
 ⑤ $\{1, 3\} \not\subset A$

정답 ⑤

해설 $\{1, 3\}$ 은 부분집합도 되고 원소도 된다.

06 집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 의 부분집합 X 의 모든
 원소의 합을 $S(X)$ 라 하자. $2 \notin X, 5 \in X$ 인 모든 X 에
 대하여 $S(X)$ 의 합은?

- ① 456 ② 466 ③ 476
 ④ 486 ⑤ 496

정답 ⑤

해설 $2 \notin X, 5 \in X$ 인 집합 X 의 개수는
 $2^{7-1-1} = 2^5 = 32$
 한편, 32개의 집합 중에서 1을 반드시 원소로 갖는 집합의
 개수는 $1 \in X, 2 \notin X, 5 \in X$ 인 집합의 개수와 같으므로
 $2^{7-1-2} = 2^4 = 16$
 마찬가지로 3, 4, 6, 7을 각각 원소로 갖는 집합의 개수도
 16이므로 $S(X)$ 의 합은
 $32 \cdot 5 + 16(1 + 3 + 4 + 6 + 7) = 496$

07 집합 $A = \{x | x = 5n - 2, n \text{은 } 0 < n \leq 8 \text{인 정수}\}$ 의
 부분집합 중 적어도 한 개의 3의 배수를 원소로 갖는
 부분집합의 개수를 구하시오.

정답 224

해설 $A = \{x | x = 5n - 2, n \text{은 } 0 < n \leq 8 \text{인 정수}\}$ 에서
 $A = \{3, 8, 13, 18, \dots, 28, 33, 38\}$
 집합 A 의 원소 중 3의 배수는 3, 18, 33이므로 집합 A 의
 부분집합 중 적어도 한 개의 3의 배수를 원소로 갖는
 부분집합의 개수는 전체 부분집합의 개수에서 3, 18, 33을
 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수를 뺀 것과 같다.
 $\therefore 2^8 - 2^{8-3} = 2^8 - 2^5 = 256 - 32 = 224$

08 집합 $X = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 원소 n 에
 대하여 X 의 부분집합 중 n 을 최대의 원소로 갖는 모든
 집합의 개수를 $f(n)$ 이라 하자. 다음 보기 중 옳은 것만을
 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

- ㄱ. $f(4) = 8$
 ㄴ. $a \in X, b \in X$ 일 때, $a < b$ 이면
 $f(a) < f(b)$ 이다.
 ㄷ. $f(2) + f(4) + f(6) + f(8) + f(10) = 682$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 ⑤

해설 ㄱ. $f(4)$ 는 4를 최대의 원소로 갖는 모든 집합의
 개수이므로 집합 X 에서 4는 포함하고 5 이상은
 포함하지 않는 부분집합의 개수와 같다.
 따라서 부분집합의 개수는
 $f(4) = 2^{10-1-6} = 8$ (참)
 ㄴ. $f(a) = 2^{a-1}, f(b) = 2^{b-1}$ 이고 $a < b$ 이므로
 $f(a) < f(b)$ (참)
 ㄷ. $f(2) = 2, f(4) = 8, f(6) = 32, f(8) = 128,$
 $f(10) = 512$ 이므로
 $f(2) + f(4) + f(6) + f(8) + f(10) = 682$ (참)
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ 이다.

09 집합 $A = \{x | x \text{는 } 100 \text{보다 작은 짝수}\}$ 의 부분집합 B 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

- (가) 집합 B 의 진부분집합의 개수는 31이다.
(나) 집합 B 의 원소 중 가장 작은 원소는 12이다.

이때 집합 B 의 원소의 개수를 p , 집합 B 의 원소의 합을 q 라 할 때, $\frac{q}{p}$ 의 최솟값은?

- ① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

정답 ①

해설 조건 (가)에서 $n(B) = p$ 라 하면
집합 B 의 진부분집합의 개수는 $2^p - 1 = 31$
 $\therefore p = 5$
이때 $\frac{q}{p}$ 가 최솟값을 가지려면 q 가 최소이어야 한다.
조건 (나)에서 집합 B 의 원소 중 가장 작은 원소는 12이므로 합이 가장 작은 집합 B 는
 $B = \{12, 14, 16, 18, 20\}$
즉, $q = 12 + 14 + 16 + 18 + 20 = 80$
따라서 $\frac{q}{p}$ 의 최솟값은 $\frac{80}{5} = 16$

10 [2016년 9월 고2 이과 13번/3점]
집합 $A = \{3, 4, 5, 6, 7\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 A 의 모든 부분집합 X 의 개수는?

- (가) $n(X) \geq 2$
(나) 집합 X 의 모든 원소의 곱은 6의 배수이다.

- ① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

정답 ②

해설 부분집합의 개수 추론하기
(i) $6 \in X$ 인 경우 집합 X 의 개수는
 $2^4 - 1 = 15$
(ii) $6 \notin X$ 인 경우 집합 X 는 3, 4를 반드시 포함해야
하므로 집합 X 의 개수는
 $2^{4-2} = 4$
(i), (ii)에 의하여 주어진 조건을 만족시키는 집합 X 의 개수는 19이다.

11 집합 $A = \{x | x \text{는 } 12 \text{의 약수}\}$ 일 때, 적어도 하나의 원소가 홀수인 집합 A 의 부분집합의 개수를 구하시오.

정답 48

해설 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$
적어도 하나는 홀수인 부분집합의 개수는 모든 부분집합의 개수에서 짝수의 원소로만 이루어진 부분집합의 개수를 빼면 되므로 $2^6 - 2^{6-2} = 64 - 16 = 48$ 이다.

12 집합 $A = \{1, 2, \dots, n\}$ 의 부분집합 중에서 원소 1, 2를 반드시 포함하고 n 을 포함하지 않는 부분집합의 개수가 16개일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

정답 7

해설 $2^{(1, 2, n \text{을 제외한 원소의 개수})} = 2^{n-3} = 16 = n^4$
 $\therefore n = 7$

13 집합 $A = \{1, 2, 3\}$ 의 부분집합을 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_8$ 이라 하고, A_1 의 원소의 총합을 $S(A_1)$, A_2 의 원소의 총합을 $S(A_2)$, \dots , A_8 의 원소의 총합을 $S(A_8)$ 이라 할 때, $S(A_1) + S(A_2) + \dots + S(A_8)$ 의 값은?

- ① 20 ② 22 ③ 24
④ 26 ⑤ 28

정답 ③

해설 집합 A 의 부분집합을 모두 구해보면
 $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\},$
 $\{1, 2, 3\}$ 이다.
 이때 1을 반드시 포함하는 집합은 4개, 2를 반드시
 포함하는 집합은 4개, 3을 반드시 포함하는 집합은
 4개이므로 원소의 총합은
 $4(1+2+3)=24$

- 14** 집합 $U = \{1, 2, 3, x, 7, 9\}$ 의 부분집합 중 원소의
 개수가 2개인 부분집합을 각각 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ 이라
 하고, 집합 A_k ($k=1, 2, 3, \dots, n$)의 모든 원소의 합을
 s_k 라 하자.
 $s_1 + s_2 + s_3 + \dots + s_n = 150$ 일 때, x 의 값을 구하시오.

정답 8

해설 집합 $U = \{1, 2, 3, x, 7, 9\}$ 의 부분집합 중
 원소의 개수가 2인 부분집합은
 $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, x\}, \{1, 7\}, \{1, 9\}, \{2, 3\},$
 $\{2, x\}, \{2, 7\}, \{2, 9\}, \{3, x\}, \{3, 7\}, \{3, 9\},$
 $\{x, 7\}, \{x, 9\}, \{7, 9\}$ 로 15개다.
 $\therefore n = 15$
 집합 U 의 부분집합 중 1을 포함하고 원소의 개수가 2인
 부분집합의 개수는 5이다.
 마찬가지로 2, 3, x , 7, 9를 각각 포함하는 원소의 개수가
 2인 부분집합의 개수도 5이므로
 $s_1 + s_2 + s_3 + \dots + s_n = 5 \cdot (1+2+3+x+7+9)$
 $5(x+22)=150$
 $\therefore x = 8$

- 15** 집합 X 의 모든 원소의 곱을 $f(X)$ 라 하자.
 집합 $A = \{1, 2, 4, 8, 16, 32\}$ 의 공집합이 아닌 모든
 부분집합을 각각 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{63}$ 이라 할 때,
 $f(A_1) \times f(A_2) \times f(A_3) \times \dots \times f(A_{63}) = 2^k$ 을
 만족시키는 상수 k 의 값을 구하시오.

정답 480

해설 집합 A 의 부분집합 중에서 1을 반드시 원소로 갖는 집합의
 개수는
 $2^{6-1} = 2^5 = 32$
 마찬가지로 2, 4, 8, 16, 32를 각각 원소로 갖는 집합의
 개수도 32이므로
 $f(A_1) \times f(A_2) \times f(A_3) \times \dots \times f(A_{63})$
 $= 1^{32} \times 2^{32} \times 4^{32} \times 8^{32} \times 16^{32} \times 32^{32}$
 $= 2^{32} \times (2^2)^{32} \times (2^3)^{32} \times (2^4)^{32} \times (2^5)^{32}$
 $= 2^{32} \times 2^{64} \times 2^{96} \times 2^{128} \times 2^{160}$
 $= 2^{32+64+96+128+160}$
 $= 2^{480}$
 $\therefore k = 480$

- 16** 집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 의 부분집합 중에서
 원소의 개수가 2인 부분집합은 21개이다. 이 집합을
 B_k ($k=1, 2, 3, \dots, 21$)라 하고 집합 B_k 의 모든 원소의
 합을 S_k 라 할 때, $S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_{21}$ 의 값은?

- ① 156 ② 160 ③ 164
 ④ 168 ⑤ 172

정답 ④

해설 집합 B_k 중에서 1을 원소로 갖는 집합은
 $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}, \{1, 6\}, \{1, 7\}$
 의 6개이다.
 마찬가지로 2, 3, 4, 5, 6, 7을 각각 원소로 갖는 집합의
 개수도 6이므로
 $S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_{21}$
 $= 6(1+2+3+4+5+6+7)$
 $= 168$

- 17** 집합 $S = \{x | x \text{는 } 9 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 공집합이 아닌
 부분집합 A 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때,
 집합 A 의 모든 원소의 곱의 최솟값을 구하시오.

- (가) $a \in A$ 이면 $(10-a) \in A$ 이다.
 (나) 집합 A 의 모든 원소의 합은 3의 배수이다.

정답 45

해설 조건 (가)에 의하여 1과 9, 2와 8, 3과 7, 4와 6은 어느 하나가 A 의 원소이면 나머지 하나도 반드시 A 의 원소이다.
 또, $A = \{5\}$ 이면 조건 (가)를 만족시킨다.
 집합 A 는 집합 $\{1, 9\}, \{2, 8\}, \{3, 7\}, \{4, 6\}, \{5\}$ 중에서 일부 또는 전체를 부분집합으로 갖는다.
 네 집합 $\{1, 9\}, \{2, 8\}, \{3, 7\}, \{4, 6\}$ 은 모든 원소의 합이 각각 10이므로 원소의 합이 3의 배수가 될 수 있는 경우는 15, 30, 45이다.
 위의 조건을 만족시키면서 집합 A 의 모든 원소의 곱이 최소가 되는 경우는 $\{1, 9\} \subset A, \{5\} \subset A$ 이다.
 즉, $A = \{1, 5, 9\}$ 일 때 모든 원소의 곱의 최솟값 45를 갖는다.

18 집합 $U = \{2, 3, 5, 7, 11\}$ 의 부분집합 중 2개의 원소로 이루어진 부분집합 전체를 각각 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{10}$ 이라 하고, 집합 A_k 의 원소의 합을 a_k ($k = 1, 2, 3, \dots, 10$)이라 할 때, $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{10}$ 의 값은?

- ① 104 ② 106 ③ 108
 ④ 110 ⑤ 112

정답 ⑤

해설 집합 U 의 부분집합 중에서 원소의 개수가 2이면서 2를 원소로 갖는 부분집합은 $\{2, 3\}, \{2, 5\}, \{2, 7\}, \{2, 11\}$ 의 4개이다.
 즉, $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{10}$ 중에서 2를 원소로 갖는 집합은 위의 4개이다.
 마찬가지로 3, 5, 7, 11을 원소로 갖는 집합도 각각 4개씩 있다.
 $\therefore a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{10} = 4(2 + 3 + 5 + 7 + 11)$
 $= 112$

19 집합 $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ 의 공집합이 아닌 서로 다른 부분집합을 각각 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{31}$ 이라 하고, 집합 A_k ($k = 1, 2, 3, \dots, 31$)의 원소 중에서 가장 작은 원소를 a_k 라 할 때, $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{31}$ 의 값은?

- ① 80 ② 81 ③ 82
 ④ 83 ⑤ 84

정답 ④

해설 (i) $a_k = 1$ 일 때,
 1을 반드시 포함하는 경우이므로
 $2^{5-1} = 16$
 (ii) $a_k = 3$ 일 때,
 1은 포함하지 않고, 3은 반드시 포함하는 경우이므로
 $2^{5-2} = 8$
 (iii) $a_k = 5$ 일 때,
 1, 3은 포함하지 않고, 5는 반드시 포함하는 경우이므로
 $2^{5-3} = 4$
 (iv) $a_k = 7$ 일 때,
 1, 3, 5는 포함하지 않고, 7은 반드시 포함하는 경우이므로
 $2^{5-4} = 2$
 (v) $a_k = 9$ 일 때,
 9만 포함하는 경우이므로 1
 (i) ~ (v)에 의하여
 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{31}$
 $= 1 \cdot 16 + 3 \cdot 8 + 5 \cdot 4 + 7 \cdot 2 + 9 \cdot 1$
 $= 83$

20 집합 $A = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^3}, \dots, \frac{1}{2^8} \right\}$ 의 공집합이 아닌 모든 부분집합을 $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n$ 이라 할 때, 각 부분집합의 최소 원소들의 합을 구하시오.

정답 4

해설 집합 $A = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^3}, \dots, \frac{1}{2^8} \right\}$ 의 부분집합 중에서

(i) 최소 원소가 $\frac{1}{2^8}$ 인 경우

즉, 원소 $\frac{1}{2^8}$ 을 반드시 포함하는 부분집합의 개수는

$$2^{8-1} = 2^7$$

(ii) 최소 원소가 $\frac{1}{2^7}$ 인 경우

즉, 원소 $\frac{1}{2^7}$ 은 반드시 포함하고,

원소 $\frac{1}{2^8}$ 은 포함하지 않는 부분집합의 개수는

$$2^{8-1-1} = 2^6$$

(iii) 최소 원소가 $\frac{1}{2^6}$ 인 경우

즉, 원소 $\frac{1}{2^6}$ 은 반드시 포함하고,

두 원소 $\frac{1}{2^8}, \frac{1}{2^7}$ 은 포함하지 않는 부분집합의 개수는

$$2^{8-1-2} = 2^5$$

⋮

따라서 각 부분집합의 최소 원소들의 합은

$$\frac{1}{2^8} \cdot 2^7 + \frac{1}{2^7} \cdot 2^6 + \frac{1}{2^6} \cdot 2^5 + \dots + \frac{1}{2} \cdot 1$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2} = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4$$

21 집합 $X = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 원소 n 에 대하여 X 의 부분집합 중 n 을 최소의 원소로 갖는 모든 집합의 개수를 $f(n)$ 이라 하자. 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $f(6)=8$

ㄴ. $a \in X, b \in X$ 일 때, $a > b$ 이면 $f(a) < f(b)$

ㄷ. $f(2)+f(4)+f(6)+f(8)+f(10)=341$

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 ③

해설 집합 X 의 부분집합이 n 을 최소의 원소로 가지려면 n 은 원소로 갖고, n 보다 작은 $1, 2, \dots, n-1$ 은 원소로 갖지 않아야 하므로

$$f(n) = 2^{10-(n-1)-1} = 2^{10-n}$$

ㄱ. $f(6) = 2^{10-6} = 2^4 = 16$ (거짓)

ㄴ. $f(a) = 2^{10-a}, f(b) = 2^{10-b}$

$a > b$ 이면 $10-a < 10-b$ 이므로

$$2^{10-a} < 2^{10-b}$$

$\therefore f(a) < f(b)$ (참)

ㄷ. $f(2)+f(4)+f(6)+f(8)+f(10)$

$$= 2^{10-2} + 2^{10-4} + 2^{10-6} + 2^{10-8} + 2^{10-10}$$

$$= 2^8 + 2^6 + 2^4 + 2^2 + 2^0$$

$$= 256 + 64 + 16 + 4 + 1$$

$$= 341 \text{ (참)}$$

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

22 집합 $A = \left\{ 4, 2, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2} \right\}$ 의 공집합이 아닌 서로 다른

부분집합을 각각 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{31}$ 이라 하자.

집합 A_k ($k = 1, 2, 3, \dots, 31$)의 원소 중에서 최소인

것을 a_k 라 할 때, $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{31}$ 의 값을

구하시오.

정답 20

해설 (i) $a_k = 4$ 일 때

집합 A_k 는 $\{4\}$ 로 1개뿐이다.

따라서 $a_k = 4$ 인 k 의 개수는 1이다.

(ii) $a_k = 2$ 일 때

집합 A_k 는 2는 포함하고 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}$ 은 포함하지

않는 부분집합이므로 집합 A_k 의 개수는 집합 $\{4\}$ 의
부분집합의 개수와 같으므로 k 의 개수는 2^1

(iii) $a_k = 1$ 일 때

집합 A_k 는 1은 포함하고 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}$ 은 포함하지 않는

부분집합이므로 집합 A_k 의 개수는 집합 $\{4, 2\}$ 의
부분집합의 개수와 같으므로 k 의 개수는 2^2

(iv) $a_k = \frac{1}{2}$ 일 때

집합 A_k 는 $\frac{1}{2}$ 은 포함하고 $\frac{1}{2^2}$ 은 포함하지 않는

부분집합이므로 집합 A_k 의 개수는 집합 $\{4, 2, 1\}$ 의
부분집합의 개수와 같으므로 k 의 개수는 2^3

(v) $a_k = \frac{1}{2^2}$ 일 때

집합 A_k 는 $\frac{1}{2^2}$ 을 포함하는 부분집합이므로

집합 A_k 의 개수는 집합 $\left\{4, 2, 1, \frac{1}{2}\right\}$ 의 부분집합의

개수와 같으므로 k 의 개수는 2^4

(i) ~ (v)에 의하여

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{31} &= (4 \cdot 1) + (2 \cdot 2) + (1 \cdot 2^2) \\ &\quad + \left(\frac{1}{2} \cdot 2^3\right) + \left(\frac{1}{2^2} \cdot 2^4\right) \\ &= 20 \end{aligned}$$

23 집합 $A = \{1, 3, 5, 7, \dots, 2m-1\}$ 의 부분집합 중에서
원소 1과 3은 반드시 포함하고 5와 $2m-1$ 은 포함하지
않는 부분집합의 개수가 32일 때 자연수 m 의 값을
구하시오.

정답 9

해설 $A = \{1, 3, 5, 7, \dots, 2m-1\} \Rightarrow n(A) = m(\text{개})$

원소 1과 3은 반드시 포함하고 5와 $2m-1$ 은 반드시
포함하지 않는 부분집합의 개수가 32개이므로

$$2^{m-2-2} = 32, m-4 = 5$$

$$m = 9$$

24 $M = \{1, 2, 3\}$ 일 때, $2^M = \{X \mid X \subset M\}$ 으로
정의한다. 이때 2^M 의 부분집합의 개수를 구하시오.

정답 256

해설 $2^M = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$

$$n(2^M) = 8 \text{이므로 } 2^M \text{의 부분집합의 개수는 } 2^8 = 256$$

[다른 풀이]

2^M 의 부분집합의 개수를 구하는 것이므로

2^M 의 원소의 개수만 알면 된다.

M 의 부분집합의 개수가 2^M 의 원소의 개수이다.

2^M 의 원소의 개수는 $2^3 = 8$ 이므로 2^M 의 부분집합의
개수는 $2^8 = 256$

25 집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 27 \text{의 약수}\}$ 일 때, 다음을 만족하는
집합 B 의 개수를 구하시오.

$$\{1\} \subset B \subset A, n(B) = 3$$

정답 3

해설 $A = \{1, 3, 9, 27\}$

집합 B 는 원소 1을 포함한 집합 A 의 부분집합 중 원소의
개수가 3개인 집합이므로

$\{1, 3, 9\}, \{1, 3, 27\}, \{1, 9, 27\}$ 의 3개이다.

26 두 집합

$$A = \{x \mid x^2 - 12x + 27 = 0\},$$

$$B = \left\{x \mid x = \frac{36}{n}, x, n \text{은 자연수}\right\}$$

에 대하여 $A \subset X \subset B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수를
구하시오.

정답 128

해설 $x^2 - 12x + 27 = 0$ 에서 $(x - 3)(x - 9) = 0$
따라서 $x = 3$ 또는 $x = 9$ 이므로
 $A = \{3, 9\}$
 $x = \frac{36}{n}$ (n 은 자연수)을 만족시키는 자연수 x 는 36의
양의 약수이므로 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36
 $\therefore B = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$
따라서 $A \subset X \subset B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수는
집합 B 의 부분집합 중에서 3, 9를 반드시 원소로 갖는
집합이므로 집합 X 의 개수는
 $2^{9-2} = 2^7 = 128$