

☆2019-2-2-기말-수1-대동세무고-공통-등차수열~수학적 귀납법☆

1)첫째항이 3, 공차가 4인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 a_8 의 값은? (3.6점)

- ① 27 ② 31 ③ 35
④ 39 ⑤ 43

3) $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 7^3$ 의 값은? (3.7점)

- ① 384 ② 484 ③ 584
④ 684 ⑤ 784

2)세 수 3, a , b 는 이 순서대로 등차수열을 이루고, 세 수 4, a , b 는 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $a+b$ 의 값은? (단, $a < b$) (3.6점)

- ① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24

4)수열 $\{a_n\}$ 이 $\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_{n+1} = 2a_n - 1 \end{cases} (n = 1, 2, 3, \dots)$ 과 같이 귀납적으로 정의될 때, a_{10} 의 값은? (3.7점)

- ① 255 ② 257 ③ 511
④ 513 ⑤ 1205

☆2019-2-2-기말-수1-대동세무고-공통-등차수열~수학적 귀납법☆

5)등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_3 + a_{11} = 40, a_{12} - a_8 = 12$$

을 만족시킬 때, a_7 의 값은? (3.8점)

- ① 4 ② 8 ③ 12
④ 16 ⑤ 20

6)모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 첫째항부터 제4항까지의 합이 45, 제5항부터 제8항까지의 합이 720일 때, a_5 의 값은? (3.9점)

- ① 48 ② 54 ③ 60
④ 66 ⑤ 72

7) $\sum_{k=1}^{10} a_k = 6, \sum_{k=1}^{10} b_k = 8$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} (-3a_k + 6b_k - 2)$ 의 값은? (4.0점)

- ① 10 ② 20 ③ 30
④ 40 ⑤ 50

8)수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} - a_n = 2 \times 3^{n-3} - 3n$$

을 만족시킬 때, $a_8 - a_4$ 의 값은? (4.0점)

- ① 121 ② 174 ③ 212
④ 218 ⑤ 284

☆2019-2-2-기말-수1-대동세무고-공통-등차수열~수학적 귀납법☆

9)첫째항이 -28 , 공차가 3 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, S_n 의 값이 최소가 되게 하는 자연수 n 의 값은?
(4.1점)

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

10) $\sum_{k=1}^n a_k = 2n^2 - n$ 일 때, $\sum_{k=1}^{20} a_{2k}$ 의 값은? (4.1 점)

- ① 1280
- ② 1440
- ③ 1620
- ④ 1820
- ⑤ 1920

11)자연수 n 에 대하여 n^2 을 4 으로 나눈 나머지를 a_n 이라 할 때, $\sum_{k=1}^{180} a_k$ 의 값은? (4.2점)

- ① 30
- ② 60
- ③ 90
- ④ 120
- ⑤ 150

12)모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$4S_n = \{a_n\}^2 + 2a_n - 3 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

가 성립한다. a_7 의 값은? (4.3점)

- ① 6
- ② 9
- ③ 12
- ④ 15
- ⑤ 18

☆2019-2-2-기말-수1-대동세무고-공통-등차수열~수학적 귀납법☆

13) $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{4+8+12+\dots+4k}$ 의 값은? (4.4점)

- ① $\frac{5}{11}$ ② $\frac{10}{11}$ ③ $\frac{10}{21}$
 ④ $\frac{20}{21}$ ⑤ $\frac{5}{21}$

14) 수열 $\{a_n\}$ 이

$$\begin{cases} a_1 = 3 \\ a_{n+1} = \frac{2n+3}{2n+1} a_n \end{cases} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

과 같이 귀납적으로 정의될 때, a_7 의 값은? (4.5점)

- ① 6 ② 9 ③ 12
 ④ 15 ⑤ 18

15) 모든 자연수 n 에 대하여 다음 공식

$$(1^2 + 1) \times 1! + (2^2 + 1) \times 2! + \dots + (n^2 + 1)n! = n \times (n+1)!$$

이 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명하는 과정이다. 가, 나에 알맞은

식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라 할 때, $\frac{g(5)}{f(3)}$ 의 값은? (4.6점)

(i) $n = 1$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = (1^2 + 1) \times 1! = 2, (\text{우변}) = 1 \times (1+1) = 2$$

(ii) $n = k$ 일 때, 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$(1^2 + 1) \times 1! + (2^2 + 1) \times 2! + \dots$$

$$+ (k^2 + 1) \times k! = k \times (k+1)! \dots\dots \text{㉠}$$

㉠의 좌변에 $\{(k+1)^2 + 1\} \times \boxed{\text{가}}$ 을 더하면

$$(1^2 + 1) \times 1! + (2^2 + 1) \times 2! + \dots$$

$$+ (k^2 + 1) \times k! + \{(k+1)^2 + 1\} \times \boxed{\text{가}}$$

$$= k \times (k+1)! + \{(k+1)^2 + 1\} \times \boxed{\text{가}}$$

$$= \{(k+1)(k+2)\} \times (k+1)!$$

$$= (k+1) \times \boxed{\text{나}}$$

위 등식은 주어진 등식에 $n = k+1$ 을 대입한 것과 같다.

따라서 $n = k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 등식 ㉠이 성립한다.

- ① 90 ② 150 ③ 210
 ④ 270 ⑤ 330

☆2019-2-2-기말-수1-대동세무고-공통-등차수열~수학적 귀납법☆

16)수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 88$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 3 & (a_n \geq 65) \\ \frac{1}{2}a_n & (a_n < 65) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{15} a_n$ 의 값은? (4.8점)

- ① 365
- ② 478
- ③ 596
- ④ 635
- ⑤ 747

(서술형 1)

17)수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 4, a_2 = 7$$

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = 0$$

과 같이 귀납적으로 정의될 때, a_{10} 의 값은? (7점)

(서술형 2)

18) $8^2 + 9^2 + 10^2 + \cdots + 20^2$ 의 값은? (7점)

☆2019-2-2-기말-수1-대동세무고-공통-등차수열~수학적 귀납법☆

(서술형 3)

19)다음은 $n \geq 5$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$2^n > n^2$$

이 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명한 것이다.

(i) $n = 5$ 일 때,

(1) _____

따라서 $n = 5$ 일 때, 주어진 부등식이 성립한다.

(ii) $n = k (k \geq 5)$ 일 때, 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$2^k > k^2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

부등식 $\textcircled{1}$ 의 양변에 2를 곱하면

$$2^{k+1} > 2k^2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

한편

(2) _____

$$\text{즉 } 2k^2 - (k+1)^2 > 0 \text{이므로 } 2k^2 > (k+1)^2 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2}, \textcircled{3} \text{에서 } 2^{k+1} > (k+1)^2$$

위 부등식은 주어진 부등식에 $n = k+1$ 을 대입한 것과 같다.

따라서 $n = k+1$ 일 때도 주어진 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 $n \geq 5$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.

(서술형 4)

20)수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k = \log \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

를 만족시킨다. $\sum_{k=1}^{20} a_{2k}$ 의 값은? (8점)

위의 증명에서 밑줄에 들어갈 식은? (8점)

- 1) (정답) ②
- 2) (정답) ②
- 3) (정답) ⑤
- 4) (정답) ④
- 5) (정답) ⑤
- 6) (정답) ①
- 7) (정답) ①
- 8) (정답) ②
- 9) (정답) ⑤
- 10) (정답) ③
- 11) (정답) ③
- 12) (정답) ④
- 13) (정답) ①
- 14) (정답) ④
- 15) (정답) ③
- 16) (정답) ⑤
- 17) (정답) 31
- 18) (정답) 2730
- 19) (정답) 해설참조

(i) $n = 5$ 일 때,

$$(1) \text{ (좌변)} = 2^5 = 32 > 5^2 = 25 = \text{(우변)}$$

따라서 $n = 5$ 일 때, 주어진 부등식이 성립한다.

(ii) $n = k (k \geq 5)$ 일 때, 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$2^k > k^2 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

부등식 \textcircled{A} 의 양변에 2를 곱하면

$$2^{k+1} > 2k^2 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

한편

$$(2) \text{ } 2k^2 - (k+1)^2 = k^2 - 2k - 1 = k(k-2) - 1$$

$$\text{이때 } k \geq 5 \text{ 이므로 } k(k-2) - 1 > 0$$

$$\text{즉 } 2k^2 - (k+1)^2 > 0 \text{ 이므로 } 2k^2 > (k+1)^2 \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

$$\textcircled{B}, \textcircled{C} \text{ 에서 } 2^{k+1} > (k+1)^2$$

위 부등식은 주어진 부등식에 $n = k+1$ 을 대입한 것과 같다.

따라서 $n = k+1$ 일 때도 주어진 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 $n \geq 5$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.

20) (정답) $\log 21$