

## 교과서 유사문제\_미래엔 - 공통수학2 \_평 면좌표와 직선의 방정식

### 선분의 내분, 내분점의 좌표 ~ 점과 직선 사이의 거리

- 01** 수직선 위의 두 점  $A(6)$ ,  $B(-1)$  사이의 거리를 구하시오.

- 02** 다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.


$O(0)$ ,  $A(-1)$

- 03** 좌표평면에서 두 점  $A(-4 + \sqrt{3}, \sqrt{2})$ ,  $B(\sqrt{3}, 3 + \sqrt{2})$  사이의 거리를 구하시오.

- 04** [2017년 3월 고2 문과 22번 변형]  
좌표평면 위의 두 점  $A(3, 0)$ ,  $B(0, 7)$ 에 대하여 선분  $AB$ 의 길이를  $l$ 이라 할 때,  $l^2$ 의 값을 구하시오.

- 05** 수직선 위의 두 점  $A(7)$ ,  $B(-1)$ 에 대하여  $\overline{AB}$ 를  $2:3$ 으로 내분하는 점  $P$ 의 좌표를 구하시오.

- 06** 다음 그림과 같이 선분  $AB$ 의 사등분점을 각각  $C$ ,  $D$ ,  $E$ 라 할 때, 점  $D$ 는  $\overline{AB}$ 를  $t:1$ 로 내분하는 점이다. 이때,  $t$ 의 값을 구하시오.



- 07** 좌표평면 위의 두 점  $A(-1, 3)$ ,  $B(9, 3)$ 에 대하여 선분  $AB$ 를  $3:7$ 로 내분하는 점의 좌표를  $(x, y)$ 라 할 때,  $xy$ 의 값을 구하시오.


- 08** 두 점  $A(-8, 3)$ ,  $B(6, -4)$ 에 대하여 선분  $AB$ 를  $m:n$ 으로 내분하는 점의 좌표가  $(-4, 1)$ 일 때, 선분  $AB$ 를  $n:m$ 으로 내분하는 점의 좌표는?  
(단,  $m, n$ 은 서로소인 자연수이다.)

- ①  $(-2, -2)$       ②  $(-1, -2)$       ③  $(2, -2)$   
④  $(2, 1)$       ⑤  $(2, 2)$

- 09** 점  $(2, -1)$ 을 지나고 직선  $y = 2x + 4$ 에 평행한 직선의 방정식은?

- ①  $y = \frac{1}{2}x - 2$       ②  $y = 2x - 5$   
③  $y = -2x - 5$       ④  $y = 2x + 2$   
⑤  $y = -2x + 5$

- 10 다음 직선  $l$  과 평행하면서 점  $(-2, 2)$  를 지나는 직선의 방정식은  $y = ax + b$  이다. 이때,  $a + b$  의 값은 ?



- ①  $-4$       ②  $-3$       ③  $-2$   
④  $-1$       ⑤  $0$

- 11 점  $(1, 2)$ 를 지나는 직선  $y = ax + b$ 가 직선  $y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ 에 수직일 때, 상수  $a, b$ 에 대하여  $ab$ 의 값은?

- ①  $-8$       ②  $-6$       ③  $-4$   
④  $-2$       ⑤  $0$

- 12 [2024년 10월 고1 22번 변형] 좌표평면 위의 두 점  $(0, a), (3, 3a - 2)$ 를 지나는 직선과 직선  $y = 4x + 3$ 이 서로 평행할 때,  $a$ 의 값을 구하시오.

- 13 좌표평면 위의 점  $(5, 5)$ 와 직선  $-x + 3y = 0$  사이의 거리는?

- ①  $\sqrt{2}$       ②  $2$       ③  $\sqrt{5}$   
④  $\sqrt{10}$       ⑤  $5$

- 14 점  $(-3, 5)$ 와 직선  $x = 7$  사이의 거리를 구하시오.

- 15 세 꼭짓점의 좌표가 각각  $A(a, 3), B(-1, -5), C(3, 7)$ 인  $\triangle ABC$ 가  $\angle A$ 가 직각인 직각삼각형이 되도록 하는 상수  $a$ 의 값들의 합은?

- ①  $-2$       ②  $-1$       ③  $0$   
④  $1$       ⑤  $2$

- 16 세 점  $A(0, 0), B(1, 4), C(5, 3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형  $ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

- ① 정삼각형  
②  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  
③  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형  
④  $\angle B = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형  
⑤ 둔각삼각형

- 17 두 점  $A(1, 3), B(4, -2)$ 를 잇는 선분  $AB$ 를 3:1로 내분하는 점이 직선  $y = x + a$  위에 있을 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ①  $-7$       ②  $-6$       ③  $-5$   
④  $-4$       ⑤  $-3$

18 두 점  $A(a, b)$ ,  $B(c, d)$ 를 이은 선분  $AB$  위에 점  $P(x, y)$ 가 있다.  $\overline{AB}=20$ 이고,  $5x=2a+3c$ ,  $5y=2b+3d$ 가 성립할 때, 선분  $AP$ 의 길이는?

- ① 8                      ② 10                      ③ 12  
④ 14                      ⑤ 16

19 세 점  $A(a, 0)$ ,  $B(-3, 2)$ ,  $C(13, b)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형  $ABC$ 의 무게중심  $G$ 의 좌표가  $G(1, 3)$ 일 때, 상수  $a, b$ 의 합  $a+b$ 의 값을 구하시오.

20 삼각형  $ABC$ 의 두 꼭짓점의 좌표가  $A(-1, 4)$ ,  $B(0, 3)$ 이고, 무게중심의 좌표가  $G(2, 1)$ 일 때, 꼭짓점  $C$ 의 좌표를 구하면?

- ①  $(7, -4)$                       ②  $(3, -6)$   
③  $(5, -5)$                       ④  $(-1, 8)$   
⑤  $(1, 1)$

21 두 직선  $3x+y=8$ ,  $3x+y=k$  사이의 거리가  $\sqrt{10}$  일 때, 양수  $k$ 의 값은?

- ① 10    ② 12    ③ 14    ④ 16    ⑤ 18

22 두 직선  $3x+4y+3=0$ ,  $3x+4y+k=0$  사이의 거리가 2가 되도록 하는 실수  $k$ 의 값의 합을 구하시오.

23 직선  $(x+2y-1)+k(3x-y+1)=0$ 에 대한 다음 보기의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

- ㄱ. 두 직선  $x+2y=1$ ,  $3x-y=-1$ 의 교점을 지난다.  
ㄴ.  $k=2$ 일 때, 기울기는 0이다.  
ㄷ.  $y$ 축에 평행한 직선이 존재한다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 두 직선  $x+2y-2=0$ ,  $mx-y+m=0$ 이 좌표평면의 제1사분면 위에서 만나도록 하는 실수  $m$ 의 값의 범위가  $\alpha < m < \beta$ 일 때,  $\alpha+\beta$ 의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤ 5

25 두 직선  $x+y=1$ ,  $ax+2y+a+2=0$ 이 제1사분면에서 만나도록 하는 정수  $a$ 의 개수는?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤ 5

26 두 직선  $x+3y+2=0$ ,  $x-3y+1=0$ 으로부터 같은 거리에 있는 점  $P$ 의 자취의 방정식 중 그 그래프가  $y$ 축과 평행한 것은?

- ①  $x=0$                       ②  $2x+1=0$   
③  $x+1=0$                       ④  $2x+3=0$   
⑤  $x+2=0$

## 교과서 유사문제\_미래엔 - 공통수학2 \_평 면좌표와 직선의 방정식

선분의 내분, 내분점의 좌표 ~ 점과 직선 사이의 거리

### 빠른정답

01 7	02 1	03 5
04 58	05 $\frac{19}{5}$	06 1
07 6	08 ③	09 ②
10 ①	11 ①	12 7
13 ④	14 10	15 ⑤
16 ④	17 ④	18 ③
19 0	20 ①	21 ⑤
22 6	23 ③	24 ①
25 ②	26 ④	

## 교과서 유사문제\_미래엔 - 공통수학2 \_평 면좌표와 직선의 방정식

### 선분의 내분, 내분점의 좌표 ~ 점과 직선 사이의 거리

01 정답 7

해설  $|6 - (-1)| = 7$

02 정답 1

해설  $\overline{OA} = |-1| = 1$

03 정답 5

해설 두 점  $A(-4 + \sqrt{3}, \sqrt{2})$ ,  $B(\sqrt{3}, 3 + \sqrt{2})$  사이의 거리는  
 $\overline{AB}$   
 $= \sqrt{\{\sqrt{3} - (-4 + \sqrt{3})\}^2 + \{3 + \sqrt{2} - (\sqrt{2})\}^2}$   
 $= \sqrt{4^2 + 3^2}$   
 $= \sqrt{25}$   
 $= 5$

04 정답 58

해설 선분 AB의 길이는 두 점 A, B 사이의 거리이므로  
 $l = \sqrt{(0-3)^2 + (7-0)^2} = \sqrt{58}$   
 $\therefore l^2 = 58$

05 정답  $\frac{19}{5}$

해설  $\frac{2 \cdot (-1) + 3 \cdot 7}{2+3} = \frac{19}{5}$   
 $\therefore P\left(\frac{19}{5}\right)$

06 정답 1

해설  $\overline{AD} : \overline{DB} = 2 : 2 = 1 : 1$ 로  $t = 1$ 이다.

07 정답 6

해설 두 점  $A(-1, 3)$ ,  $B(9, 3)$ 을 잇는 선분 AB를  
 $3 : 7$ 로 내분하는 점의 좌표는  
 $(x, y) = \left(\frac{3 \cdot 9 + 7 \cdot (-1)}{3+7}, \frac{3 \cdot 3 + 7 \cdot 3}{3+7}\right) = (2, 3)$   
 $\therefore xy = 6$

08 정답 ③

해설  $\frac{m \cdot 6 + n \cdot (-8)}{m+n} = -4$ ,  $\frac{m \cdot (-4) + n \cdot 3}{m+n} = 1$   
 이므로  $5m = 2n$   
 $\therefore m : n = 2 : 5$   
 따라서  $\overline{AB}$ 를  $5 : 2$ 로 내분하는 점의 좌표는  
 $\left(\frac{5 \cdot 6 + 2 \cdot (-8)}{5+2}, \frac{5 \cdot (-4) + 2 \cdot 3}{5+2}\right)$ , 즉  $(2, -2)$

09 정답 ②

해설  $y = 2x + 4$ 에 평행한 직선의 기울기는 2이다.  
 따라서 구하는 직선의 방정식은  
 $y - (-1) = 2(x - 2)$   
 $\therefore y = 2x - 5$

10 정답 ①

해설 그림의 직선의 기울기는  $-2$  이므로  
 구하는 직선은 기울기가  $-2$  이고 점  $(-2, 2)$  를 지난다.  
 $y - 2 = -2(x + 2)$ ,  $y = -2x - 2$   
 $y = -2x - 2$ ,  $a = -2$ ,  $b = -2$  이므로,  
 $\therefore a + b = -4$

## 11 정답 ①

**해설** 두 직선  $y = ax + b$ ,  $y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ 이 수직이므로

$$\frac{1}{2}a = -1$$

$$\therefore a = -2$$

따라서 직선  $y = -2x + b$ 가 점  $(1, 2)$ 를 지나므로

$$2 = -2 + b$$

$$\therefore b = 4$$

$$\therefore ab = -8$$

## 12 정답 7

**해설** 두 점  $(0, a)$ ,  $(3, 3a-2)$ 를 지나는 직선의 기울기가 4이므로

$$\frac{(3a-2)-a}{3-0} = \frac{2a-2}{3} = 4$$

$$2a-2 = 12$$

$$\therefore a = 7$$

## 13 정답 ④

**해설** 점  $(5, 5)$ 와 직선  $-x+3y=0$  사이의 거리  $d$ 는

$$d = \frac{|-1 \cdot 5 + 3 \cdot 5|}{\sqrt{(-1)^2 + 3^2}} = \sqrt{10}$$

## 14 정답 10

**해설**  $|-3-7|=10$

## 15 정답 ⑤

**해설**  $\triangle ABC$ 에서  $\angle A$ 가 직각이므로 피타고라스의 정리에 의해  $\overline{AB}^2 + \overline{CA}^2 = \overline{BC}^2$  ... ㉠

이때 세 점  $A(a, 3)$ ,  $B(-1, -5)$ ,  $C(3, 7)$ 에 대하여

$$\overline{AB}^2 = (-1-a)^2 + (-5-3)^2 = a^2 + 2a + 65$$

$$\overline{CA}^2 = (a-3)^2 + (3-7)^2 = a^2 - 6a + 25$$

$$\overline{BC}^2 = (3+1)^2 + (7+5)^2 = 160$$

㉠에 의해  $2a^2 - 4a + 90 = 160$

$$\therefore a^2 - 2a - 35 = 0$$

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의해  $a$ 의 값들의 합은 2이다.

## 16 정답 ④

**해설** 삼각형  $ABC$ 의 세 변의 길이의 제곱을 각각 구하면

$$\overline{AB}^2 = (1-0)^2 + (4-0)^2 = 17$$

$$\overline{BC}^2 = (5-1)^2 + (3-4)^2 = 17$$

$$\overline{CA}^2 = (5-0)^2 + (3-0)^2 = 34$$

이므로  $\overline{AB} = \overline{BC}$ ,  $\overline{CA}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2$

따라서 삼각형  $ABC$ 는  $\angle C = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형이다.

## 17 정답 ④

**해설**  $\overline{AB}$ 를 3:1로 내분하는 점의 좌표는

$$\left( \frac{3 \cdot 4 + 1 \cdot 1}{3+1}, \frac{3 \cdot (-2) + 1 \cdot 3}{3+1} \right), \text{ 즉 } \left( \frac{13}{4}, -\frac{3}{4} \right)$$

이 점이 직선  $y = x + a$  위에 있으므로

$$-\frac{3}{4} = \frac{13}{4} + a \quad \therefore a = -4$$

## 18 정답 ③

**해설**  $5x = 2a + 3c$ ,  $5y = 2b + 3d$ 를 변형하면

$$x = \frac{2a+3c}{5} = \frac{3c+2a}{3+2}$$

$$y = \frac{2b+3d}{5} = \frac{3d+2b}{3+2}$$

이때 점  $P$ 의 좌표는

$$P(x, y) = P\left(\frac{2a+3c}{3+2}, \frac{2b+3d}{3+2}\right)$$

따라서 점  $P$ 는 두 점  $A(a, b)$ ,  $B(c, d)$ 를 이은 선분  $AB$ 를 3:2로 내분하는 점이므로

$$\overline{AP} : \overline{PB} = 3 : 2$$

$$\therefore \overline{AP} = \frac{3}{5}\overline{AB} = \frac{3}{5} \times 20 = 12$$

## 19 정답 0

**해설** 삼각형  $ABC$ 의 무게중심  $G$ 의 좌표는

$$G\left(\frac{a-3+13}{3}, \frac{0+2+b}{3}\right),$$

즉,  $G\left(\frac{a+10}{3}, \frac{b+2}{3}\right)$

이 점의 좌표가  $G(1, 3)$ 이므로

$$\frac{a+10}{3} = 1, \frac{b+2}{3} = 3$$

따라서  $a = -7$ ,  $b = 7$ 이므로  $a+b = -7+7 = 0$

## 20 정답 ①

**해설** 무게중심 구하는 공식을 이용한다.

$C = (x, y)$ 라 하면

$$\left(\frac{-1+0+x}{3}, \frac{4+3+y}{3}\right) = (2, 1)$$

$$\therefore x=7 \quad y=-4$$

$$\therefore C = (7, -4)$$

## 21 정답 ⑤

**해설** 두 직선이 평행하므로 직선  $3x+y=8$  위의 한 점  $(0, 8)$ 과 직선  $3x+y=k$ , 즉  $3x+y-k=0$  사이의 거리가  $\sqrt{10}$ 이다.

$$\text{즉 } \frac{|8-k|}{\sqrt{3^2+1^2}} = \sqrt{10} \text{ 이므로 } |8-k| = 10$$

$$8-k=\pm 10 \quad \therefore k=-2 \text{ 또는 } k=18$$

이때  $k$ 는 양수이므로  $k=18$

## 22 정답 6

**해설** 두 직선  $3x+4y+3=0$ ,  $3x+4y+k=0$ 이 서로 평행하므로 직선  $3x+4y+3=0$  위의 한 점  $(-1, 0)$ 과 직선  $3x+4y+k=0$  사이의 거리는

$$\frac{|3 \times (-1) + 0 + k|}{\sqrt{3^2+4^2}} = 2$$

$$|k-3| = 10, \quad k-3 = \pm 10$$

$$\therefore k = -7 \text{ 또는 } k = 13$$

따라서 상수  $k$ 의 값의 합은  $-7+13=6$

## 23 정답 ③

**해설** ㄱ. 주어진 직선은  $x+2y-1=0$ ,  $3x-y+1=0$  즉, 두 직선  $x+2y=1$ ,  $3x-y=-1$ 의 교점을 지나는 직선이다. (참)

ㄴ.  $k=2$ 이면 주어진 직선은

$$(x+2y-1)+2(3x-y+1)=0, \quad 7x+1=0$$

$$\therefore x = -\frac{1}{7}$$

이때 직선  $x = -\frac{1}{7}$ 은  $y$ 축에 평행한 직선이므로

기울기는 0이 아니다. (거짓)

ㄷ. ㄴ에서  $k=2$ 이면 주어진 직선은  $x = -\frac{1}{7}$ 이므로


$y$ 축에 평행한 직선이 존재한다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

## 24 정답 ①

**해설** 직선  $mx-y+m=0$ , 즉  $y=m(x+1)$ 은 기울기인  $m$ 의 값에 관계없이 항상 점  $(-1, 0)$ 을 지난다.

따라서 두 직선  $x+2y-2=0$ ,  $mx-y+m=0$ 이 제1사분면에서 만나려면 다음 그림과 같이 직선  $y=m(x+1)$ 이 (i), (ii)의 두 가지 경우 사이에 존재해야 한다.



(i) 직선  $y=m(x+1)$ 이 점  $(0, 1)$ 을 지나는 경우  
 $1 = m(0+1)$

$$\therefore m = 1$$

(ii) 직선  $y=m(x+1)$ 이 점  $(2, 0)$ 을 지나는 경우  
 $0 = m(2+1)$

$$\therefore m = 0$$

(i), (ii)에 의하여  $0 < m < 1$ 이므로

$$\alpha = 0, \beta = 1$$

$$\therefore \alpha + \beta = 0 + 1 = 1$$

## 25 정답 ②

**해설** 두 직선  $x+y=1$ ,  $ax+2y+a+2=0$ 이 만나야하므로  $a \neq -2$

두 직선의 교점을 구하면

$$\left(\frac{a+4}{2-a}, \frac{2a+2}{a-2}\right)$$

교점이 제1사분면에 있어야 하므로

$$\frac{a+4}{2-a} > 0, \quad \frac{2a+2}{a-2} > 0$$

(i)  $\frac{a+4}{2-a} > 0$ 에서 분모와 분자가 0이 아니고 부호가

서로 같아야 하므로

$$(a-2)(a+4) < 0$$

$$\therefore -4 < a < 2$$

(ii)  $\frac{2a+2}{a-2} > 0$ 에서 분모와 분자가 0이 아니고 부호가

서로 같아야 하므로

$$(2a+2)(a-2) > 0$$

$$\therefore a < -1 \text{ 또는 } a > 2$$

두 식의 양변에  $(a-2)^2$ 을 곱하면

즉, (i), (ii)에서  $-4 < a < -1$ 이다.

따라서 정수  $a$ 는  $-3, -2$ 의 2개이다.

## 26 정답 ④

**해설**  $P(x, y)$ 라 하면 점  $P$ 는 주어진 두 직선으로부터 같은 거리에 있으므로

$$\frac{|x+3y+2|}{\sqrt{1^2+3^2}} = \frac{|x-3y+1|}{\sqrt{1^2+(-3)^2}}$$

$$|x+3y+2| = |x-3y+1|$$

$$x+3y+2 = \pm(x-3y+1)$$

$$\therefore 6y+1=0 \text{ 또는 } 2x+3=0$$

따라서 점  $P$ 의 자취의 방정식 중 그 그래프가  $y$ 축과 평행한 것은

$$2x+3=0$$