

교과서_미래엔 - 공통수학2 (명제)96~97p_중단원

명제와 조건 ~ 절대부등식

실시일자	-
25문제 / DRE수학	

유형별 학습

이름

01 다음 중 거짓인 명제인 것은?

- ① π^2 은 무리수이다.
- ② 4.0001은 4에 아주 가까운 수이다.
- ③ 모든 홀수는 소수이다.
- ④ $x^2 \geq 2x - 1$
- ⑤ $x + 5 \leq x + 8$

02 전체집합 $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 조건 $x^2 - 2 > 0$ 의 진리집합은?

- ① \emptyset
- ② $\{0, 1\}$
- ③ $\{3, 4, 5\}$
- ④ $\{2, 3, 4, 5\}$
- ⑤ U

03 전체집합 $U = \{x | x \text{는 한 자리 자연수}\}$ 에 대하여 조건 p 가 ' $p: x^2 - 4x - 12 \leq 0$ '일 때, 조건 p 의 진리집합의 원소의 개수를 구하시오.

04 [2023년 3월 고2 2번/2점] 실수 x 에 대한 조건 ' x 는 음이 아닌 실수이다.'의 진리집합은?

- ① $\{x | x < 0\}$
- ② $\{x | x \leq 0\}$
- ③ $\{x | x \neq 0\}$
- ④ $\{x | x \geq 0\}$
- ⑤ $\{x | x > 0\}$

05 전체집합 $U = \{x | x \text{는 한 자리 자연수}\}$ 에 대하여 조건 p 가 ' $p: x^2 - 3x - 18 < 0$ '일 때, 조건 p 의 진리집합의 원소의 개수는?

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7
- ⑤ 8

06 [2023년 3월 고2 2번 변형] 실수 x 에 대한 조건 ' x 는 양이 아닌 실수이다.'의 진리집합은?

- ① $\{x | x < 0\}$
- ② $\{x | x \leq 0\}$
- ③ $\{x | x \neq 0\}$
- ④ $\{x | x \geq 0\}$
- ⑤ $\{x | x > 0\}$

07 다음 중 역이 거짓인 명제는? (단, x, y, z 는 실수이다.)

- ① 두 집합 A, B 에 대하여 $B \subset A$ 이면 $A \cup B = A$ 이다.
- ② $x > 0$ 이고 $y > 0$ 이면 $x + y > 0$ 이다.
- ③ x 가 3의 배수이면 x 는 9의 배수이다.
- ④ $xz = yz$ 이면 $x = y$ 이다.
- ⑤ $x^2 + y^2 \neq 0$ 이면 $x \neq 0$ 또는 $y \neq 0$ 이다.

08 두 조건 p, q 에 대하여 명제 $p \rightarrow \sim q$ 가 참일 때, 다음 중 항상 참인 명제는?

- ① $p \rightarrow q$ ② $q \rightarrow p$ ③ $q \rightarrow \sim p$
- ④ $\sim q \rightarrow p$ ⑤ $\sim q \rightarrow \sim p$

09 두 조건 p, q 에 대하여 $\sim p$ 가 q 이기 위한 필요조건일 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① q 는 p 이기 위한 충분조건이다.
- ② p 는 q 이기 위한 충분조건이다.
- ③ p 는 $\sim q$ 이기 위한 충분조건이다.
- ④ $\sim q$ 는 p 이기 위한 충분조건이다.
- ⑤ $\sim q$ 는 $\sim p$ 이기 위한 필요조건이다.

10 정삼각형 ABC 는 이등변삼각형 ABC 이기 위한 무슨 조건인가?

- ① 충분조건 ② 필요조건 ③ 대우
- ④ 필요충분조건 ⑤ 아무 조건도 아니다.

11 다음 중 $x > 7$ 의 필요조건이고, 충분조건은 되지 않는 것은?

- ① $x > 7$ ② $x < 7$ ③ $x \geq 7$
- ④ $x \leq 7$ ⑤ $x = 7$

12 다음 중 참인 명제는?

- ① 어떤 자연수 x 에 대하여 $0 < x < 1$ 이다.
- ② 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 < 0$ 이다.
- ③ 모든 자연수 x 에 대하여 $x - 3 \geq 0$ 이다.
- ④ 어떤 실수 x 에 대하여 $1 - x^2 > 0$ 이다.
- ⑤ 모든 실수 x 에 대하여 $(x - 2)(x + 3) = 0$ 이다.


- 13** 다음 조건을 p 라 할 때, 모든 실수 x 에 대하여 p 가 참인 것을 모두 고르면?

- ① $|x| = x$
 ② $x^2 = 1$
 ③ $(x-1)(x+1) = x^2 - 1$
 ④ $x^2 \geq 0$
 ⑤ $x^2 + 1 > 2x$

- 14** 전체집합 U 에서 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자. 명제 $p \rightarrow \sim q$ 가 참일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?(단, P, Q 는 공집합이 아니다.)

- ① $Q \subset P^c$ ② $P \subset Q^c$
 ③ $P \cap Q = \emptyset$ ④ $Q^c \cap P = Q^c$
 ⑤ $Q - P = Q$

- 15** 전체집합 U 에서 세 조건 p, q, r 를 만족시키는 집합을 각각 P, Q, R 라 할 때, 세 집합 사이의 포함 관계가 아래 그림과 같다. 이때 다음 명제 중 참인 것은?



- ① $q \rightarrow r$ ② $r \rightarrow \sim p$
 ③ $(q \text{ 또는 } r) \rightarrow \sim p$ ④ $(\sim q \text{이고 } r) \rightarrow p$
 ⑤ $p \rightarrow (\sim q \text{ 또는 } r)$

- 16** 두 조건 $p: |x-3| \leq 9, q: x^2 - 9k^2 \leq 0$ 에 대하여 명제 $p \rightarrow q$ 의 역이 참이 되도록 하는 자연수 k 의 최댓값을 구하시오.

- 17** 다음 중 그 역과 대우가 모두 참인 명제는?
(단, x, y 는 실수이다.)

- ① x, y 가 홀수이면 $x+y$ 는 홀수이다.
 ② $x^2 = 1$ 이면 $|x| = 1$ 이다.
 ③ $x = y$ 이면 $x^2 = y^2$ 이다.
 ④ $x = 1, y = 1$ 이면 $xy = 1$ 이다.
 ⑤ x^2 이 유리수이면 x 는 유리수이다.

- 18** [2018년 11월 고3 문과 11번 변형]
실수 x 에 대한 두 조건 p, q 가 다음과 같다.

$$p: x^2 - 5x + 6 \leq 0,$$

$$q: x > a$$

p 가 $\sim q$ 이기 위한 충분조건이 되도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

19

[2021년 11월 고1 11번 변형]

실수 x 에 대한 두 조건

$p: |x+1| \leq n, q: x^2+4x-12 \leq 0$ 에 대하여

p 가 q 이기 위한 필요조건이 되도록 하는 자연수 n 의 최솟값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

20

두 명제 $p \Rightarrow q$ 와 $r \Rightarrow \sim q$ 가 모두 참일 때, 다음 명제 중 반드시 참인 것을 모두 고르면?

- ㉠ $\sim q \Rightarrow \sim p$ ㉡ $r \Rightarrow \sim p$
㉢ $r \Rightarrow p$ ㉣ $p \Rightarrow r$
㉤ $\sim q \Rightarrow p$

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉣
③ ㉢, ㉤ ④ ㉠, ㉣
⑤ ㉡, ㉤

21

두 명제 $p \rightarrow \sim q$ 와 $\sim r \rightarrow q$ 가 참일 때, 다음 중 항상 참이라고 할 수 없는 것은? (단, $\sim p$ 는 p 의 부정이다.)

- ① $q \rightarrow \sim p$ ② $p \rightarrow r$ ③ $q \rightarrow \sim r$
④ $\sim q \rightarrow r$ ⑤ $\sim r \rightarrow \sim p$

22

[2022년 3월 고2 17번/4점]

실수 x 에 대한 두 조건

$p: x^2+2ax+1 \geq 0, q: x^2+2bx+9 \leq 0$ 이 있다.

다음 두 문장이 모두 참인 명제가 되도록 하는

정수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수는?

- 모든 실수 x 에 대하여 p 이다.
• p 는 $\sim q$ 이기 위한 충분조건이다.

- ① 15 ② 18 ③ 21
④ 24 ⑤ 27

23

실수 x 에 대한 두 조건

$p: (x+2)^2 \leq 0, q: x^2+(k-4)x+4=0$

에 대하여 p 가 q 이기 위한 필요조건이 되도록 하는 모든 정수 k 의 개수는?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

24

실수 x, y 에 대하여

$2x^2+3y^2-2y+\frac{36}{2x^2+2y^2+1}$ 의 최솟값을 구하시오.

25 두 실수 x, y 에 대하여

$3x^2 + 2y^2 - 4x + \frac{16}{x^2 + 2y^2 + 3}$ 은 $x = a, y = b$ 일 때,

최솟값 m 을 갖는다. 세 상수 a, b, m 에 대하여
 $a + b + m$ 의 값은?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

교과서_미래엔 - 공통수학2 (명제)96~97p_중단원

명제와 조건 ~ 절대부등식

실시일자	-
25문제 / DRE수학	

유형별 학습

이름

빠른정답

01 ③	02 ④	03 6
04 ④	05 ②	06 ②
07 ②	08 ③	09 ③
10 ①	11 ③	12 ④
13 ③ , ④	14 ④	15 ②
16 2	17 ②	18 ③
19 ③	20 ①	21 ③
22 ①	23 ②	24 10
25 ②		

교과서_미래엔 - 공통수학2 (명제)96~97p_중단원

명제와 조건 ~ 절대부등식

실시일자	-
25문제 / DRE수학	

유형별 학습

이름

01 정답 ③

해설 ① 참인 명제이다.
 ② '가까운'의 기준이 명확하지 않아 참, 거짓을 판별할 수 없으므로 명제가 아니다.
 ③ [반례] 9는 홀수이지만 소수가 아니다. 따라서 거짓인 명제이다.
 ④ x 의 값에 따라 참, 거짓이 달라지므로 명제가 아니다.
 ⑤ $x+5 \leq x+8$ 에서 $5 \leq 8$ 이므로 참인 명제이다. 따라서 거짓인 명제는 ③이다.

02 정답 ④

해설 주어진 조건 $x^2 - 2 > 0$ 에
 $x = 0$ 을 대입하면 $0 - 2 < 0$ 이므로 거짓이다.
 $x = 1$ 을 대입하면 $1 - 2 < 0$ 이므로 거짓이다.
 $x = 2$ 를 대입하면 $4 - 2 > 0$ 이므로 참이다.
 $x = 3$ 을 대입하면 $9 - 2 > 0$ 이므로 참이다.
 $x = 4$ 를 대입하면 $16 - 2 > 0$ 이므로 참이다.
 $x = 5$ 를 대입하면 $25 - 2 > 0$ 이므로 참이다.
 따라서 구하는 진리집합은 $\{2, 3, 4, 5\}$ 이다.

03 정답 6

해설 $U = \{1, 2, 3, \dots, 9\}$ 이고 조건 p 의 진리집합을 P 라 하면
 $p: x^2 - 4x - 12 \leq 0$ 에서
 $(x+2)(x-6) \leq 0$
 $\therefore -2 \leq x \leq 6$
 $\therefore P = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
 따라서 p 의 진리집합의 원소의 개수는 6이다.

04 정답 ④

해설 조건의 진리집합을 이해한다.
 실수 x 에 대한 조건 ' x 는 음이 아닌 실수이다.'의 진리집합은 $\{x | x \geq 0\}$ 이다.

05 정답 ②

해설 $U = \{1, 2, 3, \dots, 9\}$ 이고
 조건 p 의 진리집합을 P 라 하면
 $x^2 - 3x - 18 < 0$ 에서
 $(x+3)(x-6) < 0$
 $\therefore -3 < x < 6$
 따라서 $P = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 이므로
 조건 p 의 진리집합의 원소의 개수는 5이다.

06 정답 ②

해설 실수 x 에 대한 조건 ' x 는 양이 아닌 실수이다.'의 진리집합은 $\{x | x \leq 0\}$ 이다.

07 정답 ②

해설 ① 역: 두 집합 A, B 에 대하여 $A \cup B = A$ 이면 $B \subset A$ 이다. (참)
 ② 역: $x+y > 0$ 이면 $x > 0$ 이고 $y > 0$ 이다. (거짓)
 [반례] $x = -3, y = 5$ 이면 $x+y = 2 > 0$ 이지만 $x < 0$
 ③ 역: x 가 9의 배수이면 x 는 3의 배수이다. (참)
 ④ 역: $x = y$ 이면 $xz = yz$ 이다. (참)
 ⑤ 역: $x \neq 0$ 또는 $y \neq 0$ 이면 $x^2 + y^2 \neq 0$ 이다. (참)
 따라서 역이 거짓인 명제는 ②이다.

08 정답 ③

해설 명제 $p \rightarrow \sim q$ 가 참이므로 항상 참인 명제는 그 대우인 $q \rightarrow \sim p$ 이다.

09 정답 ③

해설 $\sim p$ 가 q 이기 위한 필요조건이므로
 $q \Rightarrow \sim p$
 ③ 명제 $q \rightarrow \sim p$ 가 참이므로
 그 대우인 $p \rightarrow \sim q$ 도 참이다.
 즉, $p \Rightarrow \sim q$ 이므로
 p 는 $\sim q$ 이기 위한 충분조건이다.

10 정답 ①

해설 정삼각형이면 이등변삼각형이므로
 정삼각형 ABC는 이등변삼각형 ABC이기 위한
 충분조건이다.

11 정답 ③

해설 $x > 7$ 범위를 포함하는 것을 고르면 $x \geq 7$

12 정답 ④


해설 ① 0과 1사이에는 자연수가 없으므로 주어진 명제는 거짓이다.
 ② 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 \geq 0$ 이므로 주어진 명제는 거짓이다.
 ③ [반례] $x = 1$ 이면 $x - 3 \geq 0$ 가 성립하지 않으므로 주어진 명제는 거짓이다.
 ④ $x = \frac{1}{2}$ 이면 $1 - x^2 > 0$ 이므로 주어진 명제는 참이다.
 ⑤ [반례] $x = 0$ 이면 $(x - 2)(x + 3) \neq 0$ 이므로 주어진 명제는 거짓이다.

13 정답 ③, ④

해설 ① 모든 실수 x 에 대하여 $|x| = x$ (거짓)
 $x \geq 0$ 일 때 $|x| = x$, $x < 0$ 일 때 $|x| = -x$ 이다.
 ② 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 = 1$ (거짓)
 $x = \pm 1$ 일 때만 $x^2 = 1$ 이다.
 ③ 모든 실수 x 에 대하여 $(x - 1)(x + 1) = x^2 - 1$ (참)
 ④ 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 \geq 0$ (참)
 ⑤ 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 + 1 > 2x$ (거짓) $x^2 + 1 - 2x = (x - 1)^2 \geq 0$ 이므로 $x \neq 1$ 인 x 에 대해서만 $x^2 + 1 > 2x$ 이다.

14 정답 ④

해설 명제 $p \rightarrow \sim q$ 가 참이므로 $P \subset Q^C$ 이다. 이를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같다. 따라서 $Q^C \cap P = P$ 이므로 옳지 않은 것은 ④이다.




15 정답 ②

해설 ② 주어진 벤 다이어그램에서 $R \subset P^C$ 이므로 $r \rightarrow \sim p$ 는 참인 명제이다.

16 정답 2

해설 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자.
 $|x - 3| \leq 9$ 에서 $-9 \leq x - 3 \leq 9$
 $\therefore -6 \leq x \leq 12$
 $\therefore P = \{x \mid -6 \leq x \leq 12\}$
 $x^2 - 9k^2 \leq 0$ 에서 $(x + 3k)(x - 3k) \leq 0$
 $\therefore -3k \leq x \leq 3k$
 $\therefore Q = \{x \mid -3k \leq x \leq 3k\}$
 이때 명제 $p \rightarrow q$ 의 역은 $q \rightarrow p$ 이다.
 명제 $q \rightarrow p$ 가 참이 되려면 $Q \subset P$ 이어야 하므로
 다음 그림에서 $-3k \geq -6, 3k \leq 12$
 $k \leq 2, k \leq 4$
 $\therefore k \leq 2$
 따라서 자연수 k 의 최댓값은 2이다.



17 정답 ②


- 해설** ① 역: $x+y$ 가 홀수이면 x, y 는 홀수이다. (거짓)
 명제: (반례) $x=1, y=1$ 일 때, $x+y=2$
 주어진 명제가 거짓이므로 그 대우도 거짓
- ② 역: $|x|=1$ 이면 $x^2=1$ 이다. (참)
 명제: $|x|=1$ 이면 $x=\pm 1$ 이므로 $x^2=1$
 주어진 명제가 참이므로 그 대우도 참
- ③ 역: $x^2=y^2$ 이면 $x=y$ 이다. (거짓)
 [반례] $x=1, y=-1$ 일 때, $x^2=y^2=1$
 주어진 명제가 참이므로 그 대우도 참
- ④ 역: $xy=1$ 이면 $x=1, y=1$ 이다. (거짓)
 [반례] $x=\frac{1}{2}, y=2$ 이면 $xy=1$
 주어진 명제가 참이므로 그 대우도 참
- ⑤ 역: x 가 유리수이면 x^2 은 유리수이다. (참)
 명제: [반례] $x=\sqrt{2}$ 일 때, $x^2=2$
 주어진 명제가 거짓이므로 그 대우도 거짓이다.
 따라서 역과 대우가 모두 참인 명제는 ②

18 정답 ③

- 해설** 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자.
 조건 $\sim q$ 의 진리집합은 Q^C 이다.
 이때
 $P=\{x \mid x^2-5x+6 \leq 0\}=\{x \mid 2 \leq x \leq 3\}$
 $Q^C=\{x \mid x \leq a\}$
 따라서 p 가 $\sim q$ 이기 위한 충분조건이므로
 $P \subset Q^C$ 이어야 한다.
 즉, $a \geq 3$ 이다.
 따라서 실수 a 의 최솟값은 3이다.

19 정답 ③

- 해설** 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면
 $P=\{x \mid -n-1 \leq x \leq n-1\}$,
 $Q=\{x \mid -6 \leq x \leq 2\}$
 이때 p 가 q 이기 위한 필요조건이 되려면 $Q \subset P$ 이어야 한다.



- 이때 $-n-1 \leq -6, n-1 \geq 2$ 이므로 $n \geq 5$
 따라서 자연수 n 의 최솟값은 5이다.

20 정답 ①

- 해설** $p \Rightarrow q$ 와 $r \Rightarrow \sim q$ 가 참이면 그 대우인 $\sim q \Rightarrow \sim p, q \Rightarrow \sim r$ 이 참 $p \Rightarrow q \Rightarrow \sim r$ 이므로 $p \Rightarrow \sim r$ 가 참이고 그 대우인 $r \Rightarrow \sim p$ 가 참

21 정답 ③

- 해설** 두 명제 $p \rightarrow \sim q, \sim r \rightarrow q$ 가 참이므로 그 대우인 $q \rightarrow \sim p, \sim q \rightarrow r$ 도 참이다.
 즉, 두 명제 $p \rightarrow \sim q, \sim q \rightarrow r$ 가 참이므로 명제 $p \rightarrow r$ 도 참이고 그 대우인 $\sim r \rightarrow \sim p$ 도 참이다.
 따라서 항상 참이라고 할 수 없는 것은 ③이다.

22 정답 ①

- 해설** 이차부등식을 포함한 문장이 참인 명제가 되도록 하는 문제를 해결한다.
 실수 전체의 집합을 U 라 하고, 두 조건 p, q 의 진리 집합을 각각 P, Q 라 하자.
 '모든 실수 x 에 대하여 p 이다.'가 참인 명제가 되려면 $P=U$ 이어야 한다.
 따라서 모든 실수 x 에 대하여 $x^2+2ax+1 \geq 0$ 이어야
 하므로 이차방정식 $x^2+2ax+1=0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면
 $\frac{D_1}{4}=a^2-1 \leq 0$
 $(a+1)(a-1) \leq 0$
 $\therefore -1 \leq a \leq 1$
 따라서 정수 a 는 $-1, 0, 1$ 이다.
 이때 'p는 $\sim q$ 이기 위한 충분조건이다.'가 참인 명제가 되려면 $P \subset Q^C$ 이어야 하고 $P=U$ 이므로
 $Q^C=U$ 이다.
 따라서 모든 실수 x 에 대하여 $x^2+2bx+9 > 0$ 이어야
 하므로 이차방정식 $x^2+2bx+9=0$ 의 판별식을 D_2 라 하면
 $\frac{D_2}{4}=b^2-9 < 0$
 $(b+3)(b-3) < 0$
 $\therefore -3 < b < 3$
 따라서 정수 b 는 $-2, -1, 0, 1, 2$ 이다.
 따라서 정수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수는
 $3 \cdot 5 = 15$

23 정답 ②

해설 두 조건 p, q 의 진리집합을 P, Q 라 하면
 p 가 q 이기 위한 필요조건이 되려면 $Q \subset P$ 이어야 한다.
 $(x+2)^2 \leq 0$ 에서 $x = -2$ 이므로 $P = \{-2\}$
 (i) $Q = \{-2\}$ 일 때
 $x^2 + (k-4)x + 4 = 0$ 이 $x = -2$ 를 근으로
 가지므로
 $4 - 2(k-4) + 4 = 0$
 $\therefore k = 8$
 이때 방정식 $x^2 + 4x + 4 = 0$ 은 오직 $x = -2$ 만
 근으로 가지므로 만족시킨다.
 (ii) $Q = \emptyset$ 일 때
 이차방정식 $x^2 + (k-4)x + 4 = 0$ 의 판별식을 D 라
 하면
 $D = (k-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 < 0$
 $k^2 - 8k < 0$
 $k(k-8) < 0$
 $\therefore 0 < k < 8$
 (i), (ii)에 의하여 만족시키는 정수 k 는
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8이므로 8개다.

24 정답 10

해설 $2x^2 + 3y^2 - 2y + \frac{36}{2x^2 + 2y^2 + 1}$ 에서
 $2x^2 + 2y^2 + 1 + \frac{36}{2x^2 + 2y^2 + 1} + y^2 - 2y - 1$
 $2x^2 + 2y^2 + 1 + \frac{36}{2x^2 + 2y^2 + 1} + (y-1)^2 - 2$
 이때 모든 실수 x, y 에 대하여 $2x^2 + 2y^2 + 1 > 0$,
 $\frac{36}{2x^2 + 2y^2 + 1} > 0$ 이므로
 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
 $2x^2 + 2y^2 + 1 + \frac{36}{2x^2 + 2y^2 + 1} \geq 2\sqrt{36} = 12$
 (단, 등호는 $2x^2 + 2y^2 + 1 = \frac{36}{2x^2 + 2y^2 + 1}$,
 즉 $2x^2 + 2y^2 = 5$ 일 때 성립)
 또한, y 는 실수이므로
 $(y-1)^2 \geq 0$ (단, 등호는 $y = 1$ 일 때 성립)
 따라서 주어진 식의 최솟값은 $x = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$, $y = 1$ 일 때,
 $12 + 0 - 2 = 10$ 이다.

25 정답 ②

해설 x, y 는 실수이므로 $x^2 \geq 0, y^2 \geq 0$ 이다.
 따라서 $x^2 + 2y^2 + 3 > 0$ 이므로
 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
 $3x^2 + 2y^2 - 4x + \frac{16}{x^2 + 2y^2 + 3}$
 $= x^2 + 2y^2 + 3 + \frac{16}{x^2 + 2y^2 + 3}$
 $\quad + 2x^2 - 4x - 3$
 $\geq 2\sqrt{(x^2 + 2y^2 + 3) \cdot \frac{16}{x^2 + 2y^2 + 3}}$
 $\quad + 2x^2 - 4x - 3 \quad \dots \textcircled{1}$
 $= 2x^2 - 4x + 5$
 $= 2(x-1)^2 + 3 \geq 3 \quad \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}$ 에서 등호는 $x^2 + 2y^2 + 3 = \frac{16}{x^2 + 2y^2 + 3}$ 에서
 $x^2 + 2y^2 = 1$ 일 때 성립하고
 $\textcircled{2}$ 에서 이 값은 $x = 1$ 일 때 최솟값 3을 갖는다.
 따라서 $x = 1$ 일 때 $x^2 + 2y^2 = 1$ 에서 $y = 0$ 이므로
 $a = 1, b = 0, m = 3$ 이다.
 $\therefore a + b + m = 1 + 0 + 3 = 4$