

# 개념+유형 개념편 - 수학II (2025) (넓이와 속도)

177~192p


넓이 ~ 속도와 거리

실시일자	-
30문제 / DRE수학	

## 유형별 학습


이름

- 01** 다음 그림과 같이 곡선  $y = x^2 - 7x + 10$ 과  $x$ 축,  $y$ 축 및 직선  $x = 4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?



- ① 4                      ② 8                      ③ 12  
④ 16                    ⑤ 20


- 02** 다음 그림과 같이 곡선  $y = -\frac{3}{4}x^2 - 3$ 과  $x$ 축 및 두 직선  $x = -1$ ,  $x = 3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.




- 03** 곡선  $y = -2x^2 + 6x + 8$ 과  $x$ 축 및 두 직선  $x = 1$ ,  $x = 3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① 22                      ②  $\frac{67}{3}$                       ③  $\frac{68}{3}$   
④ 23                      ⑤  $\frac{70}{3}$


- 04** 이차함수  $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 곡선  $y = ax^2 + bx + c$ 와  $x$ 축 및  $y$ 축으로 둘러싸인 색칠한 도형의 넓이를 구하시오.




- 05** 다음 그림과 같이 곡선  $y = -x^2 + 4$ 와  $x$ 축 및 두 직선  $x = 1$ ,  $x = 3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



- 06** 다음 그림에서 곡선과  $x$ 축 및 두 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



- 07** 다음 그림에서 곡선과  $x$ 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



- 08** 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서의 속도가  $v(t) = 4t + 1$  ( $t \geq 0$ )일 때,  $t = 0$ 에서  $t = 3$ 까지 점 P의 위치의 변화량을 구하시오.


- 09** 좌표가 2인 점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서의 속도가  $v(t) = t + 3$  ( $t \geq 0$ )일 때,  $t = 2$ 에서 점 P의 위치를 구하시오.

- 10** 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의  
시각  $t$ 에서의 속도가  $v(t) = 3t^2 - 6t$  ( $t \geq 0$ )일 때,  
 $t = 1$ 에서  $t = 4$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

- 11** [2020년 10월 고3 문과 10번/3점]  
양수  $a$ 에 대하여 곡선  $y = x^2$ 과 직선  $y = ax$ 로 둘러싸인  
부분의 넓이는?


- ①  $\frac{a^3}{12}$       ②  $\frac{a^3}{8}$       ③  $\frac{a^3}{6}$   
④  $\frac{a^3}{4}$       ⑤  $\frac{a^3}{3}$

- 12** 최고차항의 계수가 2인 삼차함수  $y = f(x)$ 의 그래프 위의  
점  $(2, f(2))$ 에서의 접선  $y = g(x)$ 가 다음 그림과 같을  
때, 곡선  $y = f(x)$ 와 직선  $y = g(x)$ 로 둘러싸인 도형의  
넓이는?



- ①  $\frac{4}{3}$       ②  $\frac{8}{3}$       ③ 4  
④  $\frac{16}{3}$       ⑤  $\frac{20}{3}$

- 13** 다음 그림과 같이 두 곡선  $y = -x^3 + 4x$ 와  $y = -x^2 + 4$ 로  
둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각  $S_1, S_2$ 라 할 때,  
 $12(S_1 + S_2)$ 의 값을 구하시오.



- 14** 곡선  $y = x^4 - (k+1)x^3 + kx^2$ 과  $x$ 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같을 때, 상수  $k$ 의 값은? (단,  $k > 1$ )

- ①  $\frac{4}{3}$                       ②  $\frac{5}{3}$                       ③ 2  
④  $\frac{7}{3}$                       ⑤  $\frac{8}{3}$


- 15** 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서의 속도  $v(t)$ 가  $v(t) = 40 - at$ 이다. 시각  $t = 4$ 에서 점 P의 운동 방향이 바뀌었을 때, 점 P가 시각  $t = 0$ 에서  $t = 6$ 까지 움직인 거리는? (단,  $a$ 는 상수이다.)

- ① 90                      ② 95                      ③ 100  
④ 105                      ⑤ 110

- 16** 지상 120m 높이에서 50m/s의 속도로 지면과 수직하게 위로 쏘아 올린 물체의  $t$ 초 후의 속도가  $v(t) = 50 - 10t$  ( $0 \leq t \leq 12$ )일 때, 이 물체의 지면으로부터의 최고 높이를 구하시오.


- 17** 지상에서 처음 속도 20m/s로 똑바로 위로 발사한 물체의  $t$ 초 후의 속도가  $v(t) = -4t + 20$ (m/s)라 할 때, 발사 후 8초 동안 물체가 움직인 거리를 구하시오.

- 18** 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의  $t$ 초 후의 속도  $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.  $t = 3$ 에서의 점 P의 위치가 14일 때,  $t = 5$ 에서 점 P의 위치는? (단,  $0 \leq t \leq 5$ )



- ① 8                      ② 12                      ③ 16  
④ 20                      ⑤ 24

- 19** 좌표가  $-1$ 인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간  $t$  ( $0 \leq t \leq 6$ )에서의 속도  $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 점 P가 원점으로부터 가장 멀리 떨어져있을 때, 점 P의 위치를 구하시오.




- 20** [2019년 11월 고3 문과 26번/4점]  
두 함수

$$f(x) = \frac{1}{3}x(4-x), g(x) = |x-1|-1$$

의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를  $S$ 라 할 때,  $4S$ 의 값을 구하시오.

- 21** [2020년 3월 고3 이과 10번 변형]

다음 그림과 같이 두 함수  $y = ax^2 + 3$ 과  $y = 4|x|$ 의 그래프가 두 점 A, B에서 각각 접한다.  
두 함수  $y = ax^2 + 3$ 과  $y = 4|x|$ 의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는? (단,  $a$ 는 상수이다.)



- ① 2                      ②  $\frac{5}{2}$                       ③ 3  
④  $\frac{7}{2}$                       ⑤ 4


- 22** 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 와 그 도함수  $f'(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} (가) & f(0) = f'(0) = 4 \\ (나) & f(1) = f'(1) \end{aligned}$$

두 곡선  $y = f(x)$ 와  $y = f'(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?


- ①  $\frac{1}{12}$                       ②  $\frac{1}{6}$                       ③  $\frac{1}{4}$   
④  $\frac{1}{3}$                       ⑤  $\frac{5}{12}$

- 23** 다음 그림과 같이 곡선  $y = x^2$ 과 직선  $y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 직선  $x = a$ 에 의하여 이등분될 때, 상수  $a$ 의 값은?



- ①  $\frac{1}{3}$                       ②  $\frac{2}{3}$   
 ③  $\frac{3}{4}$                       ④ 1  
 ⑤  $\frac{5}{4}$

- 24** 함수  $f(x) = \frac{1}{5}x(x^2 + 1)$  ( $x \geq 0$ )의 그래프가 다음 그림과 같다. 함수  $f(x)$ 의 역함수를  $g(x)$ 라 할 때, 정적분  $\int_2^6 g(x)dx$ 의 값을 구하시오.



- 25** 함수  $f(x) = x^3$ 의 역함수를  $g(x)$ 라고 할 때,  $\int_1^3 f(x) dx + \int_1^{27} g(x) dx$ 의 값은?

- ① 20                      ② 40                      ③ 41  
 ④ 80                      ⑤ 81

- 26** 함수  $f(x) = x^3 + 2$  ( $x \geq 0$ )의 역함수를  $g(x)$ 라 할 때,  $\int_0^2 f(x)dx + \int_2^{10} g(x)dx$ 의 값은?


- ① 12                      ② 14                      ③ 16  
 ④ 18                      ⑤ 20

- 27** 함수  $f(x) = \frac{1}{12}x^2$  ( $x \geq 0$ )의 역함수를  $g(x)$ 라고 할 때, 두 곡선  $y = f(x)$ ,  $y = g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

- 28 함수  $f(x) = x^4 - (2+a)x^3 + 2ax^2$ 에 대하여 곡선  $y = f(x)$ 와  $x$ 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같도록 하는 모든 양수  $a$ 의 값의 곱은? (단,  $a \neq 2$ )

- ① 2                      ② 3                      ③ 4  
④ 5                      ⑤ 6

- 29 [2009년 9월 고3 이과 7번]  
두 곡선  $y = x^4 - x^3$ ,  $y = -x^4 + x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 곡선  $y = ax(1-x)$ 에 의하여 이등분될 때, 상수  $a$ 의 값은? (단,  $0 < a < 1$ )



- ①  $\frac{1}{4}$                       ②  $\frac{3}{8}$                       ③  $\frac{5}{8}$   
④  $\frac{3}{4}$                       ⑤  $\frac{7}{8}$

- 30 [2023년 11월 고3 12번 변형]  
함수  $f(x) = \frac{1}{3}x(x-3)(x-6)$ 과 실수  $t$  ( $0 < t < 3$ )에

대하여 함수  $g(x)$ 는

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < t) \\ -2(x-t) + f(t) & (x \geq t) \end{cases} \text{이다.}$$

함수  $y = g(x)$ 의 그래프와  $x$ 축으로 둘러싸인 영역의 넓이의 최댓값은?

- ①  $\frac{20}{3}$                       ②  $\frac{61}{9}$                       ③  $\frac{62}{9}$   
④ 7                      ⑤  $\frac{64}{9}$

# 개념+유형 개념편 - 수학 II (2025) (넓이와 속도)

177~192p

넓이 ~ 속도와 거리

실시일자	-
30문제 / DRE수학	

## 유형별 학습

이름

### 빠른정답

01 ③	02 19	03 ③
04 $\frac{58}{3}$	05 4	06 $\frac{59}{6}$
07 $\frac{256}{3}$	08 21	09 10
10 22	11 ③	12 ②
13 142	14 ②	15 ③
16 245m	17 68m	18 ④
19 3	20 14	21 ③
22 ①	23 ①	24 $\frac{41}{4}$
25 ④	26 ⑤	27 48
28 ③	29 ④	30 ⑤



# 개념+유형 개념편 - 수학 II (2025) (넓이와 속도)

177~192p

넓이 ~ 속도와 거리

실시일자	-
30문제 / DRE수학	

## 유형별 학습

이름

### 01 정답 ③

**해설**  $\int_0^4 |x^2 - 7x + 10| dx$

$$= \int_0^2 (x^2 - 7x + 10) dx + \int_2^4 (-x^2 + 7x - 10) dx$$

$$= \left[ \frac{1}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 + 10x \right]_0^2 + \left[ -\frac{1}{3}x^3 + \frac{7}{2}x^2 - 10x \right]_2^4$$

$$= 12$$

### 02 정답 19

**해설**  $\int_{-1}^3 \left\{ -\left( -\frac{3}{4}x^2 - 3 \right) \right\} dx = \int_{-1}^3 \left( \frac{3}{4}x^2 + 3 \right) dx$

$$= \left[ \frac{1}{4}x^3 + 3x \right]_{-1}^3$$

$$= \frac{63}{4} - \left( -\frac{13}{4} \right) = 19$$

### 03 정답 ③


**해설** 구하는 도형의 넓이는

$$\int_1^3 (-2x^2 + 6x + 8) dx$$

$$= \left[ -\frac{2}{3}x^3 + 3x^2 + 8x \right]_1^3$$

$$= (-18 + 27 + 24) - \left( -\frac{2}{3} + 3 + 8 \right)$$

$$= \frac{68}{3}$$



### 04 정답 $\frac{58}{3}$

**해설** 곡선  $y = ax^2 + bx + c$ 의  $y$ 절편이 15이므로  $c = 15$

이차방정식  $ax^2 + bx + c = 0$ 의 두 근이  $x = 3$  또는  $x = 5$ 이므로

$$a(x-3)(x-5) = 0$$

$$ax^2 - 8ax + 15a = 0$$

$$15a = c = 15 \text{이므로}$$

$$a = 1$$

$$-8a = b \text{이므로}$$

$$b = -8$$

따라서 구하는 도형의 넓이는

$$\int_0^3 (x^2 - 8x + 15) dx - \int_3^5 (x^2 - 8x + 15) dx$$

$$= \left[ \frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + 15x \right]_0^3 - \left[ \frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + 15x \right]_3^5$$

$$= 18 + \frac{4}{3} = \frac{58}{3}$$

### 05 정답 4

**해설**  $\int_1^3 |-x^2 + 4| dx$

$$= \int_1^2 (-x^2 + 4) dx + \int_2^3 (x^2 - 4) dx$$

$$= \left[ -\frac{1}{3}x^3 + 4x \right]_1^2 + \left[ \frac{1}{3}x^3 - 4x \right]_2^3$$

$$= \frac{5}{3} + \frac{7}{3} = 4$$

06 정답  $\frac{59}{6}$

해설  $\int_{-5}^{-2} |x^2 + 3x| dx$

$$= \int_{-5}^{-3} (x^2 + 3x) dx + \int_{-3}^{-2} (-x^2 - 3x) dx$$

$$= \left[ \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 \right]_{-5}^{-3} + \left[ -\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 \right]_{-3}^{-2}$$

$$= \frac{26}{3} + \frac{7}{6} = \frac{59}{6}$$

07 정답  $\frac{256}{3}$

해설  $\int_{-5}^3 (-x^2 - 2x + 15) dx$

$$= \left[ -\frac{1}{3}x^3 - x^2 + 15x \right]_{-5}^3$$

$$= (-9 - 9 + 45) - \left( \frac{125}{3} - 25 - 75 \right)$$

$$= \frac{256}{3}$$

08 정답 21

해설  $\int_0^3 (4t + 1) dt = \left[ 2t^2 + t \right]_0^3 = 21$


09 정답 10

해설  $2 + \int_0^2 (t + 3) dt = 2 + \left[ \frac{1}{2}t^2 + 3t \right]_0^2$

$$= 2 + 8 = 10$$

10 정답 22

해설  $v(t) = 3t^2 - 6t$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$$\therefore \int_1^4 |v(t)| dt$$

$$= \int_1^2 (-3t^2 + 6t) dt + \int_2^4 (3t^2 - 6t) dt$$

$$= \left[ -t^3 + 3t^2 \right]_1^2 + \left[ t^3 - 3t^2 \right]_2^4$$

$$= 2 + 20 = 22$$

11 정답 ③

해설 정적분을 이용하여 곡선과 직선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구한다.

곡선  $y = x^2$ 과 직선  $y = ax$ 의 교점의 좌표는

방정식  $x^2 = ax$ 에서  $(0, 0)$ ,  $(a, a^2)$

따라서 구하는 넓이는

$$\int_0^a |ax - x^2| dx = \left[ \frac{a}{2}x - \frac{x^3}{3} \right]_0^a$$

$$= \frac{a^3}{2} - \frac{a^3}{3} = \frac{a^3}{6}$$

12 정답 ②

해설 직선  $y = g(x)$ 가 곡선  $y = f(x)$  위의

점  $(2, f(2))$ 에서의 접선이고, 직선  $y = g(x)$ 와

곡선  $y = f(x)$ 가 원점에서 만나므로

삼차방정식  $f(x) - g(x) = 0$ 은 중근 2와 다른 한 근  $x = 0$ 을 갖는다.

이때  $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 2이므로

$$f(x) - g(x) = 2x(x - 2)^2 = 2x^3 - 8x^2 + 8x$$

따라서 구하는 넓이는

$$\int_0^2 \{f(x) - g(x)\} dx = \int_0^2 (2x^3 - 8x^2 + 8x) dx$$

$$= \left[ \frac{1}{2}x^4 - \frac{8}{3}x^3 + 4x^2 \right]_0^2$$

$$= \frac{8}{3}$$

### 13 정답 142

**해설** 두 곡선  $y = -x^3 + 4x$ ,  $y = -x^2 + 4$ 의 교점의  $x$ 좌표는  
 $-x^3 + 4x = -x^2 + 4$ 에서

$$\begin{aligned} x^3 - x^2 - 4x + 4 &= 0 \\ (x-1)(x+2)(x-2) &= 0 \\ \therefore x &= 1 \text{ 또는 } x = \pm 2 \end{aligned}$$

따라서 두 도형의 넓이는


$$\begin{aligned} S_1 &= \int_{-2}^1 \{(-x^2 + 4) - (-x^3 + 4x)\} dx \\ &= \int_{-2}^1 (x^3 - x^2 - 4x + 4) dx \\ &= \left[ \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x \right]_{-2}^1 \\ &= \frac{45}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_2 &= \int_1^2 \{(-x^3 + 4x) - (-x^2 + 4)\} dx \\ &= \int_1^2 (-x^3 + x^2 + 4x - 4) dx \\ &= \left[ -\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 4x \right]_1^2 \\ &= \frac{7}{12} \end{aligned}$$

$$\therefore 12(S_1 + S_2) = 12 \left( \frac{45}{4} + \frac{7}{12} \right) = 142$$

### 14 정답 ②

**해설**  $y = x^4 - (k+1)x^3 + kx^2 = x^2(x-k)(x-1)$ 이므로  
 곡선  $y = x^4 - (k+1)x^3 + kx^2$ 은 다음 그림과 같다.



따라서 곡선  $y = x^4 - (k+1)x^3 + kx^2$ 과  $x$ 축으로  
 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같으므로

$$\begin{aligned} &\int_0^k \{x^4 - (k+1)x^3 + kx^2\} dx \\ &= \left[ \frac{1}{5}x^5 - \frac{k+1}{4}x^4 + \frac{k}{3}x^3 \right]_0^k \\ &= \frac{k^5}{5} - \frac{(k+1)k^4}{4} + \frac{k^4}{3} = 0 \end{aligned}$$

$$\text{이때 } k > 1 \text{ 이므로 } \frac{k}{5} - \frac{k+1}{4} + \frac{1}{3} = 0$$

$$12k - 15(k+1) + 20 = 0, \quad -3k + 5 = 0$$

따라서  $k = \frac{5}{3}$ 이다.

### 15 정답 ③

**해설** 시각  $t = 4$ 에서 점 P의 운동 방향이 바뀌므로  
 $v(4) = 0$ 이다.

$$v(4) = 40 - 4a = 0 \text{에서 } a = 10$$

점 P가 시각  $t = 0$ 에서  $t = 6$ 까지 움직인 거리를  $s$ 라  
 하면

$$\begin{aligned} s &= \int_0^6 |v(t)| dt = \int_0^6 |40 - 10t| dt \\ &= \int_0^4 (40 - 10t) dt + \int_4^6 (10t - 40) dt \\ &= [40t - 5t^2]_0^4 + [5t^2 - 40t]_4^6 = 80 + 20 = 100 \end{aligned}$$

### 16 정답 245m

**해설**  $v(t) = 50 - 10t = 0$ 에서  $t = 5$ 이다.

따라서 물체는 위로 쏘아 올린 지 5초 후에 최고 높이에  
 도달하므로 구하는 높이는

$$\begin{aligned} 120 + \int_0^5 (50 - 10t) dt &= 120 + [50t - 5t^2]_0^5 \\ &= 120 + 125 \\ &= 245(\text{m}) \end{aligned}$$

### 17 정답 68m


**해설** 움직인 거리는  $\int_0^8 |-4t + 20| dt$ 이므로

$$\begin{aligned} &\int_0^5 (-4t + 20) dt + \int_5^8 (4t - 20) dt \\ &= \left[ -2t^2 + 20t \right]_0^5 + \left[ 2t^2 - 20t \right]_5^8 \\ &= 68(\text{m}) \end{aligned}$$

## 18 정답 ④

**해설**  $t = 3$ 일 때의 점 P의 위치가 14이므로

$$\begin{aligned} 14 &= \int_0^3 v(t) dt \\ &= \int_0^1 v(t) dt + \int_1^2 v(t) dt + \int_2^3 v(t) dt \\ &= \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 4a + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 4a - \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot a \\ &= 2a + 2a - \frac{1}{2}a = \frac{7}{2}a \end{aligned}$$



즉,  $\frac{7}{2}a = 14$ 이므로  $a = 4$

$t = 5$ 일 때의 점 P의 위치를 구하면

$$\begin{aligned} \int_0^5 v(t) dt &= \int_0^2 v(t) dt + \int_2^4 v(t) dt + \int_4^5 v(t) dt \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4a - \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot a + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 4a \\ &= 4a - a + 2a \\ &= 5a \\ &= 4 \cdot 5 \\ &= 20 \end{aligned}$$

## 19 정답 3


**해설** 점 P는  $t = 4$ 일 때 원점으로부터 가장 멀리 떨어져 있고 그때의 점 P의 위치는

$$\begin{aligned} -1 + \int_0^4 v(t) dt &= -1 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 2 \\ &= -1 + 4 \\ &= 3 \end{aligned}$$

## 20 정답 14

**해설** 정적분을 이용하여 넓이를 구할 수 있는가?

두 함수  $f(x) = \frac{1}{3}x(4-x)$ ,  $g(x) = |x-1| - 1$ 의 그래프는 다음과 같다.



$x < 1$ 일 때,  $g(x) = -x$ 이므로

$$\frac{1}{3}x(4-x) = -x \text{에서}$$

$$x = 0$$

$x \geq 1$ 일 때,  $g(x) = x - 2$ 이므로

$$\frac{1}{3}x(4-x) = x - 2 \text{에서}$$

$$4x - x^2 = 3x - 6$$

$$x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2) = 0$$

$$x = 3$$

따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 \{f(x) - g(x)\} dx \\ &\quad + \int_1^3 \{f(x) - g(x)\} dx \\ &= \int_0^1 \left( -\frac{1}{3}x^2 + \frac{7}{3}x \right) dx \\ &\quad + \int_1^3 \left( -\frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{3}x + 2 \right) dx \\ &= \left[ -\frac{1}{9}x^3 + \frac{7}{6}x^2 \right]_0^1 + \left[ -\frac{1}{9}x^3 + \frac{1}{6}x^2 + 2x \right]_1^3 \\ &= \left( -\frac{1}{9} + \frac{7}{6} \right) + \left\{ \left( -3 + \frac{3}{2} + 6 \right) - \left( -\frac{1}{9} + \frac{1}{6} + 2 \right) \right\} \\ &= \frac{7}{2} \\ \therefore 4S &= 14 \end{aligned}$$

## 21 정답 ③

**해설**  $x < 0$ 일 때, 점 A에서 두 함수  $y = ax^2 + 3$ 과  $y = -4x$ 의 그래프가 접하므로  
 $ax^2 + 3 = -4x$ , 즉  $ax^2 + 4x + 3 = 0$   
 이 이차방정식의 판별식을  $D$ 라 하면  
 $\frac{D}{4} = 4 - 3a = 0$   
 따라서  $a = \frac{4}{3}$ 이므로 접점 A의  $x$ 좌표는  $-\frac{3}{2}$ 이다.  
 점 B는 점 A와  $y$ 축에 대하여 대칭이므로  
 접점 B의  $x$ 좌표는  $\frac{3}{2}$ 이다.  
 주어진 두 함수의 그래프가 모두  $y$ 축에 대하여 대칭이므로  
 구하는 넓이는  

$$2 \int_0^{\frac{3}{2}} \left( \frac{4}{3}x^2 + 3 - 4x \right) dx$$

$$= 2 \left[ \frac{4}{9}x^3 + 3x - 2x^2 \right]_0^{\frac{3}{2}}$$

$$= 2 \left\{ \frac{4}{9} \cdot \left( \frac{3}{2} \right)^3 + 3 \cdot \frac{3}{2} - 2 \cdot \left( \frac{3}{2} \right)^2 \right\}$$

$$= 2 \cdot \frac{3}{2} = 3$$

## 22 정답 ①

**해설**  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$  ( $a, b, c$ 는 상수)로 놓으면  
 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$   
 조건 (가)에서  $f(0) = c = 4$ ,  $f'(0) = b = 4$ 이므로  
 $f(x) = x^3 + ax^2 + 4x + 4$ ,  $f'(x) = 3x^2 + 2ax + 4$   
 조건 (나)에서  $f(1) = 1 + a + 4 + 4 = a + 9$   
 $f'(1) = 3 + 2a + 4 = 2a + 7$ 이므로  
 $a + 9 = 2a + 7$ 에서  
 $a = 2$   
 즉,  $f(x) = x^3 + 2x^2 + 4x + 4$ ,  $f'(x) = 3x^2 + 4x + 4$   
 $f(x) = f'(x)$ 에서  $f(x) - f'(x) = 0$ 이므로  
 $x^3 - x^2 = 0$ ,  $x^2(x - 1) = 0$   
 $x = 0$  또는  $x = 1$   
 $0 \leq x \leq 1$ 에서  $f(x) \leq f'(x)$ 이므로  
 두 곡선  $y = f(x)$ 와  $y = f'(x)$ 로 둘러싸인 부분의  
 넓이는  

$$\int_0^1 \{ (3x^2 + 4x + 4) - (x^3 + 2x^2 + 4x + 4) \} dx$$


$$= \int_0^1 (x^2 - x^3) dx = \left[ -\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1$$

$$= -\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$$

## 23 정답 ①

**해설** 곡선  $y = x^2$ 과 직선  $y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$ 의 교점의  $x$ 좌표는  
 $x^2 = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$ 에서  
 $3x^2 - 2x - 1 = 0$ ,  $(3x + 1)(x - 1) = 0$   
 $\therefore x = -\frac{1}{3}$  또는  $x = 1$   
 따라서 곡선  $y = x^2$ 과 직선  $y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$ 로 둘러싸인  
 도형의 넓이를  $S$ 라 하면  

$$S = \int_{-\frac{1}{3}}^1 \left( \frac{2}{3}x + \frac{1}{3} - x^2 \right) dx$$
  
 그런데  $S$ 는 곡선  
 $y = -x^2 + \frac{2}{3}x + \frac{1}{3} = -\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{4}{9}$ 와  $x$ 축으로  
 둘러싸인 부분의 넓이이므로 대칭축  $x = \frac{1}{3}$ 에 의하여  
 이등분된다.  
 $\therefore a = \frac{1}{3}$




## 24 정답 41/4

**해설** 함수  $f(x) = \frac{1}{5}x(x^2+1)$  ( $x \geq 0$ )의 역함수가

$g(x)$ 이므로  $y=f(x)$ 의 그래프와  $y=g(x)$ 의 그래프는 직선  $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

다음 그림에서



$$(B의 넓이) = (A의 넓이)$$

$$= 3 \cdot 6 - 2 \cdot 2 - (C의 넓이)$$

$$= 14 - \int_2^3 f(x)dx$$

$$= 14 - \int_2^3 \frac{1}{5}x(x^2+1)dx$$

$$= 14 - \frac{1}{5} \int_2^3 (x^3+x)dx$$


$$= 14 - \frac{1}{5} \left[ \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 \right]_2^3$$

$$= 14 - \frac{1}{5} \cdot \frac{75}{4} = \frac{41}{4}$$

$$\therefore \int_2^6 g(x)dx = (B의 넓이) = \frac{41}{4}$$

## 25 정답 ④

**해설** 두 곡선  $y=f(x)$ ,  $y=g(x)$ 는 직선  $y=x$ 에 대하여 대칭이다.



$$S_1 = \int_1^3 f(x)dx, S_2 = \int_1^{27} g(x)dx \text{라고 하면}$$


$$\int_1^3 f(x)dx + \int_1^{27} g(x)dx = S_1 + S_2$$

$$= 3 \cdot 27 - 1 \cdot 1 = 80$$

## 26 정답 ⑤

**해설** 함수  $f(x) = x^3 + 2$  ( $x \geq 0$ )

의 역함수가  $g(x)$ 이므로  $y=f(x)$ 의 그래프와  $y=g(x)$ 의 그래프는 직선  $y=x$ 에 대하여 대칭이다.



그림에서  $(A의 넓이) = (B의 넓이)$ 이므로

$$\int_0^2 f(x)dx + \int_2^{10} g(x)dx$$

$$= (C의 넓이) + (B의 넓이)$$

$$= (C의 넓이) + (A의 넓이)$$

$$= 2 \cdot 10 = 20$$

## 27 정답 48

**해설** 곡선  $y=f(x)$ 와 곡선  $y=g(x)$ 는 직선  $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 구하는 도형의 넓이는 곡선  $y=f(x)$ 와 직선  $y=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 2배이다.

곡선  $y=f(x)$ 와 직선  $y=x$ 의 교점의  $x$ 좌표는  $x=0$  또는  $x=12$

달한구간  $[0, 12]$ 에서  $x \geq \frac{1}{12}x^2$ 이므로

구하는 도형의 넓이는


$$2 \int_0^{12} \left( x - \frac{1}{12}x^2 \right) dx = 2 \left[ \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{36}x^3 \right]_0^{12} = 48$$

## 28 정답 ③

**해설**  $f(x) = x^4 - (2+a)x^3 + 2ax^2$   
 $= x^2(x-2)(x-a)$

(i)  $0 < a < 2$ 인 경우

곡선  $y = f(x)$ 는 [그림 1]과 같다.



[그림 1]

곡선  $y = f(x)$ 와  $x$ 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같으므로


$$\begin{aligned} \int_0^2 f(x)dx &= \int_0^2 \{x^4 - (2+a)x^3 + 2ax^2\}dx \\ &= \left[ \frac{1}{5}x^5 - \frac{2+a}{4}x^4 + \frac{2a}{3}x^3 \right]_0^2 \\ &= \frac{32}{5} - 4(2+a) + \frac{16a}{3} \\ &= \frac{20a-24}{15} \end{aligned}$$

에서  $20a-24=0$

$$\therefore a = \frac{6}{5}$$

(ii)  $a > 2$ 인 경우

곡선  $y = f(x)$ 는 [그림 2]와 같다.



[그림 2]

곡선  $y = f(x)$ 와  $x$ 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같으므로

$$\begin{aligned} \int_0^a f(x)dx &= \int_0^a \{x^4 - (2+a)x^3 + 2ax^2\}dx \\ &= \left[ \frac{1}{5}x^5 - \frac{2+a}{4}x^4 + \frac{2a}{3}x^3 \right]_0^a \\ &= \frac{1}{5}a^5 - \frac{2+a}{4} \cdot a^4 + \frac{2}{3}a^4 \\ &= a^4 \left( -\frac{a}{20} + \frac{1}{6} \right) = 0 \end{aligned}$$

에서  $a \neq 0$ 이므로  $a = \frac{20}{6} = \frac{10}{3}$

(i), (ii)에서 구하는 모든 양수  $a$ 의 값의 곱은

$$\frac{6}{5} \cdot \frac{10}{3} = 4$$

## 29 정답 ④

**해설** 도형의 넓이가 같으므로

$$\begin{aligned} &\int_0^1 \{(-x^4+x) - (x^4-x^3)\}dx \\ &= 2 \int_0^1 \{(-x^4+x) - (ax-ax^2)\}dx \\ &= \int_0^1 (-2x^4+x^3+x)dx \\ &= 2 \int_0^1 \{x^4+ax^2+(1-a)x\}dx \\ &= \int_0^1 (-2x^4+x^3+x)dx - \\ &\quad 2 \int_0^1 \{x^4+ax^2+(1-a)x\}dx = 0 \\ &= \int_0^1 [(-2x^4+x^3+x) - 2\{x^4+ax^2+(1-a)x\}]dx \\ &= 0 \\ &= \int_0^1 \{x^3-2ax^2+(2a-1)x\}dx = 0 \\ &= \left[ \frac{x^4}{4} - \frac{2}{3}ax^3 + \frac{2a-1}{2}x^2 \right]_0^1 = 0 \\ &= \frac{1}{4} - \frac{2}{3}a + a - \frac{1}{2} = 0 \\ &\therefore a = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

## 30 정답 ⑤

**해설** 함수  $g(x)$ 는  $x \geq t$ 일 때, 점  $(t, f(t))$ 를 지나고 기울기가  $-2$ 인 직선이므로 이 직선은  $x$ 축과 점  $\left(t + \frac{f(t)}{2}, 0\right)$ 에서 만난다.

따라서 함수  $y = g(x)$ 의 그래프와  $x$ 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를  $S(t)$ 라 하면

$$\begin{aligned} S(t) &= \int_0^t f(x)dx + \frac{1}{2} \cdot \left(t + \frac{f(t)}{2} - t\right) \cdot f(t) \\ &= \int_0^t f(x)dx + \frac{\{f(t)\}^2}{4} \end{aligned}$$

이때 양변을 미분하면

$$\begin{aligned} S'(t) &= f(t) + \frac{f(t) \cdot f'(t)}{2} \\ &= f(t) \left\{ 1 + \frac{f'(t)}{2} \right\} \end{aligned}$$

한편,  $f(x) = \frac{1}{3}x(x-3)(x-6)$ 이므로  $0 < t < 3$ 에서

$$f(t) > 0$$

이때  $1 + \frac{f'(t)}{2}$ 를 정리하면

$$1 + \frac{f'(t)}{2}$$

$$\begin{aligned}
 &= 1 + \frac{1}{6} \{ (t-3)(t-6) + t(t-6) + t(t-3) \} \\
 &= 1 + \frac{1}{6} \{ (t^2 - 9t + 18) + (t^2 - 6t) + (t^2 - 3t) \} \\
 &= 1 + \frac{1}{6} (3t^2 - 18t + 18) \\
 &= 1 + \frac{1}{2} (t^2 - 6t + 6) \\
 &= \frac{1}{2} (t^2 - 6t + 8) \\
 &= \frac{1}{2} (t-2)(t-4)
 \end{aligned}$$

따라서  $0 < t < 3$ 에서  $S(t)$ 의 증가와 감소는 다음 표와 같다.

$x$	(0)	...	2	...	(3)
$S'(x)$		+	0	-	
$S(x)$		↗	(극대)	↘	

따라서  $S(t)$ 는  $t=2$ 에서 극대이면서 최대이므로  
최댓값은

$$\begin{aligned}
 S(2) &= \int_0^2 f(x) dx + \frac{\{f(2)\}^2}{4} \\
 &= \frac{1}{3} \int_0^2 x(x-3)(x-6) dx \\
 &\quad + \frac{1}{4} \cdot \left\{ \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot (-1) \cdot (-4) \right\}^2 \\
 &= \frac{1}{3} \int_0^2 (x^3 - 9x^2 + 18x) dx + \frac{16}{9} \\
 &= \frac{1}{3} \left[ \frac{1}{4} x^4 - 3x^3 + 9x^2 \right]_0^2 + \frac{16}{9} \\
 &= \frac{1}{3} \cdot \left( \frac{1}{4} \cdot 16 - 3 \cdot 8 + 9 \cdot 4 \right) + \frac{16}{9} \\
 &= \frac{64}{9}
 \end{aligned}$$