函子

接下来我们来提供函子的正式定义:

- F: C→D 为函子当且仅当
 - 对任意 C 中对象 c , cF 为
 D 中对象且 :cidF = :cF id ;
 - 对任意 C 中箭头 j_1 : $c_1 \xrightarrow{c} c_2$ 和 j_2 : $c_2 \xrightarrow{c} c_3$, 始终都有等式 $(j_1 \circ j_2)F = j_1F \circ j_2F$ 成立。

若已确信 $F: C \xrightarrow{Cat} D$ 为函子且 还知 C 中有对象 c_1, c_2 以及 C 中有箭头 $\mathbf{j}: c_1 \xrightarrow{C} c_2$ 则

- 若 j 为单态 / 满态 / 同构
 则 jF 为单态 / 满态 / 同构;
- 若 jF 为同构
 则 j 为同构。

Note

不难发现函子具有保持 对象 / 态射性质的能力。

函子的复合运算

若还知道 $G: D \xrightarrow{Cat} E$ 为函子则

• $F \overset{\text{Cat}}{\circ} G : C \overset{\text{Cat}}{\longrightarrow} E$ 也构成一个函子。

恒等函子

对于函子我们也有恒等映射,即:

$$\bullet \quad \underset{:C}{\overline{\mathrm{Id}}} \circ \stackrel{\mathsf{Cat}}{F} = \stackrel{F}{F} \\
= \stackrel{\mathsf{Cat}}{F} \circ :_{\mathsf{D}} \overline{\mathrm{Id}}$$

忠实,完全和本质满函子

若 C, D, E 皆为**局部小范畴**,则

- **F** 是**忠实的**当且仅当对任意 C 中的对象 c_1, c_2 , $c_1 \xrightarrow{C} c_2$ 与 $c_1 \xrightarrow{F} \xrightarrow{D} c_2 \xrightarrow{F}$ 之间始终都存在单射 ;
- **F** 是**完全的**当且仅当对任意 C 中的对象 c_1, c_2 , $c_1 \xrightarrow{C} c_2$ 与 $c_1 \xrightarrow{F} c_2 \xrightarrow{F}$ 之间始终都存在满射 ;
- **F** 是**完全忠实的**当且仅当任意 C 中对象 c_1, c_2 , $c_1 \xrightarrow{C} c_2$ 与 $c_1 \xrightarrow{P} c_2 F$ 之间始终都存在双射 。

Note

刚才提到的"单/满/双射"针对的都是范畴的箭头部分。

• F 是**本质满的**当且仅当对任意 D 中对象 d 都存在 C 中对象 c 使 $cF \xrightarrow{D} d$ 之间有双射。


根据刚才的信息我们不难得知

- 若 F, G 为忠实 / 完全 / 完全忠实 / 本质满函子则 F G 为忠实 / 完全 / 完全忠实 / 本质满 函子;
- 若 $F \stackrel{\text{Cat}}{\circ} G$ 为完全忠实函子 且知道 G 为完全忠实函子 则可知 F 为完全忠实函子;

自然变换

如果还知道 F': $C \xrightarrow{Cat} D$ 为函子 , 那么


η: F → F' 为自然变换当且仅当对任意
 C 中对象 c, c' 始终都会有下述交换图成立:



自然变换的复合


若已知 $\eta: F \xrightarrow{Cat} F'$ 构成自然变换且还知道 $\eta': F' \xrightarrow{Cat} F''$ 为自然变换则

• $\eta \circ \eta' : F \xrightarrow{Cat} F''$ 为自然变换,称作 η 和 η' 的**纵复合**。




如果还知道 $G': D \xrightarrow{Cat} E$ 也是个函子 及自然变换 $\theta: G \xrightarrow{D \to E} G'$ 那么便有

• $\eta \circ \theta : F \circ G \xrightarrow{Cat} F' \circ G'$ 为 自然变换,称作 η 和 θ 的**横复合**。



若 $heta': extbf{G} \xrightarrow{ extbf{D} o extbf{G}'} extbf{为自然变换则}$


• $(\eta \circ \theta)$ \circ $(\eta' \circ \theta') = (\eta \circ \eta') \circ (\theta \circ \theta')$, 即便改变横纵复合先后顺序也不影响最终结果。



恒等自然变换

同样对于自然变换也有恒等映射。

 :F^ι: F → F 为恒等自然变换当且仅当 对范畴 C 中任意对象 c 都有下述交换图成立:



自然同构

自然同构与你想象中的同构不太像。

• $\eta: \stackrel{\stackrel{Cat}{\longrightarrow} D}{F} \longrightarrow F'$ 为**自然同构**当且仅当 c^η 总是同构 , 这里 c 为任意 c 中对象 。 此时 F , F' 的关系可用 $F \cong F'$ 表示

范畴等价的定义

我们用自然同构来定义范畴的等价 。

• $C \cong D$ 当且仅当
存在函子 $F_{a:} \subset C_{at} \subset D$ 及 $F' : D \xrightarrow{Cat} \subset C$ 使 $F \circ F' \cong C_{cid} \subset C$ 使 $F \circ F' \cong C_{cid} \subset C$