


# 06 类型的幂

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Definitions are here.

## 泛性质

默认函子  $\overset{\mathcal{C}}{\rightarrow} : \mathcal{C} \overset{\text{Cat}}{\times} \mathcal{C} \overset{\text{Cat}}{\longrightarrow} \mathcal{C}$  在范畴  $\mathcal{C}$  中有下述性质：

- $(c_1 \overset{\mathcal{C}}{\times} c) \overset{\mathcal{C}}{\rightarrow} c_2 \overset{\text{Set}}{\cong} c \overset{\mathcal{C}}{\rightarrow} (c_1 \overset{\mathcal{C}}{\rightarrow} c_2) \overset{\text{Set}}{\cong} c_1 \overset{\mathcal{C}}{\rightarrow} (c \overset{\mathcal{C}}{\rightarrow} c_2)$   
——  $c$  为任意  $\mathcal{C}$  中对象。此即为幂的泛性质，亦表示了指数加乘法之间的运算关系。





## 函子性


如何证明  $\overset{\mathcal{C}}{\rightarrow}$  构成函子呢？请看

- $\overset{\mathcal{C}}{\rightarrow} : (:_{c_1} \text{id} \cdot :_{c_2} \text{id}) \longmapsto :_{(c_1 \overset{\mathcal{C}}{\rightarrow} c_2)} \text{id}$   
—— 即函子  $\rightarrow$  能**保持恒等箭头**；
- $\overset{\mathcal{C}}{\rightarrow} : (f'_1 \overset{\mathcal{C}}{\circ} f_1 \cdot f_2 \overset{\mathcal{C}}{\circ} f'_2) \longmapsto f \overset{\mathcal{C}}{\circ} f'$   
—— 即函子  $\rightarrow$  **保持箭头复合运算**。

下图有助于形象理解证明过程：



下图 ( 自上到下分别为图 1 和图 2 ) 后面会用到。



范畴  $\mathcal{C}$  内任意两对象  $c_1$  和  $c_2$  间的箭头构成一个集合  $c_1 \xrightarrow{\mathcal{C}} c_2$  ,  
说明  $\xrightarrow{\mathcal{C}}$  只能将两个对象打到一个集合 ; 下面使  $\xrightarrow{\mathcal{C}}$  升级为函子 :  
若还知道箭头  $f_1 : c'_1 \xrightarrow{\mathcal{C}} c_1$  以及  $f_2 : c_2 \xrightarrow{\mathcal{C}} c'_2$  , 则规定

- $(-\xrightarrow{\mathcal{C}} c_2) : \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \xrightarrow{\text{Cat}} \mathbf{Set}$  为函子且  
 $(-\xrightarrow{\mathcal{C}} c_2) : c_1 \longmapsto (c_1 \xrightarrow{\mathcal{C}} c_2)$  , 并且有  
 $(-\xrightarrow{\mathcal{C}} c_2) : f_1 \longmapsto (f_1 \xrightarrow{\mathcal{C}} c_2) = (f_1 \xrightarrow{\mathcal{C}} :_{c_2} \text{id}) = c_2^{(f_1 \circ -)}$

图 1 有助于理解。

$$\begin{aligned} &(-\xrightarrow{\mathcal{C}} f_2) : \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \xrightarrow{\text{Cat}} \mathbf{Set} , \\ &(-\xrightarrow{\mathcal{C}} f_2) : c_1 \longmapsto (c_1 \xrightarrow{\mathcal{C}} f_2) = (:_{c_1} \text{id} \xrightarrow{\mathcal{C}} f_2) = c_2^{(- \circ f_2)} \\ &(-\xrightarrow{\mathcal{C}} f_2) : f_1 \longmapsto (f_1 \xrightarrow{\mathcal{C}} f_2) = (f_1 \circ -) \xrightarrow{\text{Cat}}_{\mathbf{Set}} (- \circ f_2) = (- \circ f_2) \xrightarrow{\text{Cat}}_{\mathbf{Set}} (f_1 \circ -) \end{aligned}$$

图 2 有助于理解。