


章节 04 - 05 类型的积与和

\LaTeX Definitions are here.

泛性质


默认函子 $\overset{\mathcal{C}}{\times} : \mathcal{C}^{\text{Cat}} \times \mathcal{C}^{\text{Cat}} \overset{\text{Cat}}{\longrightarrow} \mathcal{C}$ 在范畴 \mathcal{C} 中有下述性质：

- $(x \overset{\mathcal{C}}{\rightarrow} a) \overset{\text{Set}}{\times} (x \overset{\mathcal{C}}{\rightarrow} b) \cong (x \overset{\mathcal{C}}{\rightarrow} (a \overset{\mathcal{C}}{\times} b))$, x 为任意 \mathcal{C} 中对象。
—— **泛性质**, 指数对乘法的分配律。下图便于形象理解：



默认函子 $\overset{\mathcal{C}}{+} : \mathcal{C}^{\text{Cat}} \times \mathcal{C}^{\text{Cat}} \overset{\text{Cat}}{\longrightarrow} \mathcal{C}$ 在范畴 \mathcal{C} 中有下述性质：

- $(a \overset{\mathcal{C}}{\rightarrow} x) \overset{\text{Set}}{\times} (b \overset{\mathcal{C}}{\rightarrow} x) \cong ((a \overset{\mathcal{C}}{+} b) \overset{\mathcal{C}}{\rightarrow} x)$, x 为任意 \mathcal{C} 中对象。
—— **泛性质**, 指数对加法的分配律。下图便于形象理解：



Note

在上面的插图中：



- $\overset{\mathcal{C}}{\Delta} : \mathcal{C} \overset{\text{Cat}}{\longrightarrow} \mathcal{C}^{\text{Cat}} \times \mathcal{C}^{\text{Cat}}$ 为对角函子, 满足 $\Delta : c \mapsto c . c$
- $I : \textcircled{2} \overset{\text{Cat}}{\longrightarrow} \mathcal{C}$ 为函子, 满足 $I : 1 \mapsto a$ $2 \mapsto b$
 $\textcircled{2}$ 为只有两个对象的范畴, 1 和 2 分别为其中的对象。
这里 $\textcircled{2}$ 充当一个指标范畴。

函子性

如何证明 $\overset{\mathcal{C}}{\times}$ 构成函子呢？请看

- $\overset{\mathcal{C}}{\times} : (:_{a_2}\text{id} \cdot :_{b_2}\text{id}) \longmapsto :_{a_2 \times b_2}\text{id}$
—— 即函子 \times **保持恒等箭头**；
- $\overset{\mathcal{C}}{\times} : (f_2 \overset{\mathcal{C}}{\circ} f_1 \cdot g_2 \overset{\mathcal{C}}{\circ} g_1) \mapsto h_2 \overset{\mathcal{C}}{\circ} h_1$
—— 即函子 \times **保持箭头复合运算**。

下图有助于形象理解证明的过程：





另外规定 $\overset{\mathcal{C}}{\times}$ 在实参分别为箭头和对象时的输出：

- $\overset{\mathcal{C}}{\times} : (f_1 \cdot b_1) \longmapsto f_1 \overset{\mathcal{C}}{\times} :_{b_1}\text{id}$
 $\overset{\mathcal{C}}{\times} : (a_1 \cdot g_1) \longmapsto :_{a_1}\text{id} \times g_1$

如何证明 $\overset{\mathcal{C}}{+}$ 构成函子呢？请看

- $\overset{\mathcal{C}}{+} : (:_{a_1}\text{id} \cdot :_{b_1}\text{id}) \longmapsto :_{a_1 + b_1}\text{id}$
—— 即函子 $+$ **保持恒等箭头**；
- $\overset{\mathcal{C}}{+} : (f_1 \overset{\mathcal{C}}{\circ} f_2 \cdot g_1 \overset{\mathcal{C}}{\circ} g_2) \mapsto h_1 \overset{\mathcal{C}}{\circ} h_2$
—— 即函子 $+$ **保持箭头复合运算**。

下图有助于形象理解证明的过程：



同理规定 $\overset{\mathcal{C}}{+}$ 在实参分别为箭头和对象时的输出：


- $\overset{\mathcal{C}}{+} : (f_1 \cdot b_1) \longmapsto f_1 \overset{\mathcal{C}}{+} :_{b_1}\text{id}$
 $\overset{\mathcal{C}}{+} : (a_1 \cdot g_1) \longmapsto :_{a_1}\text{id} + g_1$

运算性质

对于函子 $\times^{\mathcal{C}}$ 我们不难得知


- $\mathbf{a} \times^{\mathcal{C}} \mathbf{1} \cong \mathbf{1} \times^{\mathcal{C}} \mathbf{a} \cong \mathbf{a}$ —— 乘法有**么元 1**。

下图便于理解证明： (f, g) 决定 h, h' 。




- $\mathbf{a} \times^{\mathcal{C}} \mathbf{b} \cong \mathbf{b} \times^{\mathcal{C}} \mathbf{a}$ —— 乘法运算有**交换律**。

下图便于理解证明： (f, g) 决定 h, h' 。



- $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} \cong \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ —— 乘法运算具有**结合律**。


下图有助于形象理解证明： (f_{ax}, f_{bx}, f_{cx}) 决定 h, h' 。



对于函子 $+\mathcal{C}$ 我们不难得知


- $\mathbf{a} + \mathbf{0} \cong \mathbf{0} + \mathbf{a} \cong \mathbf{a}$ —— 加法有**么元 0**。

下图有助于理解： (f, g) 决定 h, h' 。




- $\mathbf{a} + \mathbf{b} \cong \mathbf{b} + \mathbf{a}$ —— 加法运算有**交换律**。

下图有助于理解： (f, g) 决定 h, h' 。



- $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} \cong \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c})$ —— 加法运算具有**结合律**。

下图有助于形象理解证明： (f_{ax}, f_{bx}, f_{cx}) 决定 h, h' 。



么半范畴

像刚才这样对象运算具有**单位元**以及**结合律**的范畴称作**么半范畴**；


若上述范畴还具有**交换律**则称作**对称么半范畴**；

很明显我们的范畴 C 是典型的**对称么半范畴**。

么半群

什么是么半群呢？有两种定义方式：

- **么半群** M 是个范畴，其只含一个对象 m；其中的复合运算正好有单位元以及结合律。
- 对象 m 属于么半范畴 C，满足下述交换图：



其中

- $u : 1 \xrightarrow{C} m$ 其实就是 m 里面的么元
- $u_l : 1 \times m \xrightarrow{C} m$ 表示 u 构成左么元
- $u_r : m \times 1 \xrightarrow{C} m$ 表示 u 构成右么元
- $p : m \times m \xrightarrow{C} m$ 即为 m 中的二元运算
- $a : (m \times m) \times m \xrightarrow{C} m \times (m \times m)$ 表示 m 具有结合律