

休克及普通急症

一、是非題

- 1.() 對休克患者之保暖，可用毛毯包裹或腳下放熱水袋。
- 2.() 休克是人的有效血循環量不足的一種情況，他會造成組織與器官血液灌注不足，因而擾亂細胞功能。
- 3.() 任何嚴重傷害，均可能導致休克，故應給予預防休克的處理。
- 4.() 中風患者意識還清醒時，應使之平臥，頭肩部微墊高。
- 5.() 異物刺入眼球時，應盡速用手或手帕將異物取出，以免傷害眼睛。
- 6.() 暈倒是一種神經系統反應，由於腦部充血所致，故臉色潮紅。

二、選擇題

- 1.() 休克患者的姿勢，是使其平躺，下肢抬高幾公分？
(1)10~20 公分 (2)20~30 公分 (3)30~40 公分 (4)40 公分以上
- 2.() 下列何種原因可能導致休克？
(1)外傷、出血 (2)骨折、凍傷、燒傷 (3)飢餓、疲勞 (4)以上皆是一般意識不清的患者，適合採用的姿勢是哪一種？
(1)半坐臥 (2)抬高腳部 (3)復甦姿勢 (4)俯臥
- 4.() 魚刺哽在喉嚨中，正確處理方式是：
(1)趕快吞一口飯 (2)喝些醋助軟化 (3)順其自然
(4)看的見試行夾出，未能去除，立即就醫
- 5.() 患者突感胸痛、呼吸急促，可能是：
(1)胃病發作 (2)急性心臟病發作 (3)中風 (4)中暑
- 6.() 患者語言不清、半邊身體麻痺、微笑時嘴角歪一邊，可能是？
(1)心絞痛 (2)中風 (3)熱衰竭 (4)中暑
- 7.() 下列何者不是休克早期的徵象？
(1)皮膚蒼白 (2)皮膚濕冷 (3)脈搏弱且快 (4)脈搏弱且慢
- 8.() 休克患者何種情況不可抬高其下肢？
(1)頭部外傷 (2)呼吸困難 (3)抬高下肢患者會感到頭痛 (4)以上皆是
- 9.() 有人發生痙攣時，下列何者緊急處置是錯誤的？
(1)把他的嘴巴打開，塞東西給他咬，避免他咬到舌頭
(2)注意減緩跌倒 (3)鬆解頸部束縛物 (4)不提供任何飲料或食物

答案

一、1.× 2.○ 3.○ 4.○ 5.× 6.× 二、1.(2) 2.(4) 3.(3) 4.(4) 5.(2) 6.(2) 7.(4) 8.(4) 9.(1)

第七章

中毒

一、定義

任何固態、液態或氣態物質，經由鼻腔、口腔或皮膚等進入人體，造成健康損害或危害生命的現象。

二、急救的目的

(一) 維持患者的生命，並盡速送醫。

(二) 盡可能清除或沖淡毒物，以減少吸收，但不可因而延誤就醫時間。

三、急救的一般原則

(一) 評估現場及患者是否安全，必要時撥打 119 求援。

(二) 患者清醒且有正常呼吸時

1. 盡快詢問中毒原因、毒物名稱、接觸時間、殘留物放置處等。
2. 迅速替患者保暖、預防休克，並以救護車或車輛盡速送醫。

(三) 患者意識不清但有正常呼吸時

1. 採取復甦姿勢，預防嘔吐物進入呼吸道。
2. 不可給飲料、水或催吐。
3. 保暖，盡速送醫。

(四) 患者無意識且無正常呼吸者

立即撥打 119 求援並進行心肺復甦術，直到醫療救護人員接手或患者有反應。

台北榮民總醫院「毒藥物防治諮詢中心」
電話：02-28717121，由醫藥護理人員輪值，提供 24 小時諮詢服務。

四、常見中毒的急救

(一) 食物中毒

1. 詢問中毒原因，收集可疑毒物，以助診斷。
2. 給予患者保暖及預防休克
3. 將患者及現場殘留之毒物、嘔吐物及排泄物等一併送醫。
4. 預防
 - (1) 不要冒然嗜食野生動植物及來路不明的食物
 - (2) 選擇新鮮的食物
 - (3) 注意飲食衛生

(二) 藥物中毒 (口服食入 1 小時內，宜採左側臥)

1. 普通藥物中毒

- (1) 患者清醒時，立刻讓患者喝大量的水，沖淡毒物；或喝大量的牛奶，保護消化系統，減緩毒物被吸收的速度。
- (2) 立即送醫

2. 腐蝕性藥物中毒 (強酸、強鹼)

- (1) 不可催吐、稀釋或中和
- (2) 不可給予服用任何東西
- (3) 維持呼吸道暢通
- (4) 預防休克
- (5) 盡速送醫

3. 若口唇有灼傷情形時

- (1) 不可催吐
- (2) 不可稀釋
- (3) 不可中和毒物

4. 若偏遠地區無法將患者盡速送醫時，能確定患者服用毒物的種類和時間（原則以 1 小時以內），且未發現患者的嘴唇或口中有灼傷現象與特別氣味：

(1) 給水稀釋，沖淡毒物。

(2) 催吐

◎用湯匙輕壓患者舌根處，使其嘔吐。

◎如係兒童，可將其腹部俯臥在急救者膝上，頭部稍低，以免吸進嘔吐物。

◎千萬不可因等待催吐而延誤送醫，並讓患者採坐姿或臥姿。

5. 預防

(1) 所有藥品、家庭用清潔劑、消毒藥品及殺蟲劑等，應放置於兒童拿不到的地方，並標示清楚。

(2) 服藥或給藥時，務必遵照醫師指示之方式、時間及劑量。

(3) 清潔劑等與一般口服藥品應分開放置並上鎖；清潔劑等物品上應註明大而清晰的字樣，並於使用完畢後丟棄空瓶。

(4) 病癒未用完的藥品，應立即交回醫院單位回收。

(5) 教導較大的兒童認識毒物的危險

(三) 氣體中毒

1. 一氧化碳中毒：因燃燒不完全而產生，如在密閉空間燒炭或使用瓦斯爐、汽車排出的廢氣、洗澡時燃燒瓦斯熱水器及火災現場等，皆可能造成一氧化碳中毒。

急救處置

(1) 打開門窗，使空氣流通，將患者移至通風處。

(2) 撥打 119 求援，盡速送醫。

(3) 檢查生命徵象，如無意識且無正常呼吸者，應立即進行心肺復甦術。

(4) 使患者靜臥，並鬆開其身上束縛的衣物。

(5) 檢查有無其他傷害，予以及時處理。

2. 因缺氧而造成窒息（如進入深坑、深井及廢礦坑等環境）

急救處置：施救者應注意自身安全，盡速撥打 119 求援，其他措施參考一氧化碳中毒急救處置。

(四) 汽油、煤油及石油類中毒

急救處置

1. 不可給予患者任何口服物品

2. 不可催吐

3. 維持呼吸道暢通，如無意識且無正常呼吸者，應立即進行心肺復甦術。

4. 盡速送醫

(五) 接觸性中毒或過敏

急救處置

1. 盡快用清水反覆多次沖洗接觸處

2. 若有搔癢或灼熱感，可用肥皂及清水輕微洗滌。

3. 如有起水泡或過敏狀況，請盡速就醫。

(六) 毒蛇咬傷

1. 毒蛇咬傷的預防

(1) 切勿招惹毒蛇：毒蛇大部分不會主動襲擊人類，因此發現毒蛇時，立即遠離。絕對不要好奇或嬉戲玩弄牠，以防攻擊。

(2) 配備防蛇裝備：毒蛇咬傷多發生於前臂或下肢，尤其於手指及腳趾附近，故登山及郊遊應穿著長褲和具包覆性的鞋子等，是最簡易的預防措施。

(3) 消除蛇類棲息場所：家屋附近的竹林、草叢、洞穴等，為蛇類喜愛棲息的場所，應經常整理清除。





(4) 避免逗留徘徊戶外：夜間、日出及雨後，為蛇類最活躍的時間，應避免在可能有蛇的地方逗留徘徊，以減少被咬傷的機會。

(5) 露營時應選擇空曠而乾燥的地區，避免紮營於雜物堆附近，晚上應升起營火或火炬於營帳周圍，尤其是夏天的夜晚。

2. 急救處置

- (1) 保持鎮靜，盡可能辨別蛇的形狀、顏色及特徵，並詳記咬痕及患者的症狀。
- (2) 在無法或尚未確定蛇類有無毒性的狀況下，一律以毒蛇咬傷的狀況進行急救處置。
- (3) 傷肢大多會腫脹，應盡速除去束縛物，例如：戒指、手鐲等。
- (4) 盡量減少患者及受傷部位的活動，放低傷肢減少血液回流。
- (5) 盡速以彈性繃帶包紮患肢，由遠心端往近心端包紮，至少應覆蓋傷口上下 10 到 15 公分，如無彈性繃帶時，絲襪、褲襪亦可應用。可再用木板或樹枝等做成夾板固定患肢，以限制傷肢活動，減緩淋巴回流而造成毒液擴散。
- (6) 盡速送往備有抗毒蛇血清、破傷風等疫苗的衛生所或醫院。切勿輕信巫術或秘方，以免延誤治療，危及生命。
- (7) 切勿使用止血帶
- (8) 切勿切開傷口
- (9) 切勿用嘴嘗試吸出傷口毒液
- (10) 切勿冷（冰）敷傷口或給予會加速血液循環的飲料或藥物

毒蛇咬傷不可冷敷或冰敷，因冷敷或冰敷腫脹部位，會使循環變差，造成組織大量壞死。

無毒蛇之咬痕	有毒蛇之咬痕		
			



百步蛇



雨傘節



龜殼花



眼鏡蛇



赤尾鯢



鎖鍊蛇

毒蛇咬傷下肢包紮及固定法



1. 先判別毒蛇牙痕，剪除衣袖或褲管，避免移（活）動換肢，用寬的彈性繃帶，從咬傷處包紮。



2. 包紮時勿使肢端發紫，宜大面積進行包紮。



3. 使用夾板固定，限制傷者肢體活動。



（七）動物、昆蟲類咬傷或螫傷

1. 獸咬

- (1) 立刻用清水清洗傷口及沖掉唾液
- (2) 再用肥皂和清水徹底沖洗傷口
- (3) 用紗布或乾淨的布包紮
- (4) 盡速送醫

2. 蟲咬

- (1) 用肥皂和清水清洗患處
- (2) 如患處腫脹，用冷水浸透的布蓋在患處冷敷。
- (3) 送醫

3. 有毒昆蟲咬傷或螫傷

毒蜘蛛、蠍子螫傷或蜈蚣咬傷，傷口周圍可能紅腫、腹部或肌肉痙攣難受、發燒、出汗、噁心、刺痛或灼痛，並可能蔓延及於全身。

急救處置

- (1) 保暖、預防休克。
- (2) 螫傷處冷敷，減緩毒素擴散。
- (3) 盡速送醫

4. 蜂類螫傷

- (1) 用消毒的針或小刀挑出螫刺
- (2) 用清水沖洗被螫傷的皮膚
- (3) 局部冷敷，若有休克現象讓患者平躺，腳部抬高。
- (4) 盡速送醫

5. 水母螫傷

- (1) 用海水沖，把殘留在皮膚上的刺絲胞完全清除。
- (2) 盡快送醫治療
- (3) 以食用醋塗抹患部可減輕症狀