


포스터100/6 HFA 복약 안내문



이 약은 어떤 약인가요?

기관지의 염증을 줄여주고, 기관지를 확장하여 숨이 차거나 기침 등 증상을 줄여줍니다.




성분

Beclometasone (베클로메타손) 100ug
Formoterol (포모테롤) 6ug



효능

천식과 중증의 만성폐쇄성폐질환에 의한 각종 증상을 완화시키는 약입니다.



용법

성인: **1일 2회**, 1회 2흡입
(의사의 지시에 따라 조절됩니다.)

사용 방법 (꼭 순서대로 지켜주세요!)

흔들기



‘L’ 모양으로 잡습니다.
5초 정도 부드럽게
흔들어주세요.

뚜껑 열기



뚜껑을 열어주세요.

숨 내쉬기



천천히 숨을 내쉽니다.
(기기 안으로 숨을 불지
마세요)

들이마시기



흡입구를 입에 물고
윗부분을 누르면서 **동시에**
깊고 천천히 들이마십니다.

숨참기



약 10초간
숨을 참습니다.

숨 내쉬기



천천히 숨을 내쉽니다.

반복



2회 흡입 시, 약 30초 후
같은 과정을 반복합니다.

마무리



입안을 물로 헹구거나
양치질 하세요.
(삼키지 마세요)



일주일에 한 번 흡입구를 마른 휴지로 닦아주세요.



참고사항

매일 같은 시간에 규칙적으로 사용하세요.

사용 후 덮개를 닫아 보관합니다.

흡입구는 깨끗하고 건조하게 유지합니다.

처음 사용하거나 14일 이상 사용하지 않은 경우,
사용 전 공기 중으로 3회 분무 후 사용합니다.

사용 전에는 2~8도 냉장보관하며,
개봉 후에는 25도 이하 실온보관합니다.



의사나 약사에게 미리 알려야 할 사항

임신 또는 수유 중인 경우

다른 약(특히 스테로이드제)을 사용 중인 경우



주의사항

급성 천식 발작 시에는 사용하지 않습니다.

임의로 용량을 조절하거나 사용을 중단하지 않습니다.

목이 쉬거나 구강 칸디다증(입안 곰팡이 감염)이 나타날 수 있습니다.

기침, 두통, 심계항진, 근육경련 등이 나타날 수 있습니다.

심한 호흡곤란, 가슴통증, 발진, 부종 등이 생기면 의사에게 알려세요.



궁금한 점이 있으면 언제든지 의사나 약사와 상담하세요.

담당약사 : _____ 드림

강원대학교병원 약제과 033)258-9467