

와파린 복용 안내문



대한와르파린정 2mg



이 약은 어떤 약인가요?

혈액이 응고되는 것을 억제하여
혈전(피떡)이 생기는 것을 예방하고,
이미 생긴 혈전이 더 커지는 것을 막아줍니다.



성분

Warfarin potassium (와파린 칼륨)



효능

심방세동 환자의 뇌졸중 예방
인공판막 치환술 환자에서 혈전증 예방
심부정맥혈전증, 폐색전증의 치료 및 재발 예방



용법

성인: **1일 1회, 매일 같은 시간**

복용 시 주의사항

혈액검사



효과와 안전을 위해 정기적으로
INR 검사를 받아야 합니다.
(보통 2~4주 간격)

임의 중단 금지



임의로 약 복용을 중단하면
혈전이 생겨 위험할 수
있습니다.

출혈 주의



코피, 잇몸 출혈, 멍, 혈뇨, 혈변,
검은변 등 출혈 증상이
나타나면 즉시 병원에 알려세요.

약물, 식품 상호작용 주의



다른 약 (처방약, 일반의약품, 한약, 건기식)을
임의로 추가해서 드시지 마세요.

비타민K가 많은 음식 (녹색 채소, 브로콜리,
시금치, 케일 등) 과다 섭취하지 마세요.

생활 주의



칫솔질, 면도, 손톱깎이 등은 조심히 하고,
과격한 운동이나 넘어질 수 있는 활동은
주의하세요.



참고사항

정기적인 INR 검사 일정을 지켜주세요.

약, 음식, 건강보조식품 등을 변경할 시 의사나 약사와 상의하세요.

치과 치료 전 항응고제 복용 사실을 꼭 알려세요.

건강검진 및 수술 전 항응고제 복용 사실을 꼭 알려세요.

임신 계획 시 의료진과 상의하세요.



다음과 같은 경우 즉시 병원에 알려세요

코피, 잇몸 출혈이 멈추지 않을 때

소변이나 대변에서 피가 보일 때

검은색 변이 나오거나, 토에 피가 섞여 나올 때

갑자기 심한 두통, 어지럼증, 시야장애, 마비 증상이 있을 때

상처의 출혈이 잘 멈추지 않을 때



복용을 잊었을 경우

생각난 즉시 복용하세요.

다음 복용 시간이 가까운 경우에는 놓친 약은 건너뛰고,

다음 시간에 정상 용량을 복용하세요.

한 번에 2회분을 복용하지 마세요.



**궁금한 점이 있으면 언제든지
의사나 약사와 상담하세요.**

담당약사 : _____ 드림

강원대학교병원 약제과 033)258-9467