


_____님께

트렐리지 엘립타 사용 안내문



남은 흡입 횟수를
확인할 수 있습니다.

카운터(숫자 창)



이 약은 어떤 약인가요?

이 약은 기관지의 염증과 수축을 완화하여 숨이
차거나 기침 등 증상을 줄여주는 흡입제입니다.



성분

Fluticasone (플루티카손) 100ug
Umeclidinium (유메클리디늄) 62.5 ug
Vilanterol (빌란테롤) 25ug



효능

기관지 확장 및 염증을 감소시켜
폐 기능을 개선하고, 호흡곤란 증상을 완화합니다.



용법

성인: **1일 1회**, 1회 1흡입
매일 같은 시간에 꾸준히 사용하세요

사용 방법 (꼭 순서대로 지켜주세요!)

덮개 열기



‘딸깍’소리가 날
때까지 덮개를
아래로
내립니다.

숨 내쉬기



천천히 숨을
내쉽니다.
(기기 안으로
숨을 불지 마세요)

흡입하기



입에 물고
빠르고 깊게
들이마십니다.
(입술이 흡입구를
가리지 않도록
주의하세요)

숨 참기



약 10초간
숨을 참고
천천히
내쉽니다.

마무리



입안을 물로
헹구거나
양치질 하세요.
(삼키지 마세요)



일주일에 한 번 흡입구를 마른 휴지로 닦아주세요.



참고사항

매일 같은 시간에 1일 1회, 1회 1흡입을 사용합니다.

사용 전에 덮개를 열지 마세요.

사용 후 덮개를 닫아 보관합니다.

흡입구는 깨끗하고 건조하게 유지합니다.



의사나 약사에게 미리 알려야 할 사항

임신 또는 수유 중인 경우

다른 약(특히 스테로이드제)을 사용 중인 경우

결핵, 녹내장, 백내장, 심장질환이 있는 경우



주의사항

급성 천식 발작 시에는 사용하지 않습니다.

임의로 용량을 조절하거나 사용을 중단하지 않습니다.

어지러움, 두근거림, 입마름, 변비, 배뇨곤란 등이 나타날 수 있습니다.

목이 쉬거나 구강 칸디다증(입안 곰팡이 감염)이 나타날 수 있습니다.

기침, 두통, 심계항진, 근육경련 등이 나타날 수 있습니다.

심한 호흡곤란, 가슴통증, 발진, 부종 등이 생기면 의사에게 알려주세요.



궁금한 점이 있으면 언제든지 의사나 약사와 상담하세요.

담당약사 : _____ 드림

강원대학교병원 약제과 033)258-9467