



TARJETA DE ALERTA
DE SALUD

Tarjeta 1

Hipotiroidismo



SÍNTOMAS ASOCIADOS:
menstruación anormal
y uñas quebradizas.



2



SOPORTE:

2,63%



CONFIANZA:

100%



LIFT:

38,00

3



NIVEL DE CONFIABILIDAD:

Asociación fuerte, pero con
soporte relativamente bajo.

MEDIA



4

PRECAUCIONES:



reducir el estrés



realizar ejercicio



mantener una
alimentación saludable



dormir
adecuadamente



TARJETA DE
ALERTA DE SALUD

Tarjeta 2

Malaria



SÍNTOMAS ASOCIADOS:
dolor muscular y
sudoración.



2



SOPORTE:

2,30%



CONFIANZA:

100%



LIFT:

38,00

3



NIVEL DE CONFIABILIDAD:

Confianza alta, pero con
soporte relativamente bajo.

MEDIA



4

PRECAUCIONES:



acudir al centro de
salud más cercano



evitar alimentos
grasosos



evitar alimentos
no vegetarianos



reducir la exposición
a mosquitos



TARJETA DE ALERTA
DE SALUD

Tarjeta de alerta 3

Últera péptica



SÍNTOMAS ASOCIADOS:
dolor abdominal
e indigestión.



2



SOPORTE:

1,64%



CONFIANZA:

100%



LIFT:

43,43

3



NIVEL DE CONFIABILIDAD:

Asociación fuerte, pero con
soporte relativamente bajo.

MEDIA



4

PRECAUCIONES:



evitar alimentos
grasos o picantes



consumir alimentos
probióticos



evitar o
reducir la leche



limitar el consumo
de alcohol



TARJETA DE ALERTA DE SALUD

Tarjeta de alerta 4

Reflujo gastroesofágico (GERD)



SÍNTOMAS ASOCIADOS:
acidez y dolor de pecho.



2



SOPORTE:

1,64%



CONFIANZA:

100%



LIFT:

43,43

3



NIVEL DE CONFIABILIDAD:

Alta confianza y lift,
pero con soporte bajo.

MEDIA



4

PRECAUCIONES:



evitar alimentos
grasos o picantes



no acostarse
inmediatamente
después de comer



mantener un
peso saludable



realizar
ejercicio



TARJETA DE ALERTA
DE SALUD

Tarjeta de alerta 5

Asma bronquial



SÍNTOMAS ASOCIADOS:
dificultad para respirar y
antecedentes familiares.



2



SOPORTE:

.....
1,64%



CONFIANZA:

.....
100%



LIFT:

.....
43,43

3



NIVEL DE CONFIABILIDAD:

Confianza y lift altos, pero con soporte bajo.

MEDIA



4

PRECAUCIONES:



aflojar la ropa



respirar
profundamente



alejarse del posible
desencadenante



buscar ayuda