


Lámina 3 · Distribución espacial de nudibranquios (Cataluña y Mediterráneo español)



C · Observaciones por tramo de costa × especie (fila normalizada)

Cratena peregrina	829	696	759	656	538	299	14	35	364	169	12
Flabellina affinis	363	434	349	165	153	33			277	20	
Peltodoris atromaculata	276	469	345	100	236						
Felimare picta	189	33	190	107	77	439	11	34		90	53
Edmundsella pedata	123	85	136	273	91	67		10	11	52	
Felimare tricolor	141	227	97	67	96			13		48	99
Calmella cavolini	59	165	88	142		42				67	
Diaphorodoris papillata	67	86	75	102	48					12	
Paradoris indecora	15	15	103	206		38					
Antiopella cristata	90		66	98		99					
Polycera quadrilineata	109	26	48	133		18					
Rudmania krohni	55	73	47	67	33	31					9
	Cap de Creus	Illes Medes / Estartit	Begur-Palamós	Tossa-Blanes	Maresme	Barcelonès	Garraf	Costa Daurada N	Tarragona-Salou	Delta de l'Ebre	Fuera de tramos

D · Mezcla de especies por tramo

E · Tendencia anual (8 spp. más frecuentes)

F · Zonas calientes (obs. spp / nudis del tramo)

Dónde se ve más cada especie, normalizado por esfuerzo local (total de nudibranquios del tramo). Mín. 5 obs. y 30 nudis.

Cratena peregrina
Tarragona-Salou (48%, n=364); Maresme (36%, n=538)

Flabellina affinis
Tarragona-Salou (36%, n=277); Illes Medes / Estartit (17%, n=434)

Peltodoris atromaculata
Illes Medes / Estartit (18%, n=469); Maresme (16%, n=236)

Felimare picta
Barcelonès (38%, n=439); Costa Daurada N (28%, n=34)

Edmundsella pedata
Delta de l'Ebre (10%, n=52); Tossa-Blanes (9%, n=273)

Felimare tricolor
Costa Daurada N (11%, n=13); Delta de l'Ebre (9%, n=48)

Calmella cavolini
Delta de l'Ebre (13%, n=67); Illes Medes / Estartit (6%, n=165)

Diaphorodoris papillata
Illes Medes / Estartit (3%, n=86); Tossa-Blanes (3%, n=102)

Paradoris indecora
Tossa-Blanes (7%, n=206); Begur-Palamós (4%, n=103)

G · Profundidad

Sin datos de profundidad útiles en public_observations para estas especies en la caja catalana (depth_m relleno: 0 / 12896).

El campo existe en BioQuest (API /academy/depth) pero aún casi vacío para nudibranquios.