

Lámina 3 · Distribución espacial de nudibranquios (Cataluña y Mediterráneo español)

A · Cataluña — hexágonos por especie dominante



B · Mediterráneo español — puntos (α) + costa




Especies (top 12)


- *Cratena peregrina*
- *Flabellina affinis*
- *Peltodoris atromaculata*
- *Felimare picta*
- *Edmundsella pedata*
- *Felimare tricolor*
- *Calmella cavolini*
- *Diaphorodoris papillata*
- *Paradoris indecora*
- *Antiopella cristata*
- *Polycera quadrilineata*
- *Rudmania krohni*

Hexágono = especie dominante
Intensidad ∝ nº obs. en la celda
★ zonas de buceo de referencia
Coords. públicas (SELECT); ocultas/ofuscadas no figurán.


C · Observaciones por tramo de costa × especie (fila normalizada)



D · Mezcla de especies por tramo



E · Tendencia anual (8 spp. más frecuentes)



F · Zonas calientes (obs. spp / nudis del tramo)

Dónde se ve más cada especie, normalizado por esfuerzo local (total de nudibranquios del tramo). Mín. 5 obs. y 30 nudis.

Cratena peregrina
Tarragona–Salou (48%, n=364); Maresme (36%, n=538)

Flabellina affinis
Tarragona–Salou (36%, n=277); Illes Medes / Estartit (17%, n=434)

Peltodoris atromaculata
Illes Medes / Estartit (18%, n=469); Maresme (16%, n=236)

Felimare picta
Barcelonès (38%, n=439); Costa Daurada N (28%, n=34)

Edmundsella pedata
Delta de l'Ebre (10%, n=52); Tossa–Blanes (9%, n=273)

Felimare tricolor
Costa Daurada N (11%, n=13); Delta de l'Ebre (9%, n=48)

Calmella cavolini
Delta de l'Ebre (13%, n=67); Illes Medes / Estartit (6%, n=165)

Diaphorodoris papillata
Illes Medes / Estartit (3%, n=86); Tossa–Blanes (3%, n=102)

Paradoris indecora
Tossa–Blanes (7%, n=206); Begur–Palamós (4%, n=103)

G · Profundidad

Sin datos de profundidad útiles en public_observations para estas especies en la caja catalana (depth_m relleno: 0 / 12896).

El campo existe en BioQuest (API /academy/depth) pero aún casi vacío para nudibranquios.

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir