

相似三角形面积比等于相似比的平方

二级结论

条件

条件 1（两个相似图形）：

两个图形相似，相似比为 k ，面积分别为 S_1 和 S_2 。

结论

结论一（面积比公式）：

直观描述：面积之比等于相似比的平方。

$$\frac{S_1}{S_2} = k^2.$$

推广结论（对应线段平方比）：

直观描述：相似三角形面积比等于任一对对应线段比的平方。

$$\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{a_1}{a_2}\right)^2.$$

$$\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{h_1}{h_2}\right)^2.$$

$$\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{C_1}{C_2}\right)^2.$$

理解说明

一句话直觉

面积缩放倍数是相似比的平方。

核心拆解

要点一（相似比定义）：

相似比 k 是对应线段（如边长、高）的比，即 $\frac{a_1}{a_2} = k$ 。

要点二（面积整体乘积）：

面积是“长 $\times$ 宽”的累计，每个维度都放大 k 倍，故整体放大 k^2 倍。

几何本质（二维缩放）

相似相当于对图形作均匀缩放，每个线性维度乘以 k 。面积作为二维测度，自然乘以 k^2 。

代数意义（正比于平方）

面积 S 与边长 a 的平方成正比： $S \propto a^2$ 。因此，当边长放大 k 倍时，面积扩大 k^2 倍。

考点价值（命题方向）

- 考法一（正向求面积比）：已知相似比 k ，直接写出面积比 k^2 。
- 考法二（逆向求相似比）：已知面积比 m ，则相似比 $k = \sqrt{m}$ 。

顿悟点

面积比是线段比的平方，不要忘记平方，也不要混淆为一次关系。

使用场景

- 场景一（相似面积计算）：已知一个图形的面积和相似比，求另一图形面积。
- 场景二（地图比例尺应用）：已知地图比例尺（线段比），求实际面积时使用平方关系。

证明

思路提示

考虑两个相似三角形，将面积用底和高表示，利用对应边和高成比例，推出面积比等于 k^2 。

正式推导

步骤一（设对应元素）：

设 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ ，相似比 $k = \frac{a}{a'} = \frac{h}{h'}$ （ a, a' 为对应边， h, h' 分别为 a, a' 边上的高）。

$$\frac{a}{a'} = k, \quad \frac{h}{h'} = k.$$

理由：相似三角形对应边成比例，对应高也成比例且等于相似比。

步骤二（写出面积公式）：

使用三角形面积公式：

$$S = \frac{1}{2}ah, \quad S' = \frac{1}{2}a'h'.$$

理由：任意三角形的面积等于底乘高的一半。

步骤三（求面积比并化简）：

先写面积比：

$$\frac{S}{S'} = \frac{\frac{1}{2}ah}{\frac{1}{2}a'h'}.$$

化简得：

$$\frac{S}{S'} = \frac{a}{a'} \cdot \frac{h}{h'}$$

理由：分子分母约去 $\frac{1}{2}$ ，分数相乘时分子分母分别相除。

步骤四（代入相似比得结论）：

将比值代入，得到面积比：

$$\frac{S}{S'} = k^2$$

理由：由 $\frac{S}{S'} = \frac{a}{a'} \cdot \frac{h}{h'}$ ，再代入 $\frac{a}{a'} = k$ 和 $\frac{h}{h'} = k$ ，得 $k \cdot k = k^2$ 。

结论回扣

因此，对于任意两个相似三角形，面积比等于相似比的平方。该结论也可推广到一般相似图形。

典型例题

例 1（基础直接应用）

题目：已知 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ ，相似比为 $\frac{3}{4}$ ，且 $S_{A'B'C'} = 32$ ，求 S_{ABC} 。

解题步骤：

第一步（应用面积比定理）：

由面积比定理得：

$$\frac{S_{ABC}}{S_{A'B'C'}} = \frac{9}{16}$$

理由：面积比等于相似比平方，代入 $k = \frac{3}{4}$ ， $k^2 = \frac{9}{16}$ 。

第二步（建立比例方程）：

代入 $S_{A'B'C'} = 32$ 得：

$$\frac{S_{ABC}}{32} = \frac{9}{16}$$

理由：将已知代入比例式。

第三步（求解面积结果）：

解方程：

$$S_{ABC} = 32 \times \frac{9}{16}$$

理由：两边乘 32，得 $S_{ABC} = 18$ 。

关键结论： $S_{ABC} = 18$ 。

例 2（变形——已知高比）

题目：两个相似三角形对应高之比为 $2:3$ ，且它们的面积之和为 130 ，求每个三角形的面积。

解题步骤：

第一步（由高比得相似比）：

对应高之比等于相似比，故：

$$k = \frac{2}{3}.$$

理由：相似三角形对应高成比例且等于相似比。

第二步（计算面积比）：

由面积比定理得：

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{4}{9}.$$

理由：面积比等于相似比平方， $k^2 = \frac{4}{9}$ 。

第三步（列方程求解）：

设两三角形面积分别为 $4x$ 和 $9x$ ，则：

$$4x + 9x = 130.$$

理由：由面积和列方程。解得 $x = 10$ ，故面积分别为 40 和 90 。

关键结论：两三角形面积分别为 40 和 90 。

例 3（综合——已知周长和与面积和）

题目：已知 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ，周长之比为 $2:5$ ，且面积之和为 87 ，求 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 的面积。

解题步骤：

第一步（周长比得相似比）：

周长比等于相似比，故：

$$k = \frac{2}{5}.$$

理由：相似三角形周长之比等于相似比。

第二步（计算面积比）：

由面积比定理得：

$$\frac{S_{ABC}}{S_{DEF}} = \frac{4}{25}.$$

理由：面积比等于相似比平方， $k^2 = \frac{4}{25}$ 。

第三步（列方程求解）：

设 $S_{ABC} = 4x$, $S_{DEF} = 25x$, 则：

$$4x + 25x = 87.$$

理由：由面积和列方程。解得 $x = 3$, 故 $S_{ABC} = 12$, $S_{DEF} = 75$ 。

关键结论： $S_{ABC} = 12$, $S_{DEF} = 75$ 。

易错提醒**易错点一（忽略平方关系）**

直接认为面积比等于相似比，计算时忘记平方。

正确理解（平方关系正确）：

面积比等于相似比的平方，即 $\frac{S_1}{S_2} = k^2$ 。

错因分析（一维二维混淆）：

误将线性缩放与面积缩放等同，没有注意到面积涉及两个维度。

易错点二（对应线段取错）

使用图形中任意线段（非对应线段）作为相似比。

正确理解（对应线段一致）：

相似比仅由对应线段（如对应边、对应高）确定，且所有对应线段比相等。

错因分析（对应混乱）：

未正确识别对应顶点，或者误以为任意线段比例相等。

易错点三（条件前提忽视）

对不相似的图形强行运用面积比平方关系。

正确理解（相似前提）：

该结论只对相似图形成立，使用前必须确认相似。

错因分析（忽略条件）：

只记住公式，忽视了适用条件。

结论小结

一句话核心

对于相似图形，面积比等于相似比的平方。

使用条件

- 条件 1（图形相似）：两个图形必须相似（对应角相等，对应边长成比例）。
- 条件 2（相似比已知）：相似比 k 已知或可通过线段比求得。

关键提醒

- 易错点（忽略平方）：面积比 $\neq$ 相似比，必须 $\frac{S_1}{S_2} = k^2$ 。
- 检查项（前提确认）：使用结论前先验证图形是否相似。