

全称命题否定规则

二级结论

条件

条件 1（论域非空）：

M 为非空集合。

条件 2（谓词定义）：

$p(x)$ 为定义在 M 上的谓词。

结论

结论一（全称否定）：

直观描述： $\neg(\forall x \in M, p(x))$ 等价于 $\exists x \in M, \neg p(x)$ ，即“并非所有 x 都满足 $p(x)$ ”等价于“存在 x 不满足 $p(x)$ ”。

$$\neg(\forall x \in M, p(x)) \iff \exists x \in M, \neg p(x).$$

推广结论（对偶规则）：

直观描述： $\neg(\exists x \in M, p(x))$ 等价于 $\forall x \in M, \neg p(x)$ ，即“不存在 x 满足 $p(x)$ ”等价于“所有 x 都不满足 $p(x)$ ”。

$$\neg(\exists x \in M, p(x)) \iff \forall x \in M, \neg p(x).$$

理解说明

一句话直觉

全称命题的否定，就是“找一个反例”：将全称量词变为存在量词，同时将结论取反。

核心拆解

要点一（量词互换）：

否定全称量词 $\forall$ 变为 $\exists$ ；否定存在量词 $\exists$ 变为 $\forall$ 。

要点二（谓词取反）：

在改变量词的同时，必须将原命题中的条件 $p(x)$ 改成 $\neg p(x)$ 。

几何本质（反例观点）

全称命题 $\forall x \in M, p(x)$ 为假，当且仅当存在一个 $x_0 \in M$ 使得 $p(x_0)$ 不成立。因此，否定全称命题等价于声明存在反例。

代数意义（逻辑公式）

量词否定规则是德摩根律的推广：

$$\neg(\forall x \in M, p(x)) \iff \exists x \in M, \neg p(x), \quad \neg(\exists x \in M, p(x)) \iff \forall x \in M, \neg p(x).$$

考点价值（判断与转化）

- **考法一（直接写否定）**：给出全称或存在命题，要求写出其否定形式，重点考查量词与谓词的同步转换。
- **考法二（真假间接判断）**：通过否定原命题，将判断真假转化为寻找反例，从而简化推理。

顿悟点

否定全称命题只需两步：把“所有”换成“存在”，把“成立”换成“不成立”。类比于“完全相反”。

使用场景

- **场景一（反例证伪）**：要证明全称命题为假，只需举出一个反例，这正是 $\exists x \in M, \neg p(x)$ 。
- **场景二（逻辑变形）**：解题中需要将命题等价转化时，量词否定规则是基本工具。

证明

思路提示

利用全称命题的真假定义，采用双向推导：先从左到右，再从右到左。

正式推导

步骤一（假设左真）：

假设 $\neg(\forall x \in M, p(x))$ 成立。

$$\neg(\forall x \in M, p(x))$$

理由：设定推导前提。

步骤二（反例存在）：

由全称命题真值定义，存在 $x_0 \in M$ 使得 $p(x_0)$ 不成立，即 $\neg p(x_0)$ 成立。

$$\exists x_0 \in M, \neg p(x_0)$$

理由：全称命题为假当且仅当存在反例。

步骤三（正向结论）：

因此 $\exists x \in M, \neg p(x)$ 成立。

$$\exists x \in M, \neg p(x)$$

理由：存在量词概括。

步骤四（假设右真）：

假设 $\exists x \in M, \neg p(x)$ 成立。

$$\exists x \in M, \neg p(x)$$

理由：设定反向前提。

步骤五（实例化）：

取 $x_0 \in M$ 满足 $\neg p(x_0)$ ，即 $p(x_0)$ 为假。

$$\neg p(x_0)$$

理由：存在量词实例化。

步骤六（全称假）：

由 $p(x_0)$ 为假可知 $\forall x \in M, p(x)$ 为假，故 $\neg(\forall x \in M, p(x))$ 成立。

$$\neg(\forall x \in M, p(x))$$

理由：反例推翻全称。

步骤七（等价归结）：

综合上述两个方向，得到等价关系。

$$\neg(\forall x \in M, p(x)) \iff \exists x \in M, \neg p(x)$$

理由：双向推导完成。

结论回扣

全称量词命题的否定与存在量词命题的否定互为等价，即 $\neg(\forall x \in M, p(x)) \iff \exists x \in M, \neg p(x)$ 。这一规则是逻辑量词的对偶律。

典型例题

例 1 (基础)

题目：写出命题 “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$ ” 的否定形式。

解题步骤：

第一步（识别量词）：

该命题含全称量词 “ $\forall$ ”，谓词为 “ $x^2 + 1 > 0$ ”。

理由：判定命题类型为全称命题。

第二步（应用规则）：

将全称量词改为存在量词，谓词取反： $x^2 + 1 > 0$ 的否定为 $x^2 + 1 \leq 0$ 。

理由：全称命题的否定规则： $\neg(\forall x \in M, p(x)) \iff \exists x \in M, \neg p(x)$ 。

第三步（写出否定）：

所以原命题的否定为 $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \leq 0$ 。

理由：组合成完整命题并规范表述。

关键结论： $\neg(\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0) \iff \exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \leq 0$ 。

例 2 (稍变形)

题目：已知命题 $P: \exists n \in \mathbb{N}, n^2 < 0$ 。写出 $\neg P$ ，并判断 P 与 $\neg P$ 的真假。

解题步骤：

第一步（识别量词）：

命题 P 含存在量词 “ $\exists$ ”，谓词为 “ $n^2 < 0$ ”。

理由：判定命题类型为存在命题。

第二步（应用规则）：

将存在量词改为全称量词，谓词取反： $n^2 < 0$ 的否定为 $n^2 \geq 0$ 。

理由：存在命题的否定规则： $\neg(\exists x \in M, p(x)) \iff \forall x \in M, \neg p(x)$ 。

第三步（判断真假）：

不存在自然数 n 使得 $n^2 < 0$ ，故 P 为假； $\neg P$ 为真。

理由：自然数的平方非负。

关键结论： P 假， $\neg P$ 真； $\neg P: \forall n \in \mathbb{N}, n^2 \geq 0$ 。

例 3 (综合应用)

题目：已知命题 $P: \forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x + 2 > 0$ ，判断 P 的真假，并写出 $\neg P$ 。

解题步骤：

第一步（配方化简）：

$$x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 + 1。$$

理由：配方法。

第二步（判断真假）：

对任意 $x \in \mathbb{R}$, $(x - 1)^2 + 1 \geq 1 > 0$ 恒成立，故 P 为真。

理由：平方非负性。

第三步（应用否定）：

全称命题的否定：量词改为存在，谓词取反，得 $\neg P : \exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x + 2 \leq 0$ 。

理由：全称命题否定规则。

关键结论： P 为真， $\neg P$ 为假； $\neg P : \exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x + 2 \leq 0$ 。

易错提醒**易错点一（量词未换）**

将 $\neg(\forall x \in M, p(x))$ 错误地写成 $\forall x \in M, \neg p(x)$ 。

正确理解（标准形式）：

必须同时改变量词，即 $\exists x \in M, \neg p(x)$ 。

错因分析（记忆混淆）：

记错了规则，误以为“所有不满足”就是原命题的否定。

易错点二（谓词未否）

将 $\neg(\forall x \in M, p(x))$ 错误地写成 $\exists x \in M, p(x)$ （只改量词，不否谓词）。

正确理解（标准规则）：

必须同时否定谓词，即 $\exists x \in M, \neg p(x)$ 。

错因分析（粗心省略）：

写否定时只记得换量词，忘记把条件取反。

易错点三（论域消失）

将否定写成 $\exists x, \neg p(x)$ ，省略了“ $\in M$ ”。

正确理解（完整表达）：

量词必须带上论域，即 $\exists x \in M, \neg p(x)$ 。

错因分析（忽视结构）：

认为量词已经隐含范围，但严格逻辑要求必须明确论域。

结论小结**一句话核心**

全称命题的否定是存在命题（谓词取反），存在命题的否定是全称命题（谓词取反）。

使用条件

- 条件 1（论域非空）：论域 M 必须是非空集合，否则量词真值定义会变化。
- 条件 2（谓词确定）：谓词 $p(x)$ 在 M 上有确定的真值。

关键提醒

- 易错点（转换规则）：否定时须同时改变量词和否定谓词，缺一不可。
- 检查项（论域完整）：否定后的命题必须保留原论域 M 。