ID: 2026E03-001

高中数学二级结论

逻辑拆解、快速验证与秒杀实战

500+ 高中数学核心结论 • 高考解题加速体系

适用对象： 高中生 / 高考复习 / 强基计划

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2$$

为什么这本手册是考场提分利器？

- **结果快速验证：** 为复杂题目提供" 第二核对点"，确保逻辑闭环。
- **计算路径压缩：** 绕过繁琐步骤，利用成熟模型直接锁定答案。
- **解题逻辑回检：** 当常规方法卡壳时，提供高维视角的备用方案。
- **程序员式逻辑重构：** 基于严谨逻辑推导，重塑数学底层思维。

高考数学教研组 · 内部讲义

编著：ok-shuxue 985 教学团队 | 点击关注公众号：ok-shuxue

©2026 南京市江宁区极坐标软件开发工作室

更新日期：April 17, 2026 | 版本号：V2.1.0

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

Contents

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1 圆锥曲线

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.1 圆与不相交椭圆的距离极值

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 与圆 $O:(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$。若圆与椭圆不相交，则椭圆上的点 $P(x,y)$ 到圆心 $M(x_0,y_0)$ 的距离 d 与到圆上点 Q 的距离 L 满足以下关系：

1. **距离转化：**$L_{max}=d_{max}+r, L_{min}=d_{min}-r$（若圆在椭圆外）或 $L_{min}=r-d_{max}$（若圆在椭圆内）；
2. **圆心在坐标轴上的极值：**
   - 若圆心为原点 $(0,0)$，则 $d_{max}=a, d_{min}=b$；
   - 若圆心在 x 轴上 $(x_0,0)$，设 $f(x)=(1-\frac{b^2}{a^2})x^2-2x_0x+x_0^2+b^2$，通过求其在 $[-a,a]$ 上的最值确定 d。

理解说明

该结论是圆锥曲线中”最值问题”的常考点，核心在于将”点到圆的距离”转化为”点到圆心的距离”：

- **几何直观：**椭圆上的点到圆的最短/最长距离，必然发生在圆心与椭圆点的连线上，且该连线通过圆心时与圆周的交点即为目标点。
- **代数本质：**本质上是构造一个关于椭圆坐标参数（如横坐标 x 或参数方程 θ）的二次函数，并在闭区间内寻找最值。
- **适用场景：**
  - 快速解决选择、填空题中的距离极值问题。
  - 处理圆锥曲线与圆的综合位置关系，判断是否发生碰撞或重叠。

证明

圆心在 x 轴上的通用推导：

1. 设椭圆点 $P(x,y)$，圆心 $M(x_0,0)$。则距离平方 $d^2=(x-x_0)^2+y^2$。
2. 代入椭圆方程 $y^2=b^2(1-\frac{x^2}{a^2})$，得：$d^2=x^2-2x_0x+x_0^2+b^2-\frac{b^2}{a^2}x^2$。
3. 整理得二次函数 $g(x)=\frac{c^2}{a^2}x^2-2x_0x+x_0^2+b^2$，其中 $x\in[-a,a]$。
4. **结论：**通过对称轴 $x=\frac{a^2x_0}{c^2}$ 与区间 $[-a,a]$ 的位置关系，结合二次函数单调

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

性即可确定 d^2 的最值。

典型例题

例题 1： 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4}+y^2=1$，圆 $M:(x-3)^2+y^2=1$，求椭圆上的点到圆上点的最小距离。

解析：1. 圆心 $M(3,0)$，半径 $r=1$。2. 设椭圆上点 $P(x,y)$ 到圆心距离为 d，则 $d^2=(x-3)^2+y^2$。3. 消元得 $d^2=(x-3)^2+(1-\frac{x^2}{4})=\frac{3}{4}x^2-6x+10$。4. 由于 $x\in[-2,2]$，函数 $g(x)=\frac{3}{4}x^2-6x+10$ 在区间内单调递减。5. 当 $x=2$ 时，$d^2_{min}=\frac{3}{4}(4)-12+10=1$，即 $d_{min}=1$。6. 最小距离 $L_{min}=d_{min}-r=1-1=0$。（说明圆与椭圆外切）。

例题 2： 若椭圆 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$ 上一点到圆 $x^2+y^2=1$ 的最大距离。

解析：圆心在原点，椭圆长半轴 $a=\sqrt{5}$。$d_{max}=a=\sqrt{5}$。故 $L_{max}=d_{max}+r=\sqrt{5}+1$。

易错提醒

- **区间限制陷阱：** 计算 d^2 的二次函数最值时，务必注意 x 的范围限制在 $[-a,a]$ 内，不能盲目套用顶点公式。
- **包含关系陷阱：** 若圆在椭圆内部，最小距离公式为 $L_{min}=r-d_{max}$（此时 r 是大半径），需分清内外位置。
- **平方根转换：** 计算过程中使用的是 d^2，最后求解 L 时记得先对 d^2 开方得到 d，再加减半径 r。

结论小结

1. **核心公式：** $L=|d\pm r|$，将曲线间距离转化为点到圆心的距离。2. **思想精髓：** 参数代换（将解析几何问题转化为函数最值问题）。3. **实战建议：** 优先观察圆心是否在坐标轴或原点。若圆心坐标较复杂，建议使用椭圆的参数方程 $P(a\cos\theta, b\sin\theta)$ 配合辅助角公式求解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.2 直线与椭圆的距离极值

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 与直线 $l: Ax+By+C=0$。若直线与椭圆不相交，则椭圆上的点 $P(x,y)$ 到直线 l 的距离 d 的最值满足以下等价形式：

1. **距离转化形式：** $d=\frac{|Ax+By+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$；
2. **极值公式：** $d_{max}=\frac{|C|+\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}}{\sqrt{A^2+B^2}}$, $d_{min}=\frac{|C|-\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}}{\sqrt{A^2+B^2}}$ (假设直线在椭圆外且 $C>0$)；
3. **切线常数项：** 与 l 平行的椭圆切线方程为 $Ax+By\pm\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}=0$。

理解说明

该结论在处理圆锥曲线中的" 距离最值" 与" 面积最值" 问题时非常高效：

- **几何直观：** 由于椭圆是平滑凸曲线，距离直线最近或最远的点必定是与该直线平行的切线的切点。
- **结构转化：** 利用参数方程将双变量坐标 (x,y) 统一为单变量角度 θ，从而利用三角函数的有界性。
- **适用场景：**
  - 求解椭圆上动点到定直线距离的取值范围。
  - 求解以已知定线段为底，椭圆动点为顶点的三角形面积最值。

证明

参数方程推导步骤：

1. **设点：** 设椭圆上任意点 $P(a\cos\theta, b\sin\theta)$。
2. **代入公式：** 点 P 到直线 $Ax+By+C=0$ 的距离为 $d=\frac{|Aa\cos\theta+Bb\sin\theta+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$。
3. **辅助角合一：** 令 $Aa\cos\theta+Bb\sin\theta=\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}\sin(\theta+\phi)$。
4. **求最值：** 当 $\sin(\theta+\phi)=\pm1$ 时，分子取得极值 $|C\pm\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}|$，由此得距离 d 的最值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题 1： 求椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上的点到直线 $x-y+4=0$ 的最短距离。

解析：由题意 $a=2, b=1, A=1, B=-1, C=4$。计算项 $\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}=\sqrt{1^2\cdot 2^2+(-1)^2\cdot 1^2}=\sqrt{5}$。最短距离 $d_{min}=\frac{4-\sqrt{5}}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{4-\sqrt{5}}{\sqrt{2}}=\frac{4\sqrt{2}-\sqrt{10}}{2}$。

例题 2： 椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 上一点 P 到直线 $l: x+y-10=0$ 的最大距离。

解析：$a=4, b=3, A=1, B=1, C=-10$。$\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}=\sqrt{16+9}=5$。$d_{max}=\frac{|-10|+5}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{15}{\sqrt{2}}=\frac{15\sqrt{2}}{2}$。

易错提醒

- **相交性检查：** 若直线与椭圆相交，距离最小值 $d_{min}=0$，此时公式中的负号项不再适用。
- **系数对应关系：** 公式中 a^2 必须与直线方程中 x 的系数 A 相乘，b^2 与 y 的系数 B 相乘。
- **分子绝对值：** 当直线从椭圆中间穿过或距离较近时，注意 $|C|-\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}$ 可能为负，物理距离需取绝对值。

结论小结

1. **核心结论：** 距离最值取决于分子的波动项 $\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}$。2. **工具选择：** 参数方程法（三角换元）比判别式法在处理距离问题时计算量更小。3. **扩展应用：** 该结论可直接推广至双曲线（注意符号变化）和抛物线的最值距离求解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.3 椭圆焦角最大值结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$，左、右焦点分别为 F_1, F_2。设 P 为椭圆上任意一点，记张角 $\angle F_1PF_2=\theta$，则：

1. **最大角结论**：当点 P 位于椭圆短轴端点（即 $P(0,\pm b)$）时，张角 θ 取得最大值 θ_{max}；
2. **正切值公式**：$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{c}{y_P}$（其中 y_P 为点 P 的纵坐标绝对值）；
3. **余弦值形式**：$\cos\theta=\frac{r_1^2+r_2^2-4c^2}{2r_1r_2}$，其中 r_1, r_2 为焦半径。在短轴端点处，$\cos\theta_{max}=\frac{b^2-c^2}{b^2+c^2}$。

理解说明

该结论刻画了椭圆几何形态对”视角”的限制：

- **几何直观**：将 F_1, F_2 看作定线段，椭圆上的点 P 离 x 轴越近（即纵坐标越小），张角越小；离 x 轴越远，张角越大。短轴端点是椭圆上距离 x 轴最远的点。
- **结构转化**：通过焦半径公式 $r_1=a+ex, r_2=a-ex$ 或正切半角公式，将几何角度转化为代数坐标的函数。
- **适用场景**：
  - 求解 $\angle F_1PF_2$ 的取值范围。
  - 处理与三角形 F_1PF_2 内切圆、旁切圆相关的极值问题。
  - 结合正弦/余弦定理处理复杂的角平分线或向量点积最值。

证明

利用正切半角公式推导：

1. 在 $\triangle F_1PF_2$ 中，设 $P(x_0,y_0)$。根据椭圆定义及余弦定理可推导，但最简便方法是利用直角三角形投影：
2. $\tan\angle PF_2O=\frac{y_0}{c-x_0}$，$\tan\angle PF_1O=\frac{y_0}{c+x_0}$（假设 P 在第一象限）。
3. 利用恒等式 $\tan\theta=\tan(\angle PF_1F_2+\angle PF_2F_1)$：$\tan\theta=\frac{\frac{y_0}{c+x_0}+\frac{y_0}{c-x_0}}{1-\frac{y_0^2}{c^2-x_0^2}}=\frac{2cy_0}{c^2-x_0^2-y_0^2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4. 代入 $x_0^2 = a^2(1-\frac{y_0^2}{b^2})$，整理得 $\tan\theta = \frac{2cy_0}{b^2-a^2+y_0^2(1-\frac{a^2}{b^2})} = \frac{2cy_0}{y_0^2\cdot\frac{c^2}{b^2}-c^2}$。

5. 进一步分析可知，θ 随 y_0 的增大而增大，故 $y_0 = b$ 时角度最大。

典型例题

例题 1： 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，点 P 为椭圆上一点，求 $\angle F_1PF_2$ 的最大值。

解析：1. 由方程知 $a=2, b=\sqrt{3}$，则 $c=\sqrt{4-3}=1$。2. 当点 P 为短轴端点 $(0,\sqrt{3})$ 时，张角最大。3. 此时 $\tan\frac{\theta_{max}}{2}=\frac{c}{b}=\frac{1}{\sqrt{3}}$。4. 故 $\frac{\theta_{max}}{2}=30°$，即 $\theta_{max}=60°$。

例题 2： 若椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上存在点 P 使得 $\angle F_1PF_2=90°$，求离心率 e 的取值范围。

解析：只需满足最大张角 $\theta_{max}\geq 90°$。即 $\frac{c}{b}\geq\tan 45°=1 \implies c\geq b$。$c^2\geq a^2-c^2 \implies 2c^2\geq a^2 \implies e^2\geq\frac{1}{2}$。故 $e\in[\frac{\sqrt{2}}{2},1)$。

易错提醒

- **离心率敏感性：** 当 e 较小时，椭圆接近圆，最大张角较小；当 e 接近 1 时，最大张角趋近于 $180°$。
- **公式适用性：** $\tan\frac{\theta}{2}=\frac{c}{y_P}$ 仅在长轴位于 x 轴时成立。若椭圆焦点在 y 轴，则公式需对应交换变量。
- **单调性误区：** 注意在第一象限内，随着 x 增大，y 减小，张角 θ 是单调递减的，不要记反方向。

结论小结

1. **核心结论：** 短轴端点视角最大。2. **记忆口诀：** 半角正切等于 c 比 y。3. **模型扩展：** 该结论在双曲线中相反——双曲线点 P 离中心越远，张角越小；顶点处张角最大。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.4 椭圆顶角最大值结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，其左、右顶点分别为 $A_1(-a,0), A_2(a,0)$。设 $P(x,y)$ 为椭圆上除顶点外的任意一点，记顶角 $\angle A_1PA_2=\alpha$，则：

1. **最大值位置**：当点 P 位于椭圆短轴端点 $(0,\pm b)$ 时，顶角 α 取得最大值 α_{max}；
2. **斜率乘积恒值**：直线 PA_1 与 PA_2 的斜率乘积满足 $k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=-\frac{b^2}{a^2}$；
3. **正切值公式**：$\tan\alpha=\frac{2ab|y|}{(a^2-b^2)y^2/b^2+x^2-a^2}$，在短轴端点处 $\tan\alpha_{max}=\frac{2ab}{a^2-b^2}$。

理解说明

该结论揭示了椭圆上动点对长轴直径的”张角”变化规律：

- **几何直观**：由于椭圆相对于长轴具有高度的对称性，点 P 离长轴越远（即纵坐标 $|y|$ 越大），其对两顶点的张角越大。短轴端点是全椭圆中”最高”的点，因此视角最大。
- **对比圆的性质**：在圆中（$a=b$），斜率乘积为 -1，顶角恒为 $90°$。椭圆可看作圆沿轴向压缩，因此顶角大小随位置波动。
- **应用价值**：
  - 快速求解分式结构的最值问题。
  - 在解析几何压轴题中，利用斜率乘积定值简化运算。

证明

利用斜率角推导：

1. 设 $P(x_0,y_0)$，则 $k_1=k_{PA_1}=\frac{y_0}{x_0+a}$，$k_2=k_{PA_2}=\frac{y_0}{x_0-a}$。
2. $k_1\cdot k_2=\frac{y_0^2}{x_0^2-a^2}$。由椭圆方程 $x_0^2-a^2=-\frac{a^2y_0^2}{b^2}$，代入得 $k_1k_2=-\frac{b^2}{a^2}$。
3. 设直线 PA_1, PA_2 的倾斜角分别为 β_1,β_2，则 $\alpha=\beta_2-\beta_1$。
4. $\tan\alpha=\left|\frac{k_2-k_1}{1+k_1k_2}\right|=\left|\frac{\frac{y_0}{x_0-a}-\frac{y_0}{x_0+a}}{1-\frac{b^2}{a^2}}\right|=\frac{\frac{2ay_0}{a^2-x_0^2}}{\frac{a^2-b^2}{a^2}}$。
5. 再次代入 $a^2-x_0^2=\frac{a^2y_0^2}{b^2}$，整理得 $\tan\alpha=\frac{2ab}{(a^2-b^2)}\cdot\frac{b}{y_0}$。
6. 当 y_0 最大（即 $y_0=b$）时，$\frac{b}{y_0}=1$ 为最小值，但在分母位置或其他结构中需注意，此时 α 达到最大。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题 1：已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4}+y^2=1$，求椭圆上一点 P 与长轴两顶点连线夹角的最大值。解析：1. 这里 $a=2, b=1$。2. 当 P 为短轴端点 $(0,1)$ 时，夹角 α 最大。3. 此时 $\tan\alpha_{max}=\frac{2ab}{a^2-b^2}=\frac{2\cdot2\cdot1}{4-1}=\frac{4}{3}$。4. 故 $\alpha_{max}=\arctan\frac{4}{3}$。

例题 2：若椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上存在点 P 使得 $\angle A_1PA_2=60^\circ$，求离心率 e 的取值范围。解析：1. 存在性问题等价于 $\alpha_{max}\geq 60^\circ$。2. 即 $\frac{2ab}{a^2-b^2}\geq\sqrt{3}$。3. 利用 $b^2=a^2(1-e^2)$ 代入，可转化为关于 e 的不等式求解。

易错提醒

- **顶点排除**：顶角定义中 P 点不能是 A_1, A_2，否则斜率不存在或直线重合。
- **斜率符号**：注意 $k_1k_2=-b^2/a^2$ 永远为负，说明顶角 α 在椭圆内部观测时总是钝角（对于 a 较小时）或锐角，取决于 a, b 的比例。
- **与焦角混淆**：焦角（F1, F2）的最大值与顶角（A1, A2）的最大值虽然都在短轴取得，但计算公式完全不同，务必看清题目给的是焦点还是顶点。

结论小结

1. **核心值**：α_{max} 出现在短轴顶点。2. **斜率乘积**：$k_{A_1P}\cdot k_{A_2P}=-\frac{b^2}{a^2}$（椭圆第一定义推论）。3. **记忆技巧**：圆中是 90°（即 tan 无穷大），椭圆中由于 $a\neq b$，其最大正切值为 $\frac{2ab}{a^2-b^2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.5 离心率与焦点角不等式

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$，其左、右焦点分别为 F_1, F_2。设 P 为椭圆上任意一点，记焦张角 $\angle F_1PF_2=\theta$。离心率为 e，则：

1. **核心不等式**：$\sin\frac{\theta}{2}\le e$；
2. **取等条件**：当且仅当点 P 位于短轴端点 $(0,\pm b)$ 时，$\sin\frac{\theta_{max}}{2}=e$；
3. **范围结论**：若椭圆上存在点 P 使得 $\angle F_1PF_2\ge\theta_0$，则该椭圆的离心率满足 $e\ge\sin\frac{\theta_0}{2}$。

理解说明

该结论是连接椭圆"扁平程度"与"视角"的桥梁：

- **几何直观**：离心率 e 越大，椭圆越扁，焦点越靠近顶点，动点 P 对焦点的"视野"就越开阔，最大张角也就越大。
- **结构转化**：通过 $\sin\frac{\theta}{2}$ 的形式，将复杂的三角函数范围问题直接简化为对 e 的代数约束。
- **适用场景**：
  - 已知张角的范围，求离心率 e 的取值范围。
  - 证明椭圆上是否存在满足特定角度条件的点。
  - 处理涉及三角形 F_1PF_2 的外接圆或内切圆半径的最值问题。

证明

利用焦半径公式推导：

1. 在 $\triangle F_1PF_2$ 中，设 $|PF_1|=r_1, |PF_2|=r_2$。由定义知 $r_1+r_2=2a$，底边 $|F_1F_2|=2c$。
2. 由余弦定理：$\cos\theta=\frac{r_1^2+r_2^2-(2c)^2}{2r_1r_2}=\frac{(r_1+r_2)^2-2r_1r_2-4c^2}{2r_1r_2}=\frac{4a^2-4c^2-2r_1r_2}{2r_1r_2}=\frac{2b^2}{r_1r_2}-1$。
3. 由半角公式：$\sin^2\frac{\theta}{2}=\frac{1-\cos\theta}{2}=1-\frac{b^2}{r_1r_2}$。
4. 由均值不等式：$r_1r_2\le(\frac{r_1+r_2}{2})^2=a^2$，等号在 $r_1=r_2=a$（即短轴端点）时成立。
5. 故 $\sin^2\frac{\theta}{2}\le 1-\frac{b^2}{a^2}=\frac{c^2}{a^2}=e^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6. 开方得 $\sin\frac{\theta}{2} \le e$。

典型例题

例题 1：若椭圆上存在点 P 满足 $\angle F_1PF_2 = 120°$，求椭圆离心率 e 的取值范围。解析：1. 根据结论，存在性条件为 $\sin\frac{\theta_{max}}{2} \ge \sin\frac{120°}{2}$。2. 即 $e \ge \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$。3. 结合椭圆定义，得 $e \in [\frac{\sqrt{3}}{2}, 1)$。

例题 2：已知椭圆的离心率 $e = \frac{1}{2}$，求焦张角 θ 的最大值。解析：1. 由 $\sin\frac{\theta_{max}}{2} = e = \frac{1}{2}$。2. 得 $\frac{\theta_{max}}{2} = 30°$。3. 故 $\theta_{max} = 60°$。

易错提醒

- **函数单调性**：注意 $\sin\frac{\theta}{2}$ 在 $(0, \pi)$ 上是单调增函数，因此角度越大，正弦值越大，与 e 的关系是正相关的。
- **双曲线区别**：双曲线的结论是 $\cos\frac{\theta}{2} \le \frac{1}{e}$，且最大角出现在顶点处，不要混淆。
- **边界开闭**：若题目要求"存在钝角"，则 $\theta > 90°$，应取 $e > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 而非 $\ge$。

结论小结

1. **核心不等式**：$\sin\frac{\theta}{2} \le e$（短轴处取等）。2. **物理意义**：离心率限制了椭圆焦点的"观测张角"上限。3. **实战策略**：看到"焦点张角"与"离心率范围"复合的题目，直接提取 $\sin\frac{\theta}{2}$ 与 e 建立关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.6 离心率与两焦点角度公式

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设 P 为椭圆上除长轴顶点外的任意一点, 记焦张角 $\angle F_1PF_2=\theta$. 则该角度与离心率 e 满足以下精确数量关系:

1. **万能余弦公式**: $\cos\theta=\frac{r_1^2+r_2^2-4c^2}{2r_1r_2}$, 其中 r_1, r_2 为焦半径;
2. **半角正切公式**: $\tan\frac{\theta}{2}=\frac{b^2}{cy_P}$ (其中 y_P 为点 P 的纵坐标);
3. **离心率不等式关系**: $\sin\frac{\theta}{2}\le e$. 当且仅当 P 为短轴端点时, $\sin\frac{\theta_{max}}{2}=e$.

理解说明

本结论将直观的几何角度与椭圆的代数特征 e 深度耦合:

- **结构美感**: 这种" 角弦转化" 避开了复杂的联立方程, 是处理" 视角" 问题的首选工具.
- **适用场景**:
  - 快速求解已知 $\angle F_1PF_2$ 大小时的离心率取值范围.
  - 处理三角形 F_1PF_2 的面积与周长、内切圆等综合问题.

证明

利用焦半径与余弦定理推导:

1. 根据椭圆定义, $r_1+r_2=2a$. 记 $|F_1F_2|=2c$.
2. 在 $\triangle F_1PF_2$ 中, 由余弦定理得: $4c^2=r_1^2+r_2^2-2r_1r_2\cos\theta=(r_1+r_2)^2-2r_1r_2(1+\cos\theta)=4a^2-4r_1r_2\cos^2\frac{\theta}{2}$.
3. 整理得 $r_1r_2\cos^2\frac{\theta}{2}=a^2-c^2=b^2$.
4. 又由三角形面积公式 $S=\frac{1}{2}r_1r_2\sin\theta=c|y_P|$, 得 $r_1r_2=\frac{2c|y_P|}{\sin\theta}$.
5. 联立消去 r_1r_2, 可导出 $\tan\frac{\theta}{2}=\frac{c|y_P|}{b^2}$ (注意此为另一种变形形式).
6. 结合 $r_1r_2\le a^2$, 代入 $\cos\theta$ 公式即可证得 $\sin\frac{\theta}{2}\le e$.

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题 1: 若椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上存在点 P 使得 $\angle F_1PF_2=90^\circ$, 求离心率 e 的范围. 解析: 根据结论 $\sin\frac{\theta_{max}}{2}=e$, 存在性要求 $\theta_{max}\geq 90^\circ$. 则 $\sin\frac{\theta_{max}}{2}\geq\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以 $e\in[\frac{\sqrt{2}}{2},1)$.

例题 2: 已知椭圆离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$, 求焦张角 θ 的最大值. 解析: 由 $\sin\frac{\theta_{max}}{2}=e=\frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $\frac{\theta_{max}}{2}=60^\circ$. 故 $\theta_{max}=120^\circ$.

易错提醒

- **计算陷阱**: 很多学生会混淆 $\sin\frac{\theta}{2}$ 与 $\cos\theta$, 在处理不等式方向时务必注意正弦函数在 $(0,\pi/2)$ 的单调性.
- **符号规范**: 在代码实现或文档编写时, 必须使用英文半角符号, 如"e >= sin(theta/2)" 而非全角字符, 否则会导致解析器失效.
- **图形误导**: 不要误以为 P 在顶点时角度最大, 实际上在短轴端点处, P 到两焦点的距离最平衡, 张角才达到巅峰.

结论小结

1. **核心记忆**: 椭圆半角正弦的最大值等于离心率 ($e=\sin\frac{\theta_{max}}{2}$). 2. **思想方法**: 几何问题代数化, 复杂方程三角化. 3. **实战建议**: 在考试中遇到" 存在点 P 满足某角度" 的表述, 直接写出该不等式, 可节省约 5-10 分钟的推导时间.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.7 椭圆斜率式切线判定结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 与直线 $l: y=kx+m$. 直线与椭圆相切的充分必要条件（即切线判定公式）为：

1. **核心判定式：** $m^2=a^2k^2+b^2$;
2. **位置关系推论：**
   - 若 $m^2<a^2k^2+b^2$, 则直线与椭圆相交;
   - 若 $m^2>a^2k^2+b^2$, 则直线与椭圆相离.
3. **切线方程：** 已知斜率为 k 的椭圆切线方程可直接设为 $y=kx\pm\sqrt{a^2k^2+b^2}$.

理解说明

该结论是解析几何中" 判别式 Δ" 的结构化产物, 具有极高的实战价值:

- **计算提速**: 传统方法需要联立方程、展开、代入判别式 $\Delta=0$. 使用此结论可跳过所有运算步骤, 直接建立 k 与 m 的等量关系.
- **双向应用**: 既可以由斜率 k 求截距 m, 也可以由已知点（如切线过定点）代入公式反求斜率 k.
- **适用场景**:
  - 求解椭圆切线方程.
  - 处理与切线垂直或平行相关的最值问题.
  - 解决" 两条切线互相垂直" 产生的动点轨迹问题（如蒙日圆）.

证明

利用判别式法推导:

1. 联立直线 $y=kx+m$ 与椭圆 $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$.
2. 代入得: $b^2x^2+a^2(kx+m)^2=a^2b^2$.
3. 展开整理为关于 x 的一元二次方程: $(b^2+a^2k^2)x^2+2a^2kmx+a^2(m^2-b^2)=0$.
4. 直线与椭圆相切 $\iff \Delta=0$.
5. $\Delta=(2a^2km)^2-4(b^2+a^2k^2)\cdot a^2(m^2-b^2)=0$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6. 化简得: $4a^4k^2m^2 - 4a^2(b^2m^2 - b^4 + a^2k^2m^2 - a^2k^2b^2) = 0$.
7. 进一步消项得: $b^2m^2 = b^4 + a^2k^2b^2$.
8. 同时除以 b^2, 最终得证: $m^2 = a^2k^2 + b^2$.

典型例题

例题 1: 求斜率为 1 且与椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 相切的直线方程. 解析: 1. 由题意知 $a^2 = 4, b^2 = 1, k = 1$. 2. 由判定公式 $m^2 = a^2k^2 + b^2 = 4(1)^2 + 1 = 5$. 3. 故 $m = \pm\sqrt{5}$. 4. 所求切线方程为 $y = x + \sqrt{5}$ 或 $y = x - \sqrt{5}$.

例题 2: 过点 $M(3, 0)$ 引椭圆 $x^2 + 2y^2 = 2$ 的切线, 求切线斜率. 解析: 1. 椭圆标准方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 则 $a^2 = 2, b^2 = 1$. 2. 设切线方程为 $y = k(x - 3)$, 即 $y = kx - 3k$, 则 $m = -3k$. 3. 代入公式 $(-3k)^2 = 2k^2 + 1 \implies 9k^2 = 2k^2 + 1$. 4. $7k^2 = 1 \implies k = \pm\frac{\sqrt{7}}{7}$.

易错提醒

- **斜率不存在陷阱**: 公式 $m^2 = a^2k^2 + b^2$ 仅适用于斜率存在的直线. 若切线垂直于 x 轴（即 $x = \pm a$）, 需单独讨论.
- **标准方程转化**: 在代入 a^2, b^2 前, 务必先将椭圆方程化为标准形式 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.
- **正负号注意**: 开方求 m 时不要漏掉 $\pm$ 号, 椭圆上同一斜率的切线通常成对出现.
- **符号规范**: 在系统输入时, 确保使用英文半角括号"()" 和逗号",", 否则无法触发 Fuse.js 的公式检索.

结论小结

1. **公式口诀**: " 截距平方等于 a 平 k 平加 b 平". 2. **核心价值**: 彻底摆脱 Δ 联立运算, 是一类解析几何题目的" 秒杀" 起点. 3. **知识联动**: 该公式可推广至双曲线（$m^2 = a^2k^2 - b^2$）, 具有极强的规律美感.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.8 椭圆切点幂与切线方程结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$. 设点 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆上的一点, 则过点 P 的切线方程与相关性质如下:

1. **切线方程 (切点幂形式)**: $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$;
2. **切线斜率**: 若 $y_0\neq 0$, 则切线斜率 $k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$;
3. **切点幂定理扩展**: 若点 $M(x_1,y_1)$ 在椭圆外, 则方程 $\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1$ 表示过点 M 引两条切线的切点连线 (极线) 方程.

理解说明

该结论是圆锥曲线" 切线理论" 的基石, 通过简单的结构替换实现了从曲线方程到直线方程的转化:

- **几何直观**: 切线方程呈现出一种极高的对称美. 将方程中的 x^2 拆解为 $x_0\cdot x$, y^2 拆解为 $y_0\cdot y$, 即可得到切线.
- **搜索逻辑优化**: 关键词"$x_0x/a^2+y_0y/b^2=1$" 是解析几何中最具代表性的公式指纹, 能有效提升匹配精度.
- **适用场景**:
  - 快速写出已知切点的切线方程.
  - 处理" 切点连线" (极线) 问题, 避开复杂的参数运算.
  - 解决与切线有关的垂直、夹角及轨迹问题.

证明

利用导数法推导:

1. 对椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 两边关于 x 求导.
2. $\frac{2x}{a^2}+\frac{2y}{b^2}\cdot y'=0$, 解得 $y'=-\frac{b^2x}{a^2y}$.
3. 代入切点 $P(x_0,y_0)$, 得到切线斜率 $k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$.
4. 根据点斜式方程: $y-y_0=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}(x-x_0)$.
5. 展开整理得: $b^2x_0x+a^2y_0y=b^2x_0^2+a^2y_0^2$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6. 同时除以 a^2b^2, 得 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}$.

7. 因为 P 在椭圆上, 右端项等于 1, 故 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 得证.

典型例题

例题 1: 求椭圆 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{2}=1$ 在点 $P(2,1)$ 处的切线方程.
解析: 1. 校验点 P: $\frac{2^2}{8}+\frac{1^2}{2}=1$, 点在椭圆上. 2. 使用切点幂公式: $\frac{2x}{8}+\frac{1y}{2}=1$. 3. 化简得: $x+2y-4=0$.
例题 2: 过点 $M(2,2)$ 引椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的两条切线, 求切点连线的直线方程.
解析: 1. 点 M 在椭圆外. 2. 根据极线结论, 切点连线方程为 $\frac{x_Mx}{a^2}+\frac{y_My}{b^2}=1$. 3. 代入 $M(2,2)$ 得: $\frac{2x}{4}+2y=1$, 即 $x+4y-2=0$.

易错提醒

- **点的位置判定**: 使用公式前必须确认 P 点在椭圆上. 若在椭圆外, 得到的是极线方程而非切线方程.
- **分母非零限制**: 在求斜率 $k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$ 时, 若 $y_0=0$, 则切点在长轴顶点, 切线斜率不存在, 方程为 $x=\pm a$.
- **符号规范**: 所有的运算符和标点必须保持英文半角, 例如在系统输入"$(x_0\cdot x)/a^2$" 时, 确保括号、逗号等无全角字符.

结论小结

1. **核心公式**: 切点幂代换 $x^2\to x_0x$, $y^2\to y_0y$. 2. **统一性**: 该结论可推广至双曲线和抛物线. 3. **实战建议**: 在处理相切或切点弦问题时, 该公式比联立方程求导更快.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.9 椭圆切线斜率范围结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设直线 $l: y=kx+m$ 与椭圆相切. 关于斜率 k 的范围与性质如下:

1. **全集性质**: 对于椭圆上任意一点 (非长轴顶点), 总存在唯一的切线斜率 $k\in\mathbb{R}$.
2. **过点切线斜率方程**: 过椭圆外一点 $M(x_0,y_0)$ 引椭圆的切线, 斜率 k 满足方程: $(a^2-x_0^2)k^2+2x_0y_0k+(b^2-y_0^2)=0$.
3. **存在性判定**: 过点 M 能引两条切线的充要条件是 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}>1$.

理解说明

该结论主要用于解决涉及" 视角" 或" 动态切线" 的离心率与最值问题:

- **几何直观**: 当点 M 远离椭圆时, 两条切线的夹角变小, 斜率 k 的取值范围受到点 M 坐标的严格约束.
- **方程意义**: 方程 $(a^2-x_0^2)k^2+2x_0y_0k+(b^2-y_0^2)=0$ 是处理切线斜率乘积 (k_1k_2) 和斜率之和 (k_1+k_2) 的核心工具.
- **适用场景**:
  - 求解过定点切线斜率的取值范围.
  - 结合切线夹角公式求解点 M 的轨迹 (如蒙日圆).
  - 解决与斜率相关的最值或恒成立问题.

证明

利用切线判定式推导:

1. 设过点 $M(x_0,y_0)$ 的切线方程为 $y-y_0=k(x-x_0)$, 即 $y=kx+(y_0-kx_0)$.
2. 根据椭圆切线判定公式 (C07), 直线与椭圆相切需满足 $m^2=a^2k^2+b^2$.
3. 将 $m=y_0-kx_0$ 代入得: $(y_0-kx_0)^2=a^2k^2+b^2$.
4. 展开方程: $y_0^2-2x_0y_0k+x_0^2k^2=a^2k^2+b^2$.
5. 移项并整理为关于 k 的二次方程: $(x_0^2-a^2)k^2-2x_0y_0k+(y_0^2-b^2)=0$.
6. 该方程的解即为过点 M 的切线斜率.

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题 1: 过点 $M(2,2)$ 引椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的两条切线, 求切线斜率 k 的积.

解析: 1. 识别参数: $a^2=4, b^2=1, x_0=2, y_0=2$. 2. 代入斜率方程: $(4-2^2)k^2+2(2)(2)k+(1-2^2)=0$. 3. 整理得: $0\cdot k^2+8k-3=0$. 4. 此时方程退化, 说明一条切线斜率不存在 (垂直线 $x=2$), 另一条斜率 $k=\frac{3}{8}$.

例题 2: 若过点 $M(x_0,y_0)$ 的两条切线互相垂直, 求点 M 的轨迹.

解析: 1. 两切线垂直意味着 $k_1k_2=-1$. 2. 由韦达定理: $k_1k_2=\frac{y_0^2-b^2}{x_0^2-a^2}=-1$. 3. 整理得: $y_0^2-b^2=-(x_0^2-a^2) \implies x_0^2+y_0^2=a^2+b^2$. 4. 结论: 点 M 的轨迹是以原点为圆心, $\sqrt{a^2+b^2}$ 为半径的圆 (蒙日圆).

易错提醒

- **斜率不存在的情况**: 当 $x_0=\pm a$ 时, 二次项系数为 0, 方程变为一元一次方程. 这意味着其中一条切线垂直于 x 轴, 斜率不存在. 在讨论范围时务必分情况讨论.
- **点的位置判定**: 若点 M 在椭圆内部, 方程的判别式 $\Delta<0$, 此时不存在实数斜率 k.
- **符号规范**: 确保所有英文半角符号的使用, 特别是在 LaTeX 代码中使用"$x_0^2-a^2$" 而非全角字符.

结论小结

1. **核心工具**: 切线斜率方程 $(a^2-x_0^2)k^2+2x_0y_0k+(b^2-y_0^2)=0$. 2. **数学思想**: 方程思想与韦达定理的应用. 3. **实战提醒**: 遇到过定点引切线的问题, 第一反应应是建立 k 的二次方程, 而非盲目联立判别式.

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.10 椭圆切线距离公式结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设 l 是椭圆的任意一条切线. 关于距离关系有以下核心结论:

1. **原心距公式**: 原点 $O(0,0)$ 到切线 $y=kx\pm\sqrt{a^2k^2+b^2}$ 的距离 $d=\frac{\sqrt{a^2k^2+b^2}}{\sqrt{k^2+1}}$;
2. **焦点距离积定值**: 若左右焦点分别为 F_1, F_2, 则 F_1 到切线 l 的距离 d_1 与 F_2 到切线 l 的距离 d_2 之积满足 $d_1\cdot d_2=b^2$;
3. **垂足位置性质**: 焦点在切线上的投影 (垂足) 必落在椭圆的主圆 $x^2+y^2=a^2$ 上.

理解说明

该结论揭示了切线、焦点与辅助圆之间的深层联系:

- **几何直观**: 椭圆的切线可以将焦点" 反射" 到以另一个焦点为圆心、半径为 $2a$ 的圆上, 而垂足恰好是该路径的中点, 从而落在半径为 a 的主圆上.
- **结构转化**: 垂足性质 $x^2+y^2=a^2$ 常用于处理涉及" 垂足"、" 垂直" 以及" 动态投影" 的轨迹问题.
- **适用场景**:
  - 快速判定焦点在切线上的投影位置.
  - 结合光学性质处理反射光线过焦点的证明题.
  - 解决与主圆相关的相切或覆盖范围问题.

证明

1. 焦点距离积的解析证明:

1. 设切线方程为 $l: kx-y+m=0$, 其中满足 $m^2=a^2k^2+b^2$.
2. 焦点坐标为 $F_1(-c,0)$ 和 $F_2(c,0)$.
3. $d_1=\frac{|-kc+m|}{\sqrt{k^2+1}}$, $d_2=\frac{|kc+m|}{\sqrt{k^2+1}}$.
4. $d_1\cdot d_2=\frac{|m^2-k^2c^2|}{k^2+1}=\frac{|a^2k^2+b^2-k^2(a^2-b^2)|}{k^2+1}=\frac{b^2k^2+b^2}{k^2+1}=b^2$.

2. 垂足位置性质 (主圆轨迹) 的证明:

1. 设切线 $l: y=kx+m$, 垂足为 $H(x,y)$.

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2. 由于 H 在切线上，满足方程 (1): $y - kx = m$.
3. 过焦点 $F_2(c, 0)$ 作切线的垂线，其斜率为 $-1/k$，方程为 (2): $y - 0 = -\frac{1}{k}(x - c)$，整理得 $ky + x = c$.
4. 将方程 (1) 和 (2) 分别平方后相加: $(y - kx)^2 + (ky + x)^2 = m^2 + c^2$.
5. 左边展开化简: $y^2 - 2kxy + k^2x^2 + k^2y^2 + 2kxy + x^2 = (1 + k^2)(x^2 + y^2)$.
6. 右边代入切线判定式 $m^2 = a^2k^2 + b^2$: $m^2 + c^2 = a^2k^2 + b^2 + (a^2 - b^2) = a^2k^2 + a^2 = a^2(1 + k^2)$.
7. 故 $(1 + k^2)(x^2 + y^2) = a^2(1 + k^2)$，即 $x^2 + y^2 = a^2$.
8. 结论证毕: 垂足 H 的轨迹是以原点为圆心，长半轴 a 为半径的圆.

典型例题

例题 1: 椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$，求焦点到斜率为 1 的切线的距离之积.
解析: 1. 识别参数: $b^2 = 9$. 2. 直接应用结论: $d_1 \cdot d_2 = b^2 = 9$.
例题 2: 已知椭圆中心在原点，焦点在 x 轴上，且焦点到任一切线的距离积为 4，椭圆经过点 $(0, 2)$，求椭圆方程.
解析: 1. 由 $d_1 \cdot d_2 = 4$ 知 $b^2 = 4$. 2. 椭圆过点 $(0, 2)$，代入 $\frac{0}{a^2} + \frac{4}{4} = 1$ 恒成立，满足题意. 3. 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ $(a > 2)$.

易错提醒

- **斜率不存在讨论**: 当切线为 $x = \pm a$ 时，焦点到切线距离分别为 $a - c$ 与 $a + c$，乘积为 $a^2 - c^2 = b^2$，结论依然成立.
- **距离方向**: 距离始终为正值. 计算中若涉及坐标，务必保留绝对值符号.
- **符号规范**: 确保所有英文半角符号的使用. 严禁在非数学环境直接书写"b^2"或"d_1"，必须包裹在数学符号内.

结论小结

1. **定值性质**: 焦点到切线的距离之积等于 b^2. 2. **主圆性质**: 切线垂足的轨迹是 $x^2 + y^2 = a^2$. 3. **实战建议**: 在处理复杂的圆锥曲线切线距离问题时，优先检查是否可以利用焦点性质实现秒杀.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.11 椭圆切线与垂径斜率积结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设点 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆上一点. 若过点 P 的切线 l 的斜率为 k_l, 点 P 与原点连线的斜率为 k_{OP}, 则有:

$$k_l \cdot k_{OP} = e^2 - 1 = -\frac{b^2}{a^2}$$

其中 e 为椭圆的离心率.

理解说明

该结论揭示了椭圆切线斜率与径向斜率之间的固定比例关系:

- **结构特征**: 这是一个关于斜率乘积的定值结论, 其常数项 $-\frac{b^2}{a^2}$ 仅与椭圆的形状 (长短轴之比) 有关.
- **对称性**: 无论点 P 在椭圆的哪个象限, 只要不是四个顶点 (导致斜率为 0 或不存在), 该乘积始终保持不变.
- **适用场景**:
  - 求解涉及切线与原点连线垂直或夹角关系的题目.
  - 在已知一个斜率时, 快速定位切点坐标或另一个斜率.
  - 证明与中点弦相关的平行或比例性质.

证明

利用导数与坐标代入证明:

1. 设点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上, 则满足 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$, 即 $b^2x_0^2+a^2y_0^2=a^2b^2$.
2. 对椭圆方程求导得切线斜率: $k_l=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$.
3. 根据斜率定义, 点 P 与原点连线的斜率为: $k_{OP}=\frac{y_0}{x_0}$.
4. 计算两斜率之积: $k_l\cdot k_{OP}=\left(-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}\right)\cdot\left(\frac{y_0}{x_0}\right)=-\frac{b^2}{a^2}$.
5. 又由离心率公式 $e^2=\frac{c^2}{a^2}=\frac{a^2-b^2}{a^2}=1-\frac{b^2}{a^2}$, 可得 $e^2-1=-\frac{b^2}{a^2}$.
6. 故 $k_l\cdot k_{OP}=e^2-1$ 得证.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题 1: 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4}+y^2=1$, 点 P 为其上第一象限内一点. 若 $k_{OP}=1$, 求过点 P 的切线方程.

解析: 1. 识别参数: $a^2=4, b^2=1$, 则 $k_l \cdot k_{OP}=-1/4$. 2. 已知 $k_{OP}=1$, 则 $k_l=-1/4$. 3. 设点 $P(x_0,y_0)$, 由 $k_{OP}=y_0/x_0=1$ 得 $x_0=y_0$. 4. 代入椭圆方程: $x_0^2/4+x_0^2=1 \implies \frac{5}{4}x_0^2=1 \implies x_0=\frac{2\sqrt{5}}{5}, y_0=\frac{2\sqrt{5}}{5}$. 5. 切线方程为: $y-\frac{2\sqrt{5}}{5}=-\frac{1}{4}(x-\frac{2\sqrt{5}}{5})$, 化简得 $x+4y-2\sqrt{5}=0$.

易错提醒

- **顶点处的不连续性**: 当点 P 为长轴或短轴顶点时, k_{OP} 或 k_l 中会有一个为 0, 另一个不存在 (垂直), 此时斜率乘积无意义, 需单独讨论.
- **离心率符号**: 注意 e^2-1 始终为负值, 这反映了切线斜率与径向斜率异号的几何特征.
- **符号规范**: 确保所有英文半角符号的使用, 严禁在非数学环境直接书写"k_l"或"b^2/a^2", 必须包裹在数学符号内.

结论小结

1. **核心公式**: $k_l \cdot k_{OP}=-\frac{b^2}{a^2}$. 2. **物理关联**: 该性质与椭圆的向径反射性质密切相关. 3. **解题技巧**: 看到涉及原点的斜率积时, 应迅速联想到椭圆的长短轴平方比.

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.12 椭圆切线原心距性质

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设 $P(x_0,y_0)$ 是椭圆上任意一点, l 为椭圆在点 P 处的切线. 设 d 是原点到直线 l 的距离, r_1,r_2 分别是点 P 到椭圆两个焦点 F_1,F_2 的距离, 则有:

$$\sqrt{r_1r_2}\cdot d=ab$$

该结论描述了椭圆切线的原心距与切点焦半径乘积之间的定值关系.

理解说明

该性质是椭圆度量几何中的高级结论, 关联了原点、切线与焦点:

- **几何直观**: 随着点 P 在椭圆上移动, 虽然原点到切线的距离 d 以及焦半径 r_1,r_2 都在变化, 但它们的组合项 $\sqrt{r_1r_2}\cdot d$ 始终锁定为长短轴半轴长的乘积.
- **结构美感**: 公式左边体现了切点的局部性质 (焦半径几何平均数) 与全局位置 (原心距) 的耦合, 右边则是椭圆的核心面积特征参数.
- **适用场景**:
  - 求解涉及原点到切线距离的最值问题.
  - 处理与焦半径乘积相关的综合计算题.
  - 在解析几何压轴题中作为隐藏的等量关系辅助建模.

证明

利用坐标解析法证明:

1. 设 $P(x_0,y_0)$, 切线 $l: \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$. 原点到 l 的距离 $d=\frac{1}{\sqrt{\frac{x_0^2}{a^4}+\frac{y_0^2}{b^4}}}$.
2. 整理得 $d^2=\frac{a^4b^4}{b^4x_0^2+a^4y_0^2}$.
3. 焦点坐标 $F(\pm c,0)$, 焦半径公式为 $r_1=a+ex_0, r_2=a-ex_0$.
4. 乘积 $r_1r_2=a^2-e^2x_0^2=a^2-\frac{c^2}{a^2}x_0^2=\frac{a^4-(a^2-b^2)x_0^2}{a^2}$.
5. 利用 $y_0^2=b^2(1-\frac{x_0^2}{a^2})$, 代入 d^2 分母: $b^4x_0^2+a^4\cdot b^2(1-\frac{x_0^2}{a^2})=b^4x_0^2+a^2b^2(a^2-x_0^2)=b^2(b^2x_0^2+a^4-a^2x_0^2)$.
6. 进一步化简分母为 $b^2[a^4-(a^2-b^2)x_0^2]$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

7. 观察发现 $d^2 = \frac{a^4b^4}{b^2(a^2 \cdot r_1r_2)} = \frac{a^2b^2}{r_1r_2}$.

8. 两边开方得 $d = \frac{ab}{\sqrt{r_1r_2}}$, 即 $\sqrt{r_1r_2} \cdot d = ab$. 证毕.

典型例题

例题 1: 椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 点 P 为其上一点. 若点 P 到两焦点距离之积 $r_1r_2 = 2$, 求原点到点 P 处切线的距离 d.

解析: 1. 识别参数: $a = 2, b = 1, ab = 2$. 2. 应用公式: $\sqrt{2} \cdot d = 2$. 3. 解得 $d = \sqrt{2}$.

例题 2: 证明椭圆上使原点到切线距离 d 最大的点是短轴顶点.

解析: 1. 由 $d = \frac{ab}{\sqrt{r_1r_2}}$ 知, d 最大等价于 r_1r_2 最小. 2. $r_1r_2 = a^2 - e^2x_0^2$. 3. 由于 $0 \le x_0^2 \le a^2$, 当 $x_0 = 0$ 时, r_1r_2 取得最大值 a^2 (此时 d 最小为 b); 当 $x_0 = \pm a$ 时, r_1r_2 取得最小值 b^2 (此时 d 最大为 a). 4. 注意: 原点到切线距离在长轴顶点处最大, 在短轴顶点处最小. (纠正解析直觉).

易错提醒

- **长短轴混淆**: 在应用公式时, 务必确认 a 和 b 的具体数值, 不要代错平方项.
- **最大最小值误区**: 很多学生直观认为 d 在短轴处最大, 实际上根据 $d = ab/\sqrt{r_1r_2}$, 在长轴顶点 $x_0 = a$ 时 $r_1r_2 = a^2 - c^2 = b^2$, 此时 $d = a$ 为最大值.
- **符号规范**: 确保所有运算符如 $\cdot$ 以及下标如 r_1 均在数学环境 ‘‘ 内书写, 严禁使用全角标点.

结论小结

1. **核心公式**: $\sqrt{r_1r_2} \cdot d = ab$. 2. **物理隐喻**: 该公式反映了椭圆切线在” 包围” 原点时的某种能量守恒特性. 3. **关联结论**: 结合 $r_1 + r_2 = 2a$, 可以利用基本不等式进一步探究 d 的取值范围.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.13 椭圆长轴端点切线相交性质

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设 $A_1(-a,0), A_2(a,0)$ 为长轴的两个端点. 经过 A_1, A_2 的切线与经过椭圆上任意一点 P 的切线分别相交于点 P_1 和 P_2, 则有以下结论:

1. **乘积定值**: $|P_1A_1|\cdot|P_2A_2|=b^2$;
2. **面积最值**: 四边形 $A_1P_1P_2A_2$ 面积的最小值为 $2ab$.

理解说明

该结论展示了椭圆切线在平行边界约束下的优美比例关系:

- **几何直观**: 随着点 P 在椭圆上滑动, 左右两条切线段的高度一增一减, 但它们的乘积始终被锁定在短半轴平方 b^2.
- **面积特征**: 四边形 $A_1P_1P_2A_2$ 是一个直角梯形, 其高为 $2a$, 上下底之乘积为定值. 根据基本不等式, 这种结构必然存在面积最小值.
- **适用场景**:
  - 求解涉及切线段长度乘积的解析几何填空题.
  - 处理与切线围成的多边形面积相关的最值压轴题.
  - 快速验证复杂切线问题的数值逻辑.

证明

1. 乘积定值的证明:

1. 设 $P(x_0,y_0)$, 则过 P 的切线为 $l: \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$.
2. A_1 处切线方程为 $x=-a$, 代入 l 得 P_1 纵坐标: $\frac{-ax_0}{a^2}+\frac{y_0y_1}{b^2}=1 \implies y_1=\frac{b^2(a+x_0)}{ay_0}$.
3. A_2 处切线方程为 $x=a$, 代入 l 得 P_2 纵坐标: $\frac{ax_0}{a^2}+\frac{y_0y_2}{b^2}=1 \implies y_2=\frac{b^2(a-x_0)}{ay_0}$.
4. 则 $|P_1A_1|\cdot|P_2A_2|=|y_1\cdot y_2|=\frac{b^4(a^2-x_0^2)}{a^2y_0^2}$.
5. 由点 P 在椭圆上知 $y_0^2=\frac{b^2(a^2-x_0^2)}{a^2}$, 代入上式: $|y_1y_2|=\frac{b^4(a^2-x_0^2)}{a^2\cdot\frac{b^2(a^2-x_0^2)}{a^2}}=b^2$. 证毕.

2. 面积最小值的证明:

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1. 四边形 $A_1P_1P_2A_2$ 为直角梯形，面积 $S = \frac{1}{2}(|y_1| + |y_2|) \cdot 2a = a(|y_1| + |y_2|)$.
2. 由算术-几何平均值不等式：$|y_1| + |y_2| \geq 2\sqrt{|y_1y_2|}$.
3. 代入定值 $|y_1y_2| = b^2$，得 $S \geq a \cdot 2\sqrt{b^2} = 2ab$.
4. 当且仅当 $|y_1| = |y_2| = b$ 时取等号，此时 P 为短轴顶点 $(0, \pm b)$.

典型例题

例题：已知椭圆 $C : x^2/16 + y^2/4 = 1$，P 是椭圆上异于长轴端点的动点，过 P 作椭圆切线交两准线于 M, N. (类比本结论)

解析：虽然本题问的是准线，但其逻辑与长轴端点切线一致. 回到本结论模型：若 $a = 4, b = 2$，则 A_1, A_2 处切线截得的线段乘积为 $b^2 = 4$. 若题目给出 $|P_1A_1| = 1$，则立刻推知 $|P_2A_2| = 4$. 此时梯形面积 $S = 4(1 + 4) = 20$. 对比最小值 $2ab = 2(4)(2) = 16$，符合 $20 > 16$.

易错提醒

- **象限陷阱**：在计算 y_1, y_2 时，若点 P 在 x 轴下方，纵坐标为负，但距离 $|P_1A_1|$ 始终取绝对值，乘积仍为正的 b^2.
- **端点定义**：结论中点 P 必须异于 A_1, A_2，否则切线重合或平行，无法形成上述四边形.

结论小结

1. **核心乘积**：左右切线截距之积 $d_L \cdot d_R = b^2$. 2. **最值点**：面积最小值在短轴顶点处取得，此时图形具有最强对称性. 3. **知识联动**：本结论是研究圆锥曲线切线包络性质的重要模型，也是解决直线与曲线综合位置关系的常用跳板.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.14 椭圆焦点与切线综合性质

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设 $P(x_0,y_0)$ 是其上任意一点, l 为点 P 处的切线, F_1,F_2 为左右焦点. 设 F_1,F_2 到 l 的距离分别为 d_1,d_2, 射影分别为 H_1,H_2, 则有:

1. **距离积**: $d_1d_2=b^2$;
2. **面积最值**: 四边形 $F_1H_1H_2F_2$ 面积的最大值为 a^2;
3. **光学性质**: 切线 l 是 $\angle F_1PF_2$ 的外角平分线, 且内角平分线 $m\perp l$;
4. **共圆性质**: 垂足 H_1,H_2 在主圆 $x^2+y^2=a^2$ 上;
5. **截距性质**: 内外角平分线与 x 轴交点 M,N 的横坐标满足 $x_M\cdot x_N=c^2$.

理解说明

该性质集是解析几何中研究" 切线与焦点" 关系的巅峰结论:

- **几何美感**: 无论是距离的乘积、垂足的轨迹, 还是光线的反射, 都指向了椭圆最本质的参数 a,b,c.
- **解题价值**: 在综合压轴题中, 该性质常用于简化复杂的角平分线计算, 或将" 垂直" 条件转化为" 共圆" 或" 定值" 条件.
- **直观理解**: 想象椭圆边缘是一面镜子, 从一个焦点发出的光线经切线反射后, 必经过另一个焦点.

证明

1. 焦点距离积 $d_1d_2=b^2$ 的详细代数证明:

1. 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, 切线 l 的斜率为 k. 则切线方程可设为 $y=kx+m$.
2. 根据直线与椭圆相切的判别式 $\Delta=0$, 得到切线背景下的定值关系: $m^2=a^2k^2+b^2$.
3. 左右焦点分别为 $F_1(-c,0),F_2(c,0)$. 利用点到直线距离公式 $d=\frac{|kx-y+m|}{\sqrt{k^2+1}}$:
   - $d_1=\frac{|-kc-0+m|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{|m-kc|}{\sqrt{k^2+1}}$;
   - $d_2=\frac{|kc-0+m|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{|m+kc|}{\sqrt{k^2+1}}$.
4. 计算乘积 $d_1\cdot d_2=\frac{|(m-kc)(m+kc)|}{k^2+1}=\frac{|m^2-k^2c^2|}{k^2+1}$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

5. 代入 $m^2 = a^2k^2 + b^2$ 和 $c^2 = a^2 - b^2$: $d_1d_2 = \frac{a^2k^2+b^2-k^2(a^2-b^2)}{k^2+1} = \frac{a^2k^2+b^2-a^2k^2+b^2k^2}{k^2+1} = \frac{b^2(1+k^2)}{k^2+1} = b^2$. 证毕.

2. 垂足 H_1, H_2 在主圆 $x^2+y^2=a^2$ 上的证明:

1. 以 $F_2(c,0)$ 为例, 过 F_2 且垂直于切线 $y = kx + m$ 的直线 (垂线) 方程为: $y = -\frac{1}{k}(x-c)$, 即 $x + ky = c$.
2. 切线方程整理为: $kx - y = -m$.
3. 将两方程分别平方后相加: $(x+ky)^2 + (kx-y)^2 = c^2 + (-m)^2$.
4. 左边展开: $x^2 + 2kxy + k^2y^2 + k^2x^2 - 2kxy + y^2 = (1+k^2)(x^2+y^2)$.
5. 右边代入 m^2: $c^2 + a^2k^2 + b^2 = (a^2-b^2) + a^2k^2 + b^2 = a^2(1+k^2)$.
6. 约去 $(1+k^2)$ 得 $x^2+y^2=a^2$. 垂足 H_1, H_2 均在圆上. 证毕.

3. 光学性质 (切线平分 $\angle F_1PF_2$ 外角) 的几何证明:

1. 延长 F_1P 到 F_1', 使得 $PF_1' = PF_1$. 由椭圆定义 $PF_1 + PF_2 = 2a$, 故 $F_2F_1' = 2a$.
2. 根据垂足性质, F_1 关于切线 l 的对称点 Q 满足 F_2, P, Q 三点共线 (这是反射定律的几何表达).
3. 由于 H_1 是 F_1 在切线上的射影且 H_1 在主圆上, 利用中位线定理可证 P 处法线即为 $\angle F_1PF_2$ 的角平分线.
4. 因此, 切线 l 作为法线的垂线, 必为该角的内角平分线的垂线, 即外角平分线. 证毕.

典型例题

例题 1: 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$, 点 P 在其上. 焦点 F_1, F_2 在切线 l 上的投影为 H_1, H_2. 求 $|OH_1|$ 的长. 解析: 由性质 (4) 知, 垂足 H_1 在主圆 $x^2+y^2=a^2$ 上. 故 $|OH_1| = a = 2$.

例题 2: 若从焦点 F_1 发出的光线经 P 点反射后经过 F_2, 证明切线 l 与光路夹角相等. 解析: 依据光学性质 (3), 切线是 $\angle F_1PF_2$ 的外角平分线. 根据几何原理, 入射光线与反射光线关于法线对称, 则它们与切线的夹角必相等.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

易错提醒

- **数学环境检查**: 所有的变量如 d_1, d_2, a^2 必须置于 \$ 中. 严禁在数学环境外直接书写"d_1", 这会导致编译在下划线处崩溃.
- **面积定义域**: 结论 (2) 中的四边形在切线垂直于 x 轴时退化, 此时 d_1, d_2 虽然存在, 但 H_1, H_2 坐标重合, 计算面积时需注意其几何意义.
- **角平分线混淆**: 切线是 $\angle F_1PF_2$ 的" 外" 角平分线, 而法线才是其" 内" 角平分线, 在解题应用中切勿记反.

结论小结

1. **定值三剑客**: $d_1d_2 = b^2$, 垂足共圆 $r = a$, $x_Mx_N = c^2$. 2. **核心思想**: 解析法证明定值, 几何法理解光学性质. 3. **实战提醒**: 遇到涉及角平分线或焦点垂影的题型, 优先尝试本结论模块进行" 降维打击".

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.15 椭圆焦点三角形四心坐标性质

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 左右焦点为 $F_1(-c,0), F_2(c,0)$. 设 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆上异于长轴端点的动点, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的四心坐标如下:

1. **重心** G: $G\left(\frac{x_0}{3},\frac{y_0}{3}\right)$;
2. **内心** I: $I\left(ex_0,\frac{cy_0}{a+c}\right)$, 其中 e 为离心率;
3. **垂心** H: $H\left(x_0,\frac{c^2-x_0^2}{y_0}\right)$;
4. **外心** O': $O'\left(0,\frac{x_0^2+y_0^2-c^2}{2y_0}\right)$.

理解说明

- **重心与内心**: 这两个点的轨迹与原椭圆高度相关。内心横坐标 $x_I=ex_0$ 是极高频考点，意味着内心始终在 P 点和 y 轴之间。
- **垂心与外心**: 这两个点的纵坐标分母都有 y_0，说明当 P 靠近长轴端点（即 $y_0\to 0$）时，三角形退化，垂心和外心会趋向无穷远。
- **几何对称**: 由于焦点关于 y 轴对称，外心始终在底边的中垂线（即 y 轴）上。

证明

1. 重心 G 坐标公式的详细推导

核心思路：重心是中线的交点，其坐标是三角形三个顶点坐标的算术平均值。这是四心公式中最简单的一个。

1. **第一步：列出顶点坐标**设椭圆上一点 $P(x_0,y_0)$，左焦点 $F_1(-c,0)$，右焦点 $F_2(c,0)$。
2. **第二步：代入重心公式**根据重心公式 $G=\frac{P+F_1+F_2}{3}$，分量计算：
   - 横坐标：$x_G=\frac{x_0+(-c)+c}{3}=\frac{x_0}{3}$；
   - 纵坐标：$y_G=\frac{y_0+0+0}{3}=\frac{y_0}{3}$。
3. **结论：** 重心 $G\left(\frac{x_0}{3},\frac{y_0}{3}\right)$。这说明重心轨迹是原椭圆缩小到 $\frac{1}{3}$ 后的图形。

---

2. 内心 I 坐标公式的详细推导

核心思路：内心是角平分线的交点。利用内心坐标通用公式（边长加权平均），结合椭圆独有的“焦半径公式”进行化简。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1. **第一步：确定三条边的边长**在 $\triangle PF_1F_2$ 中，设角 P, F_1, F_2 所对的边分别为 p, f_1, f_2：
   - 底边 $p = |F_1F_2| = 2c$；
   - 侧边 $f_1 = |PF_2| = a - ex_0$（右焦半径公式）；
   - 侧边 $f_2 = |PF_1| = a + ex_0$（左焦半径公式）。
   - 周长 $L = p + f_1 + f_2 = 2c + (a - ex_0) + (a + ex_0) = 2a + 2c$。
2. **第二步：代入内心分点公式**横坐标 $x_I = \frac{p \cdot x_0 + f_1 \cdot (-c) + f_2 \cdot c}{L}$。
3. **第三步：分子代数拆解（重点）**将边长代入分子：

$$\text{分子} = (2c)x_0 + (a - ex_0)(-c) + (a + ex_0)c$$

   逐项展开：$= 2cx_0 - ac + ecx_0 + ac + ecx_0 = 2cx_0 + 2ecx_0 = 2cx_0(1 + e)$。
4. **第四步：整体约分**

$$x_I = \frac{2cx_0(1+e)}{2a+2c} = \frac{2cx_0(1+e)}{2a(1+\frac{c}{a})} = \frac{2cx_0(1+e)}{2a(1+e)} = \frac{c}{a}x_0 = ex_0$$

   纵坐标同理：$y_I = \frac{p \cdot y_0 + f_1 \cdot 0 + f_2 \cdot 0}{2a+2c} = \frac{2cy_0}{2(a+c)} = \frac{cy_0}{a+c}$。

---

3. 垂心 H 坐标公式的详细推导

核心思路：垂心是高线的交点。由于底边在 x 轴上，过 P 的高线就是一条垂直于 x 轴的竖直线，这大大简化了计算。

1. **找高线 1**：底边在 x 轴，所以过 $P(x_0, y_0)$ 的高线是 $x = x_0$。
2. **找高线 2**：连接 PF_2，斜率 $k_{PF2} = \frac{y_0}{x_0 - c}$。
3. **算斜率**：过 F_1 的高线垂直于 PF_2，所以斜率 $k_H = -\frac{x_0 - c}{y_0}$。
4. **写方程**：高线为 $y - 0 = -\frac{x_0 - c}{y_0}(x + c)$。
5. **求交点**：把 $x = x_0$ 代入，得 $y_H = -\frac{(x_0 - c)(x_0 + c)}{y_0} = -\frac{x_0^2 - c^2}{y_0} = \frac{c^2 - x_0^2}{y_0}$。

---

4. 外心 O' 坐标公式的详细推导

核心思路：外心是三边中垂线的交点，也是到三个顶点距离相等的点。我们利用底边 F_1F_2 的中垂线（即 y 轴）来寻找突破口是不对的，因为 F_1, F_2 关于 y 轴对称，外心必在 y 轴上仅限于等腰三角形（即 P 在短轴端点）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1. **第一步：列出中垂线方程**底边 F_1F_2 的中点是原点 $(0,0)$，其中垂线是 y 轴（$x=0$）。注意：这是错误的思维陷阱！只有当 P 在短轴上时外心才在 y 轴。正确步骤：设外心 $O'(x,y)$。由于 $O'F_1=O'F_2$，由勾股定理：$(x+c)^2+y^2=(x-c)^2+y^2 \implies x^2+2xc+c^2=x^2-2xc+c^2 \implies 4xc=0 \implies x=0$。**修正结论**：无论 P 在哪，$\triangle PF_1F_2$ 的外心 O' 始终在 y 轴上，即 $x_{O'}=0$。

2. **第二步：利用距离相等求纵坐标**外心到 $F_2(c,0)$ 的距离等于到 $P(x_0,y_0)$ 的距离：$c^2+y_{O'}^2=x_0^2+(y_0-y_{O'})^2$ 展开右边：$c^2+y_{O'}^2=x_0^2+y_0^2-2y_0y_{O'}+y_{O'}^2$ 消去 $y_{O'}^2$ 得：$2y_0y_{O'}=x_0^2+y_0^2-c^2$

3. **第三步：化简纵坐标** $y_{O'}=\frac{x_0^2+y_0^2-c^2}{2y_0}$。代入 $c^2=a^2-b^2$：$y_{O'}=\frac{x_0^2+y_0^2-a^2+b^2}{2y_0}$。再次利用椭圆方程化简，可得到与 x_0,y_0 相关的最终简洁形式。

典型例题

例题 1: 在椭圆 $x^2/4+y^2/3=1$ 上有一点 P, 其焦点三角形 $\triangle PF_1F_2$ 的重心轨迹方程是什么? 解析: 设重心 $G(x,y)$, 则 $x=x_0/3, y=y_0/3 \implies x_0=3x, y_0=3y$. 代入椭圆方程: $\frac{(3x)^2}{4}+\frac{(3y)^2}{3}=1 \implies \frac{x^2}{4/9}+\frac{y^2}{1/3}=1$.

例题 2: 证明椭圆焦点三角形的内心横坐标与 P 点横坐标之比为定值. 解析: 由结论 (2) 可知 $x_I=\frac{c}{a}x_0$, 则 $x_I/x_0=e$ (离心率). 该比值仅取决于椭圆形状, 与 P 点位置无关.

易错提醒

- **定义域限制**: 当 P 为短轴端点时, 焦点三角形为等腰三角形, 四心均在 y 轴上; 当 P 趋近长轴端点时, 三角形退化, 公式中的分母 y_0 趋于 0, 需规避.
- **外心符号**: 外心坐标公式中的 O' 坐标是相对于坐标原点的绝对坐标, 不要误认为是相对于 P 点的相对坐标.
- **内心公式简化**: 内心 y 坐标常写成 $y_I=\frac{r_i\cdot y_0}{PF_1+PF_2+F_1F_2}$, 计算时确保边长对应准确.

结论小结

① **核心特征**:

四心坐标均可由 $P(x_0,y_0)$ 线性表达. 其中重心 G 是平移缩放, 内心 I 的横坐标由离心率 e 锁定.

② **实战提醒**:

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

遇到“动点 P 运动时四心轨迹”问题, 直接利用坐标变换公式（代入法）即可秒杀, 无需重新推导.

③ **几何直观**:

垂心与外心的纵坐标通常较大, 反映了焦点三角形在 y 方向上的高度变化特征.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.16 双曲线焦点三角形四心坐标性质

二级结论

对于双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > 0, b > 0)$, 左右焦点为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$. 设 $P(x_0, y_0)$ 为双曲线右支上异于顶点的动点, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的四心坐标如下:

1. **重心** G: $G\left(\frac{x_0}{3}, \frac{y_0}{3}\right)$;
2. **内心** I: $I\left(a, \frac{cy_0}{c+ex_0}\right)$, 其中 e 为离心率 (若 P 在左支, 则横坐标 $x_I = -a$);
3. **垂心** H: $H\left(x_0, \frac{c^2-x_0^2}{y_0}\right)$;
4. **外心** O': $O'\left(0, \frac{x_0^2+y_0^2-c^2}{2y_0}\right)$.

理解说明

- **内心的惊人结论**: 与椭圆不同，双曲线焦点三角形内心的横坐标是定值 $\pm a$。这意味着内心始终在双曲线的顶点切线上运动。这是一个极高频的秒杀考点。
- **公式的延续性**: 重心、垂心、外心的坐标公式在形式上与椭圆完全一致。这是因为这三个心的推导仅依赖于顶点坐标 (x_0, y_0) 和 $(\pm c, 0)$，与曲线的具体方程（是加还是减）无关。
- **轨迹特征**:
  - 重心 G 的轨迹是原双曲线缩放 $\frac{1}{3}$ 后的双曲线。
  - 外心 O' 始终在 y 轴上，这源于底边 F_1F_2 在 x 轴上且关于 y 轴对称。

证明

1. 内心 I 坐标公式的详细推导（核心）

核心思路：利用角平分线定理及内心分点公式，配合双曲线焦半径公式。

1. **第一步：确定边长** (设 P 在右支 $x_0 \geq a$):
   - 底边 $p = |F_1F_2| = 2c$;
   - 侧边 $f_1 = |PF_2| = ex_0 - a$;
   - 侧边 $f_2 = |PF_1| = ex_0 + a$.
   - 周长 $L = 2c + (ex_0 - a) + (ex_0 + a) = 2c + 2ex_0$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2. **第二步：代入内心坐标公式**

$$x_I = \frac{p \cdot x_0 + f_1 \cdot (-c) + f_2 \cdot c}{L}$$

3. **第三步：分子化简**

分子 $= 2cx_0 - c(ex_0 - a) + c(ex_0 + a) = 2cx_0 - cex_0 + ac + cex_0 + ac = 2cx_0 + 2ac$

4. **第四步：求值**

$$x_I = \frac{2c(x_0 + a)}{2(c + ex_0)} = \frac{c(x_0 + a)}{c + \frac{c}{a}x_0} = \frac{c(x_0 + a)}{\frac{c}{a}(a + x_0)} = a$$

同理可得 $y_I = \frac{2c \cdot y_0 + 0 + 0}{2c + 2ex_0} = \frac{cy_0}{c + ex_0}$。

2. 垂心 H 与外心 O' 的推导简述

- **垂心**: 过 P 的高线为 $x = x_0$。过 F_1 的高线斜率为 $k = -\frac{1}{k_{PF_2}} = -\frac{x_0 - c}{y_0}$。方程为 $y = -\frac{x_0 - c}{y_0}(x + c)$。联立得 $y_H = \frac{c^2 - x_0^2}{y_0}$。
- **外心**: 底边中垂线为 $x = 0$。设外心 $(0, y_{O'})$, 利用距离相等 $O'F_2^2 = O'P^2$: $c^2 + y_{O'}^2 = x_0^2 + (y_0 - y_{O'})^2 \implies 2y_0 y_{O'} = x_0^2 + y_0^2 - c^2$。

典型例题

例题 1 (基础): 双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 上一点 P, F_1, F_2 为焦点, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的内心横坐标为 ____. 解析: 直接套用结论, $x_I = \pm a = \pm 3$。

例题 2 (进阶): 设 $P(x_0, y_0)$ 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 右支上一点, I 为 $\triangle PF_1F_2$ 内心, 证明 $\triangle IF_1F_2$ 的面积与 $\triangle PF_1F_2$ 的面积之比为 $\frac{a}{a + ex_0}$。解析: 面积之比等于高之比（底边相同, 均为 $2c$）。$h_I = y_I = \frac{cy_0}{c + ex_0}$, $h_P = y_0$。比值 $= \frac{c}{c + ex_0} = \frac{c}{c(1 + ex_0/c)} = \frac{1}{1 + \frac{x_0}{a}} = \frac{a}{a + x_0}$? 注意: $e = c/a$, 则 $\frac{y_I}{y_0} = \frac{c}{c + ex_0} = \frac{a}{a + ex_0}$。证毕。

例题 3 (综合): 当 P 在双曲线上运动时, 垂心 H 的横坐标轨迹是什么? 解析: 因为 $x_H = x_0$, 所以垂心的横坐标范围与双曲线 x 范围一致, 即 $(-\infty, -a] \cup [a, +\infty)$。

易错提醒

- **分支问题**: 别忘了双曲线有两支！内心 $x_I = a$ 仅针对右支；若 P 在左支，则 $x_I = -a$。考试常考“内心轨迹方程”，应填 $x = \pm a$（去掉顶点处）。
- **顶点退化**: 当 P 趋近于顶点 $(\pm a, 0)$ 时，$y_0 \to 0$，垂心和外心的纵坐标趋于无穷大，此时三角形退化为线段，公式失去几何意义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **离心率混淆**: 在内心纵坐标公式 $y_I = \frac{cy_0}{c+ex_0}$ 中，注意分母是 $c+ex_0$ 而非椭圆中的 $a+c$。

结论小结

双曲线焦点三角形“四心”口诀:

1. **重心**: 坐标三等分, 轨迹同形状。
2. **内心**: 横标等于 a, 始终在“门”口（顶点切线）。
3. **外心**: 必在 y 轴上, 对称美如画。
4. **垂心**: 横坐标随动, 纵标反比化。

速记: 椭圆内心横标动 (ex_0), 双曲内心横标定 ($\pm a$)。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.17 椭圆切线条件：直线 y=kx+m 与椭圆相切的充要条件

二级结论

条件

条件 1（标准方程）：

椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>b>0$；直线方程为 $y=kx+m$。

结论

结论一（相切条件）：

直观描述： 直线与椭圆相切时，截距平方满足固定关系。

$$m^2=a^2k^2+b^2$$

推广结论（切线方程）：

直观描述： 切线方程可直接写出截距表达式。

$$y=kx\pm\sqrt{a^2k^2+b^2}$$

理解说明

一句话直觉 直线与椭圆相切等价于联立方程后二次判别式为零，导出简洁的 m^2 表达式。

核心拆解

要点一（联立方程）：

将直线代入椭圆，得到关于 x 的二次方程。

要点二（判别式零）：

相切时二次方程有重根，故判别式 $\Delta=0$。

几何本质（唯一交点） 切线与椭圆仅有一个公共点，且该点处直线斜率与椭圆局部斜率一致，但代数上只需用公共点唯一性刻画。

代数意义（重根条件） 联立后的二次方程 $Ax^2+Bx+C=0$ 有相等实根，因此判别式 $B^2-4AC=0$，化简即得 $m^2=a^2k^2+b^2$。

考点价值（切线问题）

- **考法一（求切线）：** 已知斜率 k，直接套公式写出切线方程。
- **考法二（求参数）：** 已知直线与椭圆相切，反求 k 或 m 的值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点 m^2 的表达式中 a^2k^2 与 b^2 相加，形式对称，便于记忆；它本质是判别式为零的紧凑形式。

使用场景

- **场景一（判断相切）**：给定直线与椭圆，快速验证是否相切。
- **场景二（写切线）**：已知椭圆和斜率，直接写出切线方程。

证明

思路提示 将直线方程代入椭圆方程，得到关于 x 的二次方程；相切意味着该方程有唯一解，即判别式为零，由此推导 m 与 k 的关系。

正式推导

步骤一（代入消元）：

将 $y = kx + m$ 代入椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$。

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{(kx+m)^2}{b^2} = 1$$

理由： 联立直线与椭圆方程，消去 y，得到只含 x 的方程。

步骤二（整理二次）：

两边乘以 a^2b^2 并展开整理。

$$b^2x^2 + a^2(k^2x^2 + 2kmx + m^2) = a^2b^2$$
$$(b^2 + a^2k^2)x^2 + 2a^2km\,x + (a^2m^2 - a^2b^2) = 0$$

理由： 通分后合并同类项，化为关于 x 的标准二次方程 $Ax^2 + Bx + C = 0$。

步骤三（令判别式零）：

相切时方程有重根，故判别式 $\Delta = B^2 - 4AC = 0$。

$$(2a^2km)^2 - 4(b^2 + a^2k^2)(a^2m^2 - a^2b^2) = 0$$

理由： 二次方程有唯一解当且仅当 $\Delta = 0$，这是相切的代数等价条件。

步骤四（化简求解）：

展开判别式并化简。

$$4a^4k^2m^2 - 4a^2(b^2 + a^2k^2)(m^2 - b^2) = 0$$
$$a^2k^2m^2 - (b^2 + a^2k^2)(m^2 - b^2) = 0$$
$$a^2k^2m^2 - (b^2m^2 - b^4 + a^2k^2m^2 - a^2k^2b^2) = 0$$
$$-b^2m^2 + b^4 + a^2k^2b^2 = 0$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

整理得：

$$b^2m^2 = b^4 + a^2k^2b^2$$

因为 $b > 0$，两边除以 b^2 得到最终条件。

理由：逐步展开、合并同类项，注意消去公共因子，保留 m^2 项。

结论回扣 **化简后即得 $m^2 = a^2k^2 + b^2$，这正是直线与椭圆相切的充要条件。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$，直线 $y = 2x + 1$，判断直线与椭圆是否相切。

解题步骤：

第一步（提取参数）：

从椭圆方程得 $a^2 = 4, b^2 = 3$；从直线得 $k = 2, m = 1$。

理由：识别公式 $m^2 = a^2k^2 + b^2$ 所需参数。

第二步（计算左边）：

计算 $m^2 = 1^2 = 1$。

理由：公式左边是截距平方。

第三步（计算右边）：

计算 $a^2k^2 + b^2 = 4 \times 2^2 + 3 = 4 \times 4 + 3 = 16 + 3 = 19$。

理由：代入公式右边表达式。

第四步（比较判断）：

因为 $1 \neq 19$，所以 $m^2 \neq a^2k^2 + b^2$。

理由：充要条件不满足，故直线与椭圆不相切。

关键结论：直接应用公式快速判断：若 $m^2 = a^2k^2 + b^2$ 成立则相切，否则不相切。

例 2（稍变形）

题目： 椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$，直线 $y = kx + 2$ 与椭圆相切，求斜率 k 的值。

解题步骤：

第一步（代入公式）：

由相切条件 $m^2 = a^2k^2 + b^2$，代入 $a^2 = 9, b^2 = 5, m = 2$。

$$2^2 = 9k^2 + 5$$

理由：已知相切，直接套用结论建立方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（解方程）：

计算 $4 = 9k^2 + 5$，移项得 $9k^2 = -1$。

理由：整理方程求解 k^2。

第三步（分析结果）：

$9k^2 = -1$ 无实数解，因为平方数非负。

理由：实数范围内 $k^2 \geq 0$，右边为负矛盾。

第四步（结论）：

不存在实数 k 使直线与椭圆相切。

理由：方程无解意味着给定截距 $m = 2$ 下，无法找到斜率 k 使直线相切。

关键结论：利用公式列方程时，注意实数解的存在性；本例显示截距 $m = 2$ 过大，无法与椭圆相切。

易错提醒

易错点一（忽略条件）

忘记椭圆方程中 $a > b > 0$ 的条件，误用 a, b 符号或大小关系。

正确理解（标准方程）：

公式仅适用于椭圆标准方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 且 $a > b > 0$，否则 a^2, b^2 意义不同。

错因分析（前提混淆）：

未注意结论前提，直接套用于非标准椭圆或 a, b 顺序颠倒的情况。

易错点二（公式记错）

记忆 $m^2 = a^2k^2 + b^2$ 时，误写成减号或混淆 a^2, b^2 位置。

正确理解（相加结构）：

右边是 a^2k^2 与 b^2 相加，顺序固定，且为加号。

错因分析（符号混淆）：

与其他圆锥曲线切线公式（如双曲线）混淆，或受判别式展开中间步骤干扰。

易错点三（斜率特殊）

忽略直线斜率不存在（即 $x = c$ 型）的情况，此时公式不直接适用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（分类讨论）：

当直线垂直时，应单独考虑切线方程 $x = \pm a$，其对应 k 无穷大，但公式需极限处理。

错因分析（漏解）：

只记斜截式公式，未涵盖所有切线情形，导致漏解。

结论小结

一句话核心 **直线 $y = kx + m$ 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 相切的充要条件是 $m^2 = a^2k^2 + b^2$。**

使用条件

- **条件 1（标准方程）：** 椭圆必须为标准方程，且 $a > b > 0$。
- **条件 2（直线形式）：** 直线需为斜截式 $y = kx + m$，斜率 k 为实数。

关键提醒

- **易错点（公式符号）：** 牢记右边是 $a^2k^2 + b^2$，不是减号，且 a^2, b^2 顺序固定。
- **检查项（特殊情形）：** 遇到垂直切线（斜率不存在）时，应单独验证 $x = \pm a$ 是否满足。

2 平面向量

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2.1 V01 极化恒等式

二级结论

设 $\vec{a},\vec{b}$ 为平面内任意两个向量，则它们的数量积可以表示为：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{1}{4}\left[(\vec{a}+\vec{b})^2-(\vec{a}-\vec{b})^2\right]$$

几何意义：向量的数量积等于以该组向量为邻边的平行四边形的" 和对角线" 平方与" 差对角线" 平方差的 $\frac{1}{4}$。即：$\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{1}{4}\left(|AC|^2-|DB|^2\right)$。

理解说明

极化恒等式实现了" 数量积" 与" 模长" 之间的转换。其核心价值在于将复杂的夹角运算转化为纯粹的长度运算。
在平行四边形 $ABCD$ 中：

- $\vec{a}+\vec{b}$ 对应对角线 $\vec{AC}$；
- $\vec{a}-\vec{b}$ 对应对角线 $\vec{DB}$；

该公式是初中几何中" 平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和" 这一性质的向量化深入表达。

证明

利用向量数量积的运算律：

1. 展开和的平方：

$$|\vec{a}+\vec{b}|^2=(\vec{a}+\vec{b})^2=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2 \quad —①$$

2. 展开差的平方：

$$|\vec{a}-\vec{b}|^2=(\vec{a}-\vec{b})^2=|\vec{a}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2 \quad —②$$

3. 式① 减去式② 得：

$$|\vec{a}+\vec{b}|^2-|\vec{a}-\vec{b}|^2=4\vec{a}\cdot\vec{b}$$

4. 两边同时除以 4，得证：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{1}{4}\left[|\vec{a}+\vec{b}|^2-|\vec{a}-\vec{b}|^2\right]$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：在 $\triangle ABC$ 中，M 为 BC 边的中点，若 $AM=3$，$BC=4$，求 $\vec{AB}\cdot\vec{AC}$ 的值。

解析：由中线向量性质可知 $\vec{AB}+\vec{AC}=2\vec{AM}$，$\vec{AB}-\vec{AC}=\vec{CB}$。代入极化恒等式：

$$\vec{AB}\cdot\vec{AC}=\frac{1}{4}\left(|2\vec{AM}|^2-|\vec{CB}|^2\right)=\frac{1}{4}(6^2-4^2)=\frac{1}{4}(36-16)=5.$$

易错提醒

- **图形对应**：注意公式中减去的是”差对角线”（即连接两向量终点的线段）。在三角形中，这通常对应底边的长度。
- **中线形式**：极化恒等式最常用的变体是中线模式：$\vec{AB}\cdot\vec{AC}=|\vec{AM}|^2-|\vec{BM}|^2$（其中 M 为 BC 中点）。很多同学容易记错系数。

结论小结

1. **关键词**：变数量积为模长平方差。2. **核心场景**：题目中给出三角形中线长度或底边长度，求两边数量积时，首选极化恒等式。3. **扩展**：它是解决向量动态最值问题（如动点 P 满足某轨迹，求 $\vec{PA}\cdot\vec{PB}$）的利器。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2.2 V02 极化恒等式：三角形模式

二级结论

在 $\triangle ABD$ 中，M 为 BD 的中点，则极化恒等式可表示为：

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{AM}|^2 - \frac{1}{4}|\vec{DB}|^2 \quad (\text{三角形模式})$$

几何意义：两个向量的数量积等于它们起点指向终点中点的向量模长的平方，减去终点之间距离一半的平方。

理解说明

三角形模式是平行四边形模式的直接推论。在平行四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 交于点 M，则 M 既是 AC 的中点也是 BD 的中点。

- 此时 $|\vec{AC}| = 2|\vec{AM}|$；
- 将其代入平行四边形模式：$\vec{a}\cdot\vec{b} = \frac{1}{4}[|2\vec{AM}|^2 - |\vec{DB}|^2]$；
- 化简即得：$\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{AM}|^2 - |\frac{1}{2}\vec{DB}|^2$。

证明

利用中线向量表示及平方差公式：

1. 因为 M 是 BD 中点，设 $\vec{AB} = \vec{a}, \vec{AD} = \vec{b}$，则：
$$\vec{AM} = \frac{1}{2}(\vec{a}+\vec{b}) \implies (\vec{a}+\vec{b})^2 = 4|\vec{AM}|^2$$
2. 向量 $\vec{DB} = \vec{a} - \vec{b}$，则：
$$(\vec{a}-\vec{b})^2 = |\vec{DB}|^2$$
3. 代入极化恒等式基本型：
$$\vec{a}\cdot\vec{b} = \frac{1}{4}[(\vec{a}+\vec{b})^2 - (\vec{a}-\vec{b})^2]$$
4. 结合上述两式：
$$\vec{a}\cdot\vec{b} = \frac{1}{4}[4|\vec{AM}|^2 - |\vec{DB}|^2] = |\vec{AM}|^2 - \frac{1}{4}|\vec{DB}|^2$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题：已知 $\triangle ABC$ 中，$BC=6$，点 P 满足 $\vec{PB}\cdot\vec{PC}=16$，求点 P 到 BC 中点 M 的距离。

解析：设 M 为 BC 中点，由极化恒等式三角形模式可知：

$$\vec{PB}\cdot\vec{PC}=|\vec{PM}|^2-\frac{1}{4}|\vec{BC}|^2$$

代入已知数据：

$$16=|\vec{PM}|^2-\frac{1}{4}\times 6^2 \implies 16=|\vec{PM}|^2-9$$

解得 $|\vec{PM}|^2=25$，即 $PM=5$。点 P 到 BC 中点的距离为 5。

易错提醒

- **系数陷阱**：三角形模式中 $|\vec{DB}|^2$ 前面的系数是 $\frac{1}{4}$。若改用半边长 $|\vec{BM}|$，公式则为 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{AM}|^2-|\vec{BM}|^2$。
- **图形位置**：务必确认 M 是两个向量公共起点对面那条边的中点。

结论小结

1. **核心地位**：三角形模式是高中向量解题中最常用的极化恒等式形式，尤其在处理动点轨迹问题时。2. **适用场景**：题目出现”中点”、”中线”或求数量积的定值、最值时，应优先考虑。3. **几何联系**：该公式本质上将向量的数量积计算转化为了线段长度的平方差计算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2.3 V03 极化恒等式：矩形模式

二级结论

在矩形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 交于点 O。设 P 为平面内任意一点，则有以下两个重要的向量关系：

1. $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$；
2. $\vec{PA} \cdot \vec{PC} = \vec{PB} \cdot \vec{PD}$。

理解说明

该结论展示了矩形对角线对称性在向量运算中的强大作用。

- **关系** ① 是长度的平方关系，本质上是勾股定理或中线定理在矩形中的多重应用。
- **关系** ② 是数量积关系，它说明了点 P 对一组对边顶点的" 张角倾向" 在数量积意义上是相等的。

这两个关系常用于处理动点 P 在特定轨迹（如直线或圆）上时，涉及矩形四个顶点的综合模长或数量积最值问题。

证明

连接 PO。由于 O 是矩形对角线 AC 和 BD 的公共中点，且 $|OA| = |OC| = |OB| = |OD|$：

1. **证明** ①：根据极化恒等式（模长平方和形式）：

$$PA^2 + PC^2 = 2(PO^2 + OA^2)$$

$$PB^2 + PD^2 = 2(PO^2 + OB^2)$$

由于 $OA = OB$，故 $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$。

2. **证明** ②：根据极化恒等式（三角形模式）：

$$\vec{PA} \cdot \vec{PC} = PO^2 - OA^2$$

$$\vec{PB} \cdot \vec{PD} = PO^2 - OB^2$$

由于 $OA = OB$，故 $\vec{PA} \cdot \vec{PC} = \vec{PB} \cdot \vec{PD}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题：已知矩形 $ABCD$ 的边长为 $AB=4, AD=2$。若点 P 在以点 A 为圆心，半径为 1 的圆上运动，求 $\vec{PB}\cdot\vec{PD}-\vec{PA}\cdot\vec{PC}$ 的值。

解析：根据"矩形大法"结论 ② 可知，在矩形 $ABCD$ 中，对于平面内任意一点 P，均有：

$$\vec{PA}\cdot\vec{PC}=\vec{PB}\cdot\vec{PD}$$

因此，$\vec{PB}\cdot\vec{PD}-\vec{PA}\cdot\vec{PC}=0$。此结果与点 P 的具体位置及圆的半径无关。

易错提醒

- **图形性质限制**：此结论严格依赖于 $OA=OB$ 这一特性，因此仅适用于 ** 矩形 **（含正方形）。对于普通的平行四边形，该等式不成立。
- **符号误区**：在结论 ① 中，注意是对应顶点的平方和相等（A 与 C 对应，B 与 D 对应），不要记成邻边的平方和。
- **起点一致性**：在结论 ② 中，四个向量的起点必须相同（均为点 P）。

结论小结

1. **模型精髓**：利用矩形对角线中点作为桥梁，将复杂的四点问题转化为动点 P 到中心 O 的距离问题。2. **计算简化**：当题目涉及点到矩形四个顶点的数量积加减运算时，优先考虑利用此恒等关系进行抵消或转化。3. **延伸**：结论 ② 常结合极化恒等式三角形模式使用，是解决解析几何中隐含圆问题的有力工具。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2.4 V04 极化恒等式：矩形模式的空间扩展

二级结论

在空间中，设长方体（或底面为矩形的直棱柱）的一组相对顶点为 A, C 和 B, D。对于空间内任意一点 P，有以下向量恒等式：

1. $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$；
2. $\vec{PA} \cdot \vec{PC} = \vec{PB} \cdot \vec{PD}$。

此结论亦可表述为：若四棱锥 $P - ABCD$ 的底面 $ABCD$ 为矩形，则上述关系恒成立。

理解说明

该结论是平面矩形性质在空间维度的完美对称推广。

- **空间对称性**：由于矩形的中心 O 到四个顶点 A, B, C, D 的距离相等（即 $OA = OB = OC = OD$），这种距离的均等性突破了维度的限制。
- **物理背景**：在空间坐标系中，这体现了点 P 到矩形中心 O 的距离矢量在不同方向投影的抵消特性。

在立体几何题中，当涉及动点到矩形底面四个顶点的数量积或距离时，该结论能迅速实现”跨越式”转化。

证明

设矩形 $ABCD$ 的中心为 O。在空间中连接 PO。

1. **证明 (1)**：由中线定理（极化恒等式模长形式）在空间三角形 $\triangle PAC$ 和 $\triangle PBD$ 中应用：
$$PA^2 + PC^2 = 2(PO^2 + OA^2)$$
$$PB^2 + PD^2 = 2(PO^2 + OB^2)$$
因底面为矩形，故 $OA = OB$，从而 $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$。
2. **证明 (2)**：利用极化恒等式三角形模式：
$$\vec{PA} \cdot \vec{PC} = PO^2 - OA^2$$
$$\vec{PB} \cdot \vec{PD} = PO^2 - OB^2$$
同理可知 $\vec{PA} \cdot \vec{PC} = \vec{PB} \cdot \vec{PD}$。

注意：此证明过程不依赖于 P 是否在底面平面内。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题：已知底面为矩形的四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面边长 $AB=2, AD=1$。若点 P 在空间中运动且满足 $\vec{PA}\cdot\vec{PC}=2$，求 $\vec{PB}\cdot\vec{PD}$ 的值。

解析：由极化恒等式的空间推广可知，由于底面 $ABCD$ 是矩形，对于空间中任意一点 P，其到相对顶点的向量数量积始终满足：

$$\vec{PB}\cdot\vec{PD}=\vec{PA}\cdot\vec{PC}$$

已知 $\vec{PA}\cdot\vec{PC}=2$，直接得出 $\vec{PB}\cdot\vec{PD}=2$。

易错提醒

- **底面形状**：结论的前提是底面 $ABCD$ 必须是矩形。如果是菱形（对角线不等）或普通平行四边形，由于 $OA\neq OB$，该结论不再成立。
- **相对性**：必须是" 相对顶点" 的组合。在处理空间题目时，容易将相邻顶点的数量积（如 $\vec{PA}\cdot\vec{PB}$）误用此公式。
- **空间想象**：点 P 可以在空间任何位置，不局限于棱锥的顶点，即使 P 在底面平面内或在长方体外部，结论依然有效。

结论小结

1. **结论核心**：底面是矩形的四棱锥，相对侧棱长的平方和相等，且起点为顶点的相对侧棱向量乘积相等。2. **解法优势**：在处理复杂的立体几何动态最值问题时，利用此结论可以将四点问题转化为动点 P 到矩形中心 O 的距离问题。3. **编程思考**：在开发搜索引擎时，可将此结论标记为" 模型 3 的空间扩展"，作为平面矩形大法的超集进行索引。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2.5 V05 极化恒等式: 向量乘积型

二级结论

在平面内，若 B、C 为定点，动点 A 满足向量乘积关系：

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \lambda$$

则动点 A 的轨迹是以 BC 中点 M 为圆心，半径 $R = \sqrt{\lambda + \frac{1}{4}BC^2}$ 的圆。

理解说明

该模型揭示了向量数量积与几何轨迹（圆）之间的内在联系：

- **核心逻辑**：通过极化恒等式，将抽象的向量数量积等式转化为动点到定点（中点）的距离定值问题。
- **轨迹特征**：当 $\lambda + \frac{1}{4}BC^2 > 0$ 时，轨迹为圆；当其等于 0 时，轨迹缩为一个点（中点 M）；当其小于 0 时，轨迹不存在。

这一结论在处理涉及向量数量积的轨迹问题、最值问题以及解析几何综合题时具有极高的应用价值。

证明

设 BC 的中点为 M。根据极化恒等式（三角形模式）：

1. 数量积关系可改写为：
$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AM^2 - \frac{1}{4}BC^2$$
2. 已知 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \lambda$，代入上式得：
$$AM^2 - \frac{1}{4}BC^2 = \lambda$$
3. 移项整理得：
$$AM^2 = \lambda + \frac{1}{4}BC^2$$
4. 故 $AM = \sqrt{\lambda + \frac{1}{4}BC^2}$（常数）。

由于动点 A 到定点 M 的距离为定值，故其轨迹是以 M 为圆心的圆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题： 已知 $B(-1,0)$，$C(1,0)$，若动点 A 满足 $\vec{AB}\cdot\vec{AC}=3$，求动点 A 的轨迹方程。

解析：

1. 确定参数：线段 BC 的中点为坐标原点 $M(0,0)$，且 $|BC|=2$。
2. 应用公式：$\lambda=3$。根据模型结论，轨迹是以 M 为圆心的圆。
3. 计算半径：$R^2=\lambda+\frac{1}{4}BC^2=3+\frac{1}{4}(2^2)=4$。
4. 得出结论：轨迹方程为 $x^2+y^2=4$。

易错提醒

- **半径开方：** 计算半径时，务必注意 $\lambda+\frac{1}{4}BC^2$ 的符号。若该值为负，则对应的几何轨迹不存在。
- **起点陷阱：** 公式 $\vec{AB}\cdot\vec{AC}=\lambda$ 要求两个向量具有公共起点。若题目给定的是 $\vec{AB}\cdot\vec{CA}=\lambda$，需先转化为 $-\vec{AB}\cdot\vec{AC}=\lambda$ 再应用结论。
- **系数细节：** 注意公式中是 $\frac{1}{4}BC^2$ 而非 BC^2。如果记成 $\vec{AB}\cdot\vec{AC}=AM^2-BM^2$，则不需要 $\frac{1}{4}$ 系数。

结论小结

1. **转换思想：** 极化恒等式的本质是将”转动量”（方向/夹角）转化为”长度量”（距离）。2. **模型扩展：** 该结论是解析几何中”阿波罗尼斯圆”或向量定值圆问题的有力代数工具。3. **应试技巧：** 在选择题或填空题中遇到”已知数量积为定值，求动点轨迹或最值”时，直接锁定中点圆模型可大幅节省构系计算的时间。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2.6 V06 奔驰定理

二级结论

设 O 是 $\triangle ABC$ 内任意一点，$\triangle BOC, \triangle AOC, \triangle AOB$ 的面积分别记作 S_A, S_B, S_C，则有：

$$S_A \cdot \vec{OA} + S_B \cdot \vec{OB} + S_C \cdot \vec{OC} = \vec{0}$$



Figure 1: 奔驰定理：顶点线性组合系数对应所对三角形面积之比

几何意义：该定理揭示了三角形内一点对顶点的向量线性组合系数与该点所对应的对边三角形面积之间的比例关系。

理解说明

奔驰定理因其形式与汽车品牌奔驰的标志相似而得名。其核心价值在于建立点在三角形内的”位置高度”与”向量权值”之间的联系。

- 权值分布：顶点 A 对应的权值是其对面的三角形 $\triangle BOC$ 的面积 S_A。
- 物理意义：若将三个顶点分别放置质量为 S_A, S_B, S_C 的质点，则点 O 恰好是该系统的质心。

证明

利用三角形面积比与线段比的转化：

1. 延长 AO 交 BC 于点 D。根据面积比性质，有：

$$\frac{BD}{DC} = \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}} = \frac{S_{\triangle OBD}}{S_{\triangle OCD}} = \frac{S_{\triangle ABD} - S_{\triangle OBD}}{S_{\triangle ACD} - S_{\triangle OCD}} = \frac{S_C}{S_B}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2. 由分点坐标公式得：$\vec{OD} = \frac{S_B\vec{OB}+S_C\vec{OC}}{S_B+S_C}$。
3. 又因为 $\frac{AO}{OD} = \frac{S_{\triangle ABO}}{S_{\triangle BDO}} = \frac{S_{\triangle ACO}}{S_{\triangle CDO}} = \frac{S_B+S_C}{S_A}$。
4. 将 $\vec{OD}$ 反向表示：$\vec{OA} = -\frac{S_B+S_C}{S_A}\vec{OD}$。
5. 代入化简即证：$S_A\vec{OA} + S_B\vec{OB} + S_C\vec{OC} = \vec{0}$。

典型例题

例题：在 $\triangle ABC$ 中，O 是内部一点，且满足 $\vec{OA} + 2\vec{OB} + 3\vec{OC} = \vec{0}$，求 $S_{\triangle BOC} : S_{\triangle AOC} : S_{\triangle AOB}$。

解析：根据奔驰定理，$S_A \cdot \vec{OA} + S_B \cdot \vec{OB} + S_C \cdot \vec{OC} = \vec{0}$。对比题目给出的系数：

$$S_A = 1, \quad S_B = 2, \quad S_C = 3$$

故面积之比为：

$$S_{\triangle BOC} : S_{\triangle AOC} : S_{\triangle AOB} = 1 : 2 : 3$$

易错提醒

- **顶点对应陷阱**：务必记住 S_A 对应的是以 BC 为底边的三角形面积，即点 O ”对面”的面积。
- **符号陷阱**：向量必须全部以点 O 为起点（或全部以点 O 为终点）。如果出现 $\vec{AO} = 2\vec{OB} + \ldots$，需先转化为 $-\vec{OA}$。
- **五心判定**：结合奔驰定理可以快速判断四心：
  - 重心：$1 : 1 : 1$
  - 垂心：$\tan A : \tan B : \tan C$
  - 外心：$\sin 2A : \sin 2B : \sin 2C$
  - 内心：$a : b : c$

结论小结

1. **核心公式**：$S_A\vec{OA} + S_B\vec{OB} + S_C\vec{OC} = \vec{0}$。2. **模型价值**：它是平面向量中处理三角形内部点、面积比、向量系数三者关系的”终极武器”。3. **应试技巧**：看到向量等式（如 $m\vec{OA} + n\vec{OB} + p\vec{OC} = \vec{0}$），第一时间联想面积比，尤其是在填空题中求点 O 的位置或面积比时。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2.7 V07 奔驰定理推论

二级结论

设 O 是 $\triangle ABC$ 所在平面内一点，若满足向量关系式：

$$x \cdot \vec{OA} + y \cdot \vec{OB} + z \cdot \vec{OC} = \vec{0}$$

则有以下推论成立：

1. 面积之比：$S_{\triangle BOC} : S_{\triangle COA} : S_{\triangle AOB} = |x| : |y| : |z|$；
2. 面积占比：$\frac{S_{\triangle BOC}}{S_{\triangle ABC}} = \left|\frac{x}{x+y+z}\right|$，以此类推。

理解说明

此推论是奔驰定理的代数化表达，它是解决三角形面积比例问题的”秒杀”工具：

- **转化思想**：常规做法需通过向量线性运算寻找分分点位置，而此推论直接建立了代数系数与几何面积的线性映射。
- **绝对值处理**：推论引入绝对值是为了兼容点 O 在三角形外部的情况（此时某些系数可能为负）。

证明

根据奔驰定理原定义，若 $S_A\vec{OA} + S_B\vec{OB} + S_C\vec{OC} = \vec{0}$，则系数与对应面积成正比。

1. 设 $x = kS_A, y = kS_B, z = kS_C$。
2. 则 $\frac{S_{\triangle BOC}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{S_A}{S_A+S_B+S_C} = \frac{x/k}{(x+y+z)/k} = \frac{x}{x+y+z}$。
3. 考虑到点 O 位置对向量方向的影响，对系数取绝对值以确保面积恒正。

典型例题

例题：在 $\triangle ABC$ 中，点 P 满足 $3\vec{PA} + 4\vec{PB} + 5\vec{PC} = \vec{0}$，求 $\frac{S_{\triangle PBC}}{S_{\triangle ABC}}$。
解析：已知向量系数为 $x = 3, y = 4, z = 5$ 。根据推论，$\triangle PBC$ 对应的是顶点 A 的系数 x。则所求面积占比为：

$$\frac{S_{\triangle PBC}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{|x|}{|x| + |y| + |z|} = \frac{3}{3+4+5} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- **对应关系**：再次强调，系数 x 对应的是不含顶点 A 的三角形 $\triangle BOC$。
- **零向量前提**：使用前必须确保等式右侧为 $\vec{0}$。若是 $\vec{OA}=2\vec{OB}+3\vec{OC}$，需先移项变形为 $\vec{OA}-2\vec{OB}-3\vec{OC}=\vec{0}$。
- **外点情况**：若点 O 在三角形外，分母应为系数代数和的绝对值 $|x+y+z|$，而非单纯的绝对值之和。

结论小结

1. **提速利器**：在选择填空题中，遇到向量系数求面积比，直接套用 $|x|:|y|:|z|$ 即可秒杀。2. **逆向思维**：本推论完成了从" 向量关系" 到" 几何比例" 的最后一步转化。3. **坐标关联**：此结论本质上是平面重心坐标系统（Barycentric Coordinates）的一个特例。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2.8 V08 重心

二级结论

三角形三条中线的交点叫做三角形的重心，重心到顶点的距离与重心到对边中点的距离之比为 2:1. 设 G 为 $\triangle ABC$ 的重心，角 A, B, C 对应的顶点坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$，则有以下核心结论：

1. **基准等式**：$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$；
2. **任意点表示**：对于平面内任意一点 O，有 $\vec{OG} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$；
3. **坐标公式**：重心 G 的坐标为 $G\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$；
4. **面积特性**：$S_{\triangle GAB} = S_{\triangle GBC} = S_{\triangle GCA} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC}$。

理解说明

重心结论的代数本质是" 算术平均值"：

- **平衡点**：$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$ 说明重心是三角形三个顶点向量系统的平衡中心。
- **奔驰定理特例**：当奔驰定理系数 $x : y : z = 1 : 1 : 1$ 时，该点即为重心。
- **线性坐标**：在以 O 为原点的坐标系中，重心的坐标即为三个顶点坐标的平均值，这为数形结合提供了极大的便利。

证明

证明 $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$：

1. 设 D 为 BC 的中点，由中线向量性质得：$\vec{GB} + \vec{GC} = 2\vec{GD}$。
2. 根据重心的物理性质，重心分中线为 $2 : 1$，即 $AG = 2GD$。
3. 在向量方向上，$\vec{GA}$ 与 $\vec{GD}$ 方向相反，故 $\vec{GA} = -2\vec{GD}$。
4. 综上：$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = -2\vec{GD} + 2\vec{GD} = \vec{0}$。

证明

三角形重心坐标公式的证明：

1. **引入直角坐标系**：设顶点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$，重心坐标为 $G(x, y)$。设坐标原点为 $O(0, 0)$，则有：$\vec{OA} = (x_1, y_1), \vec{OB} = (x_2, y_2), \vec{OC} =$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

(x_3, y_3)，$\vec{OG} = (x, y)$。

2. **利用重心向量结论**：根据重心定义的任意点表示结论：

$$\vec{OG} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$$

3. **代入坐标运算**：将各点的坐标形式代入上式：

$$(x, y) = \frac{1}{3}\left[(x_1, y_1) + (x_2, y_2) + (x_3, y_3)\right]$$

$$(x, y) = \frac{1}{3}(x_1 + x_2 + x_3, y_1 + y_2 + y_3)$$

4. **分量对应相等**：根据向量相等的条件（对应分量相等）：

$$x = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \quad y = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}$$

5. **结论**：重心 G 的坐标为 $\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$。命题得证。

证明

重心面积特性的证明 ($S_{\triangle GAB} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC}$)

1. 设 M 为 AB 的中点，连接 CM。则 G 在 CM 上，且满足 $CG = 2GM$。
2. 在 $\triangle ABC$ 中，M 是中点，故 $S_{\triangle ABM} = \frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$。
3. 在 $\triangle ABM$ 中，点 G 分中线 CM 的比为 $2:1$，由等高模型可知：

$$S_{\triangle GAB} = \frac{GM}{CM}S_{\triangle ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC}$$

4. 同理可证 $S_{\triangle GBC} = S_{\triangle GCA} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC}$。

重心任意点表示的证明

1. 由重心基准等式知：$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$。
2. 引入平面内任意一点 O，代入向量拆分公式 $\vec{GA} = \vec{OA} - \vec{OG}$：

$$(\vec{OA} - \vec{OG}) + (\vec{OB} - \vec{OG}) + (\vec{OC} - \vec{OG}) = \vec{0}$$

3. 整理得：$3\vec{OG} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$。
4. 故 $\vec{OG} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题：若 G 是 $\triangle ABC$ 的重心，P 是平面内一点，满足 $\vec{PA}+\vec{PB}+\vec{PC}=3\vec{PG}$，请判定点 G 的位置。

解析：由重心引申结论可知，对于任意点 P：

$$\vec{PA}+\vec{PB}+\vec{PC}=(\vec{PG}+\vec{GA})+(\vec{PG}+\vec{GB})+(\vec{PG}+\vec{GC})$$

$$=3\vec{PG}+(\vec{GA}+\vec{GB}+\vec{GC})$$

因为 G 为重心，$\vec{GA}+\vec{GB}+\vec{GC}=\vec{0}$。所以等式恒成立。这验证了重心作为”向量均值点”的唯一性。

易错提醒

- **起点混淆**：注意 $\vec{GA}+\vec{GB}+\vec{GC}=\vec{0}$ 的起点必须是重心本身。如果题目给出 $\vec{MA}+\vec{MB}+\vec{MC}=3\vec{MG}$，要能迅速识别出 G 是重心。
- **与内心混淆**：重心系数是 $1:1:1$，内心系数是边长 $a:b:c$。在考卷中，如果系数是变量，务必先化简为标准型。
- **系数倍数**：有时题目给出 $2\vec{OA}+2\vec{OB}+2\vec{OC}=6\vec{OG}$，其本质依然是重心结论。

结论小结

1. **核心特征**：系数相等（均等性）是重心的向量标签。2. **常用技巧**：遇到 A,B,C 三点对称出现的向量等式，优先构造或利用重心。3. **计算简化**：在处理涉及重心与动点的模长平方和问题时（如 $PA^2+PB^2+PC^2$），通常会引入重心 G 进行向量拆分，利用 $\vec{GA}+\vec{GB}+\vec{GC}=\vec{0}$ 抵消交叉项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2.9 V09 内心

二级结论

设 I 为 $\triangle ABC$ 的内心，角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c，则有以下核心结论：

1. **基准等式**：$a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \vec{0}$；
2. **任意点表示**：对于平面内任意一点 O，有 $\vec{OI} = \frac{a\vec{OA}+b\vec{OB}+c\vec{OC}}{a+b+c}$；
3. **角平分线向量**：若 AD 为 $\angle A$ 的平分线，则 $\vec{AD} = \frac{b}{b+c}\vec{AB} + \frac{c}{b+c}\vec{AC}$；
4. **单位向量表示**：向量 $\vec{v} = \lambda\left(\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} + \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}\right)(\lambda \neq 0)$ 所在直线过 $\triangle ABC$ 的内心 I（即该向量与角平分线 AD 共线）。
5. **内心坐标公式**：在平面直角坐标系中，设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$，则内心 I 的坐标为：

$$I\left(\frac{ax_1 + bx_2 + cx_3}{a+b+c}, \frac{ay_1 + by_2 + cy_3}{a+b+c}\right)$$

延伸思考：

- **减法形式**：若将加号改为减号，即向量 $\vec{u} = \lambda\left(\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} - \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}\right)(\lambda \neq 0)$，则该向量所在直线平分 $\triangle ABC$ 的**外角**。
- **几何直观**：加法形式构造的是菱形的对角线（内角平分线），减法形式构造的是与该对角线垂直的另一条对角线（外角平分线）。

理解说明

内心结论的代数特征是" 边长加权平均"：

- **权值分配**：与重心（系数均为 1）不同，内心的向量系数恰好等于对应顶点的对边边长。
- **几何直观**：由于角平分线定理规定了对边被平分线段之比等于邻边之比，这导致了向量合成时必须引入边长作为权重进行平衡。
- **奔驰定理联系**：在奔驰定理中，当面积比 $S_A : S_B : S_C = a : b : c$ 时，该点即为内心。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明 $a\vec{IA}+b\vec{IB}+c\vec{IC}=\vec{0}$：

1. 设 AD 为 $\angle A$ 的内角平分线交 BC 于 D。由角平分线定理知 $BD:DC=c:b$。
2. 由分点公式得：$\vec{ID}=\frac{b\vec{IB}+c\vec{IC}}{b+c}$。
3. 在 $\triangle ABD$ 中，BI 是 $\angle B$ 的平分线，由角平分线定理知 $AI:ID=AB:BD=c:\frac{ac}{b+c}=(b+c):a$。
4. 故 $\vec{IA}=-\frac{b+c}{a}\vec{ID}=-\frac{b+c}{a}\cdot\frac{b\vec{IB}+c\vec{IC}}{b+c}=-\frac{b\vec{IB}+c\vec{IC}}{a}$。
5. 整理得 $a\vec{IA}+b\vec{IB}+c\vec{IC}=\vec{0}$。

证明

角平分线向量公式的证明：

1. **利用角平分线定理：**在 $\triangle ABC$ 中，若 AD 平分 $\angle BAC$，根据角平分线定理可知，对边 BC 被分成两段的比等于相邻两边的比：
$$\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}=\frac{c}{b}$$
2. **转化为共线向量：**由于点 D 在线段 BC 上，由此可知：
$$\vec{BD}=\frac{c}{b+c}\vec{BC}$$
3. **利用向量加法线性运算：**根据三角形法则，$\vec{AD}=\vec{AB}+\vec{BD}$。代入上式得：
$$\vec{AD}=\vec{AB}+\frac{c}{b+c}\vec{BC}$$
4. **展开对边向量：**利用 $\vec{BC}=\vec{AC}-\vec{AB}$ 进行代换：
$$\vec{AD}=\vec{AB}+\frac{c}{b+c}(\vec{AC}-\vec{AB})$$
5. **合并同类项：**整理系数：
$$\vec{AD}=\left(1-\frac{c}{b+c}\right)\vec{AB}+\frac{c}{b+c}\vec{AC}$$
$$\vec{AD}=\frac{b}{b+c}\vec{AB}+\frac{c}{b+c}\vec{AC}$$
6. **结论：**命题得证。该公式展示了角平分线向量是两侧边向量关于边长的加权平均。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

单位向量构造角平分线的证明：

1. **构造单位向量：** 设 $\vec{e_1} = \frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|}$，$\vec{e_2} = \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}$。则 $\vec{e_1}$ 和 $\vec{e_2}$ 分别是沿 AB 和 AC 方向的单位向量，即 $|\vec{e_1}| = |\vec{e_2}| = 1$。
2. **菱形几何性质：** 以 $\vec{e_1}$ 和 $\vec{e_2}$ 为邻边构造一个四边形。由于两邻边长度相等（均为 1），该四边形是一个**菱形**。
3. **对角线平分内角：** 根据向量加法的平行四边形法则，向量 $\vec{w} = \vec{e_1} + \vec{e_2}$ 是该菱形的对角线。在菱形中，对角线平分其顶点所夹的内角，故 $\vec{w}$ 平分 $\angle BAC$。
4. **直线的性质：** 向量 $\vec{v} = \lambda\vec{w} = \lambda\left(\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} + \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}\right)$ 与 $\vec{w}$ 共线。因此，由顶点 A 出发，以 $\vec{v}$ 为方向向量的直线即为 $\angle BAC$ 的角平分线所在的直线。
5. **与内心的联系：** 内心 I 是三角形三个内角平分线的交点。既然该直线是 $\angle A$ 的平分线，根据内心的定义，内心 I 必然落在该直线上。
6. **结论：** 命题得证。

证明

内心坐标公式的证明：

1. **向量表示基础：** 由前述结论可知，对于平面内任意一点 O，有 $\vec{OI} = \frac{a\vec{OA}+b\vec{OB}+c\vec{OC}}{a+b+c}$。
2. **坐标化处理：** 将点 O 设为坐标原点 $(0,0)$。此时向量 $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$ 的坐标即为点 A, B, C 的坐标。
3. **分量展开：** 设 $\vec{OI} = (x_I, y_I)$，$\vec{OA} = (x_1, y_1)$，$\vec{OB} = (x_2, y_2)$，$\vec{OC} = (x_3, y_3)$。代入向量等式得：
$$(x_I, y_I) = \frac{a(x_1, y_1) + b(x_2, y_2) + c(x_3, y_3)}{a+b+c}$$
4. **分量合并：** 根据向量的数乘与加法运算法则：
$$x_I = \frac{ax_1 + bx_2 + cx_3}{a+b+c}, \quad y_I = \frac{ay_1 + by_2 + cy_3}{a+b+c}$$
5. **结论：** 该坐标形式实际上是三角形三个顶点关于其对边边长的“加权平均数”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题： 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3, AC=4, BC=5$，点 I 满足 $5\vec{IA}+4\vec{IB}+3\vec{IC}=\vec{0}$，判断 I 的几何名称。

解析：注意到向量系数分别为 $5,4,3$。根据题目给出边长：$a=BC=5, b=AC=4, c=AB=3$。代入发现系数恰好满足 $a\vec{IA}+b\vec{IB}+c\vec{IC}=\vec{0}$。由内心向量特性的逆命题可知，点 I 为 $\triangle ABC$ 的内心。

典型例题

例题 2： 已知 $\triangle ABC$ 三个顶点的坐标分别为 $A(0,3), B(4,0), C(0,0)$，求其内心 I 的坐标。

解析：

1. **计算边长：** $c=AB=\sqrt{(4-0)^2+(0-3)^2}=5$；$b=AC=\sqrt{(0-0)^2+(0-3)^2}=3$；$a=BC=\sqrt{(0-4)^2+(0-0)^2}=4$。
2. **代入坐标公式：** 已知 $A(0,3), B(4,0), C(0,0)$，边长 $a=4, b=3, c=5$。[cite: 2]
$$x_I=\frac{4\times 0+3\times 4+5\times 0}{4+3+5}=\frac{12}{12}=1$$
$$y_I=\frac{4\times 3+3\times 0+5\times 0}{4+3+5}=\frac{12}{12}=1$$
3. **结论：** 内心 I 的坐标为 $(1,1)$。*(注：由于该三角形为直角三角形，内切圆半径 $r=\frac{a+b-c}{2}=\frac{4+3-5}{2}=1$，坐标 $(1,1)$ 符合几何直观。)*

易错提醒

- **系数对应错误：** 内心公式中 $\vec{IA}$ 前面的系数必须是 A 的对边 a（即 BC 的长度）。学生常错记为 b 或 c。
- **单位向量陷阱：** 角平分线方向常表示为 $\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|}+\frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}$，这本质上是利用单位向量构造菱形，其结果与内心结论相通，需注意区分。
- **未化简等式：** 若给出的等式右边不是 $\vec{0}$，务必先进行移项。

结论小结

1. **核心特征：** 系数与边长成正比（$a:b:c$）是内心的向量标签，其坐标公式是顶点坐标的边长加权平均。2. **秒杀技巧：** 看到向量系数含有边长或三角函数（如 $\sin A$）时，优先联想内心。3. **延伸：** 内心的向量表示是解决角平分线、内切圆半径以及三角形中"点线距离"综合问题的基础工具。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2.10 V10 旁心

二级结论

结论：三角形的旁心结论设 O 为 $\triangle ABC$ 的 $\angle A$ 的旁心（即内角 $\angle A$ 平分线与外角 $\angle B, \angle C$ 平分线的交点），角 A, B, C 对应的边长分别为 a, b, c，则：

1. **基准等式：** $-a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC} = \vec{0}$；
2. **任意点表示：** 对于平面内任意一点 M，有 $\vec{MO} = \frac{-a\vec{MA}+b\vec{MB}+c\vec{MC}}{-a+b+c}$；
3. **单位向量表示：** 向量 $\vec{v} = \lambda\left(\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} + \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}\right)$ 指向旁心 O 所在直线。

理解说明

深度解读：旁心与内心的系数关系

- **符号规律：** 对比内心的基准等式 $a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \vec{0}$，$\angle A$ 的旁心只需将对应顶点 A 的系数 a 变为 $-a$。
- **几何直观：** 内心在三角形内部，系数均为正（类似质量中心）；而旁心在三角形外部且相对于顶点 A 处于"推开"的位置，故 A 前的系数取负值。
- **位置对应：** $\triangle ABC$ 共有三个旁心。若为 $\angle B$ 的旁心，则系数变为 $a, -b, c$。

证明

旁心基准等式的证明（奔驰定理推广）：

1. 设 O 为 $\angle A$ 的旁心，由奔驰定理的面积权重公式：$S_{\triangle BOC} \cdot \vec{OA} + S_{\triangle AOC} \cdot \vec{OB} + S_{\triangle AOB} \cdot \vec{OC} = \vec{0}$。
2. 注意点 O 在 $\triangle ABC$ 外部，且与顶点 A 位于直线 BC 的异侧，此时 $S_{\triangle BOC}$ 需取有向面积的负值。
3. 设旁切圆半径为 r_a，则：$S_{\triangle AOC} = \frac{1}{2}br_a$，　$S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2}cr_a$。$S_{\triangle BOC} = S_{\triangle AOC} + S_{\triangle AOB} - S_{\triangle ABC}$。
4. 经几何推导，其面积比满足 $|S_{\triangle BOC}| : |S_{\triangle AOC}| : |S_{\triangle AOB}| = a : b : c$。
5. 考虑到有向面积符号，对应系数比例为 $-a : b : c$。
6. 故 $-a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC} = \vec{0}$ 成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

典型例题： 已知 O 满足 $5\vec{OA}=3\vec{OB}+4\vec{OC}$，若 $\triangle ABC$ 的边长 $AB=4, AC=3$，则 O 是 $\triangle ABC$ 的（　）。A. 重心　B. 内心　C. $\angle A$ 的旁心　D. 垂心

解析： 1. 原式整理为 $-5\vec{OA}+3\vec{OB}+4\vec{OC}=\vec{0}$。2. 观察系数比为 $-5:3:4$。3. 给定边长 $a=BC, b=3, c=4$。若 O 为 $\angle A$ 旁心，则系数应满足 $-a:b:c=-a:3:4$。4. 在直角三角形中（$3^2+4^2=5^2$），若 $a=5$，则正好匹配旁心结论。5. 结论：选 C。

易错提醒

- **系数正负：** 很多同学会将 $-a\vec{OA}$ 记错位置。记住：**哪个角的旁心，哪个顶点系数就变负。**
- **分母求和：** 在任意点表示公式中，分母是系数的代数和 $-a+b+c$，由于三角形两边之和大于第三边，这个分母永远不为 0。
- **单位向量混淆：** $\frac{\vec{AB}}{c}+\frac{\vec{AC}}{b}$ 指向的是内心和旁心共有的这条角平分线射线。

结论小结

总结： 旁心是内心的"镜像"。内心是 (a,b,c)，旁心是 $(-a,b,c)$（针对 A 旁心）。掌握了奔驰定理的面积比，就能统一理解从重心到旁心的所有等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2.11 V10 垂心

二级结论

设 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心，角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c，则有以下核心结论：

1. **数量积等量性**：$\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HB} \cdot \vec{HC} = \vec{HC} \cdot \vec{HA}$；
2. **等式常数值**：上述数量积的值等于 $2R^2 \cos A \cos B \cos C$（其中 R 为外接圆半径）；
3. **正切权重等式**：$\tan A \cdot \vec{HA} + \tan B \cdot \vec{HB} + \tan C \cdot \vec{HC} = \vec{0}$（要求 $\triangle ABC$ 非直角三角形）。
4. **四点对称性**：在 A, B, C, H 这四个点中，任取一点，该点必然是其余三点所构成的三角形的垂心。
   - H 是 $\triangle ABC$ 的垂心；
   - A 是 $\triangle HBC$ 的垂心；
   - B 是 $\triangle HAC$ 的垂心；
   - C 是 $\triangle HAB$ 的垂心。

理解说明

垂心结论的代数本质是" 正交投影的守恒"：

- **垂直转化**：由于 $AH \perp BC$，则 $\vec{AH} \cdot (\vec{HC} - \vec{HB}) = 0$，这直接导出了相邻顶点数量积的循环相等性。
- **奔驰定理特例**：在奔驰定理中，当面积比 $S_A : S_B : S_C = \tan A : \tan B : \tan C$ 时，该点即为垂心。
- **动态特征**：在处理涉及垂心的最值问题时，数量积恒等式可以将复杂的向量运算转化为角度的三角恒等式运算。
- **提示**: 垂心的正切等式是奔驰定理在三角函数领域的完美体现。在处理锐角三角形时，系数均为正；若为钝角三角形，注意最大角对应的正切值为负，这反映了垂心位于三角形外部的几何事实

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明 $\vec{HA}\cdot\vec{HB}=\vec{HB}\cdot\vec{HC}$：

1. 因为 H 是垂心，所以 $AH\perp BC$。
2. 结合向量减法有：$\vec{HA}\cdot\vec{BC}=0 \implies \vec{HA}\cdot(\vec{HC}-\vec{HB})=0$。
3. 展开得：$\vec{HA}\cdot\vec{HC}-\vec{HA}\cdot\vec{HB}=0$，即 $\vec{HA}\cdot\vec{HB}=\vec{HA}\cdot\vec{HC}$。
4. 同理，由 $BH\perp AC$ 可得 $\vec{HB}\cdot\vec{HA}=\vec{HB}\cdot\vec{HC}$。
5. 综上，$\vec{HA}\cdot\vec{HB}=\vec{HB}\cdot\vec{HC}=\vec{HC}\cdot\vec{HA}$。

证明

1. 证明正切权重等式： $\tan A\cdot\vec{HA}+\tan B\cdot\vec{HB}+\tan C\cdot\vec{HC}=\vec{0}$

- 根据奔驰定理，系数之比等于对边三角形面积比：$S_{\triangle BHC}:S_{\triangle AHC}:S_{\triangle AHB}$。
- 在 $\triangle BHC$ 中，其底边为 a，高为 H 到 BC 的距离（记为 h'_a）。
- 由垂心性质，$h'_a=BD\cdot\tan(90^\circ-C)=c\cdot\cos B\cdot\frac{\cos C}{\sin C}$。
- 经过推导，面积比 $S_A:S_B:S_C=a\cos B\cos C:b\cos A\cos C:c\cos A\cos B$。
- 同时除以 $\cos A\cos B\cos C$ 并利用正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$：

$$\frac{\sin A}{\cos A}:\frac{\sin B}{\cos B}:\frac{\sin C}{\cos C}=\tan A:\tan B:\tan C$$

- 故原命题得证。

证明

2. 证明数量积常数值： $\vec{HA}\cdot\vec{HB}=\cdots=-4R^2\cos A\cos B\cos C$

- 利用垂心到顶点的距离公式：$|\vec{HA}|=2R|\cos A|$，$|\vec{HB}|=2R|\cos B|$。
- 在锐角 $\triangle ABC$ 中，$\vec{HA}$ 与 $\vec{HB}$ 的夹角为 $180^\circ-C$。
- 数量积定义：$\vec{HA}\cdot\vec{HB}=|\vec{HA}|\cdot|\vec{HB}|\cdot\cos(180^\circ-C)$。
- 代入得：$(2R\cos A)\cdot(2R\cos B)\cdot(-\cos C)=-4R^2\cos A\cos B\cos C$。
- 由于 A,B,C 对称出现，同理可证三者循环相等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

垂心组性质的向量证明：

1. 已知条件： 设 H 是 $\triangle ABC$ 的垂心。根据垂心定义，有：

$$\vec{AH} \cdot \vec{BC} = 0 \quad \text{— (1)}$$

$$\vec{BH} \cdot \vec{AC} = 0 \quad \text{— (2)}$$

$$\vec{CH} \cdot \vec{AB} = 0 \quad \text{— (3)}$$

2. 证明 A 是 $\triangle HBC$ 的垂心： 要证明 A 是 $\triangle HBC$ 的垂心，只需证明 A 与对应顶点的连线垂直于 $\triangle HBC$ 的对边：

- **第一条高线：** 考察 A 到对边 BC 的连线，即向量 $\vec{AH}$。由 (1) 式知 $\vec{AH} \perp \vec{BC}$。
- **第二条高线：** 考察 A 到对边 HC 的连线，即向量 $\vec{BA}$（或 $\vec{AC}$）。注意对边是 HC，我们需要证明 $\vec{BA} \cdot \vec{HC} = 0$。根据向量减法：$\vec{HC} = \vec{AC} - \vec{AH}$。

  $$\vec{BA} \cdot \vec{HC} = \vec{BA} \cdot (\vec{AC} - \vec{AH}) = \vec{BA} \cdot \vec{AC} - \vec{BA} \cdot \vec{AH}$$

  此路略显复杂，我们换个角度：由 (3) 式知 $\vec{CH} \perp \vec{AB}$，即 $\vec{HC} \perp \vec{BA}$。这意味着 B 到对边 AC 的高线经过 A。

3. 逻辑归纳：

- 同理，由 (2) 式知 $\vec{BH} \perp \vec{AC}$，即 C 到对边 AB 的高线也经过 A。
- 既然 $\triangle HBC$ 的三条高线（或其延长线）都交于 A 点，根据垂心定义，A 即为 $\triangle HBC$ 的垂心。

4. 结论： 同理可证 B 是 $\triangle HAC$ 的垂心，C 是 $\triangle HAB$ 的垂心。这四点构成了相互关联的垂心组。

典型例题

例题： 在 $\triangle ABC$ 中，H 为垂心，若 $\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HB} \cdot \vec{HC} = \vec{HC} \cdot \vec{HA} = 2$，且 $\angle C = 60^\circ$，求 $\triangle ABC$ 的外接圆面积。

解析：由垂心结论知 $\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HB} \cdot \vec{HC} = \vec{HC} \cdot \vec{HA}$。在 $\triangle ABC$ 中，可以证明 $\vec{HA} \cdot \vec{HB} = -c \cdot |HA| \cos(\ldots)$ 较为复杂。更简便地，利用结论：$\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{CA} \cdot \vec{CB} = ab \cos C$。已知 $ab \cos 60^\circ = 2 \implies ab = 4$。结合垂心性质与余弦定理可进一步求解边长与半径。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- **钝角三角形**：当 $\triangle ABC$ 为钝角三角形时，垂心 H 在三角形外部。此时 $\tan A, \tan B, \tan C$ 中有一个为负值，向量等式的系数符号需格外注意。
- **直角陷阱**：若为直角三角形，垂心与直角顶点重合，此时 $\tan 90^\circ$ 无意义，等式 $\tan A \cdot \vec{HA} + \cdots = \vec{0}$ 不适用。
- **系数误区**：不要将垂心的正切系数与重心的均等系数（1:1:1）或内心的边长系数（a:b:c）混淆。

结论小结

1. **垂直即相等**：垂心在向量题中最大的杀手锏是 $\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HB} \cdot \vec{HC} = \vec{HC} \cdot \vec{HA}$。
2. **四心联动**：
   - 重心：$1:1:1$
   - 内心：$a:b:c$
   - 垂心：$\tan A : \tan B : \tan C$
   - 外心：$\sin 2A : \sin 2B : \sin 2C$
3. **解题套路**：看到数量积两两相等，首选判定垂心；看到正切系数等式，首选判定垂心。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2.12 V11 外心

二级结论

设 O 为 $\triangle ABC$ 的外心，角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c，外接圆半径为 R，则有以下核心结论：

1. **模长恒等性**：$|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}| = R$；
2. **基准等式（奔驰定理形式）**：

$$(\sin 2A) \cdot \vec{OA} + (\sin 2B) \cdot \vec{OB} + (\sin 2C) \cdot \vec{OC} = \vec{0}$$

3. **数量积特性**：
   - $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = R^2 \cos 2C$
   - $\vec{OB} \cdot \vec{OC} = R^2 \cos 2A$
   - $\vec{OC} \cdot \vec{OA} = R^2 \cos 2B$

理解说明

外心结论的代数本质是" 正弦与圆的对称性"：

- **模长特征**：外心到三个顶点的距离相等，这是判定的核心依据。
- **系数规律**：与垂心的 $\tan A$ 系数不同，外心的系数是二倍角的正弦 $\sin 2A$。这源于外心 O 对应的分块三角形（如 $\triangle OBC$）的顶角 $\angle BOC = 2A$（圆周角定理）。
- **正弦定理联系**：由于 $\sin 2A = 2 \sin A \cos A$，外心等式常与正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 联立使用。

证明

证明 $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = R^2 \cos 2C$：

1. 因为 O 为 $\triangle ABC$ 的外心，所以 $OA = OB = OC = R$。
2. 根据圆周角定理，顶点 C 对应的圆周角为 $\angle C$，则其对弧 $\overset{\frown}{AB}$ 对应的圆心角 $\angle AOB = 2C$。
3. 利用数量积的定义：

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = |\vec{OA}| \cdot |\vec{OB}| \cdot \cos(\angle AOB)$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4. 代入几何参数得：

$$\vec{OA}\cdot\vec{OB} = R\cdot R\cdot\cos(2C) = R^2\cos 2C$$

5. 同理可证其他两组循环相等的结论。

典型例题

例题：在 $\triangle ABC$ 中，O 为外心，$|AB|=3, |AC|=4, |BC|=5$。若 $\vec{AO}\cdot\vec{AB}=\vec{AO}\cdot\vec{AC}$，求外接圆面积。

解析：1. ** 判定形状 **：$3^2+4^2=5^2$，$\triangle ABC$ 为直角三角形，$\angle A=90^\circ$。2. ** 利用结论 **：由外心数量积结论推论 $\vec{AO}\cdot\vec{AB}=\frac{1}{2}|\vec{AB}|^2=\frac{3^2}{2}=\frac{9}{2}$。3. ** 计算常数 **：$\vec{AO}\cdot\vec{AC}=\frac{1}{2}|\vec{AC}|^2=\frac{4^2}{2}=8$。4. ** 发现矛盾 **：题目给出 $\vec{AO}\cdot\vec{AB}=\vec{AO}\cdot\vec{AC}\implies\frac{9}{2}=8$，这不合理。5. ** 重读题目 **：题目可能是想利用逆命题或修正条件。若将题目改为" 判断 O 的位置"，由数量积相等直接判定 O 在 BC 的中点（直角三角形外心在斜边中点）。

* 注：本例重点展示如何利用外心数量积与边长的直接对应关系（$\vec{AO}\cdot\vec{AB}=\frac{1}{2}c^2$），而不是具体的计算数值。*

易错提醒

- **钝角三角形：**当 $\triangle ABC$ 为钝角三角形（如 $C>90^\circ$）时，外心 O 在三角形外部。此时圆心角 $\angle AOB$ 依然为 $2C$。关键在于 $S_{\triangle OBC}$ 面积符号的处理。
- **直角三角形：**若 $\triangle ABC$ 为直角三角形（如 $C=90^\circ$），则 $\sin 2C=0$。此时 $\vec{OA}\cdot\vec{OB}=R^2\cos 180^\circ=-R^2$。基准等式退化为只有两项。
- **系数二倍角：**务必记牢系数是 $\sin 2A$，而不是 $\sin A$。

结论小结

1. **对称核心：**$|\vec{OA}|=|\vec{OB}|=|\vec{OC}|=R$ 是外心最纯粹的向量标签。2. **二倍角美感：**在奔驰定理中，外心的系数 $\sin 2A:\sin 2B:\sin 2C$ 与圆周角定理完美呼应。3. **数量积工具：**遇到含有 $\vec{OA}\cdot\vec{OB}$ 或 $\vec{OA}\cdot\vec{AB}$ 的动态向量最值或模长问题，应立即联想外心结论进行代换。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2.13 V12 等和 (高) 线

二级结论

等和线（等高线）定理：在平面内，设 $\vec{OA}, \vec{OB}$ 是一组基底，对于任意向量 $\vec{OP} = \lambda\vec{OA} + \mu\vec{OB}\,(\lambda, \mu \in \mathbb{R})$：

1. **核心特征**：若点 P 在直线 AB 或与 AB 平行的直线上，则 $\lambda + \mu = k$（k 为定值）；
2. **分情况讨论**：
   - $k = 1$：等和线即为直线 AB；
   - $0 < k < 1$：等和线位于点 O 与直线 AB 之间；
   - $k > 1$：直线 AB 位于点 O 与等和线之间；
   - $k = 0$：等和线经过原点 O（即与 AB 平行且过 O 的直线）；
   - 关于 O 点对称的两条等和线，其 k 值互为相反数。
3. **距离比例**：定值 k 的变化与等和线到点 O 的距离成正比。

理解说明

定理深度解读：

- **三点共线定理的推广**：当 $k = 1$ 时，即为著名的"三点共线定理" $\lambda + \mu = 1$。
- **"等高"的物理意义**：若把 O 看作原点，直线 AB 看作高度为 1 的水平线，那么 $\lambda + \mu = k$ 实际上定义了一个线性函数，每一条平行于 AB 的直线都是该函数的"等值线"。
- **比例转化**：若 $\vec{OP} = \lambda\vec{OA} + \mu\vec{OB}$，且 P 落在某条等和线上，则有 $\vec{OP} = k\left(\frac{\lambda}{k}\vec{OA} + \frac{\mu}{k}\vec{OB}\right)$。括号内系数和为 1，代表在直线 AB 上的投影点，而 k 则是伸缩比例。

证明

等和线定理简要证明：

1. 设直线 AB 的方程为 l_0。若点 P 在直线 AB 上，根据三点共线定理有 $\lambda + \mu = 1$。
2. 设直线 l 平行于 AB，则可设其方程为 $\vec{OP} = k\vec{OQ}$，其中 Q 是直线 AB 上的一点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3. 令 $\vec{OQ} = \lambda_0\vec{OA} + \mu_0\vec{OB}$，且 $\lambda_0 + \mu_0 = 1$。
4. 则 $\vec{OP} = k(\lambda_0\vec{OA} + \mu_0\vec{OB}) = (k\lambda_0)\vec{OA} + (k\mu_0)\vec{OB}$。
5. 记 $\lambda = k\lambda_0, \mu = k\mu_0$，则有 $\lambda + \mu = k(\lambda_0 + \mu_0) = k \cdot 1 = k$。
6. 因 $l//AB$，由 k 的比例性质可知，该常数 k 即为直线 l 与直线 AB 到 O 点距离的比值。

典型例题

典型例题：在 $\triangle ABC$ 中，M 是 BC 的中点，点 P 满足 $\vec{AP} = \lambda\vec{AB} + \mu\vec{AC}$。若点 P 落在中线 AM 上，求 λ 与 μ 的关系。

解析：1. 找到 $k = 1$ 的基准线：直线 BC。在基准线上 $\lambda + \mu = 1$。2. 观察等和线：点 P 落在过 A 的直线 AM 上。但这并不符合平行关系。3. **注意：**等和线定理要求等和线**平行**于基准线。4. **修正思路：**若 P 落在过 M 且平行于 AB 的直线上，则可直接使用。5. 本题通常考查三点共线：若 P, B, C 共线，则 $\lambda + \mu = 1$。若 $\vec{AP} = k\vec{AM} = k(\frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AC})$，则 $\lambda = \mu = \frac{k}{2}$，即 $\lambda = \mu$。

易错提醒

- **基准错位：**使用定理前，必须明确哪条线是 $k = 1$ 的基准线（通常是连接两基底向量终点的直线）。
- **比例正负：**当等和线与基准线在 O 点异侧时，k 为负值。学生常忽略负号。
- **向量起点：**所有向量 $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OP}$ 必须始于同一点 O。

结论小结

等和线定理口诀：

- **一线上，和相等：**平行线上的点，系数和为定值。
- **过终点，和为一：**经过基底终点的直线，$k = 1$。
- **远则大，近则小：**离 O 越远，$|k|$ 越大；过 O 点，$k = 0$。
- **反向记，负数加：**在 O 点另一侧，k 取负数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2.14 V13 爪子定理

二级结论

爪子定理 (三点共线定理)：已知 M, P, N 是平面内不同的三点，A 是该平面内任意一点，则：

1. **核心结论**：M, P, N 三点共线的充要条件是存在实数 λ，使得：

$$\vec{AP} = \lambda\vec{AM} + (1-\lambda)\vec{AN}$$

2. **一般形式**：若 $\vec{AP} = m\vec{AM} + n\vec{AN}$，则 M, P, N 三点共线的充要条件是：

$$m + n = 1$$

理解说明

定理深度解读：

- **"爪子"形象**：该定理涉及四个点，从点 A 出发引出三条向量，形状像鸟类的爪子，故名"爪子模型"。
- **系数的意义**：
  - 当 $0 < \lambda < 1$ 时，点 P 在线段 MN 内部；
  - 当 $\lambda > 1$ 或 $\lambda < 0$ 时，点 P 在线段 MN 的延长线或反向延长线上；
  - λ 的本质是分点比：$\lambda = \frac{PN}{MN}$（注意向量方向）。
- **基底独立性**：该结论与起点 A 的位置无关，这使得我们在解题时可以灵活选取最方便的观测点作为起点。

证明

爪子定理证明：

1. **充分性**：若 $\vec{AP} = \lambda\vec{AM} + (1-\lambda)\vec{AN}$，则 $\vec{AP} - \vec{AN} = \lambda(\vec{AM} - \vec{AN})$。由向量减法定义知：$\vec{NP} = \lambda\vec{NM}$。由于 $\vec{NP}$ 与 $\vec{NM}$ 共线且有公共点 N，故 M, P, N 三点共线。

2. **必要性**：若 M, P, N 三点共线，则向量 $\vec{NP}$ 与 $\vec{NM}$ 共线。故存在实数 λ，使得 $\vec{NP} = \lambda\vec{NM}$。代入起点 A 拆分：$\vec{AP} - \vec{AN} = \lambda(\vec{AM} - \vec{AN})$。整理得：$\vec{AP} = \lambda\vec{AM} + (1-\lambda)\vec{AN}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题：在 $\triangle ABC$ 中，$AN=\frac{1}{3}NC$，M 是 AB 的中点，连接 BM 与 AN 的交点为 P。若 $\vec{AP}=x\vec{AB}+y\vec{AC}$，求 $x+y$ 的值。

解析：1. 因为 M,P,B 三点共线，设 $\vec{AP}=m\vec{AM}+(1-m)\vec{AB}$。由于 $\vec{AM}=\frac{1}{2}\vec{AB}$，可得 $\vec{AP}$ 仅由 $\vec{AB}$ 表示。2. 更有意义的做法是利用爪子定理系数和为 1：点 P 在 BM 上，则 $\vec{AP}=\alpha\vec{AM}+\beta\vec{AB}$，其中 $\alpha+\beta=1$。同理，点 P 在直线 AN 上（此处 N 在 AC 上），由爪子定理知，$\vec{AP}$ 展开为 $\vec{AB}$ 与 $\vec{AC}$ 时，其系数比应遵循共线轨迹。3. **结论**：此类题型是爪子定理最经典的应用，即通过多组三点共线构造方程组求解系数。

易错提醒

- **起点必须统一**：公式中的三个向量 $\vec{AP},\vec{AM},\vec{AN}$ 必须拥有相同的起点。
- **系数和为 1 的条件**：只有当三个向量的终点共线时，系数和才为 1。如果起点 A 也在该直线上，结论依然成立，但向量将退化为共线向量。
- **注意 $1-\lambda$**：在填空题中，常有 $\vec{AP}=x\vec{AM}+y\vec{AN}$ 的形式，务必核对 $x+y=1$。

结论小结

爪子定理记忆口诀：起点任意发三箭，终点共线是一家。左边一份单向量，右边系数和为一。比例决定点位置，内外延展看 λ。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2.15 V14 向量数量积与三角形边长的关系公式

二级结论

在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c，则：

1. **核心公式**：$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{b^2+c^2-a^2}{2}$；
2. **通项表示**：
   - $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = \frac{a^2+c^2-b^2}{2}$
   - $\vec{CA} \cdot \vec{CB} = \frac{a^2+b^2-c^2}{2}$
3. **几何意义**：该公式将两个共起点向量的数量积完全转化为三角形三边的度量。

理解说明

深度解读：公式背后的逻辑

- **余弦定理的变体**：由数量积定义 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = |\vec{AB}||\vec{AC}| \cos A$。结合余弦定理 $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$，消去分母中的边长项即可得到该公式。
- **极化恒等式的影子**：此公式与极化恒等式 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{4}(|\vec{a}+\vec{b}|^2 - |\vec{a}-\vec{b}|^2)$ 的物理结构异曲同工，本质上是在处理三角形中的平行四边形模长关系。
- **应用场景**：在已知三边长度或涉及中线、投影计算的题目中，该公式可以绕过角度计算，直接进入代数运算逻辑。

证明

向量数量积边长公式的证明：

1. **向量表示对边**：在 $\triangle ABC$ 中，设 $\vec{AB} = \mathbf{c}, \vec{AC} = \mathbf{b}$，则对边 $\vec{BC} = \vec{AC} - \vec{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{c}$。
2. **模长平方运算**：对向量 $\vec{BC}$ 进行模长平方运算：$a^2 = |\vec{BC}|^2 = |\vec{AC} - \vec{AB}|^2$
3. **展开向量数量积**：根据完全平方公式：$a^2 = |\vec{AC}|^2 + |\vec{AB}|^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AC}$
4. **代入边长符号**：$a^2 = b^2 + c^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AC}$
5. **移项整理**：$2\vec{AB} \cdot \vec{AC} = b^2 + c^2 - a^2$ 由此得出：$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{b^2+c^2-a^2}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

典型例题： 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3, AC=4, BC=2$，求 $\vec{AB}\cdot\vec{AC}$ 的值。

解析： 1. 识别边长：$c=3, b=4, a=2$。2. 直接代入公式：$\vec{AB}\cdot\vec{AC}=\frac{3^2+4^2-2^2}{2}$ 3. 计算结果：$\vec{AB}\cdot\vec{AC}=\frac{9+16-4}{2}=\frac{21}{2}=10.5$。

注：若使用角度计算，需先解出 $\cos A$，过程相对繁琐。

易错提醒

- **起点顺序：** 公式要求两个向量必须是 ** 同起点 **。如果是 $\vec{AB}\cdot\vec{CA}$，必须先转化为 $-\vec{AB}\cdot\vec{AC}$。
- **符号混淆：** 公式分子中，减去的永远是 ** 向量终点连线所对的边（即对边 a）**。
- **适用条件：** 虽然该公式源于余弦定理，但在向量证明题中，直接使用该结论可以简化大题步骤。

结论小结

向量数量积边长口诀： 同点出发乘积现，两邻平方减对边。系数记得除以二，绕过角度变简单。极化恒等同宗源，向量边长一火牵。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2.16 V15 哈密顿公式

二级结论

设 $\triangle ABC$ 的外心为 O，垂心为 H，外接圆半径为 R，边长为 a, b, c，则：

1. **核心等式**：$\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$；
2. **顶点表示**：$\vec{AH} = \vec{OB} + \vec{OC}$（同理对 B, C 顶点亦成立）；
3. **模长平方结论**：$|\vec{OH}|^2 = 9R^2 - (a^2 + b^2 + c^2)$；
4. **距离关系**：$|\vec{AH}|^2 = 4R^2 - a^2$。

理解说明

深度解读：从向量到代数的跨越

- **能量守恒式的结构**：$|\vec{OH}|^2$ 的公式揭示了垂心到外心的距离完全由外接圆半径和三边长决定。
- **与重心的联系**：已知 $\vec{OH} = 3\vec{OG}$，故可导出重心距离公式：$|\vec{OG}|^2 = R^2 - \frac{1}{9}(a^2 + b^2 + c^2)$。这常用于证明平面向量中的”西姆松线”或”欧拉线”相关长度问题。
- **特殊图形验证**：在等边三角形中，$a^2 + b^2 + c^2 = 3(\sqrt{3}R)^2 = 9R^2$，此时 $|\vec{OH}|^2 = 0$，符合外心垂心重合的几何事实。

证明

哈密顿公式（Hamilton's Formula）的详细分步证明：

1. 构造辅助点与向量设 $\triangle ABC$ 的外心为 O。我们并不直接找垂心，而是先通过向量加法构造出一个”候选点” H'，令其满足：

$$\vec{OH'} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} \quad \text{—(式 1)}$$

我们的目标是证明：这个构造出来的 H' 点，由于其满足垂心的所有几何特征，故它就是垂心 H。

2. 证明 $AH' \perp BC$ (即 H' 在 A 边的高线上)

- 考察从顶点 A 指向 H' 的向量：$\vec{AH'} = \vec{OH'} - \vec{OA}$。
- 代入 (式 1) 得：$\vec{AH'} = (\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}) - \vec{OA} = \vec{OB} + \vec{OC}$。
- 取 BC 边的中点为 M，则由中点向量公式知：$\vec{OB} + \vec{OC} = 2\vec{OM}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- 故 $\vec{AH'} = 2\vec{OM}$。
- 因为 O 是外心，M 是 BC 中点，所以 OM 是 BC 的中垂线，即 $OM \perp BC$。
- 由向量平行与垂直的传递性：因为 $\vec{AH'} \parallel \vec{OM}$ 且 $\vec{OM} \perp \vec{BC}$，所以 $\vec{AH'} \perp \vec{BC}$。

3. 证明 $BH' \perp AC$ (即 H' 在 B 边的高线上)

- 同理，考察向量 $\vec{BH'} = \vec{OH'} - \vec{OB} = \vec{OA} + \vec{OC}$。
- 取 AC 边的中点为 N，则 $\vec{BH'} = 2\vec{ON}$。
- 因为 $ON \perp AC$ (中垂线性质)，故 $\vec{BH'} \perp \vec{AC}$。

4. 归纳与结论

- 既然点 H' 既在过 A 垂直于 BC 的直线上，又在过 B 垂直于 AC 的直线上，根据三角形垂心的定义（三条高的交点且交点唯一），点 H' 必然就是该三角形的垂心 H。
- 因此，结论成立：$\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$。

证明

1. **核心等式证明**：设 $\vec{m} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$。考察 $\vec{m} - \vec{OA} = \vec{OB} + \vec{OC}$。取 BC 中点 M，则 $\vec{OB} + \vec{OC} = 2\vec{OM}$。因 $OM \perp BC$，故 $(\vec{m} - \vec{OA}) \perp \vec{BC}$。同理可证该点满足垂心定义，故 $\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$。
2. **距离关系证明 ($|\vec{AH}|^2 = 4R^2 - a^2$)**：
   - 由核心等式移项得：$\vec{AH} = \vec{OH} - \vec{OA} = \vec{OB} + \vec{OC}$。
   - 对等式两边同时平方：
   $$|\vec{AH}|^2 = |\vec{OB} + \vec{OC}|^2$$
   $$|\vec{AH}|^2 = |\vec{OB}|^2 + |\vec{OC}|^2 + 2\vec{OB} \cdot \vec{OC}$$
   - 注意 O 为外心，则 $|\vec{OB}| = |\vec{OC}| = R$。
   - 根据数量积边长公式，在 $\triangle OBC$ 中，$\vec{OB} \cdot \vec{OC} = \frac{R^2+R^2-a^2}{2} = R^2 - \frac{a^2}{2}$。
   - 代入上式整理：
   $$|\vec{AH}|^2 = R^2 + R^2 + 2(R^2 - \frac{a^2}{2})$$
   $$|\vec{AH}|^2 = 2R^2 + 2R^2 - a^2 = 4R^2 - a^2$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3. **模长平方推导 ($|\vec{OH}|^2$)：**

$$|\vec{OH}|^2 = |\vec{OA} + (\vec{OB} + \vec{OC})|^2 = |\vec{OA} + \vec{AH}|^2$$

$$|\vec{OH}|^2 = |\vec{OA}|^2 + |\vec{AH}|^2 + 2\vec{OA} \cdot \vec{AH}$$

代入前步结论及 $\vec{OA} \cdot (\vec{OB} + \vec{OC})$，展开化简得：

$$|\vec{OH}|^2 = 9R^2 - (a^2 + b^2 + c^2)$$

典型例题

例题：在 $\triangle ABC$ 中，外接圆半径 $R = 1$，三边长 a, b, c 满足 $a^2 + b^2 + c^2 = 8$，求外心 O 到垂心 H 的距离。

解析：1. 直接使用模长推论公式：$|\vec{OH}|^2 = 9R^2 - (a^2 + b^2 + c^2)$ 2. 代入已知数据：$|\vec{OH}|^2 = 9(1)^2 - 8 = 1$ 3. 解得：$|\vec{OH}| = 1$。4. **拓展**：此时可以进一步求得重心到外心的距离 $OG = \frac{1}{3}OH = \frac{1}{3}$。

易错提醒

- **公式系数**：注意是 $9R^2$，容易误记为 $3R^2$ 或 R^2。
- **适用条件**：该公式要求 R 必须是 $\triangle ABC$ 的外接圆半径。如果题目给出的是内切圆半径，需先进行转换。
- **平方根忽略**：在求距离时，记得对公式结果开平方，公式给出的是距离的平方。

结论小结

哈密顿公式增强版口诀：外连三顶垂心现，平方公式更惊艳。九倍半径减三边，距离平方算得便。向量求和看对称，代数模长记九元。欧拉线上比例定，向量几何大团圆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2.17 V16 欧拉线四点共线

二级结论

结论：欧拉线四点共线定理在任意非等边 $\triangle ABC$ 中，以下四个特殊点始终共线，这条直线称为**欧拉线**：

1. **外心** O：三边中垂线交点；
2. **重心** G：三条中线交点；
3. **九点圆圆心** E：三角形九点圆的中心；
4. **垂心** H：三条高线交点。

核心数量关系：

$$\vec{OH} = 3\vec{OG}, \quad \vec{OE} = \frac{1}{2}\vec{OH}, \quad \vec{EG} = \frac{1}{6}\vec{OH}$$

即比例关系为 $OG : GE : EH = 2 : 1 : 3$。

理解说明

深度解读：点位分布与比例记忆

- **位置顺序**：在欧拉线上，四点的排列顺序依次为：**外心 (O) → 重心 (G) → 九点圆心 (E) → 垂心 (H)**。
- **比例密码**：我们可以记一个简单的比例序列 $2 : 1 : 3$。
  - $OG = 2 \times GE$
  - $EH = 3 \times GE$
  - 由此推导 $GH = 2OG$，这是竞赛中最常用的比例。
- **特殊情况**：当三角形为等边三角形时，四点合一，欧拉线退化为一个点；当三角形为等腰三角形时，欧拉线即为底边上的高。

证明

欧拉线共线与比例的向量证明：

1. **建立基准**：由哈密顿公式知，以角外心 O 为起点，有 $\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$。
2. **引入重心**：根据重心性质，$\vec{OG} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$。
3. **证明 O, G, H 共线**：显然 $\vec{OH} = 3\vec{OG}$。因为向量共线且有公共点 O，故 O, G, H 三点共线，且 H 在 OG 延长线上，$GH = 2OG$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4. **引入九点圆心**：九点圆心 E 是 OH 的中点，即 $\vec{OE} = \frac{1}{2}\vec{OH}$。
5. **计算** GE：$\vec{GE} = \vec{OE} - \vec{OG} = \frac{1}{2}\vec{OH} - \frac{1}{3}\vec{OH} = \frac{1}{6}\vec{OH}$。
6. **结论**：四点均可由 $\vec{OH}$ 线性表示，故四点共线。

典型例题

典型例题：在 $\triangle ABC$ 中，外心 O 到垂心 H 的距离为 6，求：(1) 外心 O 到重心 G 的距离；(2) 九点圆心 E 到重心 G 的距离。

解析：1. 已知 $OH = 6$。2. 根据欧拉线比例 $OH = 3OG$，得 $OG = \frac{1}{3} \times 6 = 2$。3. 根据比例 $OG : GE : EH = 2 : 1 : 3$，设 $GE = k$，则 $2k + k + 3k = 6k$。4. $6k = 6 \implies k = 1$。5. 故 $GE = 1$。

易错提醒

- **内心不在欧拉线上**：这是一个极高频的陷阱。除等腰三角形外，**内心** I 通常不在欧拉线上。
- **比例反向**：注意 H 离 G 更远，而 O 离 G 更近。常有学生记反为 $OG = 2GH$。
- **九点圆心位置**：九点圆圆心 E 永远是外心 O 与垂心 H 的中点。

结论小结

欧拉线记忆口诀：外重九垂一线牵，二一三比记心间。外心出发三倍重，九点圆心驻中间。内心顽皮不入列，除非等腰才并肩。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2.18 V17 九点圆

二级结论

结论：九点圆（费尔巴哈圆）定理对于任意 $\triangle ABC$，以下九个点共圆：

1. **三边中点**：D, E, F；
2. **三条高的垂足**：H_1, H_2, H_3；
3. **垂心与顶点连线的中点**（欧拉点）：X, Y, Z。

核心性质：

- **半径关系**：九点圆半径 $R_9 = \frac{1}{2}R$（R 为外接圆半径）；
- **圆心位置**：九点圆心 E 是外心 O 与垂心 H 的中点；
- **费尔巴哈定理**：九点圆与内切圆内切，与三个旁切圆外切。

二级结论

结论：九点圆心位置特性设 $\triangle ABC$ 的外心为 O，垂心为 H，九点圆圆心为 E，则：

1. **中点性质**：$\vec{OE} = \vec{EH} = \frac{1}{2}\vec{OH}$；
2. **坐标表示**：$E = \frac{O+H}{2}$；
3. **向量关系**：对于平面内任意一点 P，$\vec{PE} = \frac{1}{2}(\vec{PO} + \vec{PH})$；
4. **半径对应**：九点圆的圆心到九点的距离恒为 $\frac{1}{2}R$。

理解说明

深度解读：九点圆的几何逻辑

- **位似变换**：九点圆本质上是以垂心 H 为位似中心，将外接圆缩小为原来 $\frac{1}{2}$ 的产物。
- **欧拉线上的明珠**：九点圆心 E 恰好位于欧拉线的中点，平衡了外心 O 与垂心 H。
- **对称性**：由于 X, Y, Z 是垂心与顶点的中点，它们与边中点 D, E, F 构成了关于九点圆心的中心对称关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

九点圆心向量表示与半径证明：

1. **定义圆心：** 已知外心 O 与垂心 H。令 E 为 OH 中点，则 $\vec{OE} = \frac{1}{2}\vec{OH}$。
2. **计算到中点的距离：** 设 M 为 BC 中点。
$$\vec{EM} = \vec{OM} - \vec{OE} = \vec{OM} - \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$$
利用 $\vec{OB} + \vec{OC} = 2\vec{OM}$，代入得：
$$\vec{EM} = \vec{OM} - \frac{1}{2}\vec{OA} - \vec{OM} = -\frac{1}{2}\vec{OA}$$
3. **求模长：** $|\vec{EM}| = |-\frac{1}{2}\vec{OA}| = \frac{1}{2}R$。
4. **结论：** 同理可证 E 到其他中点、垂足及欧拉点的距离均为 $\frac{1}{2}R$。故这九点共圆，且半径为外接圆的一半。

证明

九点圆心位置与性质的完整证明：

1. **圆心位置的设定：** 设 $\triangle ABC$ 的外心为 O，垂心为 H。定义点 E 为线段 OH 的中点，即：
$$\vec{OE} = \frac{1}{2}\vec{OH} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$$
2. **证明 E 到边中点的距离为 $\frac{R}{2}$：** 设 BC 边中点为 M，则 $\vec{OM} = \frac{1}{2}(\vec{OB} + \vec{OC})$。考察向量 $\vec{EM}$：
$$\vec{EM} = \vec{OM} - \vec{OE} = \frac{1}{2}(\vec{OB} + \vec{OC}) - \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$$
$$\vec{EM} = -\frac{1}{2}\vec{OA}$$
由于 $|\vec{OA}| = R$（外接圆半径），故 $|\vec{EM}| = \frac{1}{2}R$。
3. **证明 E 到欧拉点的距离为 $\frac{R}{2}$：** 设 AH 的中点为 X（欧拉点），则 $\vec{OX} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OH})$。考察向量 $\vec{EX}$：
$$\vec{EX} = \vec{OX} - \vec{OE} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OH}) - \frac{1}{2}\vec{OH}$$
$$\vec{EX} = \frac{1}{2}\vec{OA}$$
同理得 $|\vec{EX}| = \frac{1}{2}R$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4. **证明 E 到垂足的距离**：设 BC 边上的垂足为 D。在直角三角形 XDM 中，XM 是九点圆的一条直径（长度为 R），根据直角三角形斜边中线定理，E 作为 XM 的中点，到直角顶点 D 的距离必然满足 $ED = \frac{1}{2}XM = \frac{1}{2}R$。

5. **结论**：综上所述，点 E 到九个特征点的距离均为 $\frac{1}{2}R$。因此，E 必为九点圆圆心，且其位置处于外心 O 与垂心 H 的中点。

典型例题

典型例题：已知 $\triangle ABC$ 的外接圆方程为 $x^2 + y^2 = 4$，垂心坐标为 $(2, 0)$。求其九点圆的圆心坐标及圆方程。

解析：1. **求外心**：由方程知外心 $O(0, 0)$，半径 $R = 2$。2. **求九点圆心**：九点圆心 E 是 OH 的中点。$x_E = \frac{0+2}{2} = 1, y_E = \frac{0+0}{2} = 0$。即 $E(1, 0)$。3. **求半径**：$R_9 = \frac{1}{2}R = \frac{1}{2} \times 2 = 1$。4. **写方程**：$(x-1)^2 + y^2 = 1$。

易错提醒

- **点数混淆**：九点圆包含的是”边中点”而非”角平分线中点”。
- **位似中心**：注意位似中心是垂心 H，而不是重心 G（虽然 G 也在欧拉线上）。
- **特殊图形**：在直角三角形中，垂足与顶点重合，边中点与欧拉点部分重合，此时九个点会”退化”为五个不同的点，但结论依然成立。

结论小结

九点圆记忆口诀：三中三足三欧拉，九点共圆传天下。半径折半外接圆，圆心中分欧拉画（OH 中点）。费尔巴哈切内旁，几何奇迹在中华。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2.19 V18 垂心高级性质

二级结论

结论：垂心的核心性质汇总 设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H，垂足三角形为 $\triangle DEF$：

1. **垂心组性质：** 在 A, B, C, H 四点中，任一点均为其余三点构成三角形的垂心；
2. **内心转化性质：** 垂心 H 是其垂足三角形 $\triangle DEF$ 的内心；
3. **旁心转化性质：** 原三角形顶点 A, B, C 分别是垂足三角形 $\triangle DEF$ 的旁心；
4. **对称点性质：** 垂心关于边的对称点、关于边中点的对称点均在 $\triangle ABC$ 的外接圆上。

理解说明

深度解读：垂心的几何" 嵌套"

- **角度的桥梁：** 垂心通过垂足三角形将原三角形的角度（A, B, C）与新三角形的角度联系起来。例如，垂足三角形的角 $\angle EDF = 180^\circ - 2A$（针对锐角三角形）。
- **共圆的密集区：** 垂心的存在伴随着大量直径为三角形边长或顶点与垂心连线的四点共圆。这是利用圆周角性质证明垂直关系的天然温床。
- **垂心组的稳定性：** 垂心组性质意味着这四个点在几何地位上是平等的，这种对称性常用于简化复杂的向量轨迹问题。

证明

核心证明：垂心与垂足三角形的关系

1. 垂心是垂足三角形内心：

- 由 $\angle AFC = \angle ADC = 90^\circ$ 知 A, F, D, C 四点共圆 $\implies \angle ADE = \angle ACF$。
- 同理 A, B, D, E 共圆 $\implies \angle ADF = \angle ABE$。
- 因 $\angle ACF = \angle ABE = 90^\circ - A$，故 $\angle ADE = \angle ADF$，AD 为角平分线。同理可证。

2. 垂心组对称性证明：

- 设 H 为 $\triangle ABC$ 垂心，则 $\vec{CH} \cdot \vec{AB} = 0, \vec{BH} \cdot \vec{AC} = 0$。
- 在 $\triangle HBC$ 中，考察 B 到对边 HC 的高，即 $\vec{AB} \cdot \vec{HC}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- $\vec{BA} \cdot \vec{HC} = \vec{BA} \cdot (\vec{AC} - \vec{AH})$。由已知垂直关系可推导其必为 0。
- 故 A, B, C 依次成为对应三角形的垂心。

典型例题

典型例题：在锐角 $\triangle ABC$ 中，H 为垂心，若 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R，求 $\triangle HBC$ 的外接圆半径 R'。

解析：1. 利用垂心组性质，A 是 $\triangle HBC$ 的垂心。2. 垂心关于边的对称点 H' 在外接圆上，故 $\triangle HBC$ 与 $\triangle H'BC$ 全等（关于 BC 对称）。3. $\triangle H'BC$ 的顶点均在原外接圆上，故其外心即为 O，半径为 R。4. **结论：**$R' = R$。注：垂心组构成的四个三角形，其外接圆半径全部相等。

易错提醒

- **锐钝角区别：**当 $\triangle ABC$ 为钝角三角形时，垂心 H 在外部。此时 H 不是垂足三角形的内心，而是其一个顶点，而钝角顶点才是垂足三角形的内心。
- **垂足位置：**在直角三角形中，垂心与直角顶点重合，此时垂足三角形退化为一条线段，上述性质需特殊处理。
- **内心混淆：**不要误认为垂心是原三角形的内心。垂心是原三角形的”高线交点”，只有在垂足三角形这个特定视角下，它才具备内心的性质。

结论小结

垂心高级性质口诀：垂心垂足是一家，内心就在高交下。顶点旁心互转换，四点对称是一家。关于边线做对称，外圆之上见其华。半径相等四圆聚，几何美感绽如花。

3 不等式

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

3.1 连不等式 N<f(x)<M 的四种等价形式

© Math & Code Lab 丨公众号：ok-shuxue 丨内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

条件

条件 1（实数大小）：

$M, N \in \mathbb{R}$ 且 $M > N$；函数 $f(x)$ 在定义域 D 上取实数值。

结论

结论一（原始形式）：

直观描述： 函数值介于两个给定实数之间。

$$N < f(x) < M$$

结论二（乘积形式）：

直观描述： 函数值减端点后乘积为负。

$$(f(x) - M)(f(x) - N) < 0$$

结论三（绝对值形式）：

直观描述： 函数值到区间中点的距离小于半长。

$$\left| f(x) - \frac{M+N}{2} \right| < \frac{M-N}{2}$$

结论四（分式形式）：

直观描述： 函数值相对于端点的比值大于零。

$$\frac{f(x) - N}{M - f(x)} > 0$$

结论五（倒数形式）：

直观描述： 函数值减下界的倒数大于差值的倒数（需正条件）。

$$\frac{1}{f(x) - N} > \frac{1}{M - N}, \quad \text{其中} f(x) - N > 0$$

推广结论（区间表示）：

直观描述： 函数值属于以中点为心、半长为半径的开区间。

$$f(x) \in \left(\frac{M+N}{2} - \frac{M-N}{2}, \frac{M+N}{2} + \frac{M-N}{2} \right)$$

等号/取等条件： 无等号成立情况，因原不等式为严格不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉

连不等式 $N < f(x) < M$ 可通过多种代数形式等价表达，每种形式在不同解题场景下有独特优势。

核心拆解

要点一（等价性）：

五个命题互为充分必要条件，从任一形式可推出其他形式。

要点二（变形技巧）：

通过移项、通分、平方等代数操作，实现形式间的转换。

要点三（条件注意）：

倒数形式需保证 $f(x) - N > 0$，否则不等式方向可能改变。

几何本质（数轴位置）

在数轴上，点 N 和 M 确定一个开区间 (N, M)。函数值 $f(x)$ 位于该区间内等价于 $f(x)$ 到区间中点 $\frac{M+N}{2}$ 的距离小于区间半长 $\frac{M-N}{2}$。

代数意义（符号分析）

乘积形式 $(f(x)-M)(f(x)-N) < 0$ 表明 $f(x)-M$ 与 $f(x)-N$ 异号，即 $f(x)$ 介于 M 和 N 之间。分式形式 $\frac{f(x)-N}{M-f(x)} > 0$ 表明分子分母同号，结合分母 $M - f(x) > 0$，推出 $f(x) - N > 0$。倒数形式利用函数 $\frac{1}{t}$ 在 $t > 0$ 时的单调递减性。

考点价值（不等式转化）

- **考法一（证明等价）：**在证明题中，需证 $N < f(x) < M$，可转化为证明乘积形式或绝对值形式，有时更易操作。
- **考法二（求解范围）：**当不等式包含参数或需解 x 时，转化为分式形式或倒数形式可能简化计算。

顿悟点

无论形式如何变化，实质都是表达 $f(x)$ 落在开区间 (N, M) 内。选择哪种形式取决于当前问题的最简路径。

使用场景

- **场景一（证明题）：**需要证明函数值满足连不等式时，优先考虑乘积形式或绝对值形式进行变形。
- **场景二（求解题）：**给定连不等式求定义域或值域时，可尝试分式形式或倒数形式分离变量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

从几何意义入手：$f(x)$ 在数轴上介于 N 和 M 之间。代数上，通过移项、乘除、配方等基本操作，可导出各种等价形式。注意每一步的可逆性。

正式推导

步骤一（乘积形式）：

由 $N < f(x) < M$ 出发。

$$N < f(x) < M \quad \Rightarrow \quad f(x) - N > 0 \text{ 且 } f(x) - M < 0$$

理由： 将不等式拆分为两个部分，分别移项。由于 $f(x) - N > 0$ 和 $f(x) - M < 0$，两者异号，乘积为负。

$$(f(x) - M)(f(x) - N) < 0$$

反之，若 $(f(x) - M)(f(x) - N) < 0$，则 $f(x) - M$ 与 $f(x) - N$ 异号。结合 $M > N$，可推出 $f(x) - M < 0$ 且 $f(x) - N > 0$，即 $N < f(x) < M$。故等价。

步骤二（绝对值形式）：

从乘积形式配方。

$$(f(x) - M)(f(x) - N) = \left(f(x) - \frac{M+N}{2}\right)^2 - \left(\frac{M-N}{2}\right)^2$$

理由： 直接展开并配方。由于 $(f(x) - M)(f(x) - N) < 0$，代入得

$$\left(f(x) - \frac{M+N}{2}\right)^2 - \left(\frac{M-N}{2}\right)^2 < 0$$

移项后即

$$\left|f(x) - \frac{M+N}{2}\right| < \frac{M-N}{2}$$

反之，从绝对值形式可反向推导至乘积形式，故等价。

步骤三（分式形式）：

由 $N < f(x) < M$ 直接构造。

$$N < f(x) < M \quad \Rightarrow \quad f(x) - N > 0 \text{ 且 } M - f(x) > 0$$

理由： 由于 $f(x) - N > 0$ 和 $M - f(x) > 0$，两者均为正，比值大于零。

$$\frac{f(x) - N}{M - f(x)} > 0$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

反之，若 $\frac{f(x)-N}{M-f(x)} > 0$，则分子分母同号。但 $M - f(x) > 0$ 必成立（否则分母非正时不等式可能不成立），故 $f(x) - N > 0$，结合 $M - f(x) > 0$ 得 $N < f(x) < M$。故等价。

步骤四（倒数形式）：

在 $f(x) - N > 0$ 条件下，从分式形式变形。

$$\frac{f(x) - N}{M - f(x)} > 0 \quad \text{且} \quad f(x) - N > 0$$

理由：由分式形式，分子分母同正，故 $M - f(x) > 0$。取倒数，注意正数倒数保持不等号方向。但更直接地，从 $N < f(x) < M$ 有 $0 < f(x) - N < M - N$。由于函数 $\frac{1}{t}$ 在 $t > 0$ 时递减，所以

$$\frac{1}{f(x) - N} > \frac{1}{M - N}$$

反之，若 $\frac{1}{f(x)-N} > \frac{1}{M-N}$ 且 $f(x) - N > 0$，则由于 $\frac{1}{t}$ 递减，有 $f(x) - N < M - N$，即 $f(x) < M$。结合 $f(x) - N > 0$ 得 $N < f(x) < M$。故在条件下等价。

结论回扣

综上所述，在条件 $M > N$ 下，五个命题彼此等价。在实际应用中，可根据问题特点选择最方便的形式进行推导或求解。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $f(x) = 3x - 2$，解不等式 $1 < f(x) < 7$。

解题步骤：

第一步（写出原始）：

$1 < 3x - 2 < 7$。

理由：将 $f(x)$ 代入不等式。

第二步（乘积形式）：

转化为乘积形式 $(3x - 2 - 7)(3x - 2 - 1) < 0$。

理由：令 $M = 7, N = 1$，则乘积形式为 $(f(x) - M)(f(x) - N) < 0$。

$$(3x - 9)(3x - 3) < 0$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（解不等式）：

化简并解二次不等式。

$$9(x-3)(x-1)<0 \quad \Rightarrow \quad (x-3)(x-1)<0$$

理由： 除以正数 9 不等号方向不变。解得 $1<x<3$。

第四步（回代验证）：

将解集代回原始不等式验证。

理由： 确保解的正确性。当 $1<x<3$ 时，$3x-2$ 确实介于 1 和 7 之间。

关键结论： **不等式 $1<3x-2<7$ 的解集为 $x\in(1,3)$。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $f(x)=x^2+1$，已知 $2<f(x)<10$，求 x 的取值范围。

解题步骤：

第一步（绝对值形式）：

将不等式转化为绝对值形式。

理由： 令 $M=10, N=2$，则中点 $C=\frac{10+2}{2}=6$，半长 $R=\frac{10-2}{2}=4$。绝对值形式为

$$|f(x)-6|<4$$

即 $|x^2+1-6|<4$。

第二步（化简绝对值）：

化简得 $|x^2-5|<4$。

理由： 计算 $f(x)-6=x^2+1-6=x^2-5$。

第三步（解绝对值不等式）：

解 $|x^2-5|<4$。

$$-4<x^2-5<4 \quad \Rightarrow \quad 1<x^2<9$$

理由： 绝对值不等式等价于连不等式。分别解 $x^2>1$ 和 $x^2<9$。

第四步（求 x 范围）：

由 $1<x^2<9$，得 $x^2<9$ 且 $x^2>1$，所以 $x\in(-3,-1)\cup(1,3)$。

理由： $x^2<9$ 推出 $-3<x<3$，$x^2>1$ 推出 $x<-1$ 或 $x>1$，取交集。

关键结论： **满足 $2<x^2+1<10$ 的 x 取值范围为 $(-3,-1)\cup(1,3)$。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略条件）：

使用倒数形式 $\frac{1}{f(x)-N} > \frac{1}{M-N}$ 时，未检查 $f(x)-N>0$ 是否成立。

正确理解（条件先行）：

倒数形式仅在 $f(x)-N>0$ 的条件下与原始不等式等价；否则需另行讨论。

错因分析（单调性误用）：

函数 $\frac{1}{t}$ 在 $t>0$ 时递减，但在 $t<0$ 时性质不同，直接应用可能导致不等号方向错误。

易错点二（大小关系）：

在乘积形式 $(f(x)-M)(f(x)-N)<0$ 中，认为 $f(x)$ 一定在 M 和 N 之间，但未明确 M 与 N 的大小。

正确理解（顺序重要）：

当 $M>N$ 时，乘积为负等价于 $N<f(x)<M$；若 $M<N$，则等价于 $M<f(x)<N$。

错因分析（默认顺序）：

惯性思维认为 M 和 N 已按大小排列，但题目可能未明确，需先比较 M 和 N。

易错点三（半长计算）：

在绝对值形式中，将半长误写为 $\frac{M+N}{2}$ 或 $\left|\frac{M-N}{2}\right|$ 而未简化。

正确理解（正半长）：

由于 $M>N$，半长 $\frac{M-N}{2}>0$，无需加绝对值；中点 $\frac{M+N}{2}$ 为实数。

错因分析（符号混淆）：

对绝对值概念和区间几何意义理解不透，导致公式记忆错误。

结论小结

一句话核心

连不等式 $N<f(x)<M$ 可等价转化为乘积、绝对值、分式、倒数四种形式，本质是函数值落在开区间内。

使用条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 1（实数大小）：** M 和 N 为实数，且满足 $M > N$。
- **条件 2（函数实值）：** 函数 $f(x)$ 在相关定义域上取实数值。

关键提醒

- **易错点（倒数条件）：** 使用倒数形式时，务必先确保 $f(x) - N > 0$，否则结论不成立。
- **检查项（形式适用）：** 在证明题中优先考虑乘积或绝对值形式；在求解题中可尝试分式或倒数形式简化计算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.2 基本不等式及其变形

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

a, b 均为正实数。

条件 2（任意实数）：

a, b 为任意实数（仅适用于第 4 条）。

结论

结论一（算术-几何平均）：

直观描述： 两正数之和不小于其几何平均数两倍。

$$a + b \geq 2\sqrt{ab}$$

结论二（积与和平方）：

直观描述： 两正数积不超过其算术平均平方。

$$ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$

结论三（平方和与和平方）：

直观描述： 两正数平方和不小于其和平方的一半。

$$a^2 + b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2}$$

推广结论（平方和与积）：

直观描述： 任意实数平方和不小于其积两倍。

$$a^2 + b^2 \geq 2ab$$

等号/取等条件： 当且仅当 $a = b$ 时，上述所有不等式等号成立。

理解说明

一句话直觉 两个量（正数或任意实数）之间的大小关系，其本质是“平方非负”这一简单事实的多种代数包装。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（平方差非负）：

最根本的来源是 $(a-b)^2 \geq 0$，展开即得 $a^2+b^2 \geq 2ab$。

要点二（均值转化）：

利用代换（如令 $x=\sqrt{a}, y=\sqrt{b}$）可将平方和形式转化为算术-几何平均形式。

要点三（等价变形）：

各不等式可通过代数运算（如移项、平方、配方）互相推导，本质相同。

几何本质（矩形与正方形） 以 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ 为例：周长固定的矩形中，正方形的面积最大。更一般地，平方和与积的关系反映了图形边长固定时，形状越“正”，其度量（如面积、平方和）越优。

代数意义（配方法） 不等式 $a^2+b^2 \geq 2ab$ 等价于 $(a-b)^2 \geq 0$，这揭示了所有证明的起点：一个实数的平方非负。这是不等式证明最基础的配方法思想。

考点价值（最值与证明）

- **考法一（最值求解）**：用于求解在给定约束（如和为定值、积为定值）下的最值（最大或最小）问题。
- **考法二（不等式证明）**：作为证明链中的关键一步，用于放缩或建立不等关系，常见于综合证明题。

顿悟点 **“一正二定三相等”**是使用基本不等式求最值的口诀，分别对应“正数条件”、“和或积为定值”、“等号成立条件”，缺一不可。

使用场景

- **场景一（直接套用）**：题目中表达式明显符合 $x+y$ 与 $\sqrt{xy}$ 或 x^2+y^2 与 xy 的关系。
- **场景二（变形后使用）**：通过常数代换、分母有理化、拆项、凑项等手段，将表达式化为可使用基本不等式的形式。

证明

思路提示 所有证明的起点都是“实数的平方非负”这一基本事实，即 $(a-b)^2 \geq 0$。由此出发，通过简单的代数变形（如开方、配方、替换）即可得到各种形式。关键是在变形过程中保持等价性，并指明每一步的依据。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（平方差非负）：

$$(a-b)^2 \geq 0$$

理由：任何实数的平方都非负。这是整个不等式体系的基石。

步骤二（展开得基础式）：

$$a^2 - 2ab + b^2 \geq 0$$

理由：将平方项展开。然后移项得到 $a^2+b^2 \geq 2ab$，这是对任意实数 a, b 都成立的原始不等式。

步骤三（特化到正实数）：

当 $a, b > 0$ 时，令 $x = \sqrt{a}, y = \sqrt{b}$，则 x, y 也为正实数。将 x, y 代入 $a^2+b^2 \geq 2ab$ 得

$$(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2 \geq 2(\sqrt{a})(\sqrt{b}) \quad \Rightarrow \quad a+b \geq 2\sqrt{ab}.$$

理由：通过代换，将平方和与积的关系转化为算术平均数与几何平均数的关系。

步骤四（变形得其他形式）：

由 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$，两边平方（注意正数条件保证不等号方向不变）得

$$(a+b)^2 \geq 4ab \quad \Rightarrow \quad ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2.$$

另外，由 $a^2+b^2 \geq 2ab$，将 $2ab$ 移至左边并配方，有

$$a^2+b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2}.$$

具体过程：因为 $(a+b)^2 = a^2+b^2+2ab$，结合 $a^2+b^2 \geq 2ab$，可得

$$a^2+b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2}.$$

理由：这些都是等价的代数变形，注意平方操作要求两边非负。

结论回扣 **综上，所有不等式都源于 $(a-b)^2 \geq 0$，并通过合法代数变形得到。等号成立当且仅当 $a=b$，此时平方差为零，各不等式同时取到等号。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x > 0$，求函数 $y = x + \dfrac{9}{x}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（判断正数）：

由于 $x > 0$，则 $\dfrac{9}{x} > 0$，满足“一正”。

理由： 基本不等式 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ 要求 a, b 均为正数。

第二步（套用公式）：

直接应用算术-几何平均不等式：

$$y = x + \frac{9}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{9}{x}} = 2\sqrt{9} = 6.$$

理由： 这里 $a = x$，$b = \frac{9}{x}$，且 $ab = x \cdot \frac{9}{x} = 9$ 为定值，满足“二定”。

第三步（验证取等）：

等号成立当 $x = \dfrac{9}{x}$，即 $x^2 = 9$，解得 $x = 3$（舍去负值）。

理由： 检查“三相等”，确保最小值可以取到。

关键结论： 当 $x = 3$ 时，$y_{\min} = 6$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a, b > 0$ 且 $a + b = 1$，求证：$\left(a + \dfrac{1}{a}\right)\left(b + \dfrac{1}{b}\right) \geq \dfrac{25}{4}$。

解题步骤：

第一步（展开化简）：

左边展开：

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)\left(b + \frac{1}{b}\right) = ab + \frac{a}{b} + \frac{b}{a} + \frac{1}{ab}.$$

理由： 多项式乘法。

第二步（利用条件放缩）：

由 $a + b = 1$ 和 $a, b > 0$，根据 $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$，得 $\frac{1}{ab} \geq 4$。又由 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2\sqrt{\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a}} = 2$（应用 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ 的变形）。

理由： 分别对乘积项 ab 和倒数项 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ 应用基本不等式或其变形。

第三步（代入求下界）：

将 $ab \leq \frac{1}{4}$ 代入 $ab + \frac{1}{ab}$，但注意 $ab + \frac{1}{ab}$ 在 $(0, \frac{1}{4}]$ 上单调递减，故当 $ab = \frac{1}{4}$ 时

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

取得最小值。同时 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\geq 2$。因此

$$\text{原式} \geq \left(\frac{1}{4}+4\right)+2=\frac{1}{4}+4+2=\frac{25}{4}.$$

理由：将各部分的极小值组合，得到整体的下界。

关键结论： **不等式得证，且等号当 $a=b=\frac{1}{2}$ 时成立。**

易错提醒

易错点一（忽视正数条件）

直接对负数或可能为负的变量使用 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$。

正确理解（正数前提）：

公式 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$ 和 $ab\leq((a+b)/2)^2$ 仅当 $a,b\geq 0$ 时成立。

错因分析（根式无意义）：

若 a,b 为负，$\sqrt{ab}$ 可能无实数意义；即使有意义（如两负相乘为正），算术-几何平均不等式也不一定成立。

易错点二（忽略取等条件）

求出最值后，不验证等号是否能成立，导致最值不可达。

正确理解（同时性检验）：

基本不等式等号成立当且仅当 $a=b$。在复杂表达式中，需检查此条件是否能在约束下同时满足。

错因分析（过程与结果脱节）：

推导过程中可能多次使用不等式，若等号成立条件不一致，则最终等号可能无法同时取到，所求“最值”仅为下界而非实际最值。

易错点三（混淆公式范围）

认为 $a^2+b^2\geq 2ab$ 也要求 a,b 为正数。

正确理解（实数范围成立）：

$a^2+b^2\geq 2ab$ 由 $(a-b)^2\geq 0$ 推出，对任意实数 a,b 都成立。

错因分析（记忆混淆）：

将不同形式基本不等式的适用条件记混，未区分“算术-几何平均”与“平方和与积”两种形式的前提差异。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 基本不等式及其变形是处理非负量（或实数）间大小关系的基础工具，核心思想源于“平方非负”。

使用条件

- **条件 1（正数条件）：** $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ 和 $ab \leq ((a+b)/2)^2$ 仅适用于 $a, b \geq 0$。
- **条件 2（定值条件）：** 用于求最值时，通常要求和（$a+b$）或积（ab）其中之一为定值。

关键提醒

- **易错点（取等验证）：** 每次应用后，必须检查等号 $a=b$ 是否能在给定条件下成立。
- **检查项（公式选择）：** 根据变量是正数还是任意实数，选择合适的公式形式（算术-几何平均或平方和与积）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.3 糖水不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

$a, b, m \in \mathbb{R}^+$（均为正实数）。

条件 2（大小关系）：

$a < b$。

条件 3（减糖前提）：

对于减糖原理，需额外满足 $b > m$。

结论

结论一（加糖原理）：

直观描述： 分子分母同加正数，分式值增大。

$$\frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m}$$

结论二（减糖原理）：

直观描述： 分子分母同减正数，分式值减小。

$$\frac{a}{b} > \frac{a-m}{b-m}$$

推广结论（倒数形式）：

直观描述： 原分式倒数大于加糖后倒数。

$$\frac{b}{a} > \frac{b+m}{a+m}$$

理解说明

一句话直觉 当糖水浓度较低时，加入更多糖会变甜；同理，从较淡糖水中取出糖会变淡。

核心拆解

要点一（加糖变甜）：

分子分母同时加上同一个正数，分式值变大，相当于糖水变甜。

要点二（减糖变淡）：

分子分母同时减去同一个正数（且分母大于减数），分式值变小，相当于糖

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

水变淡。

几何本质（单调函数） 考虑函数 $f(x)=\frac{a+x}{b+x}$，其中 $a<b$。该函数在 $x>0$ 时单调递增，因此加糖（$x=m>0$）使函数值增大，减糖（$x=-m$ 且 $b>m$）使函数值减小。

代数意义（差值比较） 通过通分比较差值：$\frac{a+m}{b+m}-\frac{a}{b}=\frac{m(b-a)}{b(b+m)}>0$，因为 $b>a>0$ 且 $m>0$，从而证明加糖原理。类似可证减糖原理。

考点价值（分式比较）

- **考法一（直接应用）**：直接比较两个分数大小，如判断 $\frac{3}{5}$ 与 $\frac{4}{7}$ 的大小。
- **考法二（变形证明）**：结合其他不等式进行综合证明，或用于放缩求范围。

顿悟点 **糖水不等式的核心在于原分式是否小于 1**：当 $\frac{a}{b}<1$ 时，加糖使值趋近 1，减糖使值远离 1；反之若 $\frac{a}{b}>1$，结论反向。但这里 $a<b$ 保证原分式小于 1。

使用场景

- **场景一（分数比较）**：需要快速比较两个分数，无需通分直接应用。
- **场景二（不等式放缩）**：在证明链中作为中间步骤，进行分式放大或缩小。

证明

思路提示 通过作差法比较两个分式的大小，利用条件 $a<b$ 和 $m>0$ 判断差值的正负。

正式推导

步骤一（写出差值）：

计算加糖前后分式的差值。

$$\Delta=\frac{a+m}{b+m}-\frac{a}{b}$$

理由：要证明 $\frac{a}{b}<\frac{a+m}{b+m}$，只需证 $\Delta>0$。

步骤二（通分合并）：

将差值通分为一个分式。

$$\begin{aligned}\Delta&=\frac{(a+m)b-a(b+m)}{b(b+m)}\\&=\frac{ab+bm-ab-am}{b(b+m)}\\&=\frac{m(b-a)}{b(b+m)}\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：通分后合并同类项，简化分子。

步骤三（判断符号）：

分析分子分母的符号。

$$\text{由于} a, b, m > 0 \text{ 且} a < b, \text{ 有} b - a > 0.$$

理由：因此分子 $m(b-a) > 0$，分母 $b(b+m) > 0$，所以 $\Delta > 0$。

步骤四（得证加糖）：

由 $\Delta > 0$ 推出原不等式。

$$\frac{a+m}{b+m} - \frac{a}{b} > 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m}$$

理由：差值正意味着加糖后分式更大。

步骤五（减糖原理）：

类似地，考虑减糖情形。

$$\Delta' = \frac{a}{b} - \frac{a-m}{b-m} = \frac{m(b-a)}{b(b-m)}$$

理由：此时需 $b > m > 0$ 保证分母为正，且 $b - a > 0$，故 $\Delta' > 0$，即 $\frac{a}{b} > \frac{a-m}{b-m}$。

步骤六（倒数形式）：

由加糖原理直接推导倒数形式。

$$\frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m} \quad \Rightarrow \quad \frac{b}{a} > \frac{b+m}{a+m}$$

理由：不等式两边取倒数，不等号反向，因为所有数为正。

结论回扣 **因此，在给定条件下，糖水不等式的三个结论均成立。**证明过程突出了作差法和符号分析，确保每一步都可追溯。

典型例题

例 1（基础）

题目： 比较 $\frac{3}{8}$ 与 $\frac{5}{10}$ 的大小，不直接计算分母。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（识别结构）：

注意到 $\frac{5}{10}$ 可视为 $\frac{3+2}{8+2}$。

理由： 分子分母同时加了 $m=2$，符合加糖原理条件。

第二步（应用加糖）：

根据加糖原理，由于 $3<8$ 且 $2>0$，有

$$\frac{3}{8}<\frac{3+2}{8+2}=\frac{5}{10}$$

理由： 直接代入糖水不等式结论一。

第三步（得出结论）：

因此，$\frac{3}{8}<\frac{5}{10}$。

理由： 无需通分计算，直接由不等式得到结果。

关键结论： **加糖原理允许快速比较分数，避免繁琐通分。**

例 2（稍变形）

题目： 已知 $0<x<y$，证明 $\frac{y}{x}>\frac{y+1}{x+1}$。

解题步骤：

第一步（倒数转换）：

考虑原不等式的倒数形式。

理由： 目标式形如糖水不等式的推广结论，但变量顺序需调整。

第二步（应用加糖）：

由 $0<x<y$，令 $a=x, b=y, m=1$，则 $a<b$ 且 $m>0$，根据加糖原理：

$$\frac{x}{y}<\frac{x+1}{y+1}$$

理由： 直接代入结论一，注意这里 $\frac{x}{y}<1$。

第三步（取倒数）：

对上述不等式两边取倒数，不等号反向。

$$\frac{y}{x}>\frac{y+1}{x+1}$$

理由： 由于 $x, y, x+1, y+1$ 均为正，取倒数保持不等号反向。

关键结论： **通过倒数转换，将问题化归为标准糖水不等式，简化证明。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略正数条件）

误以为 a, b, m 可为任意实数，直接应用结论。

正确理解（全为正数）：

必须保证 $a, b, m \in \mathbb{R}^+$，即所有变量为正实数。

错因分析（符号反转）：

若 m 为负数或变量为负，通分后差值符号可能改变，导致不等式方向错误。

易错点二（减糖前提遗漏）

应用减糖原理时，忽略 $b > m$ 的条件。

正确理解（分母大于减数）：

减糖原理要求 $b > m$，否则分母 $b - m$ 可能非正，分式无意义或不等号不成立。

错因分析（分母符号）：

若 $b \leq m$，则 $b - m \leq 0$，分式值可能为负或无穷，无法直接比较。

易错点三（倒数形式混淆）

错误地认为 $\frac{b}{a} > \frac{b+m}{a+m}$ 与加糖原理无关，导致记忆负担。

正确理解（逻辑推导）：

倒数形式是加糖原理的直接推论，可通过取倒数得到，无需单独记忆。

错因分析（机械记忆）：

死记硬背多个公式，未理解其内在联系，在变形时容易出错。

结论小结

一句话核心 **糖水不等式描述了分式分子分母同加减同数时，分式值的变化规律：加糖增大，减糖减小。**

使用条件

- **条件 1（全为正数）：** $a, b, m > 0$。
- **条件 2（原式小于 1）：** $a < b$（保证原分式 $\frac{a}{b} < 1$）。
- **条件 3（减糖额外）：** 应用减糖时需 $b > m$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（符号检查）**：务必先检查所有变量为正，否则结论可能失效。
- **检查项（倒数关联）**：推广结论可由加糖原理取倒数导出，减少记忆量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.4 三项立方和不等式

二级结论

条件

条件 1（变量范围）：

a, b, c 为非负实数。

结论

结论一（立方和不等式）：

直观描述： 三项立方和不小于三倍乘积。

$$a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$$

推广结论（因式分解）：

直观描述： 不等式等价于平方和非负。

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = \frac{1}{2}(a+b+c)\left[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\right] \geq 0$$

等号/取等条件： 当且仅当 $a = b = c$。

理解说明

一句话直觉

对于非负实数，三项立方之和不小于它们乘积的三倍，当且仅当三者相等时取等。

核心拆解

要点一（对称结构）：

不等式关于 a, b, c 对称，轮换不变。

要点二（非负保障）：

因式分解后，平方和与非负因子保证不等式成立。

几何本质（体积比较）

在几何中，立方项可能对应于体积，但这里更直接的是代数比较，体现均值不等式的思想。

代数意义（平方和形式）

不等式等价于 $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ 可分解为半和与平方和的乘积，从而显式非负。

考点价值（不等式证明）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（直接应用）**：在证明题中直接使用该结论简化。
- **考法二（最值求解）**：结合取等条件求最值或范围。

顿悟点

当问题中出现对称的立方和与乘积时，优先考虑此不等式。

使用场景

- **场景一（对称不等式）**：证明其他对称不等式时的中间步骤。
- **场景二（优化问题）**：在约束条件下求表达式的最值。

证明

思路提示

通过因式分解将不等式左边减去右边，化为平方和形式，利用非负性证明。

正式推导

步骤一（构造差值）：

考虑差值 $D = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$。

$$D = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$$

理由：将不等式转化为证明 $D \geq 0$。

步骤二（因式分解）：

利用恒等式分解 D。

$$D = \frac{1}{2}(a+b+c)\left[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\right]$$

理由：这是立方和差的标准因式分解，可通过展开验证。

步骤三（分析符号）：

分析因式中各部分的符号。

$$a+b+c \geq 0, \quad (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \geq 0$$

理由：由于 a, b, c 为非负实数，所以 $a+b+c \geq 0$；平方和总是非负。

步骤四（得出结论）：

因此 $D \geq 0$，即原不等式成立。

$$D \geq 0 \Rightarrow a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$$

理由：非负因子乘积非负。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣

所以对于任意非负实数 a, b, c，有 $a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$，等号当且仅当 $a = b = c$ 时成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 取 $a = 1, b = 2, c = 3$，验证不等式 $a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$ 成立。

解题步骤：

第一步（代入数值）：

将具体值代入左边和右边。

$$a^3 + b^3 + c^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3, \quad 3abc = 3 \times 1 \times 2 \times 3$$

理由： 直接计算各立方项和乘积。

第二步（计算数值）：

分别计算数值。

$$1^3 + 2^3 + 3^3 = 1 + 8 + 27 = 36, \quad 3 \times 1 \times 2 \times 3 = 18$$

理由： 执行算术运算。

第三步（比较大小）：

比较两个结果。

$$36 \geq 18$$

理由： 由于 36 大于 18，不等式成立。

关键结论： **对于这些具体值，不等式成立，符合一般结论。**

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a, b, c > 0$ 且 $abc = 1$，证明 $a^3 + b^3 + c^3 \geq 3$。

解题步骤：

第一步（应用条件）：

由 $abc = 1$，得 $3abc = 3$。

$$3abc = 3 \times 1 = 3$$

理由： 将乘积条件转化为常数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（使用不等式）：

根据原不等式，有 $a^3+b^3+c^3 \geq 3abc$。

$$a^3+b^3+c^3 \geq 3abc$$

理由：直接应用三项立方和不等式。

第三步（代入结论）：

将 $3abc=3$ 代入不等式。

$$a^3+b^3+c^3 \geq 3$$

理由：结合前两步即得所求。

关键结论：在 $abc=1$ 的条件下，$a^3+b^3+c^3$ 的最小值为 3，当且仅当 $a=b=c=1$ 时取到。

易错提醒

易错点一（忽略非负条件）

认为不等式对所有实数 a,b,c 都成立。

正确理解（变量范围）：

不等式仅对非负实数成立，负数时可能反向。

错因分析（符号影响）：

当 a,b,c 为负时，因式分解中 $a+b+c$ 可能为负，导致不等式不成立。

易错点二（取等误解）

认为只要有两个变量相等即可取等号。

正确理解（全等条件）：

等号成立当且仅当 $a=b=c$，三者全相等。

错因分析（对称性误解）：

由于不等式对称，但取等要求平方和为零，必须所有差为零。

易错点三（错误推广）

将不等式推广到 $a^4+b^4+c^4 \geq 3abc$ 或其他幂次。

正确理解（幂次特定）：

该不等式只针对三次方成立，高次需另证。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（形式混淆）：

不同幂次的不等式结构不同，不能直接类比。

结论小结

一句话核心

对于非负实数 a, b, c，有 $a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$，等号当且仅当 $a = b = c$。

使用条件

- **条件 1（非负实数）：** $a, b, c \geq 0$。
- **条件 2（对称结构）：** 表达式为对称立方和与乘积。

关键提醒

- **易错点（符号忽视）：** 使用前务必检查变量是否非负。
- **检查项（取等验证）：** 最值问题中验证等号能否达到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.5 柯西不等式

二级结论

条件

条件 1（实数序列）：

设 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \ldots, b_n$ 是两个实数序列。

结论

结论一（一般形式）：

直观描述： 平方和的乘积不小于乘积和的平方。

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2.$$

推广结论（常见特例）：

直观描述： 二维、三维及向量形式是常用的特例。

$$(a^2+b^2)(c^2+d^2) \geq (ac+bd)^2, \quad (a_1^2+a_2^2+a_3^2)(b_1^2+b_2^2+b_3^2) \geq (a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3)^2.$$

向量形式：$|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 \geq (\vec{a}\cdot\vec{b})^2$。

等号/取等条件： 当且仅当序列 (a_i) 与 (b_i) 成比例，即存在不全为零的实数 λ, μ 使得 $\lambda a_i + \mu b_i = 0$ 对所有 i 成立。

理解说明

一句话直觉

两个序列对应项乘积之和的平方，不会超过各自平方和之积。

核心拆解

要点一（平方和乘积）：

左边是两序列平方和的乘积，体现整体“能量”。

要点二（乘积和平方）：

右边是两序列对应项乘积之和的平方，体现“协同”效应。

几何本质（向量夹角）

若将序列视为向量 $\vec{a} = (a_1, \ldots, a_n), \vec{b} = (b_1, \ldots, b_n)$，则不等式等价于 $(\vec{a}\cdot\vec{b})^2 \leq |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2$，即 $|\cos\theta| \leq 1$，其中 θ 为两向量夹角。

代数意义（判别式非负）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考虑关于 t 的二次函数 $f(t)=\sum(a_it+b_i)^2$，展开后判别式 $\Delta\le 0$，即得不等式。

考点价值（证明与求最值）

- **考法一（证明不等式）**：直接用于证明平方和类不等式。
- **考法二（求解极值）**：通过配凑构造，求含有平方和与乘积和的式子的最值。

顿悟点

柯西不等式本质上是“算术-几何”关系的高维推广：它限制了“混合积”与“纯量积”之间的比例范围。

使用场景

- **场景一（证明平方和不等式）**：当待证不等式可化为两序列平方和乘积与乘积和平方的形式时。
- **场景二（条件极值问题）**：在给定线性约束下，求平方和的最值。

证明

思路提示

构造一个关于 t 的二次函数 $f(t)=\sum_{i=1}^n(a_it+b_i)^2$，由于平方和非负，故判别式 $\Delta\le 0$，由此推出不等式。

正式推导

步骤一（构造函数）：

令

$$f(t)=\sum_{i=1}^n(a_it+b_i)^2\ge 0\quad(\text{对所有实数}t)\square$$

理由：每个 $(a_it+b_i)^2\ge 0$，故和也非负。

步骤二（展开整理）：

将 $f(t)$ 展开：

$$f(t)=\sum_{i=1}^n(a_i^2t^2+2a_ib_it+b_i^2)=\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)t^2+2\left(\sum_{i=1}^n a_ib_i\right)t+\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right).$$

理由：按完全平方公式展开，并利用求和线性性质。

步骤三（判别式非负）：

因为 $f(t)\ge 0$ 对所有 t 成立，所以二次方程 $f(t)=0$ 的判别式 $\Delta\le 0$：

$$\Delta=\left[2\sum_{i=1}^n a_ib_i\right]^2-4\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right)\le 0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：二次函数 $At^2 + Bt + C \geq 0$ 恒成立，则 $A > 0$ 且 $\Delta \leq 0$。这里 $A = \sum a_i^2 \geq 0$，若 $A = 0$ 则不等式显然成立，故不妨设 $A > 0$。

步骤四（导出不等式）：

由 $\Delta \leq 0$ 直接得到

$$4\left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 - 4\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \leq 0,$$

即

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right).$$

理由：移项并除以正数 4 即得。

步骤五（取等条件）：

等号成立当且仅当 $f(t) = 0$ 有唯一实根，即存在 t_0 使 $a_i t_0 + b_i = 0$ 对所有 i 成立，亦即序列 (a_i) 与 (b_i) 成比例。

理由：$\Delta = 0$ 时方程有重根 t_0，此时 $a_i t_0 + b_i = 0$，即 a_i 与 b_i 成比例。

结论回扣

因此，柯西不等式得证，且等号成立当且仅当两序列成比例。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知实数 a, b, c, d，求证：$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2$。

解题步骤：

第一步（识别序列）：

将不等式左边视为两个序列的平方和乘积：序列一为 (a, b)，序列二为 (c, d)。

理由：柯西不等式要求两个序列，这里恰好对应。

第二步（直接应用）：

由柯西不等式（$n = 2$ 情形）：

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2.$$

理由：直接代入，左边平方和乘积，右边对应项乘积和的平方。

第三步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$（当 c, d 不全为零时），即 $ad = bc$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：两序列成比例，即存在 λ 使 $(a,b)=\lambda(c,d)$。

关键结论： **二维形式的柯西不等式直接得证，无需额外计算。**

例 2（稍变形）

题目： 已知正实数 x,y,z 满足 $x+y+z=1$，求 $x^2+y^2+z^2$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（构造序列）：

考虑两个序列：(x,y,z) 和 $(1,1,1)$。

理由：欲求 $x^2+y^2+z^2$，而条件为 $x+y+z=1$，联想到柯西不等式左边为平方和与另一序列平方和的乘积。

第二步（应用柯西）：

由柯西不等式：

$$(x^2+y^2+z^2)(1^2+1^2+1^2)\geq(x\cdot1+y\cdot1+z\cdot1)^2=(x+y+z)^2=1^2=1.$$

理由：将不等式写成柯西形式：左边为 $\sum a_i^2\cdot\sum b_i^2$，右边为 $(\sum a_ib_i)^2$。

第三步（解出最值）：

由上式得

$$3(x^2+y^2+z^2)\geq1\quad\Rightarrow\quad x^2+y^2+z^2\geq\frac{1}{3}.$$

理由：移项即可得到平方和的下界。

第四步（验证取等）：

等号成立当且仅当 $\frac{x}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z}{1}$，即 $x=y=z$，结合 $x+y+z=1$ 得 $x=y=z=\frac{1}{3}$。

理由：序列成比例，且满足条件，故最小值可达。

关键结论： **当 $x=y=z=\frac{1}{3}$ 时，$x^2+y^2+z^2$ 取得最小值 $\frac{1}{3}$。**

易错提醒

易错点一（忽略取等条件）

使用柯西不等式时，只写出不等式形式，不检查等号是否成立。

正确理解（成比例才取等）：

等号成立当且仅当两个序列成比例，即 a_i/b_i 为常数（b_i 不全为零）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（记忆不完整）：

只记住了不等式的主体，忽略了取等条件，导致求最值时误判最值点。

易错点二（结构误配）

错误地将两个序列的项配对，例如将 (a_1, a_2) 与 (b_2, b_1) 配对，导致右边不是对应项乘积和。

正确理解（对应项相乘）：

右边必须是同一下标项的乘积之和 $\sum a_i b_i$，不能随意交换顺序。

错因分析（形式混淆）：

与排序不等式等其他不等式混淆，未理解“对应项”的含义。

易错点三（向量形式记反）

误将向量形式的柯西不等式记为 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \geq |\vec{a}||\vec{b}|$。

正确理解（内积不大于模积）：

正确的形式是 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}|$，即内积的绝对值不超过模的乘积。

错因分析（直观错觉）：

误以为点积越大越好，而忽略了夹角余弦的绝对值不大于 1。

结论小结

一句话核心

平方和的乘积不小于乘积和的平方。

使用条件

- **条件 1（实数序列）**：涉及两个实数序列，且序列长度相同。
- **条件 2（平方和存在）**：序列的平方和有限（通常为有限项）。

关键提醒

- **易错点（取等条件）**：等号成立仅当两序列成比例，检查是否满足比例关系。
- **检查项（结构匹配）**：应用时确保右边是同一下标对应项乘积之和的平方。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.6 权方和不等式

二级结论

条件

条件 1（实数变量）：

$a_i \in \mathbb{R}$（$i = 1, 2, \ldots, n$）为任意实数。

条件 2（正分母）：

$b_i > 0$（$i = 1, 2, \ldots, n$）为正实数。

条件 3（指数范围）：

实数 $m \geq 1$。

结论

结论一（二维形式）：

直观描述： 两个分式平方和大于等于和的平方除以分母和。

$$\frac{a_1^2}{b_1} + \frac{a_2^2}{b_2} \geq \frac{(a_1 + a_2)^2}{b_1 + b_2}$$

结论二（一般形式）：

直观描述： n 个分式平方和大于等于总和的平方除以分母总和。

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i^2}{b_i} \geq \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{n} b_i}$$

推广结论（m 次形式）：

直观描述： 将平方推广到 m 次方，分母指数为 m-1。

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i^m}{b_i^{m-1}} \geq \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^m}{\left(\sum_{i=1}^{n} b_i\right)^{m-1}}$$

等号/取等条件： 当且仅当 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n}$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉

权方和不等式将分式的平方和与总和的平方联系起来，是柯西-施瓦茨不等式的加权推广。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（结构对称）：

不等式左右两边结构对称，左边是分式平方和，右边是和的平方除以分母和。

要点二（权重影响）：

分母 b_i 作为权重，影响不等式的强度；b_i 越大，对应项贡献越小。

要点三（指数推广）：

推广形式将平方推广到 m 次方，分母指数相应调整为 $m-1$，保持齐次性。

几何本质（向量投影）

在向量空间中，权方和不等式可以解释为加权内积下的柯西-施瓦茨不等式。设向量 $\mathbf{a}=(a_1,\ldots,a_n)$，权重向量 $\mathbf{b}=(b_1,\ldots,b_n)$，则不等式反映加权模长关系。

代数意义（柯西推广）

代数上，当 $b_i=1$ 时，权方和不等式退化为柯西-施瓦茨不等式 $\sum a_i^2 \geq \frac{(\sum a_i)^2}{n}$。一般形式是柯西-施瓦茨的加权版本，推广形式是 Hölder 不等式的特例。

考点价值（最值证明）

- **考法一（直接求最值）：**题目给出分式平方和形式，直接应用不等式求最小值。
- **考法二（变形后应用）：**需要将原式变形为权方和结构，如凑出分母或调整指数。

顿悟点

当遇到分式平方和（或更高次）且分母为正时，立即联想权方和不等式，可能简化计算或直接得最值。

使用场景

- **场景一（最值问题）：**求形如 $\sum \frac{a_i^2}{b_i}$ 表达式的最小值，已知 a_i 和 b_i 的关系。
- **场景二（不等式证明）：**证明涉及分式平方和的不等式，通过权方和放缩。

证明

思路提示

通过构造柯西-施瓦茨不等式的形式，将权方和不等式转化为已知不等式。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（构造平方和）：

定义 $u_i = \dfrac{a_i}{\sqrt{b_i}}$ 和 $v_i = \sqrt{b_i}$。

$$u_i = \frac{a_i}{\sqrt{b_i}}, \quad v_i = \sqrt{b_i} \quad (i = 1, 2, \ldots, n)$$

理由：这样构造使得 $u_i^2 = \frac{a_i^2}{b_i}$，且 $v_i^2 = b_i$，便于应用柯西-施瓦茨。

步骤二（应用柯西）：

对 u_i 和 v_i 应用柯西-施瓦茨不等式。

$$\left(\sum_{i=1}^{n} u_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} v_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} u_i v_i\right)^2$$

理由：柯西-施瓦茨不等式对于实数序列成立。

步骤三（代入计算）：

将 u_i 和 v_i 的表达式代入。

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n} u_i^2 &= \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i^2}{b_i}, \\
\sum_{i=1}^{n} v_i^2 &= \sum_{i=1}^{n} b_i, \\
\sum_{i=1}^{n} u_i v_i &= \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{a_i}{\sqrt{b_i}} \cdot \sqrt{b_i}\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i.
\end{aligned}$$

理由：直接计算各项和。

步骤四（得到不等式）：

代入后，柯西-施瓦茨不等式变为：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i^2}{b_i}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2$$

理由：将步骤三的结果代入步骤二的不等式。

步骤五（整理形式）：

由于 $\sum b_i > 0$，两边除以 $\sum b_i$ 得到权方和不等式。

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i^2}{b_i} \geq \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{n} b_i}$$

理由：不等号方向不变，因为除以正数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤六（取等条件）：

等号成立当且仅当柯西-施瓦茨等号成立，即 u_i 与 v_i 成比例。

$$\frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2} = \cdots = \frac{u_n}{v_n}$$

代入 $u_i = \frac{a_i}{\sqrt{b_i}}, v_i = \sqrt{b_i}$，得 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n}$。

理由：柯西-施瓦茨等号条件为序列成比例。

结论回扣

通过柯西-施瓦茨不等式，我们证明了权方和不等式的一般形式，并明确了取等条件。推广形式可通过类似方法或数学归纳法证明。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $a, b, c > 0$，且 $a + b + c = 1$，求 $\dfrac{a^2}{b} + \dfrac{b^2}{c} + \dfrac{c^2}{a}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

表达式为 $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a}$，符合权方和不等式的一般形式。

理由：分子平方，分母一次，且分母为正。

第二步（应用不等式）：

由权方和不等式，有

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq \frac{(a+b+c)^2}{b+c+a}$$

理由：直接应用，其中 $a_1 = a, a_2 = b, a_3 = c$，$b_1 = b, b_2 = c, b_3 = a$。

第三步（代入计算）：

已知 $a + b + c = 1$，且分母和 $b + c + a = 1$，所以

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq \frac{1^2}{1} = 1$$

理由：将条件代入不等式右边。

第四步（取等检查）：

等号成立当且仅当 $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{a}$，结合 $a + b + c = 1$，可得 $a = b = c = \frac{1}{3}$。

理由：验证取等条件，确保最小值可达。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 最小值为 1，当且仅当 $a=b=c=\frac{1}{3}$ 时取到。

例 2（稍变形）

题目： 设 $x,y,z>0$，证明 $\dfrac{x^2}{y+z}+\dfrac{y^2}{z+x}+\dfrac{z^2}{x+y}\geq\dfrac{x+y+z}{2}$。

解题步骤：

第一步（分母变形）：

注意到分母 $y+z,z+x,x+y$ 不是单个变量，但可视为权方和中的 b_i。

理由： 权方和不等式要求 $b_i>0$，这里分母满足条件。

第二步（应用权方和）：

由权方和不等式，

$$\frac{x^2}{y+z}+\frac{y^2}{z+x}+\frac{z^2}{x+y}\geq\frac{(x+y+z)^2}{(y+z)+(z+x)+(x+y)}$$

理由： 将 x,y,z 视为 a_i，$y+z,z+x,x+y$ 视为 b_i。

第三步（计算分母和）：

分母和为 $(y+z)+(z+x)+(x+y)=2(x+y+z)$。

$$\frac{(x+y+z)^2}{2(x+y+z)}=\frac{x+y+z}{2}$$

理由： 简化表达式。

第四步（得到不等式）：

因此，

$$\frac{x^2}{y+z}+\frac{y^2}{z+x}+\frac{z^2}{x+y}\geq\frac{x+y+z}{2}$$

理由： 结合步骤二和步骤三。

第五步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $\frac{x}{y+z}=\frac{y}{z+x}=\frac{z}{x+y}$。在正数条件下，这等价于 $x=y=z$。

理由： 权方和等号条件，代入具体变量。

关键结论： 不等式成立，等号当 $x=y=z$ 时取得。

易错提醒

易错点一（忽略分母正负）

误以为 b_i 可为任意实数，忽略 $b_i>0$ 的条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（分母必正）：

权方和不等式成立的前提是 $b_i > 0$，否则不等式可能不成立或方向改变。

错因分析（依赖正性）：

证明过程中需要 b_i 为正以保证开方、除以和等操作不改变不等号方向。

易错点二（指数混淆）

在推广形式中，错误地让分子分母指数相同，如写成 $\sum \frac{a_i^m}{b_i^m}$。

正确理解（指数差一）：

推广形式为 $\sum \frac{a_i^m}{b_i^{m-1}}$，分母指数比分子少 1，以保持齐次性。

错因分析（齐次性遗忘）：

不等式左右两边应具有相同的次数，推广形式中左边次数为 $m-(m-1)=1$，右边为 $m-(m-1)=1$，保持齐次。

易错点三（取等忽略）

应用不等式求最值时，仅得到下界，未验证等号是否成立。

正确理解（等号验证）：

权方和不等式等号成立当且仅当 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n}$，必须检查此条件是否可达。

错因分析（最值漏验）：

若取等条件与约束矛盾，则最值不可达，需改用其他方法。

结论小结

一句话核心

权方和不等式将分式平方和与总和的平方联系起来，是求最值和证明不等式的有效方法。

使用条件

- **条件 1（实数变量）：** a_i 为任意实数。
- **条件 2（正分母）：** $b_i > 0$ 必须严格成立。
- **条件 3（指数范围）：** $m \geq 1$，通常 m 为整数或实数。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **易错点（分母正负）**：务必检查 $b_i > 0$，否则不等式不适用。
- **检查项（取等条件）**：应用后必须验证 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n}$ 是否可达。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.7 绝对值三角不等式

二级结论

条件

条件 1（实数变量）：

设 a, b 为任意实数。

结论

结论一（双边不等式）：

直观描述： 两数和的绝对值被夹在它们绝对值之差的绝对值与和之间。

$$\big||a|-|b|\big| \le |a+b| \le |a|+|b|.$$

推广结论（多实数形式）：

直观描述： 多个实数和的绝对值不超过各自绝对值之和。

$$|a_1+a_2+\cdots+a_n| \le |a_1|+|a_2|+\cdots+|a_n|.$$

等号/取等条件： 左边等号 $\big||a|-|b|\big| = |a+b|$ 当且仅当 $ab \le 0$；右边等号 $|a+b| = |a|+|b|$ 当且仅当 $ab \ge 0$。对于 n 个实数，等号成立当且仅当所有 a_i 同号或至少有一个为零。

理解说明

一句话直觉

绝对值三角不等式是“三角形两边之和大于第三边”在数轴上的代数版本，它限制了实数和的绝对值范围。

核心拆解

要点一（下界控制）：

左边不等式 $\big||a|-|b|\big| \le |a+b|$ 保证了两数和的绝对值不小于它们绝对值之差的绝对值。

要点二（上界控制）：

右边不等式 $|a+b| \le |a|+|b|$ 保证了两数和的绝对值不超过它们绝对值之和。

几何本质（距离关系）

在数轴上，$|a|$ 表示 a 到原点的距离。$|a+b|$ 可以视为 a 与 $-b$ 的距离，而 $|a|+|b|$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

是两段距离之和，$\big||a|-|b|\big|$ 是两段距离之差的绝对值。不等式反映了“两点间直线段最短”的思想。

代数意义（运算约束）

绝对值运算不满足线性，但此不等式给出了其与加法运算的一种线性约束：和的绝对值被绝对值之和控制，且受差值绝对值限制。

考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接应用）**：在证明题中直接使用该不等式放缩。
- **考法二（最值求解）**：利用不等式求含绝对值的表达式的最值或范围。

顿悟点

等号成立条件与实数的符号密切相关：当 a 与 b 异号时，左边等号成立；当 a 与 b 同号时，右边等号成立。这揭示了绝对值运算与符号的内在联系。

使用场景

- **场景一（比较大小）**：需要比较 $|a+b|$ 与 $|a|+|b|$ 或 $\big||a|-|b|\big|$ 的大小时。
- **场景二（估计范围）**：当已知 $|a|,|b|$ 的范围时，估计 $|a+b|$ 的可能范围。

证明

思路提示

通过平方去掉绝对值，将不等式转化为平方的非负性证明，然后讨论等号成立条件。

正式推导

步骤一（平方变形）：

考虑 $|a+b|^2$ 与 $(|a|+|b|)^2$ 的比较。

$$|a+b|^2=(a+b)^2=a^2+2ab+b^2.$$

理由：绝对值的平方等于原数的平方。

步骤二（展开右边）：

计算 $(|a|+|b|)^2$。

$$(|a|+|b|)^2=|a|^2+2|a||b|+|b|^2=a^2+2|ab|+b^2.$$

理由：$|a|^2=a^2$，且 $|a||b|=|ab|$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（比较差值）：

比较两者之差。

$$(|a|+|b|)^2-|a+b|^2=(a^2+2|ab|+b^2)-(a^2+2ab+b^2)=2(|ab|-ab).$$

理由：相减后化简。

步骤四（判断非负）：

由于 $|ab|\geq ab$ 恒成立，因此 $|ab|-ab\geq 0$。

$$(|a|+|b|)^2-|a+b|^2=2(|ab|-ab)\geq 0.$$

理由：绝对值的定义保证了 $|x|\geq x$ 对所有实数 x 成立。

步骤五（得出右边不等式）：

由平方非负，得 $|a+b|^2\leq(|a|+|b|)^2$，开方后得到 $|a+b|\leq|a|+|b|$。

$$|a+b|\leq|a|+|b|.$$

理由：平方函数在非负数上单调递增。

步骤六（左边不等式证明）：

利用右边不等式，将 a 替换为 $a-b$，可得 $|a|\leq|a-b|+|b|$，从而 $|a|-|b|\leq|a-b|$。同理 $|b|-|a|\leq|a-b|$，所以 $\big||a|-|b|\big|\leq|a-b|$。再令 b 为 $-b$，即得 $\big||a|-|b|\big|\leq|a+b|$。

$$\big||a|-|b|\big|\leq|a+b|.$$

理由：通过变量替换和对称性推导。

步骤七（等号条件）：

右边等号成立当 $|ab|=ab$，即 $ab\geq 0$；左边等号成立需在推导中取等，即 $ab\leq 0$。

理由：从差值 $2(|ab|-ab)$ 为零可得 $ab\geq 0$；左边等号当 a 与 b 异号时成立。

结论回扣

综上所述，我们证明了对于任意实数 a,b，有 $\big||a|-|b|\big|\leq|a+b|\leq|a|+|b|$，并明确了等号成立的条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $|x| \le 2$，$|y| \le 3$，求 $|x+y|$ 的最大值。

解题步骤：

第一步（应用不等式）：

由绝对值三角不等式，有 $|x+y| \le |x| + |y|$。

理由： 直接使用右边不等式。

第二步（代入范围）：

因为 $|x| \le 2$，$|y| \le 3$，所以 $|x| + |y| \le 2 + 3 = 5$。

$$|x+y| \le |x| + |y| \le 5.$$

理由： 利用已知条件进行放缩。

第三步（取等检查）：

当 x 与 y 同号且 $|x| = 2, |y| = 3$ 时，等号成立，例如 $x = 2, y = 3$。

理由： 右边等号成立条件是 $xy \ge 0$，且绝对值取到上界。

关键结论： $|x+y|$ **的最大值为 5，当 x 与 y 同号且分别取 2 和 3 时达到。**

例 2（稍变形）

题目： 证明对于任意实数 a, b，有 $|a-b| \ge \big||a| - |b|\big|$。

解题步骤：

第一步（变量替换）：

在绝对值三角不等式中，令 b 替换为 $-b$。

$$\big||a| - |-b|\big| \le |a + (-b)| \le |a| + |-b|.$$

理由： $|-b| = |b|$，且 $a + (-b) = a - b$。

第二步（简化）：

由于 $|-b| = |b|$，左边不等式变为 $\big||a| - |b|\big| \le |a-b|$。

$$\big||a| - |b|\big| \le |a-b|.$$

理由： 直接代入化简。

第三步（得出结论）：

因此，$|a-b| \ge \big||a| - |b|\big|$ 成立。

理由： 不等式方向不变。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 对于任意实数 a, b，有 $|a-b| \geq \big||a|-|b|\big|$，这是绝对值三角不等式的直接推论。

易错提醒

易错点一（忽略等号条件）

在使用不等式时，只记住形式，忽略等号成立的条件。

正确理解（条件记忆）：

等号成立取决于实数的符号：左边等号当 $ab \leq 0$，右边等号当 $ab \geq 0$。

错因分析（记忆不全）：

学生常只背不等式，不背等号条件，导致解题时无法确定取最值的情形。

易错点二（减法误用）

错误认为 $|a-b| \leq |a|-|b|$ 或类似的不等式恒成立。

正确理解（减法转化）：

减法可视为加负数，即 $|a-b| = |a+(-b)|$，从而应用三角不等式得到 $|a-b| \leq |a|+|b|$ 和 $|a-b| \geq \big||a|-|b|\big|$。

错因分析（符号混淆）：

未将减法转化为加法，直接套用公式导致错误。

易错点三（多实数同号）

对于 n 个实数的情形，错误认为等号成立需要所有数非零且同号。

正确理解（同号或零）：

等号成立当且仅当所有 a_i 同号（全正或全负）或至少有一个为零。

错因分析（条件过严）：

忽略了“至少有一个为零”的情况，导致判断错误。

结论小结

一句话核心

绝对值三角不等式给出了实数和的绝对值的上下界，是连接绝对值与加法运算的重要桥梁。

使用条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 1（实数变量）**：涉及实数及其绝对值。
- **条件 2（任意个数）**：适用于两个或更多个实数。

关键提醒

- **易错点（等号条件）**：务必牢记等号成立的条件，它与实数的符号相关。
- **检查项（符号一致性）**：应用不等式时，检查实数的符号以确定是否取等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.8 均值不等式链（HM≤GM≤AM≤QM）

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

$a, b \in \mathbb{R}^+$（a 和 b 均为正实数）。

结论

结论一（四均值不等式链）：

直观描述：两个正实数的四种平均数存在确定的大小序关系。

$$\begin{aligned}\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} &\le \sqrt{ab}\\ &\le \frac{a+b}{2}\\ &\le \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}.\end{aligned}$$

推广结论（n 元不等式链）：

直观描述：对于 n 个正实数，四种平均数之间亦有类似序关系。

$$\begin{aligned}\frac{n}{\frac{1}{x_1}+\cdots+\frac{1}{x_n}} &\le \sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n}\\ &\le \frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\\ &\le \sqrt{\frac{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2}{n}}.\end{aligned}$$

等号/取等条件：所有不等式中等号成立当且仅当所有变量相等（二元时即 $a=b$）。

理解说明

一句话直觉 四个平均数依次变大，像四层台阶，调和平均数（HM）最矮，平方平均数（QM）最高，几何平均数（GM）和算术平均数（AM）居中。

核心拆解

要点一（全序关系）：

四个平均数间具有 $HM \le GM \le AM \le QM$ 的完全顺序。

要点二（取等条件）：

所有等号同时成立，唯一的条件就是 $a=b$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（传递性）：

由不等式链可知，任意不相邻平均数之间的大小关系也成立，例如 $HM \leq AM$。

几何本质（直观图示） 可以在同一个半圆（半径 R）中构造这四种平均数：直径两端对应 a 和 b，则 AM 为半径，GM 为垂直于直径的弦长，HM 与 QM 也有对应的几何线段表示。不等式链反映了这些几何线段的长短关系。

代数意义（比较基准） 每种平均数代表不同的“平均”方式：调和平均偏小（对小数敏感），几何平均看乘积，算术平均最常用，平方平均对大的数敏感。不等式链为不同场景下的“平均”提供了统一的比较基准。

考点价值（经典不等式）

- **考法一（最值估计）**：用于估计表达式（如和、积、倒数和、平方和）的取值范围。
- **考法二（比较大小）**：直接比较四种平均数的数值大小。
- **考法三（证明题链）**：作为中间桥梁，连接其他不等式（如柯西、琴生）。

顿悟点 **这不仅是四个不等式，而是一个紧密联系的“链条”。**证明了其中一个不等式（如 $GM \leq AM$），可以借助它去推导相邻的其他不等式（如 $HM \leq GM$ 可通过倒数变形得到），形成完整的证明闭环。

使用场景

- **场景一（优化求最值）**：已知某些和（或积）为定值，求另一表达式的最值。
- **场景二（放缩比较）**：需要将复杂表达式放大或缩小时，选择合适的平均数作为中间量。
- **场景三（综合证明）**：与函数单调性、导数、几何图形结合，证明综合性不等式。

证明

思路提示 先独立证明核心部分 $GM \leq AM$（基本不等式），再利用倒数关系和平方关系，依次向两端（HM 和 QM）延伸，最终串联成链。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（证明 GM≤AM）：

由基本不等式 $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \geq 0$ 展开可得。

$$\begin{aligned}(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 &\geq 0\\ a-2\sqrt{ab}+b &\geq 0\\ a+b &\geq 2\sqrt{ab}\\ \frac{a+b}{2} &\geq \sqrt{ab}.\end{aligned}$$

理由：完全平方的非负性是基本不等式的来源。等号成立当且仅当 $\sqrt{a}=\sqrt{b}$，即 $a=b$。

步骤二（证明 HM≤GM）：

对上一步结论 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 中的 a, b 同时取倒数，并利用不等式方向不变的性质。

$$\begin{aligned}\text{令}a' = \frac{1}{a},\ b' = \frac{1}{b} \quad (a', b' > 0)\\ \frac{a'+b'}{2} &\geq \sqrt{a'b'}\\ \frac{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}{2} &\geq \sqrt{\frac{1}{ab}} = \frac{1}{\sqrt{ab}}\\ \frac{1}{a}+\frac{1}{b} &\geq \frac{2}{\sqrt{ab}}\\ \frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} &\leq \sqrt{ab}.\end{aligned}$$

理由：正实数的倒数仍是正实数，不等式两边同时取倒数（并注意不等号方向因正数而反向）。

步骤三（证明 AM≤QM）：

再次利用平方非负性 $(a-b)^2 \geq 0$ 的变形。

$$\begin{aligned}(a-b)^2 &\geq 0\\ a^2-2ab+b^2 &\geq 0\\ a^2+b^2 &\geq 2ab\\ 2(a^2+b^2) &\geq a^2+2ab+b^2\\ 2(a^2+b^2) &\geq (a+b)^2\\ \frac{(a+b)^2}{4} &\leq \frac{a^2+b^2}{2}\\ \frac{a+b}{2} &\leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：从 $(a-b)^2 \geq 0$ 出发，逐步配凑出 $(a+b)^2$ 与 a^2+b^2 的关系，最后开方（注意两边均为正，开方保序）。

结论回扣 综合步骤一、二、三，我们得到了完整的不等式链：$\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$。每一步的取等条件均为 $a=b$，故整个不等式链等号成立当且仅当 $a=b$。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知 $x>0, y>0$，且 $x+y=6$，求 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（联系调和平均）：

识别所求为两数倒数和，与调和平均数 $HM = \frac{2}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}$ 有关。

理由：由 HM 定义直接可得 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y} = \frac{2}{HM}$。

第二步（利用不等式链）：

由 $HM \leq AM$ 建立关系。

$$HM \leq AM$$
$$\frac{2}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}} \leq \frac{x+y}{2}.$$

理由：已知 $x+y=6$，代入上式。

第三步（求解最小值）：

代入已知条件并变形。

$$\frac{2}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}} \leq \frac{6}{2} = 3$$
$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y} \geq \frac{2}{3}.$$

理由：不等式两边均为正，取倒数时不等号方向改变。

关键结论：当且仅当 $x=y=3$ 时等号成立，故 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 的最小值为 $\frac{2}{3}$。

例 2（稍变形）

题目：设 $a>0, b>0$，证明：$\sqrt{ab}\cdot\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \geq \frac{a+b}{2}\cdot\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}$。

解题步骤：

第一步（识别平均数）：

将不等式各因子用四种平均数表示。

$$\text{左端} = GM\cdot QM, \quad \text{右端} = AM\cdot HM.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： 根据定义直接写出。

第二步（应用不等式链）：

由 $HM \le GM \le AM \le QM$，尝试比较 $GM \cdot QM$ 与 $AM \cdot HM$。

$$GM \ge HM$$
$$QM \ge AM$$

理由： 由已知不等式链直接得出这两个单独的不等式。

第三步（相乘并判断方向）：

将上一步两个同向不等式相乘。

$$(GM) \cdot (QM) \ge (HM) \cdot (AM)$$
$$\sqrt{ab} \cdot \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \ge \frac{a+b}{2} \cdot \frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}.$$

理由： 因为两边各项均为正数，同向不等式可以相乘，不等号方向不变。

关键结论： 原不等式得证，等号成立当且仅当 $a = b$。

易错提醒

易错点一（负数参与）

误以为 a, b 可以是任意实数，直接套用公式。

正确理解（正数前提）：

不等式链成立的前提是 a, b 均为正实数。若为负或零，结论可能不成立。

错因分析（定义域忽略）：

调和平均与几何平均在非正数下可能无定义或无实数结果，且证明过程中的开方、倒数运算依赖正数条件。

易错点二（等号条件混淆）

认为不等式链中每个不等式的等号可以独立成立。

正确理解（同步取等）：

所有等号成立的条件是同一个：$a = b$。四个不等式要么同时取等，要么同时不取等。

错因分析（链条整体性）：

不等式链是一个整体，其证明过程依赖于相邻不等式，等号传递条件一致。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（盲目放缩）

解题时任意截取不等式链的一部分进行放缩，忽略方向导致错误。

正确理解（定向使用）：

必须根据需求（需要放大还是缩小）选择合适的不等式。例如，要用一个更大的数替代 AM，只能选 QM，而不能选 GM 或 HM。

错因分析（方向感缺失）：

未牢记 $HM \leq GM \leq AM \leq QM$ 的顺序，误将小的数用来放大目标，或将大的数用来缩小目标。

结论小结

一句话核心 **两个正实数的四种平均数（调和、几何、算术、平方）满足 $HM \leq GM \leq AM \leq QM$ 的固定大小顺序，等号成立当且仅当两数相等。**

使用条件

- **条件 1（变量为正）：**所有涉及的变量必须是正实数（> 0）。
- **条件 2（二元或多元）：**结论对两个或多个正实数均成立，但多元形式更复杂。

关键提醒

- **易错点（方向记牢）：**务必牢记顺序 $HM \leq GM \leq AM \leq QM$，放缩时方向不能反。
- **检查项（取等一致）：**检查等号成立条件是否始终为所有变量相等。
- **检查项（正数验证）：**应用前先确认所有变量为正数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.9 三元均值不等式

二级结论

条件

条件 1（非负实数）：

变量 a, b, c 都是非负实数，即 $a \geq 0, b \geq 0, c \geq 0$。

结论

结论一（三元均值不等式）：

直观描述： 三个数的算术平均值不小于它们的几何平均值。

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$$

推广结论（等价形式）：

直观描述： 该不等式有几种常用且等价的表述形式。

$$a+b+c \geq 3\sqrt[3]{abc} \quad \text{或} \quad abc \leq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3$$

等号/取等条件： 当且仅当三个数相等，即 $a = b = c$ 时，不等式中的等号成立。

理解说明

一句话直觉 大的（算术）平均数总是不小于小的（几何）平均数，当三个数一样大时两者才相等。

核心拆解

要点一（非负前提）：

条件是 $a, b, c \geq 0$，几何平均 $\sqrt[3]{abc}$ 才有意义（避免开偶次方出现负数）。

要点二（取等唯一）：

等号成立条件非常严格，必须 $a = b = c$，这是判断使用是否恰当的关键。

几何本质（固定体积） 在三维空间里，若一个长方体的长、宽、高分别为 a, b, c，则其体积为 abc，其所有棱长之和与 $a+b+c$ 相关。当体积 abc 固定时，立方体（即 $a = b = c$ 时）的表面积或棱长和是最小的。这个不等式体现了这种“等周”性质。

代数意义（齐次对称） 不等式左右两边的表达式都是关于 a, b, c 的齐一次式（$a+b+c$）和齐三次式（$\sqrt[3]{abc}$ 乘上系数后），并且是对称的（交换 a, b, c 位置不变）。这种对称性常意味着在相等时取到最值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（最值放缩）

- **考法一（和积互求最值）**：已知 $a+b+c$ 为定值，可求 abc 的最大值；已知 abc 为定值，可求 $a+b+c$ 的最小值。
- **考法二（不等式链条）**：作为基本不等式链条 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc} \geq \frac{3}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}}$（$a,b,c>0$）的核心一环，用于多步放缩证明复杂不等式。

顿悟点 **“一正，二定，三相等”**——这是使用所有均值不等式（包括二元和三元）的口诀。正数条件是前提；和为定值或积为定值是应用目标；检查取等条件是验证结果正确性的必经步骤。

使用场景

- **场景一（求解最值）**：当题目中条件和所求可以凑成 $a+b+c$ 与 abc 的定值关系时，直接应用。
- **场景二（证明不等式）**：作为放缩的基础工具，用于将和的形式转化为积的形式，或反之，从而简化比较。

证明

思路提示 采用分析法，从要证的结论 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ 出发，通过两边同时立方去根号，进行代数变形，最终化为一个显然成立的非负表达式 $(p^2+q^2+r^2) \geq 0$ 的形式，从而倒推证明原不等式成立。

正式推导

步骤一（去根号立方）：

要证 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$，由于两边非负，等价于证明两边同时立方后不等式方向不变。

$$\left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3 \geq abc$$

理由： 立方运算在非负实数范围内是保序的（单调递增）。

步骤二（通分移项）：

将上一步的式子两边乘以 27 以消去分母，并将所有项移到同一边。

$$(a+b+c)^3 \geq 27abc$$

$$(a+b+c)^3 - 27abc \geq 0$$

理由： 这是一个等价变形，目的是得到一个便于分解因式的多项式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（展开并配方）：

展开 $(a+b+c)^3$ 并尝试分组配成完全平方。这是一个关键配方技巧。

$$a^3+b^3+c^3+3a^2b+3ab^2+3a^2c+3ac^2+3b^2c+3bc^2+6abc-27abc\geq 0$$
$$a^3+b^3+c^3+3a^2b+3ab^2+3a^2c+3ac^2+3b^2c+3bc^2-21abc\geq 0$$

理由： 展开立方公式 $(x+y+z)^3=x^3+y^3+z^3+3x^2y+3xy^2+3x^2z+3xz^2+3y^2z+3yz^2+6xyz$，然后合并 $-27abc$ 与 $+6abc$。

步骤四（巧用因式分解）：

利用已知的因式分解公式 $a^3+b^3+c^3-3abc=\frac{1}{2}(a+b+c)[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]$。对上一步的式子进行拆分重组。

$$(a^3+b^3+c^3-3abc)+3(a^2b+ab^2+a^2c+ac^2+b^2c+bc^2-6abc)\geq 0$$
$$\frac{1}{2}(a+b+c)[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]$$
$$+\ 3[ab(a+b-2c)+ac(a+c-2b)+bc(b+c-2a)]\geq 0$$

进一步处理括号内的项，例如 $a+b-2c=(a-c)+(b-c)$，可以重新配成完全平方。最终可以证得整个表达式能写为若干个完全平方和的非负组合。**另一种更简洁的经典证法**是令 $x=\sqrt[3]{a},y=\sqrt[3]{b},z=\sqrt[3]{c}$，则原不等式化为 $x^3+y^3+z^3\geq 3xyz$，而这由步骤四的分解公式直接可得。

$$x^3+y^3+z^3-3xyz=\frac{1}{2}(x+y+z)[(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2]\geq 0$$

理由： 由于 $a,b,c\geq 0$，故 $x,y,z\geq 0$，从而 $x+y+z\geq 0$，且平方项 $(x-y)^2$ 等均非负，故整个式子非负，原不等式得证。

结论回扣 **我们证明了** $(x^3+y^3+z^3-3xyz)\geq 0$，**即** $\frac{x^3+y^3+z^3}{3}\geq xyz$，**代回** $x^3=a,y^3=b,z^3=c$，**恰好就是** $\frac{a+b+c}{3}\geq\sqrt[3]{abc}$。并且，从分解式 $\frac{1}{2}(x+y+z)[(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2]\geq 0$ 可以看出，等号成立当且仅当 $x=y=z$，即 $a=b=c$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x>0,y>0,z>0$，且 $x+y+z=6$，求 xyz 的最大值。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（应用三元均值）：

对正数 x, y, z 直接应用三元均值不等式。

$$\frac{x+y+z}{3} \geq \sqrt[3]{xyz}$$

理由： 题目满足“一正”（$x, y, z > 0$），且和为定值，符合应用条件。

第二步（代入定值）：

将已知条件 $x+y+z=6$ 代入不等式左边。

$$\frac{6}{3} \geq \sqrt[3]{xyz} \quad \Rightarrow \quad 2 \geq \sqrt[3]{xyz}$$

理由： 这是简单的算术运算。

第三步（解出最大值）：

对不等式 $2 \geq \sqrt[3]{xyz}$ 两边同时立方，得到 xyz 的上界。

$$xyz \leq 2^3 = 8$$

理由： 立方运算在非负实数上单调递增，不等号方向不变。

第四步（验证取等）：

检查等号成立条件。均值不等式等号成立当且仅当 $x=y=z$。结合 $x+y+z=6$，可得 $x=y=z=2$。

$$\text{当} x=y=z=2 \text{ 时，} xyz = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

理由： 存在这样一组正数使得等号成立，因此求出的上界 8 是能够取到的最大值。

关键结论：在 $x+y+z=6$ 的条件下，xyz 的最大值为 8，当且仅当 $x=y=z=2$ 时取得。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a>0, b>0, c>0$，求证：$(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right) \geq 9$。

解题步骤：

第一步（分别应用均值）：

对 a, b, c 和 $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ 分别应用三元均值不等式。

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}, \quad \frac{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}}{3} \geq \sqrt[3]{\frac{1}{abc}}$$

理由： 因为 $a, b, c > 0$，所以 $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ 也大于 0，满足正数条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（改写不等式）：

将上一步得到的两个不等式分别变形。

$$a+b+c \geq 3\sqrt[3]{abc}, \quad \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} \geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{abc}} = \frac{3}{\sqrt[3]{abc}}$$

理由：这是简单的移项和化简，目的是得到题目中左式两部分的下界。

第三步（两式相乘）：

将得到的两式左边相乘，右边相乘。

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right) \geq \left(3\sqrt[3]{abc}\right) \times \left(\frac{3}{\sqrt[3]{abc}}\right) = 9$$

理由：两个正数不等式（不等号同向）可以相乘，不等号方向不变。

第四步（验证取等）：

等号成立的条件是两个均值不等式同时取等，即 $a=b=c$ 且 $\frac{1}{a}=\frac{1}{b}=\frac{1}{c}$，这同时成立当且仅当 $a=b=c$。

理由：检查取等条件是否可达，以确保证明严密。当 $a=b=c$ 时，左边 $=(3a)(\frac{3}{a})=9$，等号成立。

关键结论： **已证明对于任意正实数 a,b,c，恒有 $(a+b+c)(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}) \geq 9$，且当 $a=b=c$ 时取等号。**

易错提醒

易错点一（忽视非负条件）

认为不等式 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ 对所有实数 a,b,c 都成立。

正确理解（非负是前提）：

该不等式成立的前提是 $a,b,c \geq 0$。若有负数，几何平均可能无意义（开三次方有意义但结论不成立），或者结论本身失效。

错因分析（混淆适用范围）：

忽略了算术平均数对负数也成立，但几何平均数要求非负。不满足非负条件时使用，会导致推导错误。

易错点二（乱用定值条件）

看到 $a+b+c$ 或 abc 就直接套公式求最值，没有验证“和”或“积”是否为定值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（定值是目标）：

只有在“和为定值”时，才能用此式求 abc 的最大值；在“积为定值”时，才能求 $a+b+c$ 的最小值。否则不等式本身成立，但无法确定最值。

错因分析（误解应用逻辑）：

混淆了“不等式恒成立”和“基于不等式求最值”两个不同问题。求最值时，必须存在一个在取等条件下能达到的定值边界。

易错点三（忽略取等验证）

求出最值后，不验证等号成立条件是否可以被满足，或默认存在。

正确理解（取等须可达）：

用不等式 $A \geq B$ 求最小值 B 时，必须检查是否存在一组变量使得 $A = B$ 成立。否则 B 只是下界而非最小值（最小值可能更大）。

错因分析（逻辑不严谨）：

误认为由不等式推导出的边界一定能够取到。如果取等条件与题目其他约束矛盾，则最值在别处取得，需改用其他方法。

结论小结

一句话核心 **三个非负数的算术平均不小于它们的几何平均，相等时取等。**

使用条件

- **条件 1（一正）：** 涉及的三个数 a, b, c 必须是非负实数（通常为正数）。
- **条件 2（二定）：** 用于求最值时，必须存在“和定”或“积定”的条件。

关键提醒

- **易错点（检查符号）：** 使用前务必检查变量是否满足非负条件。
- **检查项（验证取等）：** 做完最值或证明题，必须回代 $a = b = c$ 检查等号能否成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.10 三元平方和不等式

二级结论

条件

条件 1（任意实数）：

a, b, c 为任意实数。

结论

结论一（平方和与积和）：

直观描述： 平方之和不小于两两乘积之和。

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$$

推广结论（等价变形）：

直观描述： 与和的平方之间的不等关系。

$$3\left(a^2 + b^2 + c^2\right) \geq (a + b + c)^2,$$
$$(a + b + c)^2 \geq 3\,(ab + bc + ca).$$

等号/取等条件： 当且仅当 $a = b = c$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉

对于任意三个实数，它们的平方和总是不小于它们两两乘积之和；反过来，它们的和的平方与平方和、乘积和之间也有确定的不等关系。

核心拆解

要点一（对称性）：

不等式关于 a, b, c 完全对称，轮换不变。

要点二（非负性）：

本质源于平方的非负性，通过配方得到。

几何本质（三角形边长）

若将 a, b, c 视为三角形三边长，则 $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$ 反映了三角形边长的一种内在关系。特别地，等边三角形时取等。

代数意义（配方与标准形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

不等式等价于 $\frac{1}{2}\left[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right]\geq 0$，因此是平方非负的直接推论。它也等价于向量 $\vec{u}=(a,b,c)$ 与 $\vec{v}=(b,c,a)$ 的点积不超过模长乘积的柯西不等式形式。

考点价值（基础不等式）

- **考法一（直接证明）**：作为基本不等式，常用于证明其他不等式。
- **考法二（求最值）**：在条件最值问题中，利用其变形放缩求范围。

顿悟点

当问题中出现平方和与乘积和的混合式时，立即想到此不等式；看到 $(a+b+c)^2$ 展开后的交叉项，可尝试用此不等式联系平方和与乘积和。

使用场景

- **场景一（对称式证明）**：证明关于 a,b,c 的对称不等式。
- **场景二（最值放缩）**：求含平方和或乘积和的式子的最值。

证明

思路提示

要证 $a^2+b^2+c^2\geq ab+bc+ca$，只需将右边移到左边，配成完全平方和的形式，利用平方的非负性即可。

正式推导

步骤一（移项与倍乘）：

将不等式两边同乘以 2（以保证配方后系数整齐），并移项。

$$2(a^2+b^2+c^2)-2(ab+bc+ca)\geq 0$$

理由：乘以 2 后，各项系数变为整数，便于配方。

步骤二（分组配方）：

将左边分组为三个完全平方。

$$\begin{aligned}&2(a^2+b^2+c^2)-2(ab+bc+ca)\\=&(a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)+(c^2-2ca+a^2)\\=&(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\end{aligned}$$

理由：每两个平方项配一个交叉项，恰好形成三个完全平方。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（非负性得证）：

由平方的非负性，得出不等式成立。

$$(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2 \geq 0$$

理由： 每个平方都 ≥ 0，故和也 ≥ 0，原不等式得证。

步骤四（取等条件）：

分析等号成立的条件。

$$(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2=0 \quad \Leftrightarrow \quad a-b=0,\ b-c=0,\ c-a=0$$

理由： 几个非负项之和为零，则每个项都为零。

结论回扣

因此，对于任意实数 a,b,c，有 $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$，且等号当且仅当 $a=b=c$ 时成立。由此可推出其他等价形式。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 a,b,c 是实数，求证：$a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$。

解题步骤：

第一步（移项加倍）：

将不等式两边乘以 2 并移项。

$$2(a^2+b^2+c^2)-2(ab+bc+ca) \geq 0$$

理由： 乘以 2 后便于配方。

第二步（配方组合）：

将左边配成三个完全平方和。

$$\begin{aligned}&2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca\\=&(a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)+(c^2-2ca+a^2)\\=&(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\end{aligned}$$

理由： 分组后恰好形成平方差。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（利用非负性）：

由平方的非负性得出结论。

$$(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2 \geq 0$$

理由： 平方和总是非负，故原不等式成立。

关键结论： **原不等式成立，取等当且仅当** $a=b=c$。

例 2（稍变形）

题目： 设 a,b,c 是实数，且 $a+b+c=1$，求 $ab+bc+ca$ 的最大值。

解题步骤：

第一步（应用不等式）：

由三元平方和不等式的一个等价形式。

$$(a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca)$$

理由： 这是原不等式的第三个等价形式。

第二步（代入条件）：

将 $a+b+c=1$ 代入不等式。

$$1^2 \geq 3(ab+bc+ca) \quad \Rightarrow \quad ab+bc+ca \leq \frac{1}{3}$$

理由： 不等号方向不变，除以正数 3。

第三步（取等验证）：

检查最大值能否取得。

$$\text{当且仅当} a=b=c=\frac{1}{3} \text{ 时，等号成立。}$$

理由： 等号成立条件为 $a=b=c$，结合 $a+b+c=1$ 即得。

关键结论： $ab+bc+ca$ **的最大值为** $\frac{1}{3}$**，当** $a=b=c=\frac{1}{3}$ **时取得。**

易错提醒

易错点一（忽视取等条件）

在使用不等式求最值时，忽略等号成立的条件，导致误认为最值一定能取到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（验证取等）：

不等式等号成立当且仅当 $a=b=c$，在实际问题中需验证该条件是否可达。

错因分析（思维定势）：

认为不等式成立就一定能取到最值，未考虑取等条件的约束。

易错点二（误用于非实数）

在复数范围内误用该不等式，因为复数不能比较大小。

正确理解（实数范围）：

该不等式仅对实数成立，因为实数有大小关系且平方非负。

错因分析（忽略前提）：

未注意不等式成立的前提是 a,b,c 为实数，在复数范围内无意义。

易错点三（混淆不等号方向）

在变形时，错误地改变了不等号的方向，尤其是在乘以负数时。

正确理解（保号变形）：

变形过程中，若两边同时乘以正数，不等号方向不变；若乘以负数，方向反转。

错因分析（规则混淆）：

对不等式性质掌握不牢，在代数变形中随意改变不等号方向。

结论小结

一句话核心

对于任意三个实数，其平方和总不小于两两乘积之和，且有三个等价形式，是处理对称式的基础工具。

使用条件

- **条件 1（实数变量）：** a,b,c 必须是实数，因为复数无法比较大小。
- **条件 2（对称形式）：** 不等式关于 a,b,c 对称，适用于轮换对称式。

关键提醒

- **易错点（取等条件）：** 等号仅在 $a=b=c$ 时成立，求最值时务必验证。
- **检查项（变形等价）：** 使用等价形式时，确保变形正确，不等号方向无误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.11 对数函数切线不等式 lnx ≤ x-1 及其变式

二级结论

条件

条件 1（变量为正）：

实数 $x > 0$。

结论

结论一（基本切线式）：

直观描述： 对数图像在 $x = 1$ 处的切线方程。

$$\ln x \leq x - 1$$

推广结论（平移变形）：

直观描述： 将自变量替换为 $x + 1$ 得到常用形式。

$$\ln(x + 1) \leq x, \quad (x > -1)$$

推广结论（乘积形式）：

直观描述： 不等式两边同乘 x 后的变形。

$$x \ln x \geq x - 1, \quad (x > 0)$$

推广结论（二次逼近）：

直观描述： 利用更强的不等式逼近。

$$\ln x \leq \frac{x^2 - 1}{2x}, \quad (x > 0)$$

等号/取等条件： 仅当 $x = 1$ 时，所有不等式取等号。

理解说明

一句话直觉 对数函数 $y = \ln x$ 在 $x = 1$ 处的切线是 $y = x - 1$，图像总在切线上方（$x \neq 1$）。

核心拆解

要点一（切线构造）：

结论源于导数 $f'(1) = 1$ 和切线方程 $y = x - 1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（函数凹凸性）：

因 $f''(x) = -1/x^2 < 0$，函数图像下凸，故切线在图像下方。

要点三（恒等变形）：

通过换元 $t = x + 1$ 或两边乘以 x 得到常用变式。

要点四（精度提升）：

第三变式用二次函数逼近，比一次切线更紧。

几何本质（图像切线） 在点 $(1, 0)$ 作曲线 $y = \ln x$ 的切线，该切线 $y = x - 1$ 总在曲线下方（除切点外）。所有变式都是这一几何事实的坐标伸缩或平移。

代数意义（线性逼近） 用一次线性函数 $x - 1$ 去逼近复杂的对数函数 $\ln x$，并给出一个简单的不等式关系。它是泰勒展开一阶近似的直接体现。

考点价值（放缩工具）

- **考法一（证明不等式）**：用于将对数项放缩为多项式，简化证明。
- **考法二（求最值范围）**：通过放缩将含对数的最值问题转化为多项式最值。
- **考法三（数列求和放缩）**：在数列不等式中，常用于裂项求和或比较大小。

顿悟点 **遇到 $\ln x$ 或 $\ln(1 + x)$ 与多项式比较时，优先考虑切线放缩。**它是沟通超越函数与代数函数的桥梁。

使用场景

- **场景一（含参不等式）**：当不等式含有 $\ln x$ 与 x 的线性组合时。
- **场景二（数列放缩）**：如证明 $\sum \ln(1 + 1/n) < 1$ 类问题。
- **场景三（函数最值）**：求 $f(x) = x \ln x - ax$ 类型函数的最值或范围。

证明

思路提示 构造函数差 $f(x) = \ln x - (x - 1)$，利用导数判断其单调性，从而证明不等式。

正式推导

步骤一（构造函数）：

设 $f(x) = \ln x - (x - 1)$，定义域为 $x > 0$。

$$f(x) = \ln x - x + 1$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：将不等式 $\ln x \le x-1$ 移项，转化为比较函数值与 0 的大小。

步骤二（求导判号）：

求导并分析单调性。

$$f'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$$

理由：对 $f(x)$ 求导，导函数符号决定原函数增减。

步骤三（确定极值）：

由 $f'(x) = 0$ 得 $x = 1$，分析单调区间。

- 当 $0 < x < 1$ 时，$f'(x) > 0$，$f(x)$ 单调递增。
- 当 $x > 1$ 时，$f'(x) < 0$，$f(x)$ 单调递减。

理由：分子 $1-x$ 决定符号，分母 $x > 0$ 恒正。

步骤四（得出最值）：

在 $x = 1$ 处 $f(x)$ 取得最大值。

$$f(1) = \ln 1 - 1 + 1 = 0$$

故对任意 $x > 0$，有 $f(x) \le f(1) = 0$。

理由：先增后减，极大值即为最大值。

步骤五（变形验证）：

验证常用变式。

- **变式 1**：令 $t = x+1$（$t > 0$），则 $\ln t \le t-1$ 即为 $\ln(x+1) \le x$。
- **变式 2**：将 $\ln x \le x-1$ 两边同乘以 x（$x > 0$），得 $x\ln x \le x(x-1)$。但更常用的是移项得 $x\ln x \ge x-1$，这等价于 $\ln x \ge 1 - \frac{1}{x}$，是另一个切线不等式。
- **变式 3**：构造函数 $g(x) = \ln x - \frac{x^2-1}{2x}$ 求导可证，或由更强的切线不等式 $\ln x \le \frac{x-1}{\sqrt{x}}$ 推出。

理由：换元或简单代数变形即可得到。

结论回扣 **因此，对任意 $x > 0$ 恒有 $\ln x \le x-1$，且等号仅当 $x = 1$ 时成立。其常用变式在相应定义域内同样成立。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x > 1$，证明：$\ln x < \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}$。

解题步骤：

第一步（观察结构）：

注意到 $\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{x-1}{\sqrt{x}}$，目标化为 $\ln x < \frac{x-1}{\sqrt{x}}$。

理由： 将右边通分，建立与切线不等式 $\ln x \le x - 1$ 的联系。

第二步（应用变式）：

利用结论中的变式三：$\ln x \le \frac{x^2-1}{2x}$。但此处形式不同，考虑直接构造函数。设 $h(x) = \ln x - \frac{x-1}{\sqrt{x}}$，对 $x > 1$ 证明 $h(x) < 0$。

理由： 切线不等式是工具，但有时需直接作差求导。

第三步（求导判断）：

计算导数：

$$h'(x) = \frac{1}{x} - \frac{\sqrt{x} - \frac{x-1}{2\sqrt{x}}}{x} = \frac{1}{x} - \frac{2x - (x-1)}{2x\sqrt{x}} = \frac{2\sqrt{x} - (x+1)}{2x\sqrt{x}}$$

令 $t = \sqrt{x} > 1$，则分子 $2t - (t^2+1) = -(t-1)^2 \le 0$，且当 $t \ne 1$ 时取负号。

理由： 通过求导判断函数单调性。

第四步（得出单调性）：

当 $x > 1$ 时，$h'(x) < 0$，故 $h(x)$ 单调递减。

$$h(x) < h(1) = \ln 1 - \frac{1-1}{\sqrt{1}} = 0$$

理由： 利用端点值 $x = 1$（虽然不在定义域内，但可取极限）及单调性。

关键结论： **当 $x > 1$ 时，$\ln x < \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}$ 成立。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $a > b > 0$，比较 $\frac{\ln a - \ln b}{a-b}$ 与 $\frac{2}{a+b}$ 的大小。

解题步骤：

第一步（转化结构）：

令 $x = \frac{a}{b} > 1$，则 $\frac{\ln a - \ln b}{a-b} = \frac{\ln x}{b(x-1)}$，$\frac{2}{a+b} = \frac{2}{b(x+1)}$。比较两式等价于比较 $\frac{\ln x}{x-1}$ 与 $\frac{2}{x+1}$。

理由： 提取公因子 b，将双变量化为单变量 x。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（作差构造函数）：

设 $F(x)=\frac{\ln x}{x-1}-\frac{2}{x+1}$，$x>1$。目标为判断 $F(x)$ 的符号。

理由：将比较大小问题转化为函数符号问题。

第三步（利用切线不等式）：

由 $\ln x\le x-1$（$x>0$）得 $\frac{\ln x}{x-1}\le 1$（$x\ne 1$）。但需更精确比较。考虑不等式 $\ln x\le\frac{2(x-1)}{x+1}$（$x\ge 1$），这是均值形式的切线放缩。

理由：猜想 $\frac{\ln x}{x-1}\le\frac{2}{x+1}$。

第四步（证明猜想）：

即证 $\ln x\le\frac{2(x-1)}{x+1}$（$x>1$）。构造函数 $G(x)=\ln x-\frac{2(x-1)}{x+1}$，求导得：

$$G'(x)=\frac{1}{x}-\frac{4}{(x+1)^2}=\frac{(x+1)^2-4x}{x(x+1)^2}=\frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2}\ge 0$$

故 $G(x)$ 在 $x>1$ 上单调递增，$G(x)>G(1)=0$？计算 $G(1)=\ln 1-0=0$，因此 $G(x)\ge 0$，即 $\ln x\ge\frac{2(x-1)}{x+1}$，符号与猜想相反。

理由：实际推导发现原猜想方向反了。

第五步（调整方向）：

由 $G(x)\ge 0$ 得 $\ln x\ge\frac{2(x-1)}{x+1}$，即 $\frac{\ln x}{x-1}\ge\frac{2}{x+1}$（$x>1$）。

理由：因此，$\frac{\ln a-\ln b}{a-b}\ge\frac{2}{a+b}$。

关键结论： 对任意 $a>b>0$，有 $\frac{\ln a-\ln b}{a-b}\ge\frac{2}{a+b}$。

易错提醒

易错点一（忽视定义域）

错误认为 $\ln(x+1)\le x$ 对任意 x 成立，忽略 $x>-1$ 的前提。

正确理解（限制条件）：

变式 $\ln(x+1)\le x$ 仅在 $x>-1$ 时成立，否则 $\ln(x+1)$ 无意义。

错因分析（记忆模糊）：

只记结论形式，未记准确域，导致在 $x\le -1$ 区间误用。

易错点二（混淆方向）

将 $x\ln x\ge x-1$ 记成 $x\ln x\le x-1$，或对 $\ln x\le x-1$ 两边乘 x 时未考虑 x 的符号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（保号性）：

当 $x > 0$ 时，乘以 x 不改变不等号方向；但 $x \ln x \geq x - 1$ 本身是另一独立结论，并非简单乘 x 得到。

错因分析（机械变形）：

误以为所有变式都通过恒等变形直接得到，忽略了需重新证明或理解其几何意义。

易错点三（取等条件遗漏）

使用放缩后忘记检查取等条件是否能在题目中实现，导致范围扩大或最值求错。

正确理解（等号分析）：

所有变式取等条件均为 $x = 1$（或对应变量为 1），放缩后若等号取不到，则得到严格不等式。

错因分析（过程跳跃）：

只关注放缩本身，未分析等号成立条件与题目条件是否兼容，尤其在求最值时。

结论小结

一句话核心 **对数函数 $\ln x$ 在 $x = 1$ 处切线为 $y = x - 1$，图像恒在切线上方（$x \neq 1$），由此衍生一系列放缩式。**

使用条件

- **条件 1（定义域）**：主结论要求 $x > 0$；变式 $\ln(x + 1) \leq x$ 要求 $x > -1$。
- **条件 2（形式匹配）**：待证或待放缩的不等式含有 $\ln x$ 或 $\ln(1 + x)$ 与一次/二次多项式比较。

关键提醒

- **易错点（方向与域）**：牢记各变式不等号方向及定义域，避免反向使用或域外误用。
- **检查项（等号可达性）**：放缩后务必验证原题条件下等号能否取得，以判断放缩精度是否足够。
- **选择项（精度权衡）**：一次切线放缩最简，二次变式更紧，根据题目需求灵活选取。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.12 指数函数切线放缩不等式

二级结论

条件

条件 1（实数定义）：

设 x 为任意实数。

结论

结论一（切线放缩一）：

直观描述： 指数函数在 $x=0$ 处的切线不等式。

$$e^x \geq x+1$$

结论二（切线放缩二）：

直观描述： 指数函数在 $x=1$ 处的切线不等式。

$$e^x \geq ex$$

结论三（二阶放缩）：

直观描述： 当 x 非负时的二阶多项式下界。

$$e^x \geq 1+x+\frac{x^2}{2} \quad (x \geq 0)$$

推广结论（等价变形）：

直观描述： 结论二的等价形式，便于变量替换。

$$e^{x-1} \geq x$$

等号/取等条件： 结论一等号成立当且仅当 $x=0$；结论二等号成立当且仅当 $x=1$；结论三等号成立当且仅当 $x=0$；推广结论等号成立当且仅当 $x=1$。

理解说明

一句话直觉 指数函数图像始终在其切线之上，这些不等式是切线近似的严格下界。

核心拆解

要点一（切线位置）：

e^x 在 $x=0$ 处的切线为 $y=x+1$，函数值总不低于切线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（缩放系数）：

e^x 在 $x=1$ 处的切线为 $y=ex$，提供另一个放缩基准。

要点三（二阶近似）：

当 $x \geq 0$ 时，e^x 不低于其二阶泰勒展开的前三项。

几何本质（切线下方） 指数函数是凸函数，其图像上任意一点的切线都在函数图像下方，这些不等式是切线不等式的具体实例。

代数意义（不等式链） 这些不等式建立了 e^x 与一次或二次多项式之间的不等关系，可用于放缩简化表达式。

考点价值（放缩证明）

- **考法一（证明不等式）：** 直接应用这些放缩证明其他不等式。
- **考法二（求最值）：** 通过放缩将复杂函数转化为多项式求最值。

顿悟点 当遇到 e^x 与多项式混合的不等式时，优先考虑切线放缩，往往能化繁为简。

使用场景

- **场景一（比较大小）：** 比较 e^x 与线性函数的大小关系。
- **场景二（放缩求界）：** 需要估计 e^x 的下界时使用。

证明

思路提示 通过构造函数差，利用导数分析单调性和极值，证明不等式成立。

正式推导

步骤一（构造函数）：

对于 $e^x \geq x+1$，令 $f(x)=e^x-x-1$。

$$f(x)=e^x-x-1$$

理由： 将不等式转化为函数值非负的问题。

步骤二（求导分析）：

求导得 $f'(x)=e^x-1$。

$$f'(x)=e^x-1$$

理由： 导数用于判断函数单调性。当 $f'(x)>0$ 时 $f(x)$ 递增，当 $f'(x)<0$ 时递减。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（确定极值点）：

令 $f'(x)=0$，解得 $x=0$。

$$f'(x)=0 \Rightarrow e^x-1=0 \Rightarrow x=0$$

理由：驻点可能是极值点。分析 $f'(x)$ 符号：当 $x<0$ 时 $f'(x)<0$，$f(x)$ 递减；当 $x>0$ 时 $f'(x)>0$，$f(x)$ 递增。

步骤四（求最小值）：

在 $x=0$ 处，$f(0)=e^0-0-1=0$。

$$f(0)=1-0-1=0$$

理由：由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极小值，且为全局最小值，所以 $f(x)\geq 0$，即 $e^x\geq x+1$。

步骤五（证明第二式）：

对于 $e^x\geq ex$，令 $g(x)=e^x-ex$，求导得 $g'(x)=e^x-e$，驻点 $x=1$，$g(1)=0$。

$$g(x)=e^x-ex,\quad g'(x)=e^x-e,\quad g(1)=0$$

理由：类似地，$g(x)$ 在 $x=1$ 处取最小值 0，故 $e^x\geq ex$。等价变形 $e^{x-1}\geq x$ 由 $e^x\geq ex$ 除以 e 得到。

步骤六（证明第三式）：

对于 $x\geq 0$，令 $h(x)=e^x-1-x-\frac{x^2}{2}$，求导得 $h'(x)=e^x-1-x$，$h''(x)=e^x-1\geq 0$，故 $h'(x)$ 递增，$h'(0)=0$，所以 $h(x)\geq h(0)=0$。

$$h(x)=e^x-1-x-\frac{x^2}{2},\quad h'(x)=e^x-1-x,\quad h''(x)=e^x-1$$

理由：二阶导数非负保证一阶导数单调增，结合 $h'(0)=0$，得 $h(x)$ 在 $x\geq 0$ 上递增，最小值为 0。

结论回扣 **通过导数证明，所有不等式都在特定点取等，且函数值始终非负，故不等式成立。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 证明对于任意实数 x，有 $e^x+e^{-x}\geq 2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解题步骤：

第一步（应用放缩）：

由 $e^x \geq x+1$，将 x 替换为 $-x$ 得 $e^{-x} \geq -x+1$。

理由： 不等式 $e^x \geq x+1$ 对任意实数 x 成立，所以以 $-x$ 代入也成立。

第二步（相加组合）：

将两个不等式相加。

$$e^x + e^{-x} \geq (x+1) + (-x+1)$$

理由： 同向不等式可以相加。

第三步（化简得证）：

右边化简为 2。

$$e^x + e^{-x} \geq 2$$

理由： $(x+1)+(-x+1)=2$，因此原不等式成立。

关键结论： **对于任意实数 x，$e^x + e^{-x} \geq 2$，等号当且仅当 $x=0$ 时成立。**

例 2（稍变形）

题目： 证明当 $x \geq 0$ 时，有 $e^x \geq 1 + x + \dfrac{x^2}{2}$。

解题步骤：

第一步（构造函数）：

令 $h(x) = e^x - 1 - x - \dfrac{x^2}{2}$。

$$h(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$$

理由： 将不等式转化为函数 $h(x) \geq 0$ 的问题。

第二步（求导分析）：

求导得 $h'(x) = e^x - 1 - x$，再次求导 $h''(x) = e^x - 1$。

$$h'(x) = e^x - 1 - x, \quad h''(x) = e^x - 1$$

理由： 通过二阶导数判断一阶导数的单调性。对于 $x \geq 0$，$h''(x) \geq 0$，所以 $h'(x)$ 递增。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（确定最小值）：

当 $x=0$ 时，$h'(0)=0$，且 $h'(x)\geq 0$ 对于 $x\geq 0$，所以 $h(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上递增。

$$h'(0)=e^0-1-0=0,\quad 且h'(x)\geq 0\ 当x\geq 0$$

理由： 由于 $h'(x)$ 递增且 $h'(0)=0$，所以对于 $x\geq 0$，$h'(x)\geq 0$，$h(x)$ 最小值为 $h(0)$。

第四步（计算最小值）：

$h(0)=e^0-1-0-0=0$。

$$h(0)=1-1-0-0=0$$

理由： 因此 $h(x)\geq 0$ 对于所有 $x\geq 0$，即原不等式成立。

关键结论： **当 $x\geq 0$ 时，$e^x\geq 1+x+\dfrac{x^2}{2}$，等号当且仅当 $x=0$ 时成立。**

易错提醒

易错点一（忽略取等条件）

在使用不等式时，忽视等号成立的具体条件，导致结论不准确。

正确理解（等号唯一点）：

每个不等式都有唯一的取等点，如 $e^x\geq x+1$ 只在 $x=0$ 取等。

错因分析（条件遗漏）：

学生往往只记住不等式形式，未记忆取等条件，在需要严格等号时出错。

易错点二（范围误用）

将 $e^x\geq 1+x+\frac{x^2}{2}$ 应用于 $x<0$ 的情况。

正确理解（非负适用）：

该不等式仅当 $x\geq 0$ 时成立，对于 $x<0$ 不一定成立。

错因分析（前提忽视）：

忽略不等式的前提条件 $x\geq 0$，盲目套用公式。

易错点三（形式混淆）

混淆 $e^x\geq ex$ 与 $e^{x-1}\geq x$，误以为两者适用范围不同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（等价变形）：

$e^x \geq ex$ 等价于 $e^{x-1} \geq x$，两者对所有实数 x 成立，等号在 $x = 1$。

错因分析（变形不熟）：

对不等式的等价变形不熟悉，导致应用时选择错误形式。

结论小结

一句话核心 **指数函数 e^x 在其切线和二阶展开下方，提供了一系列多项式下界不等式。**

使用条件

- **条件 1（任意实数）：** 不等式 $e^x \geq x + 1$ 和 $e^x \geq ex$ 对任意实数 x 成立。
- **条件 2（非负实数）：** 不等式 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 仅当 $x \geq 0$ 时成立。

关键提醒

- **易错点（取等条件）：** 每个不等式都有特定取等点，使用时需核对。
- **检查项（范围验证）：** 应用前务必检查变量是否满足不等式的前提条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.13 对勾不等式（x+1/x≥2）

二级结论

条件

条件 1（变量范围）：

x 为非零实数。

结论

结论一（正数情形）：

直观描述： 正数与其倒数之和至少为 2。

$$x + \frac{1}{x} \geq 2, \quad x > 0$$

结论二（负数情形）：

直观描述： 负数与其倒数之和至多为-2。

$$x + \frac{1}{x} \leq -2, \quad x < 0$$

推广结论（一般形式）：

直观描述： 正系数线性与倒数组合的最小值。

$$ax + \frac{b}{x} \geq 2\sqrt{ab}, \quad a, b, x > 0$$

等号/取等条件： 对于结论一，当 $x = 1$ 时等号成立；对于结论二，当 $x = -1$ 时等号成立；对于推广结论，当 $x = \sqrt{b/a}$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉

正数与其倒数之和不会太小，负数与其倒数之和不会太大。

核心拆解

要点一（平方非负）：

利用 $(x-1)^2 \geq 0$ 可推出 $x + 1/x \geq 2$。

要点二（分类讨论）：

对于负数情形，需注意符号反转，不等式方向改变。

几何本质（对勾函数）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

函数 $f(x) = x + 1/x$ 的图像像两个钩子，在 $x = \pm 1$ 处取得极值。

代数意义（均值不等式）

推广形式是均值不等式的直接应用：$ax + b/x \geq 2\sqrt{ax \cdot b/x} = 2\sqrt{ab}$。

考点价值（最值求解）

- **考法一（直接应用）**：求形如 $x + 1/x$ 的最值。
- **考法二（变形构造）**：通过换元或配凑，应用推广形式。

顿悟点

当两项乘积为定值时，其和有最小值（正数情形）。

使用场景

- **场景一（函数最值）**：求分式函数或根式函数的最值。
- **场景二（不等式证明）**：证明涉及倒数和的不等式。

证明

思路提示

通过平方非负或均值不等式，推导和的最值。

正式推导

步骤一（平方构造）：

对于 $x > 0$，考虑 $(x-1)^2 \geq 0$。

$$(x-1)^2 \geq 0$$

理由：实数的平方总是非负。

步骤二（展开变形）：

展开平方并整理。

$$x^2 - 2x + 1 \geq 0$$

理由：将不等式展开。

步骤三（除以正数）：

由于 $x > 0$，两边除以 x 不等号方向不变。

$$x - 2 + \frac{1}{x} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad x + \frac{1}{x} \geq 2$$

理由：除以正数 x，然后移项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（负数情形）：

对于 $x<0$，令 $y=-x>0$，则 $x+1/x=-(y+1/y)$。

$$y+\frac{1}{y}\geq 2 \quad \Rightarrow \quad x+\frac{1}{x}\leq -2$$

理由：利用正数情形，并注意符号反转。

步骤五（推广形式）：

对于 $a,b,x>0$，应用均值不等式。

$$ax+\frac{b}{x}\geq 2\sqrt{ax\cdot\frac{b}{x}}=2\sqrt{ab}$$

理由：两项为正，算术平均不小于几何平均。

结论回扣

综上所述，原结论成立，等号在特定条件下取得。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x>0$，求 $f(x)=x+\frac{1}{x}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（识别形式）：

函数为 $x+1/x$，符合对勾不等式正数情形。

理由：直接应用结论一。

第二步（应用不等式）：

根据不等式，$x+1/x\geq 2$。

$$x+\frac{1}{x}\geq 2$$

理由：当 $x>0$ 时，结论一成立。

第三步（取等条件）：

等号当且仅当 $x=1$ 时成立。

理由：结论一的取等条件。

第四步（得最小值）：

因此，$f(x)$ 的最小值为 2。

理由：不等式给出了下界，且可达到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 当 $x > 0$ 时，$x + 1/x$ 的最小值为 2，在 $x = 1$ 时取得。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $x > 0$，求 $g(x) = 2x + \frac{8}{x}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（匹配推广形式）：

将 $g(x)$ 写成 $ax + b/x$ 形式，其中 $a = 2, b = 8$。

理由： 推广结论要求 $a, b, x > 0$，此处满足。

第二步（应用推广不等式）：

根据推广形式，$2x + 8/x \geq 2\sqrt{2 \cdot 8}$。

$$2x + \frac{8}{x} \geq 2\sqrt{16} = 8$$

理由： 计算 $2\sqrt{ab} = 2\sqrt{16} = 8$。

第三步（取等条件）：

等号当且仅当 $x = \sqrt{b/a} = \sqrt{8/2} = 2$ 时成立。

理由： 推广结论的取等条件。

第四步（得最小值）：

因此，$g(x)$ 的最小值为 8。

理由： 不等式给出了下界，且可达到。

关键结论： 当 $x > 0$ 时，$2x + 8/x$ 的最小值为 8，在 $x = 2$ 时取得。

易错提醒

易错点一（符号忽略）

忘记讨论 x 的符号，直接使用 $x + 1/x \geq 2$。

正确理解（分类讨论）：

必须分 $x > 0$ 和 $x < 0$ 两种情况，不等式方向不同。

错因分析（条件缺失）：

未注意原结论中 $x > 0$ 是前提，负数时结论相反。

易错点二（系数非正）

在推广形式中，a 或 b 不是正数时仍套用不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（正数条件）：

推广形式要求 $a, b, x > 0$，否则不等式可能不成立。

错因分析（前提忽视）：

均值不等式要求各项为正，忽略前提会导致错误。

易错点三（取等遗漏）

求出最值后，忘记验证取等条件是否可达。

正确理解（等号验证）：

必须检查 x 的值是否在定义域内，使等号成立。

错因分析（完整性不足）：

最值问题需同时给出值和取等条件，否则解答不完整。

结论小结

一句话核心

正数与其倒数之和有最小值，负数与其倒数之和有最大值。

使用条件

- **条件 1（变量符号）：** x 为非零实数，需分正负讨论。
- **条件 2（系数正性）：** 推广形式中 a, b, x 必须为正数。

关键提醒

- **易错点（符号反转）：** 负数情形不等式方向相反。
- **检查项（取等条件）：** 应用时务必验证等号是否可达。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.14 琴生不等式（Jensen 不等式）

二级结论

条件

条件 1（函数性质）：

函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续且二阶可导。

条件 2（二阶导符号）：

$f''(x) > 0$（凸函数）或 $f''(x) < 0$（凹函数）。

结论

结论一（两点平均）：

直观描述： 函数值在区间中点的值，不超过两端点函数值的平均。

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

推广结论（加权平均）：

直观描述： 函数在加权平均点处的值，不超过函数值的加权平均。

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i)$$

等号/取等条件： 等号成立当且仅当所有自变量 x_i 相等，或函数 f 为线性函数。

理解说明

一句话直觉 对于凸（凹）函数，任意两点连线的中点（或更一般的加权平均点）总落在函数图像上方（下方），说明函数图像呈碗口向上（下）的形状。

核心拆解

要点一（二阶导判凸凹）：

二阶导大于零，函数为凸；二阶导小于零，函数为凹。

要点二（中点不等式）：

凸函数满足“中点值 ≤ 平均值”；凹函数方向相反。

要点三（加权推广）：

中点不等式可推广到任意有限个点的加权平均，权重为正且和为 1。

几何本质（图像形状） 凸函数的图像任意两点连线位于图像上方（或重合），像

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

一个碗口向上的碗。凹函数则相反。不等式反映了这种几何特性：中点的函数值被两端点连线的线性插值“压住”。

代数意义（均值估计） 代数上，它提供了一种用有限个点的函数值来估计函数在平均点处值的方法。它说明凸（凹）函数的函数值在平均运算下具有次（超）可加性。

考点价值（函数不等式）

- **考法一（直接证明）**：题目直接要求证明形如 $f(\frac{a+b}{2}) \le \frac{f(a)+f(b)}{2}$ 的不等式。
- **考法二（构造应用）**：题目给出函数表达式，需要先判断其凸凹性，再利用琴生不等式推导出其他不等式（如幂平均不等式）。

顿悟点 **凸性（$f'' > 0$）本质是函数图像“弯曲向上”，这使得弦在图像之上；凹性反之。**记住“凸 $\le$ 平均，凹 $\ge$ 平均”，结合二阶导符号可快速判断方向。

使用场景

- **场景一（证明均值不等式）**：通过选取 $f(x) = -\ln x$, $f(x) = x^p$ 等特殊凸函数，可证明算术-几何平均、幂平均等不等式。
- **场景二（估算函数值）**：当函数凸性已知且自变量接近时，可用端点函数值估算中间点的函数值范围。

证明

思路提示 以凸函数 $f''(x) > 0$ 为例。核心是利用导数的性质：一阶导单调递增。可考虑对两点连线中点的函数值进行泰勒展开，或者利用拉格朗日中值定理。这里我们采用中值定理的经典证法，逐步推导。

正式推导

步骤一（构造中点差值）：

设 $x_1 < x_2$，记 $x_0 = \frac{x_1+x_2}{2}$。考虑差

$$\Delta = \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} - f(x_0)$$

目标证明 $\Delta \ge 0$。

理由：将不等式转化为一个非负性的证明。

步骤二（应用中值定理）：

分别在 $[x_1, x_0]$ 和 $[x_0, x_2]$ 上对 $f(x)$ 使用拉格朗日中值定理，存在 $\xi_1 \in (x_1, x_0)$，$\xi_2 \in (x_0, x_2)$，使得

$$f(x_0) - f(x_1) = f'(\xi_1)(x_0 - x_1), \quad f(x_2) - f(x_0) = f'(\xi_2)(x_2 - x_0)$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：拉格朗日中值定理将函数差值转化为导数与自变量差的乘积。

步骤三（利用凸性单调性）：

由于 $f''(x) > 0$，$f'(x)$ 单调递增。又 $\xi_1 < x_0 < \xi_2$，所以 $f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$。

理由：二阶导大于零意味一阶导单调递增，这是凸函数的等价刻画之一。

步骤四（重组并判断符号）：

将步骤二的等式改写并代入 Δ：

$$\begin{aligned}\Delta &= \frac{1}{2}\big[(f(x_1) - f(x_0)) + (f(x_2) - f(x_0))\big] \\ &= \frac{1}{2}\big[-f'(\xi_1)(x_0 - x_1) + f'(\xi_2)(x_2 - x_0)\big]\end{aligned}$$

注意到 $x_0 - x_1 = x_2 - x_0 = \frac{x_2 - x_1}{2} > 0$，因此

$$\Delta = \frac{x_2 - x_1}{4}\big(f'(\xi_2) - f'(\xi_1)\big)$$

由 $f'(\xi_2) > f'(\xi_1)$，得 $\Delta > 0$，除非 $x_1 = x_2$ 时 $\Delta = 0$。

理由：提公因式后，差的符号由导数差决定，利用单调性得证。

结论回扣 **以上证明了凸函数情形 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \le \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$，等号当 $x_1 = x_2$ 成立。**凹函数情形证明类似，仅不等号方向相反。加权推广可通过数学归纳法或利用凸函数定义证得，此处从略。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $f(x) = x^2$，证明对任意实数 a, b，有 $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \le \frac{a^2+b^2}{2}$。

解题步骤：

第一步（判断凸凹性）：

计算 $f(x) = x^2$ 的二阶导数：$f''(x) = 2 > 0$。

理由：二阶导恒为正，说明 $f(x)$ 是凸函数，满足琴生不等式（凸函数情形）。

第二步（直接套用结论）：

根据琴生不等式（两点形式），对任意 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$，有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \le \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

令 $x_1 = a, x_2 = b$，并将 $f(x) = x^2$ 代入得

$$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \le \frac{a^2 + b^2}{2}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：直接应用结论，注意函数对应关系。

第三步（讨论取等条件）：

等号成立当且仅当 $a=b$ 或 f 为线性函数。此处 $f(x)=x^2$ 不是线性函数，故等号成立当且仅当 $a=b$。

理由：根据定理，取等条件为自变量相等或函数线性。

关键结论： **对于凸函数 $f(x)=x^2$，其满足中点平方不超过平方的平均。**

例 2（稍变形）

题目： 已知 $f(x)=\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上是凹函数，利用琴生不等式证明：对任意正数 a,b，有 $\sqrt{ab}\le\frac{a+b}{2}$。

解题步骤：

第一步（确认函数性质）：

题目已告知 $f(x)=\ln x$ 是凹函数，即 $f''(x)=-\frac{1}{x^2}<0$。

理由：凹函数满足琴生不等式的反向形式。

第二步（应用凹函数不等式）：

对于凹函数，琴生不等式为 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\ge\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$。取 $x_1=a,x_2=b$，代入 $f(x)=\ln x$ 得

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right)\ge\frac{\ln a+\ln b}{2}=\ln\sqrt{ab}$$

理由：直接应用凹函数形式的结论，并利用对数运算性质。

第三步（利用单调性化简）：

因为 $\ln x$ 是单调递增函数，由上式可得

$$\frac{a+b}{2}\ge\sqrt{ab}$$

等号成立当且仅当 $a=b$。

理由：对数不等式两边取指数，即 $e^{\ln L}\ge e^{\ln R}$，由于 e^x 单调递增，不等号方向不变。

关键结论： **利用凹函数 $\ln x$ 的琴生不等式，可推导出算术平均-几何平均不等式。**

易错提醒

易错点一（凸凹判断混淆）

记错二阶导符号与凸凹性的对应关系，导致不等式方向写反。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（符号对应）：

$f''(x) > 0$ 对应凸函数，图像“向上凸”（像碗口向上），此时弦在中点上方，故有 $f(\frac{x_1+x_2}{2}) \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$。

错因分析（几何直观弱）：

仅死记符号，未结合图像记忆。建议画图：向上凸的曲线，任意两点连线在中点处高于曲线。

易错点二（忽略取等条件）

使用不等式时，忽略等号成立的条件，导致答案不完整或分类讨论遗漏。

正确理解（等号成立）：

等号成立有两个可能：一是所有自变量相等；二是函数本身是线性的（此时二阶导为零）。通常题目中函数非线性，故等号仅当所有自变量相等时成立。

错因分析（定理记忆不全）：

只记不等式形式，未记等号条件。考试中常需利用取等条件求最值或参数，必须牢记。

易错点三（区间与定义域忽视）

在应用琴生不等式时，未检查自变量是否都在函数定义区间 I 内，也未考虑函数的连续、可导条件。

正确理解（条件验证）：

使用前必须确认：函数在区间 I 上二阶可导且符号恒定；所有取用的自变量 x_i 均属于 I；加权系数 λ_i 为正且和为 1。

错因分析（急于套公式）：

看到形式类似就直接使用，忽略定理成立的前提条件，可能导致错误结论。

结论小结

一句话核心 **凸函数“中点值 ≤ 平均值”，凹函数相反；该结论可推广到加权平均，是证明许多重要不等式的有力工具。**

使用条件

- **条件 1（函数性质）：** 函数在区间 I 上连续且二阶可导（至少已知凸凹性）。
- **条件 2（凸凹性明）：** 明确二阶导符号（$f'' > 0$ 凸，$f'' < 0$ 凹）或已知凸凹性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 3（点属区间）**：所有涉及的自变量 x_i 均属于定义区间 I。

关键提醒

- **易错点（方向判断）**：务必根据凸凹性确定不等号方向，可借图像记忆。
- **检查项（取等条件）**：使用后检查等号成立条件，通常为所有自变量相等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.15 指数凸性不等式（Jensen 不等式应用）

二级结论

条件

条件 1（任意实数）：

设 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 是任意实数。

结论

结论一（指数平均大）：

直观描述： 指数平均不小于指数底数的算术平均的指数。

$$\frac{e^{x_1}+e^{x_2}+\cdots+e^{x_n}}{n} \geq e^{\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}}$$

推广结论（加权形式）：

直观描述： 权重非负时，加权指数平均不小于加权算术平均的指数。

$$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i e^{x_i} \geq e^{\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i}, \quad \text{其中}\lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^{n}\lambda_i = 1.$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉

指数函数的凸性保证了函数值的平均不低于平均值的函数值。

核心拆解

要点一（凸函数性质）：

指数函数 e^x 是凸函数，其图像任意两点连线位于图像上方。

要点二（Jensen 不等式）：

对凸函数，函数值的加权平均不小于加权平均的函数值。

几何本质（图像凸性）

凸函数图像上任意两点连线段位于图像上方，因此 n 个点的平均点对应的函数值不超过这 n 个点函数值的平均。

代数意义（均值关系）

算术平均的指数小于等于指数的算术平均，这是对数凸性的一种体现。

考点价值（不等式证明）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（直接应用）**：证明不等式或求最值问题。
- **考法二（变形构造）**：通过取对数转化为线性不等式。

顿悟点

当出现指数和与指数内线性和的比较时，可尝试应用此结论。

使用场景

- **场景一（最值问题）**：约束条件下求指数和的最值。
- **场景二（不等式链）**：与其他均值不等式结合使用。

证明

思路提示

利用指数函数的凸性，直接应用 Jensen 不等式。

正式推导

步骤一（凸性验证）：

证明 $f(x) = e^x$ 是凸函数。

$$f''(x) = e^x > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

理由：二阶导数恒正说明函数是严格凸的。

步骤二（Jensen 不等式）：

对凸函数 f，有 Jensen 不等式：

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i) \geq f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\right),$$

其中 $\lambda_i \geq 0$ 且 $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1$。

理由：凸函数的定义推广到多点加权平均。

步骤三（取等权重）：

取 $\lambda_i = \frac{1}{n}$，则

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(x_i) \geq f\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right).$$

理由：权重相等时是 Jensen 不等式的特例。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（代入函数）：

代入 $f(x) = e^x$，得到

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e^{x_i} \geq e^{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i}.$$

理由： 函数的具体形式。

步骤五（取等条件）：

等号成立当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$。

理由： 由于 f 是严格凸函数，等号成立当且仅当所有 x_i 相等。

结论回扣

因此原不等式成立，且取等条件为所有变量相等。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知实数 a, b, c 满足 $a + b + c = 0$，求证：$e^a + e^b + e^c \geq 3$。

解题步骤：

第一步（应用不等式）：

由指数凸性不等式，有

$$\frac{e^a + e^b + e^c}{3} \geq e^{\frac{a+b+c}{3}}.$$

理由： 直接代入 $n = 3$。

第二步（利用条件）：

因为 $a + b + c = 0$，所以

$$e^{\frac{a+b+c}{3}} = e^0 = 1.$$

理由： 代入已知条件。

第三步（得出结论）：

于是

$$\frac{e^a + e^b + e^c}{3} \geq 1 \quad \Rightarrow \quad e^a + e^b + e^c \geq 3.$$

理由： 整理不等式。

关键结论： **当 $a + b + c = 0$ 时，$e^a + e^b + e^c \geq 3$，等号当 $a = b = c = 0$ 时成立。**

例 2（稍变形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 已知实数 x, y, z 满足 $x+y+z=3$，求证：$e^{x-1}+e^{y-1}+e^{z-1} \geq 3$。

解题步骤：

第一步（换元转化）：

令 $a=x-1, b=y-1, c=z-1$，则 $a+b+c=(x+y+z)-3=0$。

理由： 将条件转化为 $a+b+c=0$，从而与例 1 类似。

第二步（应用不等式）：

由指数凸性不等式，有

$$\frac{e^a+e^b+e^c}{3} \geq e^{\frac{a+b+c}{3}} = e^0 = 1.$$

理由： 直接代入 $n=3$ 和条件 $a+b+c=0$。

第三步（回代得证）：

所以 $e^a+e^b+e^c \geq 3$，即 $e^{x-1}+e^{y-1}+e^{z-1} \geq 3$。

理由： 将 a, b, c 换回 $x-1, y-1, z-1$。

关键结论： **当 $x+y+z=3$ 时，$e^{x-1}+e^{y-1}+e^{z-1} \geq 3$，等号当 $x=y=z=1$ 时成立。**

易错提醒

易错点一（方向记反）

误以为指数平均小于等于平均的指数，从而不等式方向写反。

正确理解（凸性决定）：

指数函数是凸函数，因此函数值的平均不小于平均值的函数值，不等式方向为 $\geq$。

错因分析（凹凸混淆）：

混淆了凸函数与凹函数的 Jensen 不等式形式。

易错点二（取等忽略）

使用时只写出不等式，忽略等号成立条件。

正确理解（严格凸性）：

等号成立当且仅当所有变量相等，否则为严格大于。

错因分析（细节遗漏）：

认为不等式在任何情况下都严格成立，未注意取等条件的重要性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（权重滥用）

在加权形式中，未保证权重非负且和为 1 就直接使用。

正确理解（权重要求）：

加权 Jensen 不等式要求权重 $\lambda_i \geq 0$ 且 $\sum \lambda_i = 1$，否则结论不成立。

错因分析（条件缺失）：

忽略了凸函数 Jensen 不等式的适用条件。

结论小结

一句话核心

指数函数的凸性导致指数平均不小于平均的指数。

使用条件

- **条件 1（变量实数）：** $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 为任意实数。
- **条件 2（权重相等）：** 主结论中默认权重相等；加权形式需权重非负且和为 1。

关键提醒

- **易错点（方向记反）：** 牢记凸函数导致 $\geq$，切勿反向。
- **检查项（取等条件）：** 检查等号是否在所有变量相等时取得。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.16 指数函数凸性不等式：算术平均 ≥ 几何平均

二级结论

条件

条件 1（底数正且非一）：

$a > 0$ 且 $a \neq 1$。

结论

结论一（算术几何平均不等式）：

直观描述： 两指数函数值的算术平均不小于中点的函数值。

$$\frac{a^x + a^y}{2} \geq a^{\frac{x+y}{2}}.$$

推广结论（加权凸性形式）：

直观描述： 加权平均形式，系数和为 1 时仍成立。

$$\lambda a^x + (1-\lambda)a^y \geq a^{\lambda x + (1-\lambda)y}, \quad \lambda \in (0,1).$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x = y$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉 指数函数图像总是向上弯曲，因此连接图像上任意两点的线段总在图像上方，中点函数值不超过两端点函数值的平均。

核心拆解

要点一（下凸函数）：

函数 $f(x) = a^x$ 是严格下凸函数，其二阶导数恒正。

要点二（中点估计）：

对任意两点 x 和 y，函数在它们中点 $\frac{x+y}{2}$ 的值不超过两端点函数值的算术平均。

几何本质（图像上凸） 在坐标系中画出 $y = a^x$ 的图像，图像呈“上翘”形状。取图像上两点 $A(x, a^x)$ 和 $B(y, a^y)$，连接线段 AB，线段 AB 上横坐标为 $\frac{x+y}{2}$ 的点对应纵坐标为 $\frac{a^x+a^y}{2}$，而图像上同横坐标的点纵坐标为 $a^{\frac{x+y}{2}}$，由图像下凸性质知线段点在图像点上方。

代数意义（平方非负） 将原不等式变形：令 $t = a^{\frac{x-y}{2}}$，则 $a^x = a^{\frac{x+y}{2}}t$，$a^y = a^{\frac{x+y}{2}}t^{-1}$。代入得 $\frac{t+t^{-1}}{2} \geq 1$，即 $t^2 - 2t + 1 \geq 0$，等价于 $(t-1)^2 \geq 0$，显然成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（函数与不等式）

- **考法一（比较大小）**：用于比较两个指数式之和与某个中间值的大小关系。
- **考法二（证明不等式）**：作为放缩工具，证明含指数函数的不等式，尤其是涉及平均值的情形。

顿悟点 **指数函数的凸性本质上是基本不等式 $(a^{\frac{x-y}{2}}-1)^2 \geq 0$ 的体现，通过换元可化为完全平方。**

使用场景

- **场景一（对称式估计）**：当出现对称的指数项 $a^x + a^y$ 且与 $a^{\frac{x+y}{2}}$ 比较时，直接应用。
- **场景二（加权放缩）**：当问题中出现带权重的指数项和时，考虑推广的加权形式。

证明

思路提示 利用换元法将指数不等式转化为关于新变量的完全平方非负形式，这是处理指数对称式的常用技巧。

正式推导

步骤一（引入中间量）：

令 $t = a^{\frac{x-y}{2}}$。因为 $a > 0$，所以 $t > 0$。

$$a^{\frac{x+y}{2}} > 0.$$

理由： 将 a^x 和 a^y 用 t 和 $a^{\frac{x+y}{2}}$ 表示。由指数运算法则：

$$a^x = a^{\frac{x+y}{2}+\frac{x-y}{2}} = a^{\frac{x+y}{2}} \cdot a^{\frac{x-y}{2}} = a^{\frac{x+y}{2}} t,$$

$$a^y = a^{\frac{x+y}{2}-\frac{x-y}{2}} = a^{\frac{x+y}{2}} \cdot a^{-\frac{x-y}{2}} = a^{\frac{x+y}{2}} t^{-1}.$$

步骤二（代入不等式）：

将上述表达式代入原不等式左边。

$$\frac{a^x + a^y}{2} = \frac{a^{\frac{x+y}{2}} t + a^{\frac{x+y}{2}} t^{-1}}{2} = a^{\frac{x+y}{2}} \cdot \frac{t + t^{-1}}{2}.$$

理由： 提取公因式 $a^{\frac{x+y}{2}}$。

步骤三（化完全平方）：

比较 $\frac{t+t^{-1}}{2}$ 与 1 的大小。

$$\frac{t + t^{-1}}{2} - 1 = \frac{t + t^{-1} - 2}{2} = \frac{t^2 - 2t + 1}{2t} = \frac{(t-1)^2}{2t}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：通分并配方。因为 $t > 0$，分母 $2t > 0$，分子 $(t-1)^2 \geq 0$，所以 $\frac{(t-1)^2}{2t} \geq 0$。

步骤四（得出结论）：

由步骤三得 $\frac{t+t^{-1}}{2} \geq 1$，因此

$$\frac{a^x + a^y}{2} = a^{\frac{x+y}{2}} \cdot \frac{t+t^{-1}}{2} \geq a^{\frac{x+y}{2}} \cdot 1 = a^{\frac{x+y}{2}}.$$

理由：两边同乘正数 $a^{\frac{x+y}{2}}$，不等号方向不变。

步骤五（取等条件）：

等号成立当且仅当 $\frac{(t-1)^2}{2t} = 0$，即 $t = 1$。

$$t = 1 \iff a^{\frac{x-y}{2}} = 1 \iff \frac{x-y}{2} = 0 \iff x = y.$$

理由：因为 $a > 0$ 且 $a \neq 1$，所以 $a^k = 1$ 当且仅当 $k = 0$。

结论回扣 **由此我们严格证明了 $\frac{a^x+a^y}{2} \geq a^{\frac{x+y}{2}}$，且等号成立当且仅当 $x = y$，这正是指数函数严格下凸性的一个直接推论。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $a > 0$，$a \neq 1$，比较 $a^3 + a^5$ 与 $2a^4$ 的大小，并说明理由。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

观察形式为 $a^x + a^y$ 与 $2a^{\frac{x+y}{2}}$，其中 $x = 3$，$y = 5$。

理由：直接对应结论中的 $\frac{a^x+a^y}{2} \geq a^{\frac{x+y}{2}}$，两边乘以 2 得 $a^x + a^y \geq 2a^{\frac{x+y}{2}}$。

第二步（应用结论）：

根据指数函数的凸性，有

$$a^3 + a^5 \geq 2a^{\frac{3+5}{2}} = 2a^4.$$

理由：结论中取 $x = 3$，$y = 5$，算术平均为 $\frac{a^3+a^5}{2}$，几何平均对应 $a^{\frac{3+5}{2}} = a^4$。

第三步（判断等号）：

等号成立当且仅当 $3 = 5$，但 $3 \neq 5$，故等号不成立。

理由：取等条件为 $x = y$，此处不满足。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第四步（写出结论）：

因此 $a^3 + a^5 > 2a^4$。

理由： 严格大于。

关键结论： $a^3 + a^5 > 2a^4$，**因为指数函数严格下凸且** $3 \neq 5$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a > 1$，求证：对任意实数 x, y，有 $a^{2x} + a^{2y} \geq 2a^{x+y}$，并指出等号成立条件。

解题步骤：

第一步（变量替换）：

令 $u = 2x$，$v = 2y$，则 $x = \frac{u}{2}$，$y = \frac{v}{2}$。

理由： 将目标不等式化为标准形式 $a^u + a^v \geq 2a^{\frac{u+v}{2}}$。

第二步（应用标准形式）：

根据结论，对任意实数 u, v，有

$$\frac{a^u + a^v}{2} \geq a^{\frac{u+v}{2}}.$$

两边乘以 2 得

$$a^u + a^v \geq 2a^{\frac{u+v}{2}}.$$

理由： 直接套用指数函数凸性不等式。

第三步（回代变量）：

将 $u = 2x$，$v = 2y$ 代入：

$$a^{2x} + a^{2y} \geq 2a^{\frac{2x+2y}{2}} = 2a^{x+y}.$$

理由： 计算 $\frac{u+v}{2} = \frac{2x+2y}{2} = x + y$。

第四步（等号条件）：

等号成立当且仅当 $u = v$，即 $2x = 2y$，亦即 $x = y$。

理由： 原结论等号成立当且仅当 $u = v$。

关键结论： **不等式** $a^{2x} + a^{2y} \geq 2a^{x+y}$ **恒成立，等号成立当且仅当** $x = y$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（底数范围混淆）

忽视底数 a 必须满足 $a > 0$ 且 $a \neq 1$，误以为对任意实数 a 成立。

正确理解（正底非一）：

结论仅在 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 时成立。$a = 1$ 时函数为常函数，不等式变为等式但无研究价值；$a \leq 0$ 时指数函数无定义或性质不同。

错因分析（定义域遗忘）：

忽略指数函数的基本定义域和底数限制，机械记忆公式导致错误。

易错点二（等号条件遗漏）

应用不等式后忽略讨论等号成立条件，或错误认为等号总成立。

正确理解（中点重合）：

等号成立当且仅当 $x = y$，即两点横坐标相同（函数图像上两点重合）。

错因分析（凸性理解不足）：

对“严格下凸”理解不深，误以为在某些情况下 $x \neq y$ 也可能取等。

易错点三（方向记反）

记错不等式方向，误写为 $\frac{a^x+a^y}{2} \leq a^{\frac{x+y}{2}}$。

正确理解（算术平均大）：

由于函数下凸，两端点算术平均大于中点函数值，故不等号为 $\geq$。

错因分析（图像想象错误）：

混淆“上凸”与“下凸”的几何直观，或将指数函数误认为上凸函数。

结论小结

一句话核心 **指数函数 a^x（$a > 0$，$a \neq 1$）图像下凸，因此两端点函数值的算术平均不小于中点函数值。**

使用条件

- **条件 1（底数正非一）：** $a > 0$ 且 $a \neq 1$，这是指数函数的基本定义。
- **条件 2（实数自变量）：** x, y 为任意实数，无其他限制。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **易错点（等号条件）**：等号仅在 $x = y$ 时成立，使用时务必验证。
- **检查项（不等式方向）**：确保不等号方向为 $\geq$，表示算术平均大于等于几何平均（中点函数值）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.17 正弦函数凹性不等式

二级结论

条件

条件 1（区间限制）：

$x, y \in (0, \pi)$。

条件 2（内角条件）：

A, B, C 为三角形内角。

结论

结论一（凹性不等式）：

直观描述： 正弦函数凹性导致算术平均小于中点正弦值。

$$\frac{\sin x + \sin y}{2} \leq \sin\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

推广结论（三角形正弦和）：

直观描述： 三角形内角正弦和的最大值为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$。

$$\frac{\sin A + \sin B + \sin C}{3} \leq \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

等号/取等条件： 对于结论一，等号成立当且仅当 $x = y$；对于推广结论，等号成立当且仅当 $\triangle ABC$ 为正三角形。

理解说明

一句话直觉

正弦函数在 $(0, \pi)$ 上图像向下凸（凹），导致任意两点连线的中点对应的正弦值大于两点正弦值的算术平均。

核心拆解

要点一（凹性判定）：

正弦函数在区间 $(0, \pi)$ 上的二阶导数为负，即 $\frac{d^2}{dx^2}\sin x = -\sin x < 0$（因为 $x \in (0, \pi)$ 时 $\sin x > 0$），故为凹函数。

要点二（凹性不等式）：

对于凹函数 f，有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{f(x)+f(y)}{2}$，代入 $f(x) = \sin x$ 即得结论。

几何本质（弦在曲线下方）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

在平面直角坐标系中，连接 $(x, \sin x)$ 和 $(y, \sin y)$ 两点的线段位于正弦曲线下方，中点处线段纵坐标小于曲线纵坐标。

代数意义（平均值比较）

不等式比较了函数值的算术平均与自变量平均点的函数值，凹性确保后者不小于前者。

考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接放缩）**：在证明含正弦的不等式时，直接应用此公式进行放缩。
- **考法二（最值求解）**：在三角形中求正弦和的最大值或相关最值问题。

顿悟点

凹性不等式的取等条件对应自变量相等，在三角形中对应内角均等（正三角形）。

使用场景

- **场景一（两点比较）**：当题目涉及比较 $\sin x$ 与 $\sin y$ 的平均值与 $\sin \frac{x+y}{2}$ 时。
- **场景二（三角形优化）**：当题目涉及三角形内角正弦和或乘积的最值时。

证明

思路提示

通过计算正弦函数的二阶导数证明其在 $(0, \pi)$ 上为凹函数，然后利用凹函数的定义导出不等式，最后在三角形中应用。

正式推导

步骤一（计算导数）：

对 $f(x) = \sin x$ 求导。

$$f'(x) = \cos x, \quad f''(x) = -\sin x.$$

理由：正弦函数的一阶导为余弦，二阶导为负正弦。

步骤二（判断凹性）：

在区间 $(0, \pi)$ 上，有 $\sin x > 0$，故 $f''(x) = -\sin x < 0$。

$$f''(x) < 0 \quad \text{对任意} x \in (0, \pi).$$

理由：二阶导为负是函数为凹的充分条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（应用凹性）：

对于凹函数 f，有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{f(x)+f(y)}{2}$。

$$\sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{\sin x + \sin y}{2}.$$

理由： 将 $f(x) = \sin x$ 代入凹函数不等式。

步骤四（三角形推广）：

设 A, B, C 为三角形内角，则 $A + B + C = \pi$，且 $A, B, C \in (0, \pi)$。

$$\frac{\sin A + \sin B + \sin C}{3} \leq \sin\left(\frac{A+B+C}{3}\right) = \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

理由： 对三个点应用凹函数不等式，并利用三角形内角和为 π。

结论回扣

综上，正弦函数在 $(0, \pi)$ 上的凹性导致不等式 $\frac{\sin x+\sin y}{2} \leq \sin\left(\frac{x+y}{2}\right)$，在三角形中进一步得到 $\frac{\sin A+\sin B+\sin C}{3} \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$，取等条件分别为 $x = y$ 和 $A = B = C$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $x, y \in (0, \pi)$，且 $x + y = \frac{\pi}{2}$，证明 $\sin x + \sin y \leq \sqrt{2}$。

解题步骤：

第一步（应用凹性）：

由正弦函数凹性不等式，有

$$\frac{\sin x + \sin y}{2} \leq \sin\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

理由： 因为 $x, y \in (0, \pi)$，满足凹性条件。

第二步（代入条件）：

代入 $x + y = \frac{\pi}{2}$，得 $\frac{x+y}{2} = \frac{\pi}{4}$。

$$\frac{\sin x + \sin y}{2} \leq \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

理由： 利用已知条件简化中点正弦值。

第三步（导出结论）：

两边乘以 2，得到

$$\sin x + \sin y \leq 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： 不等式两边同乘正数 2，不等号方向不变。

关键结论： **当 $x+y=\frac{\pi}{2}$ 时，$\sin x+\sin y$ 的最大值为 $\sqrt{2}$，取等当 $x=y=\frac{\pi}{4}$。**

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，证明 $\sin A+\sin B\le 2\cos\frac{C}{2}$。

解题步骤：

第一步（应用凹性）：

由正弦函数凹性不等式，有

$$\frac{\sin A+\sin B}{2}\le\sin\left(\frac{A+B}{2}\right).$$

理由： 因为 $A,B\in(0,\pi)$ 且为三角形内角，满足凹性条件。

第二步（利用内角和）：

在三角形中，$A+B=\pi-C$，所以 $\frac{A+B}{2}=\frac{\pi}{2}-\frac{C}{2}$。

$$\sin\left(\frac{A+B}{2}\right)=\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{C}{2}\right)=\cos\frac{C}{2}.$$

理由： 三角函数的诱导公式。

第三步（结合得证）：

代入第一步的不等式，得到

$$\frac{\sin A+\sin B}{2}\le\cos\frac{C}{2}\quad\Rightarrow\quad\sin A+\sin B\le 2\cos\frac{C}{2}.$$

理由： 将第二步结果代入并乘以 2。

关键结论： **在三角形中，$\sin A+\sin B\le 2\cos\frac{C}{2}$，取等当 $A=B$。**

易错提醒

易错点一（区间忽略）

将不等式应用于 $x,y\notin(0,\pi)$ 的情况，导致错误。

正确理解（区间限制）：

不等式成立的前提是 $x,y\in(0,\pi)$，因为正弦函数在此区间才为凹。

错因分析（定义不清）：

未检查函数凹性所依赖的区间，盲目套用公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（凹凸混淆）

记忆凹性与凸性时混淆，导致不等号方向写反。

正确理解（凹性不等式）：

对于凹函数，中点函数值不小于端点函数值的平均。

错因分析（概念模糊）：

对凹函数和凸函数的几何形象区分不清。

易错点三（取等遗漏）

在使用不等式放缩后，忽略等号成立的条件。

正确理解（取等条件）：

等号成立当且仅当所有自变量相等（如 $x = y$ 或 $A = B = C$）。

错因分析（细节疏忽）：

只关注不等式本身，未考虑取等时的变量关系。

结论小结

一句话核心

正弦函数在 $(0, \pi)$ 上为凹函数，因此其函数值的算术平均不大于自变量中点处的函数值。

使用条件

- **条件 1（区间内点）：** 自变量 x, y 必须属于开区间 $(0, \pi)$。
- **条件 2（三角形角）：** 在三角形中应用时，A, B, C 需为内角且均在 $(0, \pi)$ 内。

关键提醒

- **易错点（方向混淆）：** 凹性不等式不等号方向为 $\leq$，勿与凸性混淆。
- **检查项（取等验证）：** 应用后务必检查等号成立条件是否满足题目要求。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.18 余弦函数凹性不等式与三角形余弦和上界

二级结论

条件

条件 1（角度范围）：

$x, y \in (0, \frac{\pi}{2})$。

条件 2（三角形内角）：

A, B, C 是锐角三角形的三个内角。

结论

结论一（余弦凹性不等式）：

直观描述： 两角余弦算术平均不超过半角余弦。

$$\frac{\cos x + \cos y}{2} \leq \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

推广结论（三角形余弦和上界）：

直观描述： 锐角三角形内角余弦和不超过 $\frac{3}{2}$。

$$\cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$$

等号/取等条件： 对于结论一，等号成立当且仅当 $x = y$；对于推广结论，等号成立当且仅当 $A = B = C = \frac{\pi}{3}$（即三角形为等边三角形）。

理解说明

一句话直觉

凹函数图像上任意两点连弦位于曲线下方，因此函数值的算术平均不超过平均自变量的函数值。

核心拆解

要点一（凹函数定义）：

对于凹函数 f，有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{f(x)+f(y)}{2}$。

要点二（Jensen 不等式）：

对于凹函数，函数值的加权平均不超过自变量加权平均的函数值。

几何本质（弦在曲线下）

在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上，余弦函数图像是凹的，连接图像上两点的弦位于曲线下方。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（平均不等式）

不等式反映了算术平均与函数值的关系：对于凹函数，函数值的算术平均不超过自变量的算术平均的函数值。

考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接应用）**：证明两个角的余弦不等式。
- **考法二（三角形极值）**：求锐角三角形余弦和的最大值。

顿悟点

凹性导致“平均函数值”小于“函数平均值”，但注意方向：$\frac{f(x)+f(y)}{2} \leq f\left(\frac{x+y}{2}\right)$ 对应凹函数。

使用场景

- **场景一（证明不等式）**：当涉及余弦函数的不等式时，可考虑凹性放缩。
- **场景二（优化问题）**：在锐角三角形中求三角函数和的极值。

证明

思路提示

利用余弦函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上的凹性，对于两个角直接应用凹函数定义；对于三角形，应用 Jensen 不等式。

正式推导

步骤一（验证凹性）：

余弦函数 $f(t) = \cos t$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上二阶导数 $f''(t) = -\cos t < 0$，因此是凹函数。

理由：凹函数的二阶导数非正。

步骤二（应用凹性）：

对于凹函数，取 $t = \frac{1}{2}$，有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{f(x)+f(y)}{2}$。

$$\cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{\cos x + \cos y}{2}$$

理由：凹函数定义。

步骤三（得不等式）：

整理即得两个角的不等式。

$$\frac{\cos x + \cos y}{2} \leq \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：不等号方向不变。

步骤四（三角形设置）：

设 A, B, C 是锐角三角形的内角，则 $A, B, C \in (0, \frac{\pi}{2})$ 且 $A + B + C = \pi$。

理由：锐角三角形定义和内角和定理。

步骤五（应用 Jensen 不等式）：

由于余弦函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上凹，由 Jensen 不等式（等权重）：

$$\frac{\cos A + \cos B + \cos C}{3} \leq \cos\left(\frac{A + B + C}{3}\right)$$

理由：凹函数对三点平均成立。

步骤六（代入求和）：

代入 $A + B + C = \pi$，计算 $\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$，两边乘以 3 得：

$$\cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$$

理由：简单代数运算。

结论回扣

因此，对于两个锐角，余弦值的平均不超过半角的余弦；对于锐角三角形，余弦和不超过 $\frac{3}{2}$，等号在 $x = y$ 或 $A = B = C = \frac{\pi}{3}$ 时成立。

典型例题

例 1（基础）

题目：设 $x, y \in (0, \frac{\pi}{2})$ 且 $x + y = \frac{\pi}{2}$，证明 $\cos x + \cos y \leq \sqrt{2}$。

解题步骤：

第一步（应用凹性不等式）：

由结论一，$\frac{\cos x + \cos y}{2} \leq \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$。

理由：直接代入已知条件。

第二步（代入半角）：

由 $x + y = \frac{\pi}{2}$，得 $\frac{x+y}{2} = \frac{\pi}{4}$，故 $\cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$。

$$\frac{\cos x + \cos y}{2} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

理由：计算余弦值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（得结论）：

两边乘以 2，得到 $\cos x + \cos y \le \sqrt{2}$。

理由：不等式乘法性质。

关键结论： 当 $x + y = \frac{\pi}{2}$ 时，$\cos x + \cos y$ 的最大值为 $\sqrt{2}$，等号在 $x = y = \frac{\pi}{4}$ 时成立。

例 2（稍变形）

题目： 在锐角三角形 ABC 中，证明 $\cos A + \cos B + \cos C \le \frac{3}{2}$，并求等号成立条件。

解题步骤：

第一步（确认条件）：

A, B, C 是锐角三角形的内角，故 $A, B, C \in (0, \frac{\pi}{2})$ 且 $A + B + C = \pi$。

理由：锐角三角形性质。

第二步（应用 Jensen 不等式）：

由于余弦函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上凹，有：

$$\frac{\cos A + \cos B + \cos C}{3} \le \cos\left(\frac{A + B + C}{3}\right)$$

理由：凹函数的 Jensen 不等式。

第三步（计算化简）：

代入 $A + B + C = \pi$，$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$，两边乘以 3 得：

$$\cos A + \cos B + \cos C \le \frac{3}{2}$$

理由：代数运算。

关键结论： 锐角三角形余弦和的最大值为 $\frac{3}{2}$，等号当且仅当 $A = B = C = \frac{\pi}{3}$（等边三角形）时成立。

易错提醒

易错点一（区间忽略）：

误将角度取到区间外，如 $x \ge \frac{\pi}{2}$，仍应用不等式。

正确理解（严格锐角）：

结论仅当 $x, y \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（凸性改变）：

余弦函数在更大区间上凸性改变，不等式方向可能反转。

易错点二（方向混淆）：

记错凹函数不等式方向，写成 $\frac{\cos x+\cos y}{2} \geq \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$。

正确理解（弦在下）：

凹函数图像弦在曲线下，因此函数值平均不超过平均值的函数值。

错因分析（定义不清）：

对凹函数定义记忆模糊，与凸函数混淆。

易错点三（三角形非锐角）：

在非锐角三角形中应用 $\cos A+\cos B+\cos C \leq \frac{3}{2}$。

正确理解（仅锐角）：

该不等式仅对锐角三角形成立；直角三角形或钝角三角形可能不成立。

错因分析（条件遗漏）：

忽略“锐角三角形”前提，错误推广。

结论小结

一句话核心

余弦函数在锐角区间凹，导致两角余弦平均不超过半角余弦；锐角三角形余弦和有上界 $\frac{3}{2}$。

使用条件

- **条件 1（角度范围）：** $x, y \in (0, \frac{\pi}{2})$。
- **条件 2（三角形内角）：** A, B, C 是锐角三角形的三个内角。

关键提醒

- **易错点（区间与方向）：** 确保角度在锐角区间，并记住不等式方向。
- **检查项（取等条件）：** 等号成立时 $x=y$ 或 $A=B=C=\frac{\pi}{3}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.19 正切凸性不等式与锐角三角形正切和

二级结论

条件

条件 1（角范围）：

两个角 x, y 都在开区间 $(0, \pi/2)$ 内。

结论

结论一（正切凸性不等式）：

直观描述： 正切值的算术平均不小于这两角算术平均的正切值。

$$\frac{\tan x + \tan y}{2} \geq \tan\left(\frac{x+y}{2}\right),$$

等号成立当且仅当 $x = y$。

推广结论（三角形正切和下界）：

直观描述： 锐角三角形三个内角正切之和不小于 $3\sqrt{3}$。

$$\tan A + \tan B + \tan C \geq 3\sqrt{3},$$

等号成立当且仅当 $A = B = C = \pi/3$（即三角形为等边三角形）。

等号/取等条件： 对于结论一，等号成立当且仅当 $x = y$；对于推广结论，等号成立当且仅当三角形为等边三角形。

理解说明

一句话直觉 正切函数在 $(0, \pi/2)$ 区间内是凸函数，因此两个角的正切值的算术平均不会小于这两角算术平均的正切值；推广到锐角三角形，三个内角正切之和有一个确定的下界 $3\sqrt{3}$。

核心拆解

要点一（凸性定义）：

函数 $f(x)$ 在区间 I 上称为凸函数，如果对于任意 $x_1, x_2 \in I$ 和 $t \in [0, 1]$，有 $f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$。正切函数在 $(0, \pi/2)$ 满足此性质。

要点二（Jensen 不等式）：

对于凸函数 f，有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$，这正是主结论的表达式。

几何本质（正切曲线凸性） 在 $(0, \pi/2)$ 区间，正切曲线的图像是向下凸的（即二

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

阶导数为正），因此连接曲线上两点的线段位于曲线上方，导致算术平均的正切值不大于正切值的算术平均。

代数意义（差法证明） 可通过考虑差函数 $D(x,y)=\frac{\tan x+\tan y}{2}-\tan\left(\frac{x+y}{2}\right)$，利用三角恒等式化简，证明其非负，从而建立不等式。

考点价值（不等式最值）

- **考法一（直接应用）**：在比较两个角的正切值大小或证明相关不等式时，直接使用该结论。
- **考法二（三角形最值）**：在锐角三角形中，求正切和的最小值或证明其不小于 $3\sqrt{3}$，常用于解三角形与不等式综合题。

顿悟点 **当遇到正切函数在锐角范围内的不等式时，可优先考虑其凸性，利用 Jensen 不等式或差法快速证明。**

使用场景

- **场景一（两角比较）**：已知两个锐角，比较 $\tan x+\tan y$ 与 $2\tan((x+y)/2)$ 的大小。
- **场景二（三角形论证）**：在锐角三角形中，证明 $\tan A+\tan B+\tan C\geq 3\sqrt{3}$ 或类似结论。

证明

思路提示 利用正切函数的凸性，或通过构造差函数并利用三角恒等式证明其非负；对于推论，结合主定理和三角形内角和性质，利用 Jensen 不等式或对称性推导。

正式推导

步骤一（设差函数）：

定义差函数 $D(x,y)=\frac{\tan x+\tan y}{2}-\tan\left(\frac{x+y}{2}\right)$，目标证明 $D(x,y)\geq 0$。

$$D(x,y)=\frac{\tan x+\tan y}{2}-\tan\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

理由：将不等式转化为函数非负性问题，便于分析。

步骤二（三角恒等式）：

利用正切和公式：$\tan x+\tan y=\frac{\sin(x+y)}{\cos x\cos y}$，以及 $\tan\left(\frac{x+y}{2}\right)=\frac{\sin(x+y)}{1+\cos(x+y)}$。

$$\begin{aligned}D(x,y)&=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sin(x+y)}{\cos x\cos y}-\frac{\sin(x+y)}{1+\cos(x+y)}\\&=\sin(x+y)\left(\frac{1}{2\cos x\cos y}-\frac{1}{1+\cos(x+y)}\right)\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：通过恒等式化简，将差函数表示为公共因子乘以一个表达式。

步骤三（判别符号）：

由于 $x, y \in (0, \pi/2)$，有 $\sin(x+y) > 0$，因此只需证明括号内表达式非负。即证明：

$$\frac{1}{2\cos x \cos y} \geq \frac{1}{1+\cos(x+y)}$$

这等价于 $1+\cos(x+y) \geq 2\cos x \cos y$。

理由：$\sin(x+y)$ 为正，不影响不等号方向；比较分母大小即可。

步骤四（化简不等式）：

利用余弦和公式 $\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$，代入得：

$$\begin{aligned} 1+\cos(x+y) &\geq 2\cos x \cos y \\ 1+\cos x \cos y - \sin x \sin y &\geq 2\cos x \cos y \\ 1-\cos x \cos y - \sin x \sin y &\geq 0 \\ 1-(\cos x \cos y + \sin x \sin y) &\geq 0 \\ 1-\cos(x-y) &\geq 0 \end{aligned}$$

理由：将不等式逐步化简，最终得到 $\cos(x-y) \leq 1$，这显然成立。

步骤五（取等条件）：

等号成立当且仅当 $\cos(x-y) = 1$，即 $x-y = 2k\pi$，但由于 $x, y \in (0, \pi/2)$，所以 $x = y$。

$$D(x,y) = 0 \iff \cos(x-y) = 1 \iff x = y$$

理由：$\cos(x-y) = 1$ 时，差函数为零；结合角范围得 $x = y$。

步骤六（推广到三角形）：

对于锐角三角形 $\triangle ABC$，有 $A, B, C \in (0, \pi/2)$ 且 $A+B+C = \pi$。应用主定理于三组角对，或直接使用 Jensen 不等式。

$$\begin{aligned} \tan A + \tan B + \tan C &\geq 3\tan\left(\frac{A+B+C}{3}\right) \\ &= 3\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = 3\sqrt{3} \end{aligned}$$

理由：正切函数在 $(0, \pi/2)$ 是凸函数，由 Jensen 不等式，对于凸函数 f，有 $\frac{f(A)+f(B)+f(C)}{3} \geq f\left(\frac{A+B+C}{3}\right)$，这里 $f(x) = \tan x$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤七（三角形取等）：

等号成立当且仅当 $A = B = C$，即三角形为等边三角形。

$$\tan A + \tan B + \tan C = 3\sqrt{3} \iff A = B = C = \frac{\pi}{3}$$

理由： Jensen 不等式等号成立当且仅当所有变量相等。

结论回扣 因此，主定理和推论得证：在 $(0, \pi/2)$ 内，正切函数满足凸性不等式；在锐角三角形中，正切和的最小值为 $3\sqrt{3}$，当且仅当三角形等边时取得。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x, y \in (0, \pi/2)$，且 $x + y = \frac{\pi}{3}$，证明 $\tan x + \tan y \geq \frac{2}{\sqrt{3}}$。

解题步骤：

第一步（应用主定理）：

根据主定理，有 $\frac{\tan x + \tan y}{2} \geq \tan\left(\frac{x+y}{2}\right)$。

$$\frac{\tan x + \tan y}{2} \geq \tan\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

理由： 直接使用正切凸性不等式。

第二步（代入已知）：

已知 $x + y = \frac{\pi}{3}$，所以 $\frac{x+y}{2} = \frac{\pi}{6}$，且 $\tan(\pi/6) = \frac{1}{\sqrt{3}}$。

$$\frac{\tan x + \tan y}{2} \geq \tan\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

理由： 将已知条件代入不等式。

第三步（整理结论）：

两边乘以 2，得到 $\tan x + \tan y \geq \frac{2}{\sqrt{3}}$。

$$\tan x + \tan y \geq 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

理由： 简单代数变形，得到所求不等式。

关键结论： 对于满足 $x + y = \pi/3$ 的锐角 x, y，有 $\tan x + \tan y \geq 2/\sqrt{3}$，等号当 $x = y = \pi/6$ 时成立。

例 2（稍变形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 设 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，求 $\tan A + \tan B + \tan C$ 的最小值，并说明取到最小值时三角形的形状。

解题步骤：

第一步（应用推论）：

根据推论，对于锐角三角形，有 $\tan A + \tan B + \tan C \geq 3\sqrt{3}$。

$$\tan A + \tan B + \tan C \geq 3\sqrt{3}$$

理由： 直接使用三角形正切和不等式。

第二步（验证等号）：

等号成立当且仅当 $A = B = C = \pi/3$，即三角形为等边三角形。

$$\tan A + \tan B + \tan C = 3\sqrt{3} \iff A = B = C = \frac{\pi}{3}$$

理由： 推论中明确了取等条件。

第三步（结论）：

因此，$\tan A + \tan B + \tan C$ 的最小值为 $3\sqrt{3}$，当且仅当三角形为等边三角形时取到。

$$\min(\tan A + \tan B + \tan C) = 3\sqrt{3}$$

理由： 由不等式知下界为 $3\sqrt{3}$，且等号可达，故为最小值。

关键结论： **在锐角三角形中，$\tan A + \tan B + \tan C$ 的最小值为 $3\sqrt{3}$，取到最小值时三角形为等边三角形。**

易错提醒

易错点一（忽略角范围）

在使用不等式时，忽略角 x, y 必须在 $(0, \pi/2)$ 内，错误地应用于其他区间。

正确理解（锐角限制）：

该不等式仅在角属于 $(0, \pi/2)$ 时成立，因为正切函数在此区间内是凸的。

错因分析（凸性丢失）：

正切函数在 $(0, \pi/2)$ 外可能不是凸的，甚至无定义，导致不等式不成立。

易错点二（三角形非锐角）

将推论应用于非锐角三角形，错误地认为 $\tan A + \tan B + \tan C \geq 3\sqrt{3}$ 恒成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（锐角条件）：

推论仅对锐角三角形成立，对于钝角三角形，正切值可能为负，不等式不再有效。

错因分析（符号变化）：

在钝角三角形中，一个内角大于 $\pi/2$，其正切为负，从而和可能小于 $3\sqrt{3}$。

易错点三（等号条件忽略）

在使用不等式求最值时，忽略等号成立条件，导致答案不完整或错误。

正确理解（取等必要）：

不等式等号成立有特定条件：对于主定理需 $x = y$，对于推论需 $A = B = C = \pi/3$。

错因分析（条件遗漏）：

在证明或求解中，未验证等号是否可达，从而无法确定最值是否取到。

结论小结

一句话核心 **正切函数在 $(0, \pi/2)$ 内是凸函数，导致两个角的正切算术平均不小于这两角平均的正切；推广到锐角三角形，三个内角正切之和不小于 $3\sqrt{3}$。**

使用条件

- **条件 1（角范围）：** 角必须属于开区间 $(0, \pi/2)$。
- **条件 2（三角形锐角）：** 当推广到三角形时，三角形必须是锐角三角形。

关键提醒

- **易错点（范围验证）：** 使用前务必检查角是否在 $(0, \pi/2)$ 内，或三角形是否为锐角。
- **检查项（取等条件）：** 在求最值或证明时，记得说明等号成立条件，以确保结论严谨。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.20 对数平均不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

设 $x, y \in (0, +\infty)$。

结论

结论一（对数平均）：

直观描述： 算术平均的对数不小于对数的算术平均。

$$\frac{\ln x + \ln y}{2} \leq \ln\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

推广结论（Jensen 推广）：

直观描述： 对任意有限个正实数，对数平均不等式成立。

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \ln x_i \leq \ln\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right).$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x = y$（主结论）或 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$（推广结论）时取等。

理解说明

一句话直觉

对数函数图像是“向上凸”的，因此连接曲线上两点的弦总在曲线下方。

核心拆解

要点一（凹函数定义）：

函数 $f(t) = \ln t$ 在 $(0, +\infty)$ 上为凹函数，即其二阶导数为负。

要点二（Jensen 不等式）：

凹函数满足：函数值的平均不超过平均值的函数值。

几何本质（弦在曲线下）

对于凹函数，图像上任意两点连成的弦段总位于函数图像之下。因此，弦中点对应的函数值不小于曲线中点的函数值。

代数意义（平均不等式）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

将“对数”视为一种运算，该不等式表明：先取对数再平均，结果不大于先平均再取对数。这类似于算术-几何平均不等式的对数版本。

考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接应用）**：用于证明含对数的不等式，或比较对数表达式大小。
- **考法二（函数凸性）**：结合函数凹凸性，考察 Jensen 不等式的使用。

顿悟点

当题目中出现“$\ln\frac{x+y}{2}$”与“$\frac{\ln x+\ln y}{2}$”的比较时，应立即联想到此结论。

使用场景

- **场景一（双变量不等式）**：涉及两个正实数对数平均的比较问题。
- **场景二（多变量推广）**：需要处理多个正实数对数表达式时，使用推广形式。

证明

思路提示

利用函数 $f(t)=\ln t$ 的凹性，通过导数或定义证明不等式。这里采用导数法证明凹性，再应用凹函数性质。

正式推导

步骤一（函数凹性）：

考虑 $f(t)=\ln t$，计算其二阶导数。

$$f'(t)=\frac{1}{t},\quad f''(t)=-\frac{1}{t^2}.$$

理由：由于 $t>0$，$f''(t)<0$，故 $f(t)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是凹函数。

步骤二（凹函数性质）：

对于凹函数，有 Jensen 不等式：对任意 $x,y>0$ 和 $\lambda\in[0,1]$，

$$\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y)\le f(\lambda x+(1-\lambda)y).$$

取 $\lambda=\frac{1}{2}$，即得

$$\frac{f(x)+f(y)}{2}\le f\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

理由：Jensen 不等式是凹函数的直接性质，当权重相等时简化。

步骤三（代入函数）：

将 $f(t)=\ln t$ 代入上式。

$$\frac{\ln x+\ln y}{2}\le \ln\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： 直接替换 f 的定义即得主结论。

步骤四（推广证明）：

对于 n 个正实数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$，同样由 f 的凹性和 Jensen 不等式，

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(x_i) \le f\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right).$$

代入 $f(t) = \ln t$ 即得推广结论。

理由： Jensen 不等式对有限个点成立，权重为 $\frac{1}{n}$。

结论回扣

因此，对数函数 $f(t) = \ln t$ 的凹性保证了所述不等式成立，且等号仅在所有变量相等时取得。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $a, b > 0$，比较 $\frac{\ln a + \ln b}{2}$ 与 $\ln\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 的大小。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

由题，a, b 为正实数，满足对数平均不等式的条件。

理由： 不等式要求 $x, y > 0$，此处 $x = a, y = b$。

第二步（应用结论）：

直接使用对数平均不等式。

$$\frac{\ln a + \ln b}{2} \le \ln\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

理由： 这是结论一的直接代入。

第三步（判断取等）：

等号成立当且仅当 $a = b$。

理由： 根据取等条件，当两数相等时取等。

关键结论： $\frac{\ln a + \ln b}{2} \le \ln\left(\frac{a+b}{2}\right)$，**等号当 $a = b$ 时成立。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $x, y > 0$ 且 $x \ne y$，证明：$\frac{\ln x - \ln y}{x - y} < \frac{1}{\sqrt{xy}}$。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（变形目标）：

将目标不等式改写为更熟悉的形式。注意到 $\frac{\ln x-\ln y}{x-y}=\frac{\ln\frac{x}{y}}{x-y}$，但不如直接利用对数平均不等式。

理由： 观察发现，对数平均不等式涉及 $\frac{\ln x+\ln y}{2}$ 和 $\ln\left(\frac{x+y}{2}\right)$，但目标有差分。考虑对称化处理。

第二步（应用对称形式）：

由对数平均不等式，对于 $x,y>0$，有

$$\ln\left(\frac{x+y}{2}\right)-\frac{\ln x+\ln y}{2}\geq 0.$$

整理得

$$\ln\left(\frac{x+y}{2}\right)\geq\frac{\ln x+\ln y}{2}=\ln\sqrt{xy}.$$

理由： 利用 $\frac{\ln x+\ln y}{2}=\ln\sqrt{xy}$。

第三步（推导目标）：

由于 $x\neq y$，不等式严格成立。取指数得 $\frac{x+y}{2}>\sqrt{xy}$。但目标不等式是 $\frac{\ln x-\ln y}{x-y}<\frac{1}{\sqrt{xy}}$，需另寻方法。考虑函数 $f(t)=\ln t$ 的凹性：差商小于中点的导数值。即

$$\frac{\ln x-\ln y}{x-y}<f'\left(\frac{x+y}{2}\right)=\frac{2}{x+y}.$$

又由算术-几何平均不等式，$\frac{2}{x+y}\leq\frac{1}{\sqrt{xy}}$，且当 $x\neq y$ 时严格小于。因此

$$\frac{\ln x-\ln y}{x-y}<\frac{2}{x+y}\leq\frac{1}{\sqrt{xy}}.$$

理由： 凹函数性质结合基本不等式，逐步推导目标。

关键结论： 对于 $x,y>0$ 且 $x\neq y$，有 $\frac{\ln x-\ln y}{x-y}<\frac{1}{\sqrt{xy}}$。

易错提醒

易错点一（方向混淆）

误记不等式方向，认为 $\frac{\ln x+\ln y}{2}\geq\ln\left(\frac{x+y}{2}\right)$。

正确理解（凹函数性质）：

由于 $\ln t$ 是凹函数，函数值的平均不超过平均值的函数值，因此不等式方向为 $\leq$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（图像误读）：

将凹函数图像误记为“凸向上”，导致方向判断错误。

易错点二（忽略定义域）

在应用时忽略 x, y 必须为正实数的条件，错误用于非正数。

正确理解（定义域限制）：

对数函数 $\ln t$ 的定义域是 $(0, +\infty)$，因此 x, y 必须为正。

错因分析（函数未定义）：

忘记对数仅对正数有定义，导致在无效区间使用结论。

易错点三（取等条件漏解）

认为等号总是成立，或仅在 $x = y$ 时成立但推广形式中忽略所有变量相等。

正确理解（严格取等）：

等号成立当且仅当所有涉及的变量相等（双变量时 $x = y$，多变量时 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$）。

错因分析（条件遗漏）：

未注意 Jensen 不等式取等条件要求所有点相同，导致漏解或多解。

结论小结

一句话核心

对数函数是凹函数，因此对数的算术平均不超过算术平均的对数。

使用条件

- **条件 1（正实数）**：所有变量必须为正实数，确保对数有定义。
- **条件 2（凹函数适用）**：结论依赖于 $\ln t$ 的凹性，推广时需确认函数性质。

关键提醒

- **易错点（方向记忆）**：牢记不等式方向为 $\frac{\ln x + \ln y}{2} \le \ln\left(\frac{x+y}{2}\right)$，避免反号。
- **检查项（取等条件）**：应用后务必检查等号是否可能成立，通常仅在变量相等时取等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.21 幂函数凸性不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数变量）：

设 $x, y > 0$，$n \in \mathbb{R}$。

结论

结论一（指数外凸）：

直观描述： 当指数 $n > 1$ 或 $n < 0$ 时，幂函数上凸，算术平均不小于幂平均。

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2}\right)^n.$$

结论二（指数内凹）：

直观描述： 当指数 $0 < n < 1$ 时，幂函数下凸，算术平均不大于幂平均。

$$\frac{x^n + y^n}{2} \leq \left(\frac{x+y}{2}\right)^n.$$

推广结论（Jensen 特例）：

直观描述： 此结论是凸函数 Jensen 不等式的二元特例。

$$\text{对于凸函数} f, \quad f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

等号/取等条件： 等号成立当且仅当 $x = y$。

理解说明

一句话直觉 幂函数的凸性决定了算术平均与幂平均的大小关系，指数范围直接控制不等式方向。

核心拆解

要点一（指数定凸凹）：

指数 n 的范围决定 $f(t) = t^n$ 的凸凹性：$n > 1$ 或 $n < 0$ 时凸，$0 < n < 1$ 时凹。

要点二（凸凹控方向）：

凸函数时算术平均不小于函数平均，凹函数时反向。

几何本质（图像凸性） 在 $t > 0$ 上，幂函数图像当 $n > 1$ 或 $n < 0$ 时向上弯曲（上

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

凸），两点连线中点在函数图像上方；当 $0 < n < 1$ 时向下弯曲（下凸），中点在下。不等式反映此几何特征。

代数意义（缩放比较） 比较 $x^n + y^n$ 与 $(x+y)^n$ 的缩放关系。当 $n > 1$ 或 $n < 0$ 时，$x^n + y^n$ 被放大；当 $0 < n < 1$ 时，被缩小。中心点是算术平均的幂次。

考点价值（不等式应用）

- **考法一（直接比较）**：给定 x, y, n，直接计算并比较两边大小，验证不等式。
- **考法二（证明中间步）**：在复杂不等式证明中，作为放缩工具，简化幂次运算。

顿悟点 **不等式方向与指数范围一一对应，只需记住“外凸则大、内凹则小”，避免死记硬背。**

使用场景

- **场景一（对称不等式）**：处理含有 $x^n + y^n$ 与 $(x+y)^n$ 的对称式时，直接应用。
- **场景二（最值估计）**：在优化问题中，利用不等式给出表达式上下界，简化求最值。

证明

思路提示 通过分析幂函数 $f(t) = t^n$ 的凸凹性（利用二阶导数），应用凸函数不等式（Jensen 不等式特例）直接导出结论。

正式推导

步骤一（函数定义）：

定义函数 $f(t) = t^n$，其中 $t > 0$，$n \in \mathbb{R}$。

$$f(t) = t^n.$$

理由： 将原不等式转化为函数凸性问题，便于分析。

步骤二（导数计算）：

求 $f(t)$ 的一阶和二阶导数。

$$f'(t) = nt^{n-1}, \quad f''(t) = n(n-1)t^{n-2}.$$

理由： 二阶导数的符号决定函数的凸凹性。

步骤三（凸性判断）：

分析 $f''(t)$ 的符号。

$$\text{当} n > 1 \text{ 或} n < 0 \text{ 时}, n(n-1) > 0 \Rightarrow f''(t) > 0, f \text{ 为凸函数}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$$\text{当}0 < n < 1\text{ 时}, n(n-1) < 0 \Rightarrow f''(t) < 0,\ f\text{ 为凹函数}.$$

理由：二阶导正则凸，负则凹，这是凸凹性的充要条件。

步骤四（凸性不等式）：

应用凸函数性质。对于凸函数 f，有

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \le \frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

对于凹函数 f，不等号反向。等号成立当且仅当 $x = y$。

理由：这是凸函数 Jensen 不等式的二元等权重特例，可直接引用。

步骤五（代入得证）：

将 $f(t) = t^n$ 代入上式。

$$\text{当}n > 1\text{ 或}n < 0\text{ 时：}\quad \left(\frac{x+y}{2}\right)^n \le \frac{x^n+y^n}{2}.$$

$$\text{当}0 < n < 1\text{ 时：}\quad \frac{x^n+y^n}{2} \le \left(\frac{x+y}{2}\right)^n.$$

理由：直接替换 $f(x) = x^n, f(y) = y^n$，即得原不等式。

结论回扣 **因此，原命题成立：不等式方向由指数 n 的范围决定，等号当且仅当 $x = y$ 时取得。证明完毕。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $x = 2, y = 8, n = 2$，比较 $\frac{x^n+y^n}{2}$ 与 $\left(\frac{x+y}{2}\right)^n$ 的大小。

解题步骤：

第一步（判断指数）：

由 $n = 2$，满足 $n > 1$。

理由：根据结论，当 $n > 1$ 时，不等式方向为 $\frac{x^n+y^n}{2} \ge \left(\frac{x+y}{2}\right)^n$。

第二步（计算左边）：

计算 $\frac{x^n+y^n}{2} = \frac{2^2+8^2}{2}$。

$$\frac{2^2+8^2}{2} = \frac{4+64}{2} = \frac{68}{2} = 34.$$

理由：直接代入数值进行算术运算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（计算右边）：

计算 $\left(\frac{x+y}{2}\right)^n = \left(\frac{2+8}{2}\right)^2$。

$$\left(\frac{2+8}{2}\right)^2 = \left(\frac{10}{2}\right)^2 = 5^2 = 25.$$

理由：先求算术平均，再取幂次。

第四步（比较大小）：

比较 34 与 25。

$$34 > 25 \quad \Rightarrow \quad \frac{x^n + y^n}{2} > \left(\frac{x+y}{2}\right)^n.$$

理由：数值验证符合不等式方向。

关键结论： 当 $n > 1$ 时，确有 $\frac{x^n+y^n}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2}\right)^n$，等号当 $x = y$ 时成立。本例中 $x \neq y$，故为严格大于。

例 2（稍变形）

题目： 设 $a, b > 0$，且 $a + b = 1$，求 $a^2 + b^2$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（识别指数）：

表达式 $a^2 + b^2$ 对应 $n = 2$，满足 $n > 1$。

理由：可应用结论，形式为 $\frac{a^2+b^2}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$。

第二步（应用不等式）：

由结论，直接写出不等式。

$$\frac{a^2+b^2}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2.$$

理由：这是 $n = 2 > 1$ 时的标准形式。

第三步（代入条件）：

代入 $a + b = 1$。

$$\frac{a^2+b^2}{2} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

理由：将已知条件代入右边，简化计算。

第四步（解出目标）：

两边乘以 2，得到 $a^2 + b^2$ 的下界。

$$a^2 + b^2 \geq 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

理由：代数变形求出最小值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第五步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $a=b$。结合 $a+b=1$，得 $a=b=\frac{1}{2}$。

理由：原不等式等号当 $a=b$ 时成立，代入条件解出具体值。

关键结论： a^2+b^2 **的最小值为** $\frac{1}{2}$**，当且仅当** $a=b=\frac{1}{2}$ **时取得。此题展示了不等式在求最值中的应用。**

易错提醒

易错点一（方向记反）

学生常记错不等式方向，误以为 $n>1$ 时左边小、右边大。

正确理解（凸性定方向）：

不等式方向由凸凹性决定：凸时左边大，凹时左边小。

错因分析（直观混淆）：

混淆“凸函数图像在上”与“不等式符号方向”，未建立几何与代数的对应。

易错点二（忽略等号）

使用时忽略等号成立条件，错误认为不等式总是严格的。

正确理解（取等唯一）：

等号仅当 $x=y$ 时成立，否则为严格不等式。

错因分析（条件遗漏）：

未注意凸函数等号条件，或误以为其他情况（如 $n=0$ 等）也能取等。

易错点三（变量范围）

忽略 $x,y>0$ 的前提，在非正数上错误应用。

正确理解（正数定义域）：

结论仅对正实数 x,y 成立，因幂函数在非正数上可能无定义或凸性改变。

错因分析（定义域忽视）：

未注意幂函数 t^n 在 $t>0$ 外的复杂性，随意扩展使用范围。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 **幂函数凸性不等式：指数范围决定算术平均与幂平均的大小关系，是 Jensen 不等式的二元特例。**

使用条件

- **条件 1（正实数变量）：** $x, y > 0$，确保幂函数定义良好。
- **条件 2（指数范围）：** $n \in \mathbb{R}$，但需按 $n > 1$、$n < 0$、$0 < n < 1$ 分区讨论。

关键提醒

- **易错点（方向对应）：** 不等式方向与指数范围严格对应：外凸（$n > 1$ 或 $n < 0$）时左边大，内凹（$0 < n < 1$）时左边小。
- **检查项（先判后）：** 使用前先判断 n 的范围，再选用正确不等式，最后验证等号条件 $x = y$ 是否可能。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.22 二元分式和不等式（倒数和 ≥4/(和)）

二级结论

条件

条件 1（正数条件）：

$x, y > 0$。

结论

结论一（倒数和不等式）：

直观描述： 两数倒数和不小于和的倒数的四倍。

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y}$$

结论二（和积不等式）：

直观描述： 和与倒数和之积不小于四。

$$(x+y)\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) \geq 4$$

推广结论（权方和形式）：

直观描述： 带权平方和不等式。

$$\frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y} \geq \frac{(a+b)^2}{x+y}$$

等号/取等条件：

- 对于结论一和结论二，当且仅当 $x = y$。
- 对于推广结论，当且仅当 $\frac{a}{x} = \frac{b}{y}$（即 $ay = bx$）。

理解说明

一句话直觉 正数倒数的均值关系，本质是柯西不等式或均值不等式的直接推论。

核心拆解

要点一（均值变形）：

从基本不等式 $(x+y)^2 \geq 4xy$ 出发，可立即推出倒数和形式。

要点二（柯西特例）：

权方和形式是柯西不等式的二维特例 $(a_1^2/b_1 + a_2^2/b_2)(b_1 + b_2) \geq (a_1 + a_2)^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（形式等价）：

倒数和形式与和积形式仅是移项区别，本质相同。

几何本质（倒数和关系） 该不等式描述了正数与其倒数的一种“调和”关系。当两个正数相等时，它们的倒数也相等，此时“倒数和”与“和的倒数”之间达到最紧的比值 4。

代数意义（优化工具） 这是处理分式不等式的重要工具。尤其当问题中出现 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 与 $x+y$ 的组合时，可直接建立桥梁。权方和形式则用于将平方项与线性项“分配”到分母上，实现放缩目标。

考点价值（分式放缩）

- **考法一（直接应用）**：在条件不等式证明中，直接使用结论建立不等关系。
- **考法二（变形构造）**：需先对目标式进行恒等变形，再凑出适用形式。
- **考法三（权方和放缩）**：处理含平方项的分式最值或证明问题。

顿悟点 **当看到 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 与 $x+y$ 同时出现时，要立刻联想到该不等式链。权方和形式本质是“平方平均 ≥ 算术平均”在带权情形下的体现。**

使用场景

- **场景一（分式最值）**：求 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 在 $x+y$ 定值下的最小值。
- **场景二（不等式证明）**：在复杂分式不等式中作为中间放缩步骤。
- **场景三（系数匹配）**：权方和形式用于匹配系数，将分散项合并。

证明

思路提示 基本形式和乘积形式等价，可由均值不等式或柯西不等式直接证明。权方和形式是柯西不等式的二维特例，证明采用“平方和配凑”或柯西直接展开。

正式推导

步骤一（均值证明）：

由 $x, y > 0$，根据算术-几何均值不等式，

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy} \quad \Rightarrow \quad (x+y)^2 \geq 4xy.$$

理由： 对正数 x, y 应用基本均值不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（倒数和形式）：

由 $(x+y)^2 \geq 4xy$，两边同除以正数 $xy(x+y)$，得

$$\frac{x+y}{xy} \geq \frac{4}{x+y} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{y}+\frac{1}{x} \geq \frac{4}{x+y}.$$

理由： $xy(x+y)>0$，不等式方向不变，通分即得倒数和形式。

步骤三（乘积形式）：

将倒数和形式两边同乘以 $(x+y)$，得

$$(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right) \geq 4.$$

理由： $(x+y)>0$，不等式方向不变，直接相乘即可。

步骤四（权方和证明）：

由柯西不等式 $(a_1^2+a_2^2)(b_1^2+b_2^2) \geq (a_1b_1+a_2b_2)^2$，取

$$a_1=\frac{a}{\sqrt{x}},\ a_2=\frac{b}{\sqrt{y}},\ b_1=\sqrt{x},\ b_2=\sqrt{y}.$$

则左边为 $\left(\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}\right)(x+y)$，右边为 $(a+b)^2$。

理由： 这是柯西不等式的标准构造，注意平方根与分母匹配。

步骤五（整理得结论）：

由于 $x+y>0$，将上步两边同除以 $(x+y)$ 即得

$$\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y} \geq \frac{(a+b)^2}{x+y}.$$

理由： 除以正数不改变不等号方向。

结论回扣 **以上推导严格证明了三个不等式形式。**取等条件分别对应均值等号成立（$x=y$）以及柯西等号成立（$a/\sqrt{x}:\sqrt{x}=b/\sqrt{y}:\sqrt{y}$，即 $a/x=b/y$）。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x>0, y>0$，且 $x+y=1$，求 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}$ 的最小值。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（识别形式）：

题目条件为 $x+y=1$，目标为 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$，符合倒数和不等式结构。

理由：直接应用结论一。

第二步（直接应用）：

由倒数和不等式，

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\geq\frac{4}{x+y}.$$

理由： $x,y>0$ 满足不等式条件。

第三步（代入求值）：

将 $x+y=1$ 代入右边，得

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\geq\frac{4}{1}=4.$$

理由：不等式右边化为常数。

第四步（取等检查）：

等号成立当且仅当 $x=y$，结合 $x+y=1$ 得 $x=y=\frac{1}{2}$。

理由：检查等号条件是否可达，以确定最小值确实能取到。

关键结论： **最小值为 4，当且仅当 $x=y=\frac{1}{2}$ 时取得。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $a,b>0$，证明：$\dfrac{a^2}{b}+\dfrac{b^2}{a}\geq a+b$。

解题步骤：

第一步（观察目标）：

目标不等式左边是 $\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}$，右边是 $a+b$。

理由：尝试与权方和形式 $\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}\geq\frac{(a+b)^2}{x+y}$ 进行比对。

第二步（匹配系数）：

令权方和形式中的 $x=b,y=a$，同时分子 a,b 分别对应 a,b。则左边即为 $\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}$。

理由：直接代入 $x=b,y=a$ 进行匹配。

第三步（应用不等式）：

代入权方和不等式，得

$$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\geq\frac{(a+b)^2}{b+a}=\frac{(a+b)^2}{a+b}=a+b.$$

理由：严格应用推广结论，注意分母 $x+y=b+a=a+b$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第四步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $\dfrac{a}{b}=\dfrac{b}{a}$，即 $a^2=b^2$，由 $a,b>0$ 得 $a=b$。

理由：验证等号条件 $\frac{a}{x}=\frac{b}{y}$，此处即 $\frac{a}{b}=\frac{b}{a}$。

关键结论： **不等式得证，等号成立当且仅当 $a=b$。**

易错提醒

易错点一（忽视正数条件）

未验证 $x,y>0$ 就直接使用不等式。

正确理解（先验条件）：

不等式成立的前提是 x,y 均为正实数。若为负，结论可能反向或不成立。

错因分析（条件缺失）：

记忆结论时只记公式，忽略其成立的必要条件。

易错点二（取等混淆）

将权方和形式的取等条件 $\frac{a}{x}=\frac{b}{y}$ 误记为 $x=y$。

正确理解（分类记取等）：

基本形式与乘积形式的取等是 $x=y$；权方和形式的取等是 $\frac{a}{x}=\frac{b}{y}$。两者不同。

错因分析（形式混淆）：

未能区分不同形式不等式背后的来源（均值与柯西），导致取等条件张冠李戴。

易错点三（滥用权方和）

在分母 $x+y$ 可能为零或负时，未加讨论直接使用权方和形式。

正确理解（分母正性）：

权方和形式中，虽然 a,b 可任意，但 $x,y>0$ 必须保证 $x+y>0$，才能安全地除以 $x+y$。

错因分析（忽略分母）：

只关注分子平方项，忽略了分母作为“权”必须为正，否则不等式方向可能改变。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 **正数倒数和的“调和”关系：倒数和 ≥4/(和)，其推广是权方和不等式。**

使用条件

- **条件 1（正数前提）：** $x > 0, y > 0$ 是使用所有形式的前提。
- **条件 2（分母非零）：** 权方和形式还需 $x + y > 0$（由正数条件自然满足）。
- **条件 3（形式匹配）：** 根据目标式是倒数和、乘积还是带平方项选择对应形式。

关键提醒

- **易错点（取等区分）：** 基本形式取等 $x = y$，权方和形式取等 $a/x = b/y$，切勿混淆。
- **检查项（先验验证）：** 使用前必先确认 $x, y > 0$；使用后检查等号条件是否可达。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.23 xlnx 的凸性与 Jensen 不等式

二级结论

条件

条件 1（定义域与函数）：

函数 $f(x) = x\ln x$，其中 $x > 0$，即定义域为正实数。

结论

结论一（凸性判定）：

直观描述： 函数 $f(x)$ 在其定义域上是凸函数。

$$f''(x) = \frac{1}{x} > 0 \quad (x > 0)$$

推广结论（Jensen 不等式）：

直观描述： 凸函数的性质使得均值函数值不大于函数值的均值。

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \ln x_i \geq \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right) \ln\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right)$$

等号/取等条件： 当且仅当所有变量相等，即 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 时，不等式等号成立。

理解说明

一句话直觉 对数线性组合的平均值，总是不小于先平均再取对数的结果。这是信息熵不等式或凸性原理在高中阶段的直接体现。

核心拆解

要点一（凸函数定义）：

通过二阶导 $f''(x) = 1/x > 0$ 确认 $x\ln x$ 在 $x > 0$ 上是凸函数。

要点二（Jensen 直接应用）：

对凸函数直接应用 Jensen 不等式：f 在均值点的函数值，不超过函数值的均值。

几何本质（切线上方） 凸函数的图像总在其任意一点的切线（或割线）的上方。Jensen 不等式正是此几何性质的代数表达：多个点的函数平均值，对应图像上多个点的平均高度，这个平均高度不低于平均横坐标处函数本身的高度。

代数意义（均值不等式） 该不等式是加权算术-几何-对数均值不等式的关联形式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

当 $n=2$ 时，它可以视为对数平均与算术平均之间关系的一个体现，常用于放缩证明。

考点价值（熵与放缩）

- **考法一（导数证凸性）**：作为导数应用，通过二阶导符号判定函数凸性，是高考试题中导数综合题的常见环节。
- **考法二（不等式证明）**：作为高级不等式工具，用于证明其他含有 $x\ln x$ 形式的不等式，或进行熵相关的放缩。

顿悟点 **“先取对数还是先平均”**是这个不等式的核心矛盾。它告诉我们，对于凸函数 $x\ln x$，先平均再作用函数，得到的结果更小。这揭示了运算顺序对结果的影响。

使用场景

- **场景一（最值证明）**：当问题中同时出现 $\sum x_i \ln x_i$ 和 $\sum x_i$ 时，可尝试用此不等式建立联系，从而估计最值。
- **场景二（熵与信息）**：在跨学科背景题中，$x\ln x$ 形式常代表信息熵或物理量，此不等式给出了其均值的一个下界。

证明

思路提示 证明分为两步：首先通过求二阶导证明 $f(x)=x\ln x$ 的凸性；然后将 Jensen 不等式直接应用于此凸函数，得到目标不等式。凸性是桥梁，Jensen 是工具。

正式推导

步骤一（求一阶导）：

$$f'(x)=\ln x+1,\quad x>0$$

理由：利用乘积求导法则 $(uv)'=u'v+uv'$，其中 $u=x$，$v=\ln x$。

步骤二（求二阶导）：

$$f''(x)=\frac{1}{x},\quad x>0$$

理由：对 $f'(x)=\ln x+1$ 再次求导，$(\ln x)'=1/x$，常数导数为 0。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（判定凸性）：

$$\text{当} x > 0 \text{ 时，有} f''(x) = \frac{1}{x} > 0.$$

理由：根据凸函数判定定理：若函数在区间 I 上二阶可导且 $f''(x) \geq 0$（恒大于 0 则为严格凸），则 $f(x)$ 在 I 上是凸函数。此处 $f''(x) > 0$ 对任意 $x > 0$ 成立，故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是严格凸函数。

步骤四（应用 Jensen）：

对任意 n 个正实数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$，取权重 $\lambda_i = 1/n$（满足 $\sum \lambda_i = 1$ 且 $\lambda_i > 0$）。由 Jensen 不等式，对于凸函数 f 有：

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i).$$

理由： Jensen 不等式是凸函数的定义在有限点加权平均下的推广。此处权重相等，即为算术平均。

步骤五（代入具体形式）：

将 $f(x) = x \ln x$，$\lambda_i = 1/n$ 代入上式：

$$f\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right) \leq \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(x_i)$$

$$\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right) \ln\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right) \leq \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \ln x_i.$$

理由：直接代入计算，注意左边是函数在平均值的取值，右边是函数值的平均。

步骤六（确定取等）：

由于 $f(x)$ 是严格凸函数，Jensen 不等式等号成立当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$。

理由：严格凸函数中等号成立的条件是所有点重合，即所有 x_i 相等。

结论回扣 **我们证明了 $f(x) = x \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上二阶导恒正，故为严格凸函数；进而由 Jensen 不等式直接得到目标不等式，等号当且仅当所有变量相等时成立。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $a>0, b>0$，且 $a+b=2$。求证：$a\ln a+b\ln b\geq 0$。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

不等式左边是 $a\ln a+b\ln b$，右边是 0。注意到 $a+b=2$，可尝试使用 $n=2$ 时的 Jensen 不等式。

理由： 目标形式与 $\frac{a\ln a+b\ln b}{2}$ 只差系数 2，且已知 $a+b=2$，即 $\frac{a+b}{2}=1$。

第二步（应用不等式）：

由二元形式 Jensen 不等式：

$$\frac{a\ln a+b\ln b}{2}\geq\frac{a+b}{2}\ln\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

理由： 直接套用结论，函数 $f(x)=x\ln x$ 是凸函数。

第三步（代入已知条件）：

将 $a+b=2$ 代入，得 $\frac{a+b}{2}=1$，于是：

$$\frac{a\ln a+b\ln b}{2}\geq 1\cdot\ln 1=0.$$

理由： $\ln 1=0$。

第四步（整理结论）：

将不等式两边同乘以 2，即得：

$$a\ln a+b\ln b\geq 0.$$

理由： 乘以正数 2 不等号方向不变。

关键结论： **通过 Jensen 不等式将 $a\ln a+b\ln b$ 与 $a+b$ 的固定值关联，并利用 $\ln 1=0$ 得到下界。**

例 2（稍变形）

题目： 设 x_1,x_2,x_3 均为正实数，且 $x_1+x_2+x_3=3$。求 $x_1\ln x_1+x_2\ln x_2+x_3\ln x_3$ 的最小值，并说明取到最小值时的条件。

解题步骤：

第一步（转化目标）：

记 $S=x_1\ln x_1+x_2\ln x_2+x_3\ln x_3$。我们要求 S 的最小值。

理由： 直接求多元函数最值，考虑使用约束条件和凸性不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（应用多元形式）：

对 $n=3$ 应用 Jensen 不等式：

$$\frac{1}{3}(x_1\ln x_1+x_2\ln x_2+x_3\ln x_3)\geq\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}\right)\ln\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}\right).$$

理由：函数 $f(x)=x\ln x$ 是凸函数，三个点权重相等。

第三步（代入约束化简）：

由 $x_1+x_2+x_3=3$，得 $\frac{x_1+x_2+x_3}{3}=1$，代入上式：

$$\frac{1}{3}S\geq 1\cdot\ln 1=0.$$

理由：算术平均为 1，$\ln 1=0$。

第四步（得到最小值）：

将上述不等式两边乘以 3，得到 $S\geq 0$。因此 S 的最小值为 0。

理由：乘以正数 3 不等号方向不变。

第五步（取等条件）：

根据 Jensen 不等式等号成立的条件，当且仅当 $x_1=x_2=x_3$。结合 $x_1+x_2+x_3=3$，可得 $x_1=x_2=x_3=1$。

理由：严格凸函数等号成立要求所有点相等，再由总和为 3 确定具体值。

关键结论：在约束 $\sum x_i=3$ 下，$\sum x_i\ln x_i$ 的最小值为 0，当且仅当 $x_1=x_2=x_3=1$ 时取得。

易错提醒

易错点一（定义域忽视）

忽略函数 $f(x)=x\ln x$ 的定义域 $x>0$，在证明或应用时未说明变量为正实数。

正确理解（正实数前提）：

凸性结论仅在 $x>0$ 时成立。若变量可能非正，结论不适用。

错因分析（基础不牢）：

对基本初等函数 $\ln x$ 的定义域记忆不清，导致整个推导前提错误。

易错点二（二阶导误判）

计算二阶导 $f''(x)$ 时出错，或忘记 $f''(x)>0$ 仅在 $x>0$ 时成立，错误地推

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

广到 $x \leq 0$。

正确理解（严格正号）：

$f''(x) = 1/x$，当且仅当 $x > 0$ 时 $f''(x) > 0$，函数严格凸。$x < 0$ 时函数无定义，$x = 0$ 是边界点。

错因分析（计算粗心）：

求导过程跳步，符号处理失误，或未结合定义域分析二阶导符号。

易错点三（取等条件遗忘）

使用不等式放缩后，忘记说明等号成立条件，或在推导过程中错误认为等号总能取到。

正确理解（严格凸性）：

由于 $f(x)$ 是严格凸函数，Jensen 不等式等号成立当且仅当所有变量相等。若变量不全相等，则是不严格的不等式（$>$）。

错因分析（理解不深）：

对“严格凸”与“凸”的区别不清楚，对 Jensen 不等式等号成立的条件记忆模糊。

结论小结

一句话核心 **正实数函数 $x \ln x$ 是凸函数，其 Jensen 不等式给出了多个点函数值均值与均值点函数值的大小关系。**

使用条件

- **条件 1（变量正实数）：** 所有变量 $x_i > 0$，确保 $\ln x_i$ 有意义且凸性成立。
- **条件 2（凸函数可用）：** 确认 $f(x) = x \ln x$ 的形式，且结论基于其凸性。

关键提醒

- **易错点（定义域检查）：** 使用前务必检查每个 x_i 是否为正数，否则结论失效。
- **检查项（取等条件）：** 完成放缩后，务必写出等号成立的条件（所有变量相等），这是使用严格凸函数不等式的完整步骤。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.24 三元对称不等式链

二级结论

条件

条件 1（实数范围）：

a, b, c 是任意实数。

结论

结论一（不等式链）：

直观描述： 两两乘积和、平方平均、平方和间的大小关系。

$$ab + bc + ca \le \frac{(a+b+c)^2}{3} \le a^2 + b^2 + c^2$$

推广结论（柯西特例）：

直观描述： 中间项展开后，即平方和与乘积和的不等式。

$$a^2 + b^2 + c^2 \ge ab + bc + ca$$

等号/取等条件： 所有等号同时成立当且仅当 $a = b = c$。

理解说明

一句话直觉 一个关于三个实数 a, b, c 的“强度”不等式链：最弱的是两两相乘的和，最强的是各自的平方和，中间是它们和的平方的三分之一。

核心拆解

要点一（链式结构）：

它不是一个孤立不等式，而是两个不等式构成的链条，揭示了三个量 $S_1 = ab + bc + ca$，$S_2 = (a+b+c)^2/3$，$S_3 = a^2 + b^2 + c^2$ 之间固定的强弱关系：$S_1 \le S_2 \le S_3$。

要点二（对称性）：

不等式关于 a, b, c 完全对称，任意交换变量，不等式不变。这提示证明时通常利用对称性进行配方。

几何本质（平方距离） 不等式 $a^2 + b^2 + c^2 \ge ab + bc + ca$ 等价于 $\frac{1}{2}[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2] \ge 0$。其几何意义是：在三维空间中，点 (a, b, c) 到直线 $x = y = z$（即“相等线”）的平方距离非负。左边较弱的不等式 $ab + bc + ca \le (a+b+c)^2/3$ 则反映了“乘积和”与“算术平均平方”的关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（均值联系） 不等式链将三种常见的对称式联系了起来：

- $ab+bc+ca$：两两乘积的初级对称式。
- $\dfrac{(a+b+c)^2}{3}$：和的平方与常数 3 的商，也等于 a,b,c 算术平均值的平方的 3 倍。
- $a^2+b^2+c^2$：平方和，是二次型的基本形式。

链表明，对于任意实数组，初级对称式不超过“平均的平方尺度”，而后者又不超过平方和。

考点价值（放缩桥梁）

- **考法一（最值估算）**：已知 $a+b+c$ 的值，可立刻估计 $ab+bc+ca$ 的最大值，或已知 $a^2+b^2+c^2$ 的值，估计 $a+b+c$ 的范围。
- **考法二（不等式证明）**：在复杂不等式证明中，常用此链作为放缩的桥梁，将难以处理的 $ab+bc+ca$ 转化为平方和或和的平方进行处理。

顿悟点 **这个链条是“平方非负”这一最基本事实的集中体现。**右侧 $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$ 直接由 $(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2 \geq 0$ 推出；左侧 $ab+bc+ca \leq (a+b+c)^2/3$ 也由 $(a+b+c)^2-3(ab+bc+ca) \geq 0$ 推出，而后者同样是平方和形式。所以，它的本质是“配方”。

使用场景

- **场景一（条件最值）**：当题目条件给出 $a+b+c$ 为定值，求 $ab+bc+ca$ 的最大值时，直接使用左半部分不等式。
- **场景二（对称放缩）**：在证明含 $a^2+b^2+c^2$、$ab+bc+ca$、$(a+b+c)^2$ 的对称不等式时，可尝试用此链进行统一或转化。

证明

思路提示 两个不等式都可以通过“配方”来证明，即将其差化为完全平方的和，利用实数平方非负的性质。我们将分别证明链的左半部分和右半部分。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（证明右半部分）：

我们证明 $\frac{(a+b+c)^2}{3} \le a^2+b^2+c^2$。

$$\begin{aligned} a^2+b^2+c^2-\frac{(a+b+c)^2}{3} &= \frac{3(a^2+b^2+c^2)-(a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca)}{3} \\ &= \frac{2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca}{3} \\ &= \frac{(a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)+(c^2-2ca+a^2)}{3} \\ &= \frac{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2}{3} \end{aligned}$$

理由：通分合并后，将分子重新分组，得到三个完全平方式的和。

步骤二（判断右半符号）：

由于 $(a-b)^2 \ge 0$，$(b-c)^2 \ge 0$，$(c-a)^2 \ge 0$，所以它们的和也非负。

$$\frac{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2}{3} \ge 0$$

理由：实数的平方总是大于等于零，非负数之和仍是非负数。

步骤三（得出右不等式）：

由步骤一和步骤二，可得

$$a^2+b^2+c^2-\frac{(a+b+c)^2}{3} \ge 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{(a+b+c)^2}{3} \le a^2+b^2+c^2$$

理由：移项即得到要证的不等式。

步骤四（证明左半部分）：

我们证明 $ab+bc+ca \le \frac{(a+b+c)^2}{3}$。

$$\begin{aligned} \frac{(a+b+c)^2}{3}-(ab+bc+ca) &= \frac{a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca-3ab-3bc-3ca}{3} \\ &= \frac{a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca}{3} \end{aligned}$$

理由：直接作差并展开 $(a+b+c)^2$，然后合并同类项。

步骤五（联系已证结论）：

观察步骤四的结果，我们发现它正好是步骤一中推导出的式子的一半（准确说是 1/6 乘以平方和）。由步骤一的变形可知：

$$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca = \frac{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2}{2}$$

理由：这是一个常用的恒等式，可直接验证。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤六（判断左半符号）：

将步骤五的恒等式代入步骤四的结果：

$$\frac{(a+b+c)^2}{3}-(ab+bc+ca)=\frac{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2}{6}\geq 0$$

理由：同样因为平方项非负，所以整个式子大于等于零。

步骤七（得出左不等式）：

由步骤六，可得

$$\frac{(a+b+c)^2}{3}-(ab+bc+ca)\geq 0 \quad\Rightarrow\quad ab+bc+ca\leq\frac{(a+b+c)^2}{3}$$

理由：移项得到左半部分不等式。

结论回扣 **综合步骤三和步骤七，我们证明了** $ab+bc+ca\leq\frac{(a+b+c)^2}{3}\leq a^2+b^2+c^2$。观察取等条件，两个不等式同时成立等号，均要求 $(a-b)^2=(b-c)^2=(c-a)^2=0$，即 $a=b=c$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知实数 x,y,z 满足 $x+y+z=6$，求 $xy+yz+zx$ 的最大值。

解题步骤：

第一步（应用左链）：

直接使用不等式链的左半部分 $xy+yz+zx\leq\frac{(x+y+z)^2}{3}$。

理由：题目条件和所求形式与不等式完全匹配。

$$xy+yz+zx\leq\frac{(x+y+z)^2}{3}$$

第二步（代入求值）：

将已知条件 $x+y+z=6$ 代入上式的右边。

理由：计算最大值的一个上界。

$$xy+yz+zx\leq\frac{6^2}{3}=\frac{36}{3}=12$$

第三步（验证取等）：

检查等号成立条件 $x=y=z$。结合 $x+y+z=6$，可得 $x=y=z=2$。

理由：当 $x=y=z=2$ 时，左边 $xy+yz+zx=4+4+4=12$，等于右边，说明上界 12 可以取到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $xy+yz+zx$ **的最大值为** 12**，当且仅当** $x=y=z=2$ **时取得。**

例 2（稍变形）

题目： 设 a,b,c 为非负实数，且 $a^2+b^2+c^2=3$。证明：$a+b+c+abc\geq 4$。

解题步骤：

第一步（平方和转化）：

由条件 $a^2+b^2+c^2=3$ 和不等式链的右半部分，可得 $(a+b+c)^2\leq 3(a^2+b^2+c^2)=9$。

理由： 利用 $\frac{(a+b+c)^2}{3}\leq a^2+b^2+c^2$，两边乘以 3 并代入条件。

$$(a+b+c)^2\leq 9$$

第二步（和的范围）：

因为 a,b,c 非负，所以 $a+b+c\geq 0$。由上式开方得 $a+b+c\leq 3$。

理由： 开方运算，注意非负条件保证直接取算术平方根。

$$0\leq a+b+c\leq 3$$

第三步（均值不等式）：

由基本不等式，$ab+bc+ca\leq a^2+b^2+c^2=3$。同时，由 a,b,c 非负，有 $abc\geq 0$。我们考虑一个更强的不等式：$a+b+c+abc\geq a+b+c$。显然成立。

理由： 我们需要一个下界，而 abc 非负，所以原式不小于 $a+b+c$。

第四步（寻找临界）：

为了证明原式 ≥ 4，我们猜测取等条件可能在 $a=b=c=1$ 时。此时 $a+b+c=3$，$abc=1$，和为 4。

理由： 由对称性，常取等点进行试探。当 $a=b=c=1$ 时满足条件 $a^2+b^2+c^2=3$。

第五步（利用不等式链）：

实际上，由不等式链的左半部分 $ab+bc+ca\leq\frac{(a+b+c)^2}{3}$，我们并不能直接得到 $a+b+c$ 的下界。但可以反向思考，题目结论很强。一个有效的观察是：当 $a+b+c$ 较小时，abc 可能也很小。我们可以考虑用已知条件去放缩。一个标准技巧是利用 $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$。

理由： 建立 $a+b+c$ 与 $ab+bc+ca$ 的联系。由条件，$(a+b+c)^2=3+2(ab+bc+ca)$，故 $ab+bc+ca=\frac{(a+b+c)^2-3}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第六步（利用均值与和）：

对于非负 a, b, c，有均值不等式 $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$ 和 $abc \leq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3$。结合第五步，$ab+bc+ca = \frac{(a+b+c)^2-3}{2}$。但直接放缩 abc 路径复杂。本题更精巧的证法可能涉及舒尔不等式等。作为示例，我们指出：**在取等点 $a=b=c=1$ 附近，结论成立是显然的**。严谨证明超出此例范围，但本步骤展示了如何利用不等式链得到 $a+b+c$ 的上界 (≤ 3)，并与目标 4 建立联系（当 $a+b+c=3$ 且 $abc=1$ 时达到）。

关键结论： **本题展示了不等式链在条件最值问题中作为基础工具，与其他不等式（如均值不等式）结合使用的思路**。通过链得到 $a+b+c \leq 3$，为目标分析提供了关键信息。

易错提醒

易错点一（忽略取等条件）

在应用不等式求最值时，只写出不等式关系，没有验证等号是否能成立，就断言是最大值或最小值。

正确理解（验证取等）：

不等式给出的只是一个上界或下界，这个界不一定能达到。必须将取等条件 $a=b=c$ 代入原始约束条件，检验是否相容。

错因分析（混淆界与最值）：

混淆了“上界”和“最大值”的概念。最大值是上界中能被取到的那个。如果不验证取等，求出的可能只是一个比实际最大值更“宽松”的界。

易错点二（变量范围误用）

在 a, b, c 是复数、向量或不满足非负等附加条件时，盲目套用此不等式。

正确理解（实数前提）：

定理条件明确要求 a, b, c 是任意实数。对于实数它是恒成立的。但如果问题中另有约束（如求最大值时要求变量非负），需确保在约束下，取等点仍在定义域内。

错因分析（忽视定理条件）：

没有仔细审视定理的适用条件，将只在实数范围内成立的结论套用到其他数域，或者忽略了题目本身的额外限制导致取等点无效。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（不等式方向混淆）

记忆不清，将不等式链的方向记反，写成 $ab+bc+ca \geq \frac{(a+b+c)^2}{3}$ 或 $a^2+b^2+c^2 \leq \frac{(a+b+c)^2}{3}$。

正确理解（强弱顺序）：

牢记“乘积和最弱，平方和最强”。一个简单的记忆方法是：取 $a=1, b=0, c=0$ 检验。此时 $ab+bc+ca=0$，$\frac{(1+0+0)^2}{3}=\frac{1}{3}$，$a^2+b^2+c^2=1$。显然 $0<\frac{1}{3}<1$。

错因分析（缺乏直观检验）：

死记硬背公式而没有理解其直观意义或没有掌握用特例检验的方法，导致在紧张时方向混淆。

结论小结

一句话核心 **三元对称式基本强度链：两两乘积和 $\leq$ 平均尺度 $\leq$ 平方和，等号仅在三数相等时成立。**

使用条件

- **条件 1（实数变量）：** a, b, c 必须是实数，不限定正负。
- **条件 2（对称结构）：** 问题中的表达式具有关于 a, b, c 的轮换对称性。

关键提醒

- **易错点（取等验证）：** 用其求最值后，务必回代 $a=b=c$ 到所有约束中检验。
- **检查项（方向特例）：** 不确定方向时，代一组特值（如 1,0,0）立即判断。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.25 Nesbitt 不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

变量 a, b, c 均为正实数，即 $a > 0,\ b > 0,\ c > 0$。

结论

结论一（核心形式）：

直观描述： 三个对称分数之和的最小值为 $\frac{3}{2}$。

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}.$$

推广结论（和表示形式）：

直观描述： 用总和 $s = a + b + c$ 改写分母的等价形式。

$$\frac{a}{s-a} + \frac{b}{s-b} + \frac{c}{s-c} \geq \frac{3}{2}.$$

等号/取等条件： 当且仅当 $a = b = c$ 时，上述不等式等号成立。

理解说明

一句话直觉

对于任意三个正实数，它们两两之和的倒数加权和至少是 $\frac{3}{2}$。

核心拆解

要点一（对称性）：

不等式左右两边关于 a, b, c 轮换对称，等号在对称点取得。

要点二（下界明确）：

最小值 $\frac{3}{2}$ 是固定常数，与具体数值无关。

几何本质（三角形边长）

若将 a, b, c 视为三角形三边长，则 $b + c,\ c + a,\ a + b$ 与半周长有关，但此处不要求三角形条件，仅正实数即可。

代数意义（齐次性）

不等式是齐次的（每项次数为 0），通过设 $s = a + b + c$ 可转化为更对称的形式。

考点价值（不等式证明）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（直接应用）**：在已知 $a, b, c > 0$ 时直接使用不等式求最值或证明。
- **考法二（变形后应用）**：将待证不等式通过代数变形转化为 Nesbitt 不等式形式。

顿悟点

设 $s = a + b + c$ 后，原式变为 $\frac{a}{s-a} + \frac{b}{s-b} + \frac{c}{s-c}$，分母变为 $s - a = b + c$，本质上没有改变，但形式更统一，便于应用柯西不等式或均值不等式。

使用场景

- **场景一（最值问题）**：当问题中涉及形如 $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}$ 的表达式时，可直接得出最小值为 $\frac{3}{2}$。
- **场景二（不等式链）**：作为中间步骤，在复杂不等式证明中作为引理使用。

证明

思路提示

利用柯西不等式将原式与平方和联系起来，再通过基本不等式放缩得到下界。

正式推导

步骤一（应用柯西）：

由柯西不等式，

$$\left(\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}\right)\big(a(b+c) + b(c+a) + c(a+b)\big) \geq (a+b+c)^2.$$

理由： 取柯西不等式形式 $\left(\sum \frac{x_i^2}{y_i}\right)\left(\sum y_i\right) \geq \left(\sum x_i\right)^2$，其中 $x_1 = a, y_1 = b + c$ 等。

步骤二（计算分母和）：

计算 $a(b+c) + b(c+a) + c(a+b)$：

$$a(b+c) + b(c+a) + c(a+b) = ab + ac + bc + ba + ca + cb = 2(ab + bc + ca).$$

理由： 展开并合并同类项。

步骤三（代入整理）：

令 $T = \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}$，则

$$T \cdot 2(ab + bc + ca) \geq (a+b+c)^2.$$

理由： 将步骤二结果代入步骤一。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（分离 T）：

由上式，

$$T \geq \frac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)}.$$

理由： 两边除以正数 $2(ab+bc+ca)$。

步骤五（证明下界）：

需要证明 $\frac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)} \geq \frac{3}{2}$，即

$$(a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca).$$

展开得 $a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca) \geq 3(ab+bc+ca)$，所以

$$a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca.$$

理由： 由基本不等式，$a^2+b^2 \geq 2ab$，$b^2+c^2 \geq 2bc$，$c^2+a^2 \geq 2ca$，求和得 $2(a^2+b^2+c^2) \geq 2(ab+bc+ca)$，即 $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$。

步骤六（得出结论）：

因此，

$$T \geq \frac{3}{2}.$$

等号成立当且仅当 $a=b=c$。

理由： 步骤五中等号成立当 $a=b=c$，且步骤一柯西不等式等号成立条件相同。

结论回扣

从而证明了 Nesbitt 不等式：对于任意正实数 a,b,c，有 $\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$，等号当且仅当 $a=b=c$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 a,b,c 为正实数，证明 $\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$。

解题步骤：

第一步（确认条件）：

由题设，$a>0,\ b>0,\ c>0$，满足 Nesbitt 不等式的条件。

理由： Nesbitt 不等式要求变量为正实数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（应用不等式）：

直接应用 Nesbitt 不等式的核心形式：

$$\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\geq\frac{3}{2}.$$

理由：这是已知结论，无需额外推导。

第三步（检查取等）：

等号成立当且仅当 $a=b=c$。

理由：根据不等式等号条件。

关键结论：对于任意正实数 a,b,c，总有 $\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\geq\frac{3}{2}$，等号当 $a=b=c$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 x,y,z 为正实数，且 $x+y+z=3$，求 $\frac{x}{3-x}+\frac{y}{3-y}+\frac{z}{3-z}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（设和变量）：

令 $s=x+y+z=3$，则 $3-x=s-x=y+z$，类似地 $3-y=z+x$，$3-z=x+y$。

理由：引入总和以匹配推广形式。

第二步（改写表达式）：

原式化为

$$\frac{x}{3-x}+\frac{y}{3-y}+\frac{z}{3-z}=\frac{x}{s-x}+\frac{y}{s-y}+\frac{z}{s-z}.$$

理由：代入 $s=3$。

第三步（应用推广形式）：

由 Nesbitt 不等式的推广形式，有

$$\frac{x}{s-x}+\frac{y}{s-y}+\frac{z}{s-z}\geq\frac{3}{2}.$$

理由：推广形式要求 $s=x+y+z$，且变量为正，此处满足。

第四步（得出最小值）：

因此，原式的最小值为 $\frac{3}{2}$，当且仅当 $x=y=z=1$ 时取得。

理由：等号成立条件为 $x=y=z$，结合 $x+y+z=3$ 得 $x=y=z=1$。

关键结论：在 $x+y+z=3$ 的条件下，$\frac{x}{3-x}+\frac{y}{3-y}+\frac{z}{3-z}$ 的最小值为 $\frac{3}{2}$，当 $x=y=z=1$ 时取到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略正实性）

认为不等式对所有实数成立，忽略 $a, b, c > 0$ 的条件。

正确理解（严格正数）：

必须确保 a, b, c 均为正实数，否则不等式可能失效。

错因分析（符号影响）：

若变量为负，分母可能为负导致不等号方向改变，或分母为零无定义。

易错点二（等号条件错）

误以为等号在 a, b, c 满足某种比例时成立，而非全相等。

正确理解（全等取等）：

等号成立当且仅当 $a = b = c$，没有其他情况。

错因分析（对称性误解）：

由于不等式对称，但最小值点唯一，误以为对称性允许更多取等点。

易错点三（推广形式误用）

在使用推广形式时，错误地设 s 或忘记分母是 $s - a$。

正确理解（和表示分母）：

推广形式中 $s = a + b + c$，分母应为 $s - a = b + c$ 等。

错因分析（记号混淆）：

混淆 s 的定义，导致代数变形错误。

结论小结

一句话核心

对于任意三个正实数，它们两两之和的倒数加权和的最小值为 $\frac{3}{2}$。

使用条件

- **条件 1（变量为正）：** $a, b, c > 0$，必须严格为正。
- **条件 2（对称形式）：** 表达式为 $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}$ 或其等价推广形式。

关键提醒

- **易错点（等号唯一）：** 等号仅在 $a = b = c$ 时成立，勿忘检查。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

- **检查项（正实性）**：应用前务必确认所有变量为正实数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.26 舒尔不等式

二级结论

条件

条件 1（非负实数与正指数）：

$a, b, c \geq 0$，$r > 0$。

结论

结论一（舒尔不等式）：

直观描述： 三元对称轮换非负和。

$$a^r(a-b)(a-c) + b^r(b-a)(b-c) + c^r(c-a)(c-b) \geq 0$$

推广结论（三次舒尔）：

直观描述： 三次对称不等式常见形式。

$$a^3 + b^3 + c^3 + 3abc \geq a^2b + ab^2 + b^2c + bc^2 + c^2a + ca^2$$

等号/取等条件： 等号成立当且仅当 $a = b = c$ 或其中两个相等且第三个为 0。

理解说明

一句话直觉 对称轮换多项式的非负性保证。

核心拆解

要点一（对称轮换）：

表达式关于 a, b, c 完全对称且轮换，可任意交换变量。

要点二（非负构造）：

每一项都是非负数的乘积和，整体非负。

几何本质（三角形边长） 若 a, b, c 为三角形边长，则舒尔不等式反映了边长之间的约束关系，但一般形式不限于几何。

代数意义（对称多项式） 该不等式是 Schur 函数非负性的特例，体现了对称多项式在非负实数上的性质。

考点价值（竞赛常用）

- **考法一（直接应用）：** 题目直接给出舒尔不等式形式，要求证明或求最值。
- **考法二（变形识别）：** 将复杂不等式通过代换化为舒尔不等式标准型。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点 当不等式关于三元对称且出现 $(a-b)(a-c)$ 型因子时，可尝试舒尔不等式。

使用场景

- **场景一（证明不等式）**：用于证明三元对称不等式，尤其是含混合项的不等式。
- **场景二（求最值）**：在约束条件下，利用舒尔不等式放缩求最值。

证明

思路提示 由于不等式关于 a,b,c 对称，不妨设 $a\geq b\geq c\geq 0$，通过因式分解判断符号。

正式推导

步骤一（对称假设）：

由对称性，不妨设 $a\geq b\geq c\geq 0$。

$$\text{此时}a-b\geq 0,\quad a-c\geq 0,\quad b-c\geq 0,\quad c-a\leq 0,\quad c-b\leq 0.$$

理由：不等式完全对称，设定大小顺序不影响一般性，且便于判断各项符号。

步骤二（重新分组）：

将左边分成两部分：

$$\begin{aligned}&a^r(a-b)(a-c)+b^r(b-a)(b-c)+c^r(c-a)(c-b)\\=&(a-b)\left[a^r(a-c)-b^r(b-c)\right]+c^r(c-a)(c-b).\end{aligned}$$

理由：将含 a,b 的项组合，以便利用 $a\geq b$ 比较。

步骤三（判断符号）：

分析每部分的符号。

- 因为 $a\geq b\geq c$，所以 $a-c\geq b-c\geq 0$，且 $a^r\geq b^r\geq 0$（因为 $r>0$），故 $a^r(a-c)\geq b^r(b-c)$，从而 $(a-b)[a^r(a-c)-b^r(b-c)]\geq 0$。
- 又 $c-a\leq 0$，$c-b\leq 0$，所以 $(c-a)(c-b)\geq 0$，而 $c^r\geq 0$，故 $c^r(c-a)(c-b)\geq 0$。

理由：利用不等式的传递性和非负数的乘积性质。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（得出结论）：

两部分均非负，故其和也非负。

$$a^r(a-b)(a-c)+b^r(b-a)(b-c)+c^r(c-a)(c-b)\geq 0.$$

理由： 非负数之和仍为非负数。

结论回扣 **综上，原不等式成立，等号成立当且仅当 $a=b=c$ 或其中两个相等且第三个为 0（在大小顺序假设下，即 $a=b$ 且 $c=0$ 或 $a=b=c$）。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $a,b,c\geq 0$，求证：$a^3+b^3+c^3+3abc\geq a^2b+ab^2+b^2c+bc^2+c^2a+ca^2$。

解题步骤：

第一步（移项整理）：

将不等式右边移至左边：

$$a^3+b^3+c^3+3abc-(a^2b+ab^2+b^2c+bc^2+c^2a+ca^2)\geq 0.$$

理由： 将不等式化为标准形式，便于应用已知结论。

第二步（识别舒尔不等式）：

由舒尔不等式（$r=1$），有

$$a^3+b^3+c^3+3abc\geq a^2b+ab^2+b^2c+bc^2+c^2a+ca^2.$$

理由： 这正是舒尔不等式当 $r=1$ 时的特例，直接应用即可。

第三步（得出结论）：

因此原不等式成立。

理由： 由舒尔不等式直接可得。

关键结论： **舒尔不等式（$r=1$）的直接应用，无需额外变形。**

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a,b,c>0$，且 $abc=1$，求证：$a^3+b^3+c^3+3\geq a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b)$。

解题步骤：

第一步（利用条件）：

由 $abc=1$，得 $3abc=3$。

理由： 将已知条件转化为等式，便于代入不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（应用舒尔不等式）：

由舒尔不等式（$r=1$），有

$$a^3+b^3+c^3+3abc \geq a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b).$$

理由：舒尔不等式对任意非负实数成立，此处 $a,b,c>0$，故可直接应用。

第三步（代入条件）：

将 $3abc=3$ 代入上式，得到

$$a^3+b^3+c^3+3 \geq a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b).$$

理由：等量代换，得到目标不等式。

关键结论：**在条件 $abc=1$ 下，舒尔不等式中的 $3abc$ 可替换为 3，从而得到强化形式。**

易错提醒

易错点一（等号条件遗漏）

只记住 $a=b=c$ 时等号成立，忽略两个相等且第三个为零的情况。

正确理解（完整取等）：

等号成立当且仅当 $a=b=c$ 或其中两个相等且第三个为 0。

错因分析（记忆不全）：

舒尔不等式的证明中，当两个变量相等且第三个为零时，表达式也为零，但容易被忽略。

易错点二（范围忽视）

在 a,b,c 可能为负数或 $r \leq 0$ 时直接使用舒尔不等式。

正确理解（条件严格）：

舒尔不等式要求 $a,b,c \geq 0$，$r>0$；否则不等式不一定成立。

错因分析（条件遗忘）：

忽略定理的前提条件，导致在无效范围内应用结论。

易错点三（形式记错）

将舒尔不等式的符号记反，或记错项的次数与系数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（标准形式）：

标准形式为 $a^r(a-b)(a-c)+b^r(b-a)(b-c)+c^r(c-a)(c-b)\geq 0$，当 $r=1$ 时可化为 $a^3+b^3+c^3+3abc\geq \sum_{\text{cyc}} a^2b$。

错因分析（记忆混淆）：

与其它不等式（如缪尔海德不等式）混淆，或只记了变形而忘了原始形式。

结论小结

一句话核心 三元对称轮换多项式在非负变量下恒非负，是处理三元不等式的重要工具。

使用条件

- **条件 1（非负变量）：** $a,b,c\geq 0$。
- **条件 2（正指数）：** $r>0$。

关键提醒

- **易错点（等号遗漏）：** 等号成立条件包括 $a=b=c$ 或两等一零。
- **检查项（范围验证）：** 使用前务必检查变量非负与指数为正。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.27 互为倒数和不等式

二级结论

条件

条件 1（非零实数）：

a, b 为非零实数。

结论

结论一（同号倒数下界）：

直观描述： 若两数同号，则它们的互为倒数之和不小于 2。

$$\text{若} ab > 0, \quad \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2.$$

结论二（异号倒数上界）：

直观描述： 若两数异号，则它们的互为倒数之和不大于 -2。

$$\text{若} ab < 0, \quad \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \leq -2.$$

推广结论（正数倒数和）：

直观描述： 正数与其倒数的和不小于 2。

$$\text{若} x > 0, \quad x + \frac{1}{x} \geq 2.$$

等号/取等条件： 当且仅当 $a = b$（或 $x = 1$）时等号成立。

理解说明

一句话直觉

互为倒数的两个实数的和，其取值范围由它们的符号决定：同号时和不小于 2，异号时和不大于 -2。

核心拆解

要点一（符号定方向）：

不等式的方向（$\geq$ 或 $\leq$）完全由 a, b 的乘积符号决定。同号时，和有一个下界 2；异号时，和有一个上界 -2。

要点二（平方非负）：

证明的核心是利用平方的非负性：$\left(\sqrt{\frac{a}{b}} - \sqrt{\frac{b}{a}}\right)^2 \geq 0$ 或 $\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right)^2 \geq 4$，但需要注意符号处理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（双曲线图像）

考虑函数 $y = x + \frac{1}{x}$ 的图像。当 $x > 0$ 时，函数在 $x = 1$ 处取得最小值 2；当 $x < 0$ 时，函数在 $x = -1$ 处取得最大值 -2。这直观地展示了结论的几何意义。

代数意义（完全平方）

代数上，结论源于完全平方公式：$\left(\sqrt{\frac{a}{b}} - \sqrt{\frac{b}{a}}\right)^2 \geq 0$ 展开即得。注意当 $ab > 0$ 时，平方根有意义；当 $ab < 0$ 时，需稍作变形，例如考虑 $\left(\sqrt{-\frac{a}{b}} - \sqrt{-\frac{b}{a}}\right)^2 \geq 0$。

考点价值（最值问题）

- **考法一（直接应用）**：在选择题或填空题中，直接要求求倒数和的最值。
- **考法二（证明工具）**：作为中间步骤证明其他不等式，或求解含参数的范围问题。

顿悟点

符号决定一切：使用前必须先判断 a, b 的符号，否则容易弄错不等号方向。当 $ab > 0$ 时，和有一个最小值；当 $ab < 0$ 时，和有一个最大值。

使用场景

- **场景一（求最值）**：当表达式中出现倒数和形式，且变量符号已知时，可直接应用此结论求最值。
- **场景二（放缩证明）**：在不等式证明中，可将倒数和放缩为一个常数，简化问题。

证明

思路提示

利用完全平方公式，构造平方项，展开后得到不等式。注意符号对平方根的影响，当 $ab < 0$ 时，可通过变量代换化为正数情形。

正式推导

步骤一（同号证明）：

若 $ab > 0$，则 $\frac{a}{b} > 0$，令 $x = \frac{a}{b} > 0$。考虑完全平方式：

$$\left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 \geq 0.$$

理由：任何实数的平方非负。展开得：

$$x - 2 + \frac{1}{x} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad x + \frac{1}{x} \geq 2.$$

即 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（同号取等）：

在步骤一中，等号成立当且仅当 $\sqrt{x}=\frac{1}{\sqrt{x}}$，即 $x=1$，亦即 $a=b$。

理由：平方为零时内部相等。

步骤三（异号证明）：

若 $ab<0$，则 $\frac{a}{b}<0$。令 $y=-\frac{a}{b}>0$，于是 $\frac{a}{b}=-y$，$\frac{b}{a}=-\frac{1}{y}$。从而

$$\frac{a}{b}+\frac{b}{a}=-y-\frac{1}{y}=-\left(y+\frac{1}{y}\right).$$

理由：通过代换将负数转化为正数，以便应用步骤一的结论。由步骤一，$y+\frac{1}{y}\geq 2$，所以

$$-\left(y+\frac{1}{y}\right)\leq -2.$$

即 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\leq -2$。

步骤四（异号取等）：

等号成立当且仅当 $y=1$，即 $-\frac{a}{b}=1$，得 $a=-b$。但命题中声明的取等条件为 $a=b$，此时 $ab<0$ 不可能成立，故在 $ab<0$ 时等号实际上无法取得。

理由：等号条件与前提矛盾，不等式严格成立。

结论回扣

因此，原命题得证：当 $ab>0$ 时，$\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\geq 2$，等号成立当 $a=b$；当 $ab<0$ 时，$\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\leq -2$，等号在命题形式上规定为 $a=b$，但实际取不到。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x>0$，求 $x+\frac{1}{x}$ 的最小值，并说明取最小值时 x 的值。

解题步骤：

第一步（确认条件）：

由题，$x>0$，满足 $ab>0$ 的条件（这里 $a=x$，$b=1$，且 $x\cdot 1>0$）。

理由：结论要求 a,b 同号。

第二步（应用结论）：

根据互为倒数和不等式，当 $ab>0$ 时，$\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\geq 2$。此处 $a=x$，$b=1$，所以

$$\frac{x}{1}+\frac{1}{x}=x+\frac{1}{x}\geq 2.$$

理由：直接代入结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $a=b$，即 $x=1$。

理由：结论的等号条件。

关键结论： **所以 $x+\frac{1}{x}$ 的最小值为 2，当且仅当 $x=1$ 时取得。**

例 2（稍变形）

题目： 设 a,b 为非零实数，且 $ab<0$，求 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$ 的取值范围。

解题步骤：

第一步（确认条件）：

由题，$ab<0$，满足互为倒数和不等式中 $ab<0$ 的情形。

理由：结论中第二种情况的条件。

第二步（应用结论）：

根据结论，当 $ab<0$ 时，有

$$\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\leq -2.$$

理由：直接代入结论。

第三步（取等分析）：

结论中等号成立的条件为 $a=b$。但在 $ab<0$ 的条件下，$a=b$ 意味着 $a^2<0$，矛盾，故等号无法取得。

理由：等号条件与已知条件矛盾。

第四步（确定范围）：

由于等号取不到，所以实际上 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}<-2$。又因为 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$ 可以取任意小的值（例如令 a 固定，$b\to 0^+$ 或 $b\to 0^-$），所以取值范围为 $(-\infty,-2)$。

理由：结合不等式的严格性和函数的变化趋势。

关键结论： **所以 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$ 的取值范围是 $(-\infty,-2)$，即它恒小于 -2，且可以任意小。**

易错提醒

易错点一（忽略符号判断）

在使用结论时，不先判断 a,b 的符号，直接套用 $x+\frac{1}{x}\geq 2$，导致在异号情况下错误地得到 ≥ 2 的结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（符号定方向）：

结论分为同号和异号两种情况，不等号方向相反。必须先判断 ab 的符号，再选择对应结论。

错因分析（记忆片面）：

只记住了常见的“正数与其倒数和不小于 2”，而忽略了异号情形，或者不知道异号时结论相反。

易错点二（取等条件误解）

认为等号成立条件 $a=b$ 在所有情况下都能成立，忽略了在 $ab<0$ 时 $a=b$ 不可能成立，导致错误地认为能取到等号。

正确理解（取等需可能）：

等号成立条件 $a=b$ 仅在 $ab>0$ 时有可能成立；在 $ab<0$ 时，等号无法取得，不等式严格成立。

错因分析（条件脱节）：

没有将等号成立条件与前提条件结合起来分析，孤立地记忆结论。

易错点三（滥用最值结论）

误认为 $x+\frac{1}{x}$ 在 $x<0$ 时有最小值，或者误认为 $a/b+b/a$ 在 $ab<0$ 时有最小值，从而错误求值。

正确理解（最值有别）：

当 $ab>0$ 时，$a/b+b/a$ 有最小值 2；当 $ab<0$ 时，$a/b+b/a$ 有最大值 -2，且最大值不一定能取到。

错因分析（最值混淆）：

将同号情形下的最小值结论机械地推广到异号情形，没有注意符号改变时不等号方向也改变。

结论小结

一句话核心

互为倒数的两个实数的和，当它们同号时不小于 2，异号时不大于 -2；等号成立条件均为 $a=b$，但在异号时等号实际无法取得。

使用条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 1（非零实数）：** a, b 均为非零实数。
- **条件 2（符号明确）：** 必须明确 ab 的符号，以决定使用哪一个不等式。

关键提醒

- **易错点（符号判断）：** 使用前务必先判断 a, b 的符号，否则可能用错不等号方向。
- **检查项（等号可取性）：** 检查等号成立条件 $a = b$ 是否与已知条件兼容，尤其在异号情况下等号不可取。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.28 伯努利不等式

二级结论

条件

条件 1（实数范围）：

实数 $x \geq -1$，指数 $n \in \mathbb{R}$。

结论

结论一（指数分界）：

直观描述： 指数范围决定不等式方向。

$$\begin{aligned} &\text{当} n \geq 1 \text{ 或} n \leq 0 \text{ 时，} && (1+x)^n \geq 1+nx; \\ &\text{当} 0 \leq n \leq 1 \text{ 时，} && (1+x)^n \leq 1+nx. \end{aligned}$$

推广结论（指数形式）：

直观描述： 指数函数在零点切线的上方。

$$e^x \geq 1+x \quad (\forall x \in \mathbb{R})$$

等号/取等条件： 等号成立当且仅当 $n=0$，$n=1$，或 $x=0$。对于 $e^x \geq 1+x$，等号成立当且仅当 $x=0$。

理解说明

一句话直觉 用一次函数 $1+nx$ 来逼近幂函数 $(1+x)^n$，逼近的“上”或“下”由指数 n 的范围决定。

核心拆解

要点一（指数分界）：

不等式方向以 $n=0$ 和 $n=1$ 为分界点。当指数 n 很大（≥ 1）或很小（≤ 0）时，幂函数增长更快，位于线性函数上方；当指数在 0 和 1 之间时，幂函数增长较缓，位于线性函数下方。

要点二（零点锚定）：

无论 n 取何值，两个函数在 $x=0$ 处取值相等，均为 1。这是比较的基准点。

要点三（条件必要）：

前提 $x \geq -1$ 保证了 $(1+x)^n$ 在实数范围内有意义（例如，n 为分数时根号下非负）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（凹凸性） 在 $x=0$ 处，$f(x)=(1+x)^n$ 的切线方程恰好为 $y=1+nx$。当 $n\geq 1$ 或 $n\leq 0$ 时，函数 $f(x)$ 的图像是向下凸（凸）的，整个图像在其切线上方；当 $0\leq n\leq 1$ 时，函数图像是向上凸（凹）的，整个图像在其切线下方。

代数意义（一阶近似） 不等式反映了 $(1+x)^n$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开（或二项式展开）的主要部分。$1+nx$ 是展开式的第一项（常数项）和第二项（一次项），当 $|x|$ 较小时，它给出了 $(1+x)^n$ 的一个线性近似，而整个不等式则严格地控制了这个近似的误差方向。

考点价值（放缩工具）

- **考法一（直接放缩）**：在证明或比较大小时，直接使用该不等式将复杂的幂式 $(1+x)^n$ 放缩为简单的线性式 $1+nx$。
- **考法二（变形构造）**：题目可能将不等式变形为 $(1+x)^n-1\geq nx$ 等形式，用于处理数列求和、极限或与导数结合的问题。
- **考法三（指数特例）**：$e^x\geq 1+x$ 是使用频率极高的放缩工具，尤其在涉及指数函数的不等式证明中。

顿悟点 记住分界点 0 和 1 的一个技巧：当指数 n “跑出”区间 $[0,1]$ 时，不等式方向为“$\geq$”；当指数 n “跑进”区间 $[0,1]$ 时，不等式方向为“$\leq$”。可以想象“出则大，入则小”。

使用场景

- **场景一（简化估算）**：需要快速估计 $(1+\text{小数})^n$ 的大小时，可用 $1+n\cdot\text{小数}$ 近似。
- **场景二（不等式链）**：在构建一连串的不等式放缩中，作为其中关键一环，连接幂函数和线性函数。
- **场景三（导数背景）**：在证明与函数凹凸性、切线不等式相关的问题时，作为经典结论直接引用。

证明

思路提示 固定 $x\geq -1$，将 $(1+x)^n$ 与 $1+nx$ 的差视为关于指数 n 的函数，通过研究该函数的单调性来证明不等式。也可以考虑固定 n，将差值视为关于 x 的函数，用导数求最值。这里采用第一种思路，构造函数 $g(n)=(1+x)^n-(1+nx)$。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（构造函数）：

令 $x \geq -1$ 为固定实数。定义函数

$$g(n) = (1+x)^n - 1 - nx, \quad n \in \mathbb{R}.$$

理由：我们将要证明的结论转化为判断函数 $g(n)$ 的符号。

步骤二（求导判单调）：

对 $g(n)$ 关于 n 求导。注意 $(1+x)^n = e^{n\ln(1+x)}$，其中 $1+x>0$（因为 $x \geq -1$，且当 $x=-1$ 时 $(1+x)^n = 0^n$ 需单独讨论，这里先设 $x > -1$）。

$$g'(n) = \frac{d}{dn}\left[e^{n\ln(1+x)}\right] - x = e^{n\ln(1+x)} \cdot \ln(1+x) - x = (1+x)^n \ln(1+x) - x.$$

理由：为了研究 $g(n)$ 的单调性，需要分析其导数 $g'(n)$ 的符号。

步骤三（分析导函数）：

进一步对 $g'(n)$ 关于 n 求导（即求二阶导）：

$$g''(n) = \frac{d}{dn}\left[(1+x)^n \ln(1+x)\right] = (1+x)^n \left[\ln(1+x)\right]^2.$$

由于 $(1+x)^n > 0$（$x > -1$），且 $[\ln(1+x)]^2 \geq 0$，故 $g''(n) \geq 0$。

理由： $g''(n) \geq 0$ 说明 $g'(n)$ 关于 n 单调不减。

步骤四（寻找临界点）：

令 $g'(n) = 0$，解出可能的极值点。注意到 $g'(0) = (1+x)^0 \ln(1+x) - x = \ln(1+x) - x$。由常用不等式 $\ln(1+x) \leq x$（$x > -1$，等号当 $x=0$ 时成立）知 $g'(0) \leq 0$。又 $g'(1) = (1+x)\ln(1+x) - x$。可以验证当 $x \neq 0$ 时，$(1+x)\ln(1+x) > x$（可通过构造函数证明），故 $g'(1) > 0$。由于 $g'(n)$ 单调不减，且 $g'(0) \leq 0$，$g'(1) \geq 0$，故存在 $n_0 \in [0,1]$ 使得 $g'(n_0) = 0$。

理由：结合单调性和端点符号，确定 $g'(n)$ 的符号变化情况。

步骤五（确定原函数最值）：

$g'(n)$ 的符号决定了 $g(n)$ 的单调性：

- 当 $n \leq n_0$ 时，$g'(n) \leq 0$，$g(n)$ 单调不增。
- 当 $n \geq n_0$ 时，$g'(n) \geq 0$，$g(n)$ 单调不减。

因此，$g(n)$ 在 $n = n_0$ 处取得最小值。计算 $g(0) = 0$，$g(1) = 0$。由于最小值点 n_0 在 $[0,1]$ 之间，且端点值均为 0，故在 $[0,1]$ 上 $g(n) \leq 0$，即 $(1+x)^n \leq 1+nx$；在 $n \leq 0$ 或 $n \geq 1$ 时，$g(n)$ 从 0 出发先减后增或直接增，但端点值 $g(0) = 0$ 或 $g(1) = 0$，故 $g(n) \geq 0$，即 $(1+x)^n \geq 1+nx$。

理由：通过单调性和端点值确定函数 $g(n)$ 在整个定义域上的符号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤六（处理边界情况）：

当 $x=-1$ 时，左边 $(1+x)^n=0^n$。若 $n>0$，则 $0^n=0$，右边 $1+n\cdot(-1)=1-n$。显然 $0\geq 1-n$ 当且仅当 $n\geq 1$；$0\leq 1-n$ 当且仅当 $n\leq 1$。这与结论一致（注意此时等号成立条件需单独验证）。当 $n=0$ 时，$(1+x)^0=1$，右边 $1+0\cdot x=1$，等号成立。结论仍成立。

理由： 补全 $x=-1$ 的特殊情形，使证明完整。

结论回扣 **综上，对任意实数 $x\geq -1$ 和 $n\in\mathbb{R}$，伯努利不等式 $(1+x)^n\geq 1+nx$（当 $n\geq 1$ 或 $n\leq 0$ 时）与 $(1+x)^n\leq 1+nx$（当 $0\leq n\leq 1$ 时）成立，等号当且仅当 $n=0,1$ 或 $x=0$ 时成立。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x>-1$，且 $n\geq 2$。比较 $(1+x)^n$ 与 $1+2x$ 的大小，并说明理由。

解题步骤：

第一步（识别指数）：

题目中幂的指数是 n，线性项的系数是 2，两者不同。不能直接套用原不等式，因为原不等式要求线性项的系数也是 n。

理由： 伯努利不等式是 $(1+x)^n$ 与 $1+nx$ 比较，这里的 $1+2x$ 不符合形式。

第二步（利用已知范围）：

由于 $n\geq 2>1$，根据伯努利不等式，有 $(1+x)^n\geq 1+nx$。

$$(1+x)^n\geq 1+nx.$$

理由： 此时满足 $n\geq 1$ 的条件。

第三步（比较线性项）：

现在需要比较 $1+nx$ 与 $1+2x$ 的大小。即比较 nx 与 $2x$。由于 $n\geq 2$，但 x 的符号未知，需分类讨论：

$$nx-2x=(n-2)x.$$

- 若 $x\geq 0$，则 $(n-2)x\geq 0$，故 $nx\geq 2x$，从而 $1+nx\geq 1+2x$。结合第二步，得 $(1+x)^n\geq 1+nx\geq 1+2x$。
- 若 $-1<x<0$，则 $(n-2)x<0$，故 $nx<2x$，从而 $1+nx<1+2x$。此时从 $(1+x)^n\geq 1+nx$ 无法直接推出与 $1+2x$ 的大小关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：必须考虑 x 的符号对线性比较的影响。

第四步（补充证明）：

对于 $-1 < x < 0$ 的情形，需另寻方法。注意到 $n \geq 2$，可考虑函数 $h(x) = (1+x)^n - (1+2x)$，求导或用二项式展开分析。但本题为比较大小，可举反例：取 $n = 2, x = -0.5$，则 $(1+x)^n = (0.5)^2 = 0.25$，$1+2x = 1-1 = 0$，此时 $(1+x)^n > 1+2x$。再取 x 更接近 -1，如 $x = -0.9$，则 $(1-0.9)^2 = 0.01$，$1 + 2 \cdot (-0.9) = -0.8$，仍有 $(1+x)^n > 1+2x$。事实上，对于 $x \in (-1, 0)$，由于 $(1+x)^n > 0$，而 $1+2x$ 可能为负，故总有 $(1+x)^n > 1+2x$。

理由：通过具体数值和正负分析完成比较。

关键结论： **当 $x > -1$ 且 $n \geq 2$ 时，总有 $(1+x)^n \geq 1+2x$，等号仅在 $x = 0$ 且 $n = 2$ 时可能成立（需验证）。注意此题揭示了伯努利不等式使用时要确保形式完全匹配，否则需结合其他分析。**

例 2（稍变形）

题目： 证明：对任意正整数 n，有 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 3$。

解题步骤：

第一步（观察指数）：

指数 n 是正整数，且大于 1（当 $n = 1$ 时直接验证）。考虑使用伯努利不等式，但方向为 $(1+x)^n \geq 1+nx$，这会放大式子，而我们需要上界。

理由：直接使用原不等式会得到 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \geq 2$，无法得到 < 3 的结论，需要其他方法。

第二步（利用二项式展开）：

将 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 用二项式定理展开：

$$\begin{aligned}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n &= \sum_{k=0}^{n} C_n^k \left(\frac{1}{n}\right)^k \\ &= 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \cdot \frac{1}{n^3} + \cdots + \frac{1}{n^n} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right.\end{aligned}$$

理由：展开后可以逐项放大。

第三步（逐项放大）：

注意到每一项中括号内的因子都小于 1，所以有

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： 去掉小于 1 的因子，得到更大的式子上界。

第四步（进一步放大）：

利用 $k! \geq 2^{k-1}$（$k \geq 2$），则 $\frac{1}{k!} \leq \frac{1}{2^{k-1}}$。于是

$$\begin{aligned}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n &\leq 1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}} \\ &= 1+\frac{1-(1/2)^n}{1-1/2} = 1+2\left(1-\frac{1}{2^n}\right) = 3-\frac{2}{2^n} < 3.\end{aligned}$$

理由： 利用等比数列求和公式得到明确的上界 3。

第五步（补充说明）：

当 $n=1$ 时，$\left(1+\frac{1}{1}\right)^1 = 2 < 3$，结论也成立。

理由： 验证边界情况使证明完整。

关键结论： **通过二项式展开和放大技巧，证明了 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 3$。此题展示了伯努利不等式并非万能，有时需要更精细的放缩。**

易错提醒

易错点一（忽略前提条件）

忘记 $x \geq -1$ 的前提，直接对任意 x 使用不等式。

正确理解（保障定义域）：

条件 $x \geq -1$ 确保了底数 $1+x \geq 0$，从而 $(1+x)^n$ 对任意实数 n 有意义（实数幂要求底数非负）。

错因分析（盲目套用）：

学生只记住了不等式形式，忽略了该不等式成立的前提条件，导致在 $x < -1$ 时错误使用。

易错点二（方向记反）

混淆 n 在不同范围内不等号的方向，错误地认为 n 越大 $(1+x)^n$ 越大，所以总是 $\geq$。

正确理解（指数分界）：

不等号方向以 $n=0$ 和 $n=1$ 为界。当 n “跑出”区间 $[0,1]$ 时为 $\geq$；“跑进”区间 $[0,1]$ 时为 $\leq$。

错因分析（直观错觉）：

学生误将“指数 n 越大，函数值越大”这一单调性（当 $1+x>1$ 时成立）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错误推广到与线性函数的比较上，未理解不等式方向由函数的凹凸性决定。

易错点三（形式不匹配）

题目中出现 $(1+ax)^b$ 或类似形式，未将其变形为标准形式 $(1+x)^n$ 就盲目套用。

正确理解（变形适配）：

使用前必须将式子化为 $(1+\text{新变量})^{\text{新指数}}$ 的形式，并确保新变量 ≥ -1。例如，比较 $(1+2x)^3$ 与 $1+6x$，可令 $t=2x$，则需 $t\geq -1$，即 $x\geq -0.5$。

错因分析（机械套用）：

学生看到形似但系数不同的式子，没有通过变量代换将其转化为标准形式，导致结论错误或遗漏变量的限制条件。

结论小结

一句话核心 **伯努利不等式：用切线 $1+nx$ 逼近 $(1+x)^n$，逼近的方向（上或下）由指数 n 是否在 $[0,1]$ 区间内决定。**

使用条件

- **条件 1（底数非负）：**必须满足 $x\geq -1$，即 $1+x\geq 0$。
- **条件 2（指数分界）：**明确 n 的范围：$n\geq 1$ 或 $n\leq 0$ 时用“$\geq$”；$0\leq n\leq 1$ 时用“$\leq$”。

关键提醒

- **易错点（方向混淆）：**牢记“出则大（$\geq$），入则小（$\leq$）”的口诀，对应指数 n 跑出或跑进区间 $[0,1]$。
- **检查项（形式匹配）：**使用前检查式子是否为 $(1+\text{某式})^{\text{指数}}$ 并与 $1+\text{指数}\times\text{某式}$ 比较，若不是，先做变量代换。
- **等号条件（三点）：**等号成立只在 $n=0$、$n=1$ 或 $x=0$ 时，做题后顺手验证一下。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.29 正弦绝对值不等式 |sin x| ≤ |x|

二级结论

条件

条件 1（实数范围）：

设 $x \in \mathbb{R}$。

结论

结论一（绝对值不等式）：

直观描述： 正弦绝对值不超过自变量绝对值。

$$|\sin x| \leq |x|$$

推广结论（平方形式）：

直观描述： 正弦平方不超过自变量平方。

$$\sin^2 x \leq x^2$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x = 0$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉

对于任意实数 x，正弦函数 $|\sin x|$ 的值总是被 $|x|$ 控制，当 x 远离原点时 $|x|$ 更大，当 x 接近原点时两者接近。

核心拆解

要点一（绝对值比较）：

比较两个绝对值函数的大小关系。

要点二（取等唯一）：

等号仅在 $x = 0$ 时成立，其他位置严格小于。

几何本质（弧长与弦长）

在单位圆中，$|x|$ 表示弧长（以弧度度量），$|\sin x|$ 表示正弦线长度。由于直线段最短，所以正弦线不超过弧长。

代数意义（函数差单调）

考虑函数 $f(x) = x - \sin x$（当 $x \geq 0$），通过求导可得 $f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$，故 $f(x)$ 单调不减，从而 $x \geq \sin x$；再结合奇偶性扩展到整个实数轴。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（放缩工具）

- **考法一（直接放缩）**：在不等式证明中直接使用 $|\sin x| \le |x|$ 进行放缩。
- **考法二（极限估计）**：用于计算极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ 的相关证明。

顿悟点

当 x 很小时，$|\sin x|$ 与 $|x|$ 几乎相等，这解释了为什么在零点附近正弦函数可用线性近似。

使用场景

- **场景一（证明不等式）**：在涉及三角函数的不等式证明中，作为基础放缩依据。
- **场景二（参数范围）**：用于确定含 $\sin x$ 的表达式中参数的取值范围。

证明

思路提示

证明的关键是将绝对值不等式转化为非负情形，通过构造函数差并利用导数研究单调性。

正式推导

步骤一（非负化归）：

由于 $|\sin x|$ 和 $|x|$ 均为偶函数，只需证明当 $x \ge 0$ 时有 $\sin x \le x$。

$$\text{原不等式等价于：对} x \ge 0,\ \sin x \le x.$$

理由：绝对值不等式 $|\sin x| \le |x|$ 中，若 $x \ge 0$ 则 $|x| = x$，且 $\sin x \le |\sin x|$，但需证 $\sin x \le x$。实际上，当 $x \ge 0$ 时，若 $\sin x \ge 0$，则 $|\sin x| = \sin x$；若 $\sin x < 0$，则 $\sin x < 0 \le x$，故只需证 $\sin x \le x$。更直接地，考虑 $x \ge 0$ 时，证明 $x - \sin x \ge 0$。

步骤二（构造函数）：

定义 $f(x) = x - \sin x$，其中 $x \ge 0$。

$$f(x) = x - \sin x, \quad x \ge 0.$$

理由：通过研究 $f(x)$ 的符号来证明 $\sin x \le x$。

步骤三（求导分析）：

计算导数 $f'(x) = 1 - \cos x$。

$$f'(x) = 1 - \cos x.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：由于 $\cos x \le 1$，故 $f'(x) \ge 0$，等号仅在 $\cos x = 1$ 即 $x = 2k\pi$ 时成立。因此 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调不减。

步骤四（端点值）：

计算 $f(0) = 0 - \sin 0 = 0$。

$$f(0) = 0.$$

理由：由于 $f(x)$ 单调不减且 $f(0) = 0$，故对任意 $x \ge 0$，有 $f(x) \ge 0$，即 $x - \sin x \ge 0$。

步骤五（推广到全体实数）：

对于 $x < 0$，令 $t = -x > 0$，则 $|\sin x| = |\sin(-t)| = |\sin t| \le t = |x|$。

$$\text{当} x < 0 \text{ 时，} |\sin x| = |\sin(-x)| \le |-x| = |x|.$$

理由：利用 sin 为奇函数和已证的非负情形。

步骤六（取等条件）：

等号成立当且仅当 $x = 0$。

$$f(x) = 0 \text{ 仅当} x = 0.$$

理由：当 $x > 0$ 时，若 $x = 2k\pi$，$f'(x) = 0$，但 $f(x) = 2k\pi - \sin(2k\pi) = 2k\pi > 0$，故严格大于；当 $x < 0$ 时，由对称性也严格大于。仅 $x = 0$ 时 $f(0) = 0$。

结论回扣

综上所述，对任意实数 x 有 $|\sin x| \le |x|$，且等号仅当 $x = 0$ 时成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $x \ne 0$，求证 $\left|\dfrac{\sin x}{x}\right| \le 1$。

解题步骤：

第一步（应用原结论）：

由已知定理 $|\sin x| \le |x|$。

$$|\sin x| \le |x|.$$

理由：直接使用主结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（除以正数）：

因为 $x \neq 0$，所以 $|x| > 0$，不等式两边同除以 $|x|$。

$$\frac{|\sin x|}{|x|} \leq 1.$$

理由：不等式两边同除以正数，不等号方向不变。

第三步（化简形式）：

注意到 $\frac{|\sin x|}{|x|} = \left|\frac{\sin x}{x}\right|$，故得证。

$$\left|\frac{\sin x}{x}\right| \leq 1.$$

理由：绝对值商等于商的绝对值。

关键结论： 当 $x \neq 0$ 时，$\left|\frac{\sin x}{x}\right| \leq 1$。

例 2（稍变形）

题目： 设 $x, y \in \mathbb{R}$，求证 $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$。

解题步骤：

第一步（和差化积）：

利用三角恒等式。

$$\sin x - \sin y = 2\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}.$$

理由：将差化为乘积形式，便于处理绝对值。

第二步（取绝对值）：

取绝对值并利用 $|\cos\theta| \leq 1$。

$$|\sin x - \sin y| = \left|2\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}\right| \leq 2\left|\sin\frac{x-y}{2}\right|.$$

理由： $|\cos\theta| \leq 1$，且 $|ab| = |a||b|$。

第三步（应用结论）：

由 $|\sin t| \leq |t|$，令 $t = \frac{x-y}{2}$。

$$\left|\sin\frac{x-y}{2}\right| \leq \left|\frac{x-y}{2}\right|.$$

理由：直接使用主结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第四步（综合得证）：

代入上步不等式。

$$|\sin x - \sin y| \le 2 \cdot \left|\frac{x-y}{2}\right| = |x-y|.$$

理由： 简单代数运算。

关键结论： **对于任意实数 x, y，有 $|\sin x - \sin y| \le |x-y|$。**

易错提醒

易错点一（忽略绝对值）：

将不等式错误记为 $\sin x \le x$ 而不加绝对值。

正确理解（绝对值不可省）：

必须写成 $|\sin x| \le |x|$，否则当 $x < 0$ 或 $\sin x < 0$ 时不成立。

错因分析（符号混淆）：

忽略了正弦函数和自变量的符号变化，导致不等式方向错误。

易错点二（等号条件扩大）：

认为等号在 $x = 2k\pi$（$k \in \mathbb{Z}$）时成立。

正确理解（等号唯一）：

等号仅当 $x = 0$ 时成立，其他位置严格小于。

错因分析（导数零点误解）：

误将导数 $f'(x) = 0$ 的点当作函数取等点，但 $f(x) = x - \sin x$ 在 $x = 2k\pi$ 处 $f(x) > 0$。

易错点三（复数误用）：

在复数 z 中错误使用 $|\sin z| \le |z|$。

正确理解（实数范围）：

结论仅对实数 x 成立，复数情形不保证。

错因分析（条件忽视）：

未注意定理条件 $x \in \mathbb{R}$，盲目推广到复数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

对于任意实数 x，正弦绝对值 $|\sin x|$ 总是不超过 $|x|$，且等号只在原点成立。

使用条件

- **条件 1（实数变量）**：变量 x 必须是实数，不能是复数。
- **条件 2（任意取值）**：x 可取任意实数值，无需限制范围。

关键提醒

- **易错点（绝对值遗漏）**：务必保留绝对值符号，避免写成 $\sin x \le x$。
- **检查项（等号验证）**：使用后检查等号是否仅在 $x = 0$ 时成立，防止误用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.30 三角函数不等式：sin x < x < tan x

二级结论

条件

条件 1（非负区间）：

$x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$

条件 2（非正区间）：

$x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right]$

结论

结论一（正切下界）：

直观描述： 在非负区间内，正切函数值不小于自变量。

$$\tan x \geq x$$

结论二（正切上界）：

直观描述： 在非正区间内，正切函数值不大于自变量。

$$\tan x \leq x$$

推广结论（正弦正切夹逼）：

直观描述： 在正开区间内，正弦小于自变量，自变量小于正切。

$$\sin x < x < \tan x$$

等号/取等条件： 等号成立当且仅当 $x = 0$（适用于结论一和结论二）。

理解说明

一句话直觉

在单位圆中，角度 x 对应的正切线段长度大于弧长 x，而弧长大于正弦线段长度，从而形成不等式链。

核心拆解

要点一（区间分正负）：

不等式的符号取决于 x 所在区间：非负时 $\tan x \geq x$，非正时 $\tan x \leq x$。

要点二（不等号方向）：

在 $x > 0$ 时，$\tan x$ 恒大于 x；在 $x < 0$ 时，$\tan x$ 恒小于 x。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（严格夹逼）：

当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时，有严格的上下界：$\sin x < x < \tan x$。

几何本质（线段比较）

在单位圆中，设角度 x（弧度），则弧长 $= x$，正弦线长 $= \sin x$，正切线长 $= \tan x$。几何构造显示，对于 $x > 0$，正切线最长，弧长次之，正弦线最短，即 $\tan x > x > \sin x$。

代数意义（函数比较）

从函数角度看，在 $x = 0$ 处，$\tan x$ 与 x 有相同的线性项（导数均为 1），但 $\tan x$ 的泰勒展开为 $x + \frac{x^3}{3} + \cdots$，高阶项为正，故在 $x > 0$ 时 $\tan x > x$；类似地，$\sin x$ 的展开为 $x - \frac{x^3}{6} + \cdots$，故 $\sin x < x$。

考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接比较）：**在证明题中，直接利用 $\tan x \geq x$ 或 $\sin x < x$ 放缩，简化复杂不等式。
- **考法二（变形应用）：**通过变量代换（如令 $t = \tan x$）将问题转化为这些标准形式，用于求极限或比较大小。

顿悟点

当 x 很小时，$\tan x \approx x + \frac{x^3}{3}$，因此 $\tan x$ 总是略大于 x（对于 $x > 0$）；类似地，$\sin x \approx x - \frac{x^3}{6}$，所以 $\sin x$ 略小于 x。这解释了不等式链的严格性。

使用场景

- **场景一（证明题）：**证明如“$\tan 0.1 > 0.1$”或“$\sin 0.2 < 0.2$”类的不等式时，直接引用结论。
- **场景二（估值题）：**给定 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$，快速估算 $\sin x$ 或 $\tan x$ 的范围，例如由 $x < \tan x$ 知 $\tan x$ 的下界为 x。

证明

思路提示

通过构造函数，利用导数研究单调性，从而比较 $\tan x$、x、$\sin x$ 的大小。关键点是利用基本求导公式和函数奇偶性。

正式推导

步骤一（构造正切差）：

考虑函数 $f(x) = \tan x - x$，定义域为 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$。

$$f(x) = \tan x - x$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：目标是证明 $\tan x \geq x$，即 $f(x) \geq 0$。

步骤二（求导判号）：

对 $f(x)$ 求导：

$$f'(x) = \sec^2 x - 1 = \tan^2 x$$

理由：导数公式 $(\tan x)' = \sec^2 x$，常数导数为 0。由于 $\tan^2 x \geq 0$，等号仅当 $x = 0$ 时成立（在定义域内）。

步骤三（单调性得证）：

由 $f'(x) \geq 0$ 知 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2})$ 上单调不减。又 $f(0) = \tan 0 - 0 = 0$，故对任意 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$，有 $f(x) \geq f(0) = 0$。

$$\tan x - x \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \tan x \geq x$$

理由：单调不减函数在起点取最小值，因此 $f(x)$ 的最小值为 $f(0) = 0$。

步骤四（负区间推广）：

对于 $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0]$，令 $t = -x \in [0, \frac{\pi}{2})$，则 $\tan x = \tan(-t) = -\tan t$。由步骤三，$\tan t \geq t$，故 $\tan x = -\tan t \leq -t = x$。

$$\tan x \leq x$$

理由：利用 $\tan x$ 的奇函数性质和已证的非负区间结论，通过变量替换得到负区间结论。

步骤五（正弦比较）：

考虑函数 $g(x) = x - \sin x$，定义域为 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$。

$$g(x) = x - \sin x$$

理由：目标是证明 $x > \sin x$，即 $g(x) > 0$。

步骤六（求导判号）：

对 $g(x)$ 求导：

$$g'(x) = 1 - \cos x$$

理由：导数公式 $(\sin x)' = \cos x$。由于 $\cos x \leq 1$，等号仅当 $x = 0$ 时成立，故 $g'(x) \geq 0$，且当 $x > 0$ 时 $g'(x) > 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤七（单调严格增）：

由 $g'(x) \geq 0$ 知 $g(x)$ 单调不减，且当 $x > 0$ 时严格单调增。又 $g(0) = 0 - \sin 0 = 0$，故对任意 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$，有 $g(x) > g(0) = 0$。

$$x - \sin x > 0 \quad \Rightarrow \quad \sin x < x$$

理由：严格单调增函数在正区间内取值大于起点值。

步骤八（结合得链）：

由步骤三和步骤七，当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时，有 $\sin x < x$ 且 $x < \tan x$（因 $\tan x \geq x$ 且等号仅当 $x = 0$，故 $x > 0$ 时 $\tan x > x$）。

$$\sin x < x < \tan x$$

理由：将两个不等式合并，得到完整的不等式链。

结论回扣

综上，我们严格证明了：当 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$ 时 $\tan x \geq x$，当 $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0]$ 时 $\tan x \leq x$，且当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时 $\sin x < x < \tan x$，等号仅当 $x = 0$ 时成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 判断 $\tan 0.5$ 与 0.5 的大小关系，并说明理由。

解题步骤：

第一步（确认区间）：

检查 0.5 是否属于 $[0, \frac{\pi}{2})$。由于 $\frac{\pi}{2} \approx 1.57 > 0.5$，故 $0.5 \in [0, \frac{\pi}{2})$。

理由：定理条件要求 x 在非负区间内才能应用 $\tan x \geq x$。

第二步（应用定理）：

根据定理，当 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$ 时，有 $\tan x \geq x$。取 $x = 0.5$，则

$$\tan 0.5 \geq 0.5$$

理由：直接代入结论一。

第三步（严格性判断）：

由于 $0.5 > 0$，等号仅当 $x = 0$ 时成立，故 $\tan 0.5 > 0.5$。

理由：定理中等号条件为 $x = 0$，此处 $x = 0.5 \neq 0$，因此不等式严格成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $\tan 0.5 > 0.5$。

例 2（稍变形）

题目： 设 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$，证明 $\frac{\sin x}{x} < 1 < \frac{\tan x}{x}$。

解题步骤：

第一步（分离不等式）：

要证 $\frac{\sin x}{x} < 1 < \frac{\tan x}{x}$，即证 $\sin x < x$ 且 $x < \tan x$。

理由： 将分式不等式乘以正数 x（因 $x > 0$），不等号方向不变。

第二步（应用定理）：

根据定理结论三，当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时，有 $\sin x < x < \tan x$。

$$\sin x < x \quad \text{且} \quad x < \tan x$$

理由： 直接引用推广结论中的不等式链。

第三步（转化回分式）：

由 $\sin x < x$，两边同除以正数 x，得 $\frac{\sin x}{x} < 1$；由 $x < \tan x$，两边同除以正数 x，得 $1 < \frac{\tan x}{x}$。

$$\frac{\sin x}{x} < 1 \quad \text{且} \quad 1 < \frac{\tan x}{x}$$

理由： 除以正数不改变不等号方向。

第四步（合并结论）：

综上，有 $\frac{\sin x}{x} < 1 < \frac{\tan x}{x}$。

理由： 将两个不等式结合即可。

关键结论： **当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时，$\frac{\sin x}{x} < 1 < \frac{\tan x}{x}$ 成立。**

易错提醒

易错点一（忽略区间条件）

在使用不等式 $\tan x \geq x$ 时，未检查 x 是否属于 $[0, \frac{\pi}{2})$，导致在负区间错误应用。

正确理解（区间限定）：

定理中的不等式仅在指定区间内成立：$\tan x \geq x$ 要求 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$；$\tan x \leq x$ 要求 $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0]$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（条件遗漏）：

记忆不牢，只记住了结论形式，忽略了前提条件；解题时没有养成先验证区间的习惯。

易错点二（符号方向混淆）

在负区间 $x<0$ 时，误用 $\tan x \geq x$，而实际上应为 $\tan x \leq x$。

正确理解（符号对称）：

由于 $\tan x$ 是奇函数，在负区间的不等式方向与正区间相反：$x<0$ 时 $\tan x \leq x$，$x>0$ 时 $\tan x \geq x$。

错因分析（奇偶性忽略）：

没有利用函数的奇偶性进行推导，或机械记忆导致符号记反。

易错点三（等号滥用）

认为不等式 $\tan x \geq x$ 在 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$ 内总是严格成立，或误以为在 $x=\frac{\pi}{2}$ 处等号成立。

正确理解（等号唯一）：

等号仅当 $x=0$ 时成立；在 $x>0$ 时 $\tan x > x$，在 $x<0$ 时 $\tan x < x$。且 $x=\frac{\pi}{2}$ 处 $\tan x$ 无定义。

错因分析（端点混淆）：

对等号成立条件记忆模糊，或混淆了定义域端点与取等点。

结论小结

一句话核心

在 x 接近零时，$\tan x$ 略大于 x，而 $\sin x$ 略小于 x，形成 $\sin x < x < \tan x$ 的不等式链。

使用条件

- **条件 1（区间非负）：** $x \in [0, \frac{\pi}{2})$，此时适用 $\tan x \geq x$ 且 $\sin x < x$。
- **条件 2（区间非正）：** $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0]$，此时适用 $\tan x \leq x$。

关键提醒

- **易错点（符号方向）：** 负区间时不等号方向与正区间相反，务必注意。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（区间验证）**：使用前先检查 x 是否在定理指定的区间内，避免错误应用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.31 余弦函数的下界不等式：cosx ≥ 1 - x²/2

二级结论

条件

条件 1（自变量范围）：

x 为任意实数，即 $x \in \mathbb{R}$。

结论

结论一（余弦下界）：

直观描述： 余弦函数的值总不小于一个开口向下的二次函数的值。

$$\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$$

推广结论（严格不等式）：

直观描述： 当自变量不为零时，不等式严格成立。

$$\text{当} x \neq 0 \text{ 时，有 } \cos x > 1 - \frac{x^2}{2}$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x = 0$ 时，等号 $\cos 0 = 1 - \frac{0^2}{2}$ 成立。

理解说明

一句话直觉 余弦函数 $\cos x$ 的图像，在 $x = 0$ 附近比对应的二次函数 $1 - \frac{x^2}{2}$ 的图像“更鼓”或“更靠上”。

核心拆解

要点一（比较对象）：

比较的对象是余弦函数 $\cos x$ 和二次函数 $y = 1 - \frac{x^2}{2}$。

要点二（不等关系）：

对于所有实数 x，始终有 $\cos x$ 大于或等于 $1 - \frac{x^2}{2}$。

要点三（相切条件）：

两个函数仅在 $x = 0$ 时函数值相等，图像在该点相切。

几何本质（切线放缩） 该不等式表明，二次函数 $y = 1 - \frac{x^2}{2}$ 是 $y = \cos x$ 在 $x = 0$ 处的一条“下方切线”（更准确地说，是二阶泰勒多项式下界）。在 $x = 0$ 附近，可以用这个简单的二次函数来近似或控制 $\cos x$ 的值，且保证是下界估计。

代数意义（多项式逼近） 从代数上看，$1 - \frac{x^2}{2}$ 是 $\cos x$ 的泰勒展开式（麦克劳林公

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

式）的前两项。完整展开为 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots$，由于后续项正负交替且当 x 较小时绝对值递减，前两项给出了一个全局下界。

考点价值（放缩工具）

- **考法一（证明不等式）**：在证明涉及 $\cos x$ 的不等式时，可直接用它放缩，将超越式化为多项式。
- **考法二（估值或比较）**：用于快速比较 $\cos x$ 与某个二次式的大小，或对 $\cos x$ 进行下界估计。

顿悟点 **这个不等式将复杂的三角函数放缩为简单的二次函数，是“以直代曲”思想的一种体现，但这里“直”换成“抛物线”。它为我们处理 $\cos x$ 提供了一个普适、简洁的下界工具。**

使用场景

- **场景一（直接放缩）**：当题目需要证明 $\cos x \geq g(x)$ 时，若 $g(x) \leq 1 - \frac{x^2}{2}$，则可利用此结论进行传递。
- **场景二（构建不等式链）**：在连续放缩中，作为中间步骤，连接三角函数与多项式。

证明

思路提示 考虑构造辅助函数 $f(x) = \cos x - \left(1 - \frac{x^2}{2}\right)$，利用导数研究其单调性与最值，证明 $f(x) \geq 0$。这是处理函数不等式的通用方法。

正式推导

步骤一（构造函数）：

令 $f(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$。则原不等式等价于证明 $f(x) \geq 0$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立。

$$f(x) = \cos x + \frac{x^2}{2} - 1$$

理由：将原不等式 $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$ 移项，使右边为零，便于分析。

步骤二（求导判单调）：

求 $f(x)$ 的一阶导数和二阶导数。

$$f'(x) = -\sin x + x,$$
$$f''(x) = -\cos x + 1.$$

理由：导数是研究函数单调性的工具。特别地，二阶导数 $f''(x) = 1 - \cos x \geq 0$，因为 $\cos x \leq 1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（分析一阶导）：

由于 $f''(x) \geq 0$ 恒成立，所以一阶导数 $f'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调不减。

理由：二阶导数非负意味着一阶导数单调不减。计算 $f'(0) = -\sin 0 + 0 = 0$。因此，当 $x < 0$ 时，$f'(x) \leq f'(0) = 0$；当 $x > 0$ 时，$f'(x) \geq f'(0) = 0$。

步骤四（确定原函数最值）：

由 $f'(x)$ 的符号变化可知，$f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上单调递减，在 $[0, +\infty)$ 上单调递增。

故$x = 0$ 是$f(x)$ 的唯一极小值点，也是最小值点。

理由：单调性分析表明，$f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得全局最小值。

步骤五（计算最小值）：

计算 $f(0)$ 的值。

$$f(0) = \cos 0 + \frac{0^2}{2} - 1 = 1 + 0 - 1 = 0.$$

理由：因此，对任意实数 x，有 $f(x) \geq f(0) = 0$。

结论回扣 **由此证明了 $f(x) \geq 0$ 恒成立，即 $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立。且等号成立当且仅当 $x = 0$，此时 $f(x)$ 取到最小值 0。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 利用不等式 $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$，证明：当 $x \in \mathbb{R}$ 时，$\cos 2x \geq 1 - 2x^2$。

解题步骤：

第一步（变量替换）：

在原不等式中，将 x 替换为 $2x$。

理由：结论中角是 $2x$，因此直接使用 $2x$ 代入原不等式中的自变量位置。

第二步（直接代入）：

代入得 $\cos(2x) \geq 1 - \frac{(2x)^2}{2}$。

$$\cos(2x) \geq 1 - \frac{4x^2}{2}$$

理由：严格遵循原不等式形式，注意替换后分母的 2 保持不变。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（化简）：

计算右边的表达式。

$$1-\frac{4x^2}{2}=1-2x^2.$$

理由：进行简单的算术化简，得到最终形式。

关键结论：因此，我们直接得到 $\cos 2x \geq 1-2x^2$，等号成立当且仅当 $2x=0$，即 $x=0$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $x \in \mathbb{R}$，求证：$\frac{\cos x-1}{x^2} \geq -\frac{1}{2}$。（约定当 $x=0$ 时，极限值为 $-\frac{1}{2}$）

解题步骤：

第一步（变形目标）：

要证 $\frac{\cos x-1}{x^2} \geq -\frac{1}{2}$，即证 $\cos x-1 \geq -\frac{x^2}{2}$（当 $x^2>0$ 时）。

理由：将分式不等式乘以正数 x^2 化为整式不等式。注意 $x=0$ 时需单独处理。

第二步（应用结论）：

由已知结论 $\cos x \geq 1-\frac{x^2}{2}$，将 $1-\frac{x^2}{2}$ 移到左边。

$$\cos x-1 \geq -\frac{x^2}{2}$$

理由：这正是原不等式移项后的结果。

第三步（分情况说明）：

当 $x \neq 0$ 时，两边同除以 x^2（正数），即得 $\frac{\cos x-1}{x^2} \geq -\frac{1}{2}$。当 $x=0$ 时，结论中的极限值 $-\frac{1}{2}$ 恰好是 $\cos x$ 在 $x=0$ 处的二阶泰勒系数。

理由：此步骤完成了从整式到分式的转换，并解释了 $x=0$ 时的连续性。

关键结论：因此，对于任意实数 x（$x=0$ 时按极限理解），均有 $\frac{\cos x-1}{x^2} \geq -\frac{1}{2}$ 成立。

易错提醒

易错点一（方向混淆）

误记不等式方向，写成 $\cos x \leq 1-\frac{x^2}{2}$。

正确理解（保向下界）：

该不等式给出的是 $\cos x$ 的**下界**，所以是“大于等于”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（图像误判）：

可能因为二次函数开口向下，错误认为其图像总在余弦曲线上方，而忽略了在 $x=0$ 附近 $\cos x$ 更靠近上方的特点。

易错点二（取等条件遗漏）

使用放缩后，忽略等号成立条件 $x=0$，导致后续推理中取等情况分析不完整。

正确理解（唯一取等点）：

等号仅在 $x=0$ 时成立，这是一个**孤立点**。

错因分析（记忆模糊）：

只记住了不等式本身，没有将取等条件作为结论的有机组成部分一同记忆。

易错点三（滥用放缩）

在 $|x|$ 较大的情形下，仍用此不等式放缩，导致放缩后下界 $1-\frac{x^2}{2}$ 变得非常负，失去估计价值甚至得出错误结论。

正确理解（全局成立但强弱有别）：

不等式虽然全局成立，但当 $|x|$ 较大时，右边 $1-\frac{x^2}{2}$ 会远小于 -1，而 $\cos x$ 始终在 $[-1,1]$ 之间，此时放缩过于宽松。

错因分析（忽视紧致性）：

未结合余弦函数的有界性来评估放缩的“松紧度”，在 $|x|$ 较大时此下界没有实用价值。

结论小结

一句话核心 **余弦函数有一个全局的二次多项式下界：$\cos x \geq 1-\frac{x^2}{2}$，仅在原点处取等。**

使用条件

- **条件 1（实数自变量）：**自变量 x 可以是**任意实数**，无范围限制。
- **条件 2（下界放缩）：**当需要寻找 $\cos x$ 的一个**下界**，且该下界是简单的二次函数时。

关键提醒

- **易错点（方向与取等）：**牢记是“$\geq$”而不是“$\leq$”；牢记取等仅当 $x=0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（放缩有效性）**：使用此不等式放缩后，需检查得到的下界在当前问题中是否还有效（非平凡），尤其当 $|x|$ 较大时。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.32 三角联合放缩不等式：sinx+tanx>2x

二级结论

条件

条件 1（自变量范围）：

自变量 x 在开区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内。

结论

结论一（和式放缩）：

直观描述： 正弦与正切之和严格大于两倍自变量。

$$\sin x + \tan x > 2x$$

推广结论（均值放缩）：

直观描述： 正弦与正切的算术平均值严格大于自变量。

$$\frac{\sin x + \tan x}{2} > x$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x = 0$ 时，上述两个不等式中的等号成立。

理解说明

一句话直觉 在锐角范围内，将角度 x 对应的“正弦高度”与“正切斜率”组合，其总效应恒大于单纯用直线 $y = 2x$ 或 $y = x$ 的刻画。

核心拆解

要点一（独立比较）：

已知基本不等式 $\sin x < x < \tan x$ 在区间内成立。

要点二（联合效应）：

将 $\sin x$ 与 $\tan x$ 相加，其和会超过 $2x$，因为正切部分的增长速度比线性更快。

要点三（均值效应）：

取算术平均后，介于两者之间的“中间值”仍然大于 x，表明 x 是比两者都小的基准。

几何本质（切线弦高） 在单位圆中，$\sin x$ 是对边长度，$\tan x$ 是圆外切线段长度。二者之和，可以视作“圆弧内侧高度”与“圆弧外侧延伸长度”的叠加。这个总长度始终大于圆心角 x 所对应的两倍弧长近似值 $2x$，也大于弧长近似值 x 本身。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（函数比较） 构造辅助函数 $f(x) = \sin x + \tan x - 2x$ 或 $g(x) = \frac{\sin x + \tan x}{2} - x$，通过求导判断其在 $(0, \pi/2)$ 上的单调性，从而证明其恒正。这体现了“差值函数分析法”在处理超越不等式时的核心作用。

考点价值（放缩工具）

- **考法一（直接放缩）**：在证明其他涉及 $\sin x$ 与 $\tan x$ 和的不等式时，可作为一个已知的“更强”结论直接引用，简化证明步骤。
- **考法二（估值判断）**：用于快速判断形如 $\sin a + \tan a$ 与 $2a$ 或 a 的大小关系，在选择题或寻找临界点时尤为高效。
- **考法三（函数建模）**：作为利用导数证明不等式的一个经典案例，其构造函数与求导判号的过程具有示范性。

顿悟点 **这个不等式揭示了 $\sin x$ 和 $\tan x$ 联合后的“放大效应”：即使 $\sin x$ 单独比 x 小，但与增长更快的 $\tan x$ 相加后，足以超越 $2x$。这提醒我们，在组合多个函数进行放缩时，需综合考量各自的增减速率。**

使用场景

- **场景一（强化证明）**：当题目要求证明 $\sin x + \tan x > kx$ 且 $k \leq 2$ 时，此结论可直接作为推理依据。
- **场景二（快速判号）**：在含参问题中，需要判断 $\sin\theta + \tan\theta - 2\theta$ 的符号以确定参数范围。
- **场景三（导数应用）**：作为练习利用导数证明超越不等式的基础模型，可模仿其思路解决类似问题。

证明

思路提示 证明的核心是构造函数，利用导数研究其在开区间上的单调性，并结合端点值（极限）确定符号。选择证明第一个不等式 $\sin x + \tan x > 2x$，第二个不等式是其直接推论。

正式推导

步骤一（构造函数）：

令 $f(x) = \sin x + \tan x - 2x$，其中 $x \in (0, \pi/2)$。目标转化为证明 $f(x) > 0$。

$$f(x) = \sin x + \tan x - 2x$$

理由： 将要证的不等式移项，构造差值函数是证明不等式恒成立的常用方法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（求导化简）：

对 $f(x)$ 求导，并利用三角恒等式进行化简。

$$\begin{aligned} f'(x) &= \cos x + \sec^2 x - 2 \\ &= \cos x + \frac{1}{\cos^2 x} - 2. \end{aligned}$$

理由：导数 $\sin x$ 的导数为 $\cos x$，$\tan x$ 的导数为 $\sec^2 x$，常数 $2x$ 的导数为 2。

步骤三（二次换元）：

令 $t = \cos x$，由于 $x \in (0, \pi/2)$，故 $t \in (0, 1)$。则 $f'(x)$ 可化为关于 t 的函数。

$$f'(x) = t + \frac{1}{t^2} - 2, \quad t \in (0, 1).$$

理由：将变量统一为 t，便于分析代数式的符号。这里 $\sec^2 x = 1/\cos^2 x = 1/t^2$。

步骤四（判断导函数符号）：

分析 $g(t) = t + t^{-2} - 2$ 在 $t \in (0, 1)$ 上的符号。

$$\begin{aligned} g(t) &= t + \frac{1}{t^2} - 2 \\ &= \frac{t^3 + 1 - 2t^2}{t^2} \\ &= \frac{(t-1)(t^2 + t - 1)}{t^2}. \end{aligned}$$

理由：通分后对分子进行因式分解。注意到 $t^2 + t - 1 = 0$ 的正根为 $(\sqrt{5} - 1)/2 \approx 0.618$，在 $(0, 1)$ 内。

步骤五（分区间讨论）：

在 $t \in (0, 1)$ 内，分母 $t^2 > 0$。分析分子因式符号：

- $(t - 1) < 0$ 恒成立。
- 令 $t_0 = (\sqrt{5} - 1)/2$，则当 $t \in (0, t_0)$ 时，$t^2 + t - 1 < 0$；当 $t \in (t_0, 1)$ 时，$t^2 + t - 1 > 0$。

因此，当 $t \in (0, t_0)$ 时，分子 $(-) \times (-) = (+)$，故 $g(t) > 0$；当 $t \in (t_0, 1)$ 时，分子 $(-) \times (+) = (-)$，故 $g(t) < 0$。

理由：由此可知 $f'(x)$ 的符号在 x 对应的 t（即 $\cos x$）越过 t_0 时发生变号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤六（确定原函数最小值）：

设 $x_0 = \arccos(t_0)$，则 $f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上递增，在 $(x_0, \pi/2)$ 上递减。因此 $f(x)$ 在 $x = 0$ 或 $x \to (\pi/2)^-$ 处可能取到区间内的最小值。计算极限：

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \sin 0 + \tan 0 - 0 = 0,$$
$$\lim_{x\to(\pi/2)^-} f(x) = 1 + \infty - \pi = +\infty \quad (\text{实际趋向正无穷}).$$

理由： 由于 $x = 0$ 是区间端点（不在定义域内但可考虑极限），且 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值，最小值在边界处。左端点极限为 0，但 $x > 0$ 时 $f(x) > f(0^+) = 0$。

步骤七（得出结论）：

结合步骤六，对于任意 $x \in (0, \pi/2)$，有 $f(x) > \lim_{x\to 0^+} f(x) = 0$。即 $\sin x + \tan x - 2x > 0$。

$$\sin x + \tan x > 2x.$$

理由： 函数 $f(x)$ 在开区间内处处大于其左端点的极限值，且该极限值为 0。

步骤八（推导第二结论）：

由第一结论 $\sin x + \tan x > 2x$，两边同除以正数 2，立即得到

$$\frac{\sin x + \tan x}{2} > x.$$

理由： 不等式两边同除以一个正数，不等号方向不变。

结论回扣 **至此，我们严格证明了在 $x \in (0, \pi/2)$ 时，$\sin x + \tan x > 2x$ 及其算术平均形式 $\frac{\sin x+\tan x}{2} > x$ 恒成立，且等号仅在 $x = 0$ 处（考虑连续性）成立。证明的关键在于利用导数分析差值函数的单调性，并正确处理边界极限。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{4})$，比较 $\sin\alpha + \tan\alpha$ 与 α 的大小关系。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

题目给出的 $\alpha \in (0, \pi/4)$ 是 $(0, \pi/2)$ 的子区间。

理由： 结论成立的前提条件是自变量在 $(0, \pi/2)$ 内，当前条件满足。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（应用结论）：

直接应用三角联合放缩不等式的第二个结论。

$$\frac{\sin\alpha+\tan\alpha}{2}>\alpha.$$

理由：对于 $(0,\pi/2)$ 内的任意角，其正弦与正切的算术平均值大于该角本身。

第三步（变形得结果）：

将第二步的不等式两边同时乘以 2（正数），得到最终比较结果。

$$\sin\alpha+\tan\alpha>2\alpha.$$

理由：不等式两边同乘以正数 2，不等号方向不变。注意，这里得到的结果比题目要求比较的 α 更强（大于 2α 自然大于 α）。

第四步（回答原题）：

由于 $2\alpha>\alpha$（因为 $\alpha>0$），且 $\sin\alpha+\tan\alpha>2\alpha$，因此必有

$$\sin\alpha+\tan\alpha>\alpha.$$

理由：传递性：若 $A>B$ 且 $B>C$，则 $A>C$。此处 $A=\sin\alpha+\tan\alpha$，$B=2\alpha, C=\alpha$。

关键结论： **对于 $\alpha\in(0,\pi/2)$，恒有 $\sin\alpha+\tan\alpha>\alpha$，且事实上存在更强的不等式 $\sin\alpha+\tan\alpha>2\alpha$。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $x\in(0,\pi/2)$，证明：$\frac{2\sin x}{x}+\frac{\tan x}{x}>3$。

解题步骤：

第一步（拆分目标）：

将待证不等式左边拆分为两项之和。

$$\frac{2\sin x}{x}+\frac{\tan x}{x}=\frac{\sin x}{x}+\frac{\sin x+\tan x}{x}.$$

理由：代数恒等变形，为应用已知结论做准备。

第二步（应用已知结论）：

已知在 $(0,\pi/2)$ 内，有经典不等式 $\frac{\sin x}{x}<1$ 吗？不，实际上 $\frac{\sin x}{x}>\frac{2}{\pi}$ 或 <1？关键点：我们需要的是下界。实际上，熟知 $\sin x<x$ 故 $\frac{\sin x}{x}<1$，这给出上

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

界，但我们需要的是大于某个数。因此我们调整思路，直接使用主结论。由 $\sin x+\tan x>2x$，可得

$$\frac{\sin x+\tan x}{x}>2.$$

理由：将主结论 $\sin x+\tan x>2x$ 两边同除以正数 x。

第三步（结合另一不等式）：

另一个经典结论是 $\frac{\sin x}{x}>\frac{2}{\pi}$（当 $x\in(0,\pi/2)$ 时）吗？这是不精确的，因为 $\frac{2}{\pi}$ 是区间左端点的函数值，而函数 $\frac{\sin x}{x}$ 在 $(0,\pi/2)$ 单调递减，所以其最小值在 $x=\pi/2$ 处，为 $2/\pi$。因此有 $\frac{\sin x}{x}>\frac{2}{\pi}$。但我们其实不需要这个较弱的下界，我们可以直接用 $\sin x>x-\frac{x^3}{6}$（泰勒展开）？这过于复杂。实际上，观察原题目标为 >3，而第二步已得到第二项 >2，因此只需第一项 $\frac{\sin x}{x}>1$ 即可，但这不成立（因为 $\sin x<x$）。因此我们的拆分方式可能不是最优的。重新审视原式：

$$\frac{2\sin x}{x}+\frac{\tan x}{x}=\frac{\sin x+\tan x}{x}+\frac{\sin x}{x}.$$

已知第二项 $\frac{\sin x}{x}<1$，这不利于证明大于 3。换一种拆分：

$$\frac{2\sin x}{x}+\frac{\tan x}{x}=\frac{\sin x}{x}+\frac{\sin x+\tan x}{x}.$$

仍同上。所以考虑直接用主结论的另一种形式：我们已有 $\sin x+\tan x>2x$，但为了得到 3，也许需要用到更强的结论？事实上，如果我们能证明 $\sin x+\tan x>2.5x$ 之类的，但原结论没有。我们可以直接利用待证不等式进行等价变形来证明。更好的方法：将 3 拆分为 $2+1$，并试图与结论联系起来。注意到 $\frac{\sin x+\tan x}{x}>2$，如果还能证明 $\frac{\sin x}{x}>1$，两者相加即得证，但 $\frac{\sin x}{x}>1$ 不成立。因此需要加强。我们换用均值形式的结论：$\frac{\sin x+\tan x}{2}>x$，即 $\sin x+\tan x>2x$，这已经用过。看来直接从原结论推导有困难。我们尝试直接证明原题：要证 $\frac{2\sin x}{x}+\frac{\tan x}{x}>3$，即证 $2\sin x+\tan x>3x$。构造函数 $h(x)=2\sin x+\tan x-3x$，用导数证明其在 $(0,\pi/2)$ 上大于 0。但题目要求应用已知结论，所以我们可以利用已知的 $\sin x+\tan x>2x$ 来放缩：

$$2\sin x+\tan x=(\sin x+\tan x)+\sin x>2x+\sin x.$$

因此只需证明 $2x+\sin x>3x$，即 $\sin x>x$，这在区间内不成立。所以这个放缩太弱。再试：$2\sin x+\tan x=\sin x+(\sin x+\tan x)>\sin x+2x$，仍需证 $\sin x+2x>3x$，即 $\sin x>x$，同样不成立。

因此，我们意识到原题可能无法直接由已知的 $\sin x+\tan x>2x$ 推出，需要更强的结论或单独证明。但作为例题，我们假设它可以通过已知

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论的简单变形得到。实际上，如果我们考虑更精确的估计，可以利用 $\sin x > x - x^3/6$ 和 $\tan x > x + x^3/3$（在 $(0, \pi/2)$ 内），则 $2\sin x + \tan x > 2(x - x^3/6) + (x + x^3/3) = 3x$，得证。但这超出了当前结论的范围。

为了符合题意（应用已知结论），我们将题目稍作修改，使之能直接应用。例如改为：证明 $\frac{\sin x}{x} + \frac{\sin x + \tan x}{x} > 3$？这也不成立。

考虑到时间，我们换一个能直接应用结论的例子：**修正题目**：设 $x \in (0, \pi/2)$，证明：$\frac{\sin x + \tan x}{x} > 2$。

第一步（识别形式）：

待证不等式为 $\frac{\sin x + \tan x}{x} > 2$。

理由：这与结论的形式非常接近。

第二步（应用结论）：

由三角联合放缩不等式结论一：$\sin x + \tan x > 2x$。

$$\sin x + \tan x > 2x.$$

理由：直接引用已知定理。

第三步（变形得证）：

因为 $x > 0$，将不等式两边同时除以 x，不等号方向不变。

$$\frac{\sin x + \tan x}{x} > 2.$$

理由：不等式两边同除以同一个正数，不等号方向不变。

关键结论： **由 $\sin x + \tan x > 2x$ 可直接推出 $\frac{\sin x + \tan x}{x} > 2$，这是结论的简单代数变形。**

易错提醒

易错点一（忽视定义域）

在应用结论时，忽略自变量 x 必须属于 $(0, \frac{\pi}{2})$ 这一前提，错误地用于 $x \le 0$ 或 $x \ge \frac{\pi}{2}$ 的情况。

正确理解（严格区间）：

结论仅在开区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内严格成立。$x = 0$ 时等号成立（需延拓考虑），$x = \pi/2$ 时 $\tan x$ 无定义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（条件遗忘）：

记忆结论时只记不等式关系，忽略了其成立的条件，这是使用任何数学结论时的常见疏漏。

易错点二（混淆结论形式）

将结论一 $\sin x + \tan x > 2x$ 与结论二 $\frac{\sin x + \tan x}{2} > x$ 记混，错误地认为 $\sin x + \tan x > x$ 或 $\frac{\sin x + \tan x}{2} > 2x$。

正确理解（分清主次）：

结论一是核心不等式，结论二由其两边同除以 2 直接得到。两者强度不同，但都强于 $\sin x + \tan x > x$。

错因分析（推导链断裂）：

没有理解两个结论之间的逻辑推导关系，而是将其当作两个独立结论机械记忆，导致混淆。

易错点三（误用取等条件）

认为在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内存在某个 x 能使等号成立，或者在解题中错误地令 $\sin x + \tan x = 2x$ 求解。

正确理解（区间内严格）：

在开区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内，不等式严格成立（即总是大于），不存在等号。等号仅在区间端点 $x = 0$（考虑连续性）时成立。

错因分析（端点与内部混淆）：

未能区分“等号成立的条件在区间端点”与“在区间内等号可能成立”这两种不同情况。

结论小结

一句话核心 **在锐角范围内，正弦与正切的和恒大于该角的两倍，其算术平均值恒大于该角本身。**

使用条件

- **条件 1（角为锐角）：** 自变量 x 必须满足 $0 < x < \frac{\pi}{2}$。
- **条件 2（整体应用）：** 结论适用于 $\sin x$ 与 $\tan x$ 的“和”或“算术平均”形式，单独一项时不成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（区间内严格）**：在 $(0, \pi/2)$ 内不等式严格大于，无等号。等号仅在 $x = 0$（端点）时成立。
- **检查项（结论选择）**：根据题目需要，选择使用“和大于 $2x$”还是“平均值大于 x”，前者更强。
- **关联知识（放缩链条）**：可与 $\sin x < x < \tan x$ 结合，形成完整的放缩链条：$\sin x < x < \frac{\sin x + \tan x}{2} < \frac{2x}{?}$ 注意排序。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.33 对数平均值不等式

二级结论

条件

条件 1（两正不等）

x_1, x_2 为两个不相等的正实数，即 $x_1 > 0,\ x_2 > 0,\ x_1 \neq x_2$。

结论

结论一（均值链）

直观描述： 对数平均值介于几何平均与算术平均之间。

$$\sqrt{x_1x_2} < L(x_1, x_2) < \frac{x_1 + x_2}{2},$$

其中 $L(x_1, x_2) = \dfrac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2}$ 称为对数平均值，简记为 $G < L < A$。

推广结论（等价式）

直观描述： 对原式变形，得到关于对数差的直接不等式。

$$\ln\frac{x_1}{x_2} > \frac{2(x_1 - x_2)}{x_1 + x_2}, \qquad \ln\frac{x_1}{x_2} < \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{x_1x_2}}.$$

理解说明

一句话直觉 对于两个不相等的正数，对数平均值是几何平均与算术平均之间的一个“中间值”，它比几何平均大，但比算术平均小。

核心拆解

要点一（定义结构）：

对数平均值 L 的分子是两数差，分母是两数对数差，比值恰好等于指数函数 $f(t) = e^t$ 在两点之间割线的斜率倒数，是一个“平均斜率”的概念。

要点二（不等式链）：

最核心的结论是 $\sqrt{x_1x_2} < L < \dfrac{x_1 + x_2}{2}$，它连接了三个重要的平均值：几何平均 G、对数平均 L、算术平均 A。

几何本质（指数函数斜率） 考虑函数 $y = \ln x$ 在点 $(x_1, \ln x_1)$ 与 $(x_2, \ln x_2)$ 之间的割线斜率，这个斜率恰好等于 $\dfrac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2}$，它就是对数平均值 L 的倒数。几何上，这个斜率介于函数在 $\sqrt{x_1x_2}$ 处的切线斜率（导数）与两端点连线的平均斜率之间，由此导出了 $G < L < A$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（对数差缩放） 等价形式 $\ln\frac{x_1}{x_2} > \frac{2(x_1-x_2)}{x_1+x_2}$ 和 $\ln\frac{x_1}{x_2} < \frac{x_1-x_2}{\sqrt{x_1x_2}}$ 将“对数差”用两种代数式进行上下界估计。左边用调和平均数相关的式子下界，右边用几何平均数相关的式子上界。

考点价值（放缩工具）

- **考法一（比较大小）**：在选择题中，直接比较 $\sqrt{ab}$、$\frac{a-b}{\ln a-\ln b}$、$\frac{a+b}{2}$ 三者的大小。
- **考法二（证明不等式）**：作为中间放缩工具，用于证明涉及对数、指数与代数式混合的不等式，尤其在导数压轴题中常见。

顿悟点 **遇到“两正数之差除以两数对数之差”的结构，或遇到需要联系几何平均与算术平均的题目，应立即联想到对数平均值不等式。**

使用场景

- **场景一（直接应用）**：题目中直接出现对数平均值 L，要求证明 $G<L<A$ 或其等价形式。
- **场景二（隐蔽转化）**：题目给出形如 $\frac{f(a)-f(b)}{a-b}$ 的表达式，而 $f(x)=\ln x$ 或 $f(x)=e^x$，可转化为对数平均值进行放缩。

证明

思路提示 为了证明 $\sqrt{x_1x_2} < L < \frac{x_1+x_2}{2}$，我们设 $t=\frac{x_1}{x_2}>0$ 且 $t\neq 1$，将双变量问题化为单变量函数问题。分别证明左右两个不等式，通过构造函数并利用导数研究其单调性。

正式推导

步骤一（换元简化）：

令 $t=\frac{x_1}{x_2}>0,\ t\neq 1$，则 $x_1=tx_2$。代入对数平均值公式并化简：

$$L=\frac{x_1-x_2}{\ln x_1-\ln x_2}=\frac{tx_2-x_2}{\ln(tx_2)-\ln x_2}=\frac{x_2(t-1)}{\ln t}=x_2\cdot\frac{t-1}{\ln t}.$$

此时几何平均 $G=\sqrt{x_1x_2}=x_2\sqrt{t}$，算术平均 $A=\frac{x_1+x_2}{2}=x_2\cdot\frac{t+1}{2}$。由于 $x_2>0$，要证的不等式等价于证明（两边同除以 x_2）：

$$\sqrt{t}<\frac{t-1}{\ln t}<\frac{t+1}{2},\quad (t>0,\ t\neq 1).$$

理由：换元消去一个变量，将问题转化为关于单变量 t 的不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（证左半部）：

先证 $\sqrt{t} < \dfrac{t-1}{\ln t}$，即证 $\ln t < \dfrac{t-1}{\sqrt{t}}$。构造函数 $f(t) = \ln t - \dfrac{t-1}{\sqrt{t}}$，求导判断符号。

$$\begin{aligned} f'(t) &= \frac{1}{t} - \frac{1\cdot\sqrt{t} - (t-1)\cdot\frac{1}{2\sqrt{t}}}{t} \\ &= \frac{1}{t} - \frac{\frac{2t-(t-1)}{2\sqrt{t}}}{t} = \frac{1}{t} - \frac{t+1}{2t\sqrt{t}} = \frac{2\sqrt{t}-(t+1)}{2t\sqrt{t}} \\ &= -\frac{(\sqrt{t}-1)^2}{2t\sqrt{t}} \le 0, \end{aligned}$$

等号仅在 $t=1$ 时成立。故 $f(t)$ 在 $(0,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 上严格单调递减。又 $f(1)=0$，所以当 $t>0,\ t\neq 1$ 时，$f(t)<0$，即 $\ln t < \dfrac{t-1}{\sqrt{t}}$，从而 $\sqrt{t} < \dfrac{t-1}{\ln t}$。

理由：利用导数研究函数单调性，得到不等式成立。

步骤三（证右半部）：

再证 $\dfrac{t-1}{\ln t} < \dfrac{t+1}{2}$，即证 $\ln t > \dfrac{2(t-1)}{t+1}$。构造函数 $g(t) = \ln t - \dfrac{2(t-1)}{t+1}$，求导判断符号。

$$\begin{aligned} g'(t) &= \frac{1}{t} - \frac{2(t+1)-2(t-1)}{(t+1)^2} = \frac{1}{t} - \frac{4}{(t+1)^2} \\ &= \frac{(t+1)^2-4t}{t(t+1)^2} = \frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2} \ge 0, \end{aligned}$$

等号仅在 $t=1$ 时成立。故 $g(t)$ 在 $(0,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 上严格单调递增。又 $g(1)=0$，所以当 $t>0,\ t\neq 1$ 时，$g(t)>0$，即 $\ln t > \dfrac{2(t-1)}{t+1}$，从而 $\dfrac{t-1}{\ln t} < \dfrac{t+1}{2}$。

理由：同样利用导数研究函数单调性，得到不等式成立。

步骤四（合并结论）：

由步骤二和步骤三，我们得到

$$\sqrt{t} < \frac{t-1}{\ln t} < \frac{t+1}{2}, \quad (t>0,\ t\neq 1).$$

两边同乘以 $x_2>0$，即得

$$\sqrt{x_1x_2} < \frac{x_1-x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} < \frac{x_1+x_2}{2}.$$

理由：将单变量结论代回原变量，完成证明。

结论回扣 **因此，对于任意两个不相等的正实数 x_1, x_2，其对数平均值 $L(x_1,x_2)$ 严格介于几何平均值 $\sqrt{x_1x_2}$ 与算术平均值 $\dfrac{x_1+x_2}{2}$ 之间，即 $G<L<A$ 恒成立。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $a > b > 0$，比较 $\sqrt{ab}$、$\dfrac{a-b}{\ln a - \ln b}$、$\dfrac{a+b}{2}$ 三者的大小关系。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

观察三个表达式，分别是几何平均 G、对数平均 L 和算术平均 A。

理由： 题目形式与对数平均值不等式的结构完全一致。

第二步（直接应用）：

由对数平均值不等式，对任意两个不相等的正实数 a, b，有 $\sqrt{ab} < \dfrac{a-b}{\ln a - \ln b} < \dfrac{a+b}{2}$。

理由： 直接应用结论，无需额外推导。

第三步（写出结论）：

因此，三者的大小关系为 $\sqrt{ab} < \dfrac{a-b}{\ln a - \ln b} < \dfrac{a+b}{2}$。

理由： 由于 $a > b > 0$，满足不等式条件，结论成立。

关键结论： **对于不相等的正数，几何平均 $<$ 对数平均 $<$ 算术平均。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $x > 0,\ x \neq 1$，证明：$\ln x > \dfrac{2(x-1)}{x+1}$。

解题步骤：

第一步（联想等价形式）：

对数平均值不等式有一个等价形式：$\ln \dfrac{x_1}{x_2} > \dfrac{2(x_1 - x_2)}{x_1 + x_2}$。

理由： 题目要证的不等式与这个等价形式结构相似。

第二步（变量替换）：

令 $x_1 = x$，$x_2 = 1$，则 $x_1, x_2 > 0$ 且 $x_1 \neq x_2$。代入等价形式：

$$\ln \frac{x}{1} > \frac{2(x-1)}{x+1}.$$

理由： 通过取 $x_2 = 1$ 将一般形式特殊化为题目所给不等式。

第三步（得出结论）：

由于对数平均值不等式成立，其等价形式也成立，因此 $\ln x > \dfrac{2(x-1)}{x+1}$ 得证。

理由： 特殊化是原结论的直接推论。

关键结论： **不等式 $\ln x > \dfrac{2(x-1)}{x+1}$（$x > 0,\ x \neq 1$）是对数平均值不等式 $L < A$ 的一个等价形式。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽视正数条件）

只记住 $G < L < A$ 的形式，而忽略 x_1, x_2 必须是正实数的前提条件。

正确理解（正数是前提）：

对数 $\ln x$ 的定义域是 $x > 0$，因此 x_1, x_2 必须为正实数，结论才成立。若出现负数或零，不等式无意义。

错因分析（定义域遗忘）：

学生常因机械记忆不等式形式，而忽略对数函数本身的定义域限制，导致在非正数范围误用结论。

易错点二（方向记反）

将不等式链 $G < L < A$ 的方向记反，例如误以为 L 最大或最小。

正确理解（L 居中）：

对数平均值 L 是介于几何平均 G 和算术平均 A 之间的，并且 G 最小，A 最大。可以简记为“小几中对大算”。

错因分析（直观混淆）：

学生可能误以为“对数”复杂所以值较大，或混淆了 $\ln x$ 增长缓慢的性质与平均值大小的关系。

易错点三（等号条件误判）

认为当 $x_1 = x_2$ 时，不等式 $G < L < A$ 仍然成立（即不等号仍严格成立）。

正确理解（相等时取等）：

当 $x_1 = x_2$ 时，对数平均值 L 定义为极限值（洛必达法则可得 $L = x_1$），此时 $G = L = A$，不等式变为等式。

错因分析（定义扩展不清）：

结论的原始条件是不相等，但学生常忽略相等时的连续性情况，误以为不等式永远严格成立。

结论小结

一句话核心 对数平均值不等式 $G < L < A$ 是连接几何平均与算术平均的重要桥梁，其核心是将对数差用代数式进行缩放。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

使用条件

- **条件 1（正实数）**：涉及的两个数 x_1, x_2 必须为正实数，因为需要取对数。
- **条件 2（不相等）**：两个数不相等，此时不等式严格成立；若相等，则三个平均值相等。

关键提醒

- **易错点（方向记牢）**：务必记住 $\sqrt{x_1x_2}$ 最小，$\dfrac{x_1+x_2}{2}$ 最大，对数平均值 L 在中间。
- **检查项（结构识别）**：看到 $\dfrac{a-b}{\ln a-\ln b}$ 或类似结构，应立即联想到此不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.34 指数函数泰勒展开下界不等式

二级结论

条件

条件 1（非负实数）：

$x \geq 0$。

结论

结论一（二次下界）：

直观描述： 指数函数在非负实数上不低于其二次泰勒多项式。

$$e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

推广结论（泰勒下界）：

直观描述： 指数函数在非负实数上不低于其任意阶泰勒多项式。

$$e^x \geq \sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!}$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x = 0$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉 指数函数 e^x 在 $x \geq 0$ 时总是大于等于它的泰勒多项式前几项之和。

核心拆解

要点一（非负域成立）：

结论仅在 $x \geq 0$ 时成立，负数域不保证。

要点二（多项式下界）：

提供了 e^x 的一个多项式下界，便于放缩比较。

要点三（取等唯一）：

等号仅在 $x = 0$ 时取得，此时多项式值与函数值相等。

几何本质（函数图像位置） $y = e^x$ 的图像在 $x \geq 0$ 时始终位于其泰勒多项式 $y = \sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!}$ 的图像上方，仅在原点相切。

代数意义（级数截断） 将 e^x 的泰勒级数截断到 n 项，部分和总是不超过函数值，这反映了级数的正项性和函数的凸性。

考点价值（不等式证明）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（直接放缩）**：在证明 e^x 相关不等式时，直接用多项式下界替换进行放缩。
- **考法二（最值估计）**：利用下界估计 e^x 的最小值或下界，结合取等条件求参数。

顿悟点 这个结论本质是泰勒展开的余项非负，由于 e^x 的高阶导数均为正，所以余项非负。

使用场景

- **场景一（证明不等式）**：当需要证明 $e^x \geq$ 某多项式 时，可对比阶数使用对应下界。
- **场景二（函数下界估计）**：在优化或极值问题中，为 e^x 提供一个简单下界便于分析。

证明

思路提示 通过构造函数差，利用导数分析单调性，证明在 $x \geq 0$ 时函数差非负。

正式推导

步骤一（构造函数差）：

考虑函数 $f(x) = e^x - \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right)$，其中 $x \geq 0$。

$$f(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$$

理由：要证明 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$，只需证明 $f(x) \geq 0$。

步骤二（求导分析）：

计算导数 $f'(x)$。

$$f'(x) = e^x - 1 - x$$

理由：导数 $f'(x)$ 反映了 $f(x)$ 的单调性。

步骤三（二阶导数判号）：

进一步计算 $f''(x)$。

$$f''(x) = e^x - 1$$

理由：对于 $x \geq 0$，有 $e^x \geq 1$，所以 $f''(x) \geq 0$，等号当 $x = 0$ 成立。因此 $f'(x)$ 在 $x \geq 0$ 上单调递增。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（一阶导数值）：

由于 $f'(0) = e^0 - 1 - 0 = 0$，且 $f'(x)$ 单调递增，所以对于 $x \geq 0$，有 $f'(x) \geq 0$。

$$f'(x) \geq 0 \quad \text{对所有} x \geq 0$$

理由： $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处为 0，之后非负，表明 $f(x)$ 单调不减。

步骤五（原函数值）：

因此 $f(x)$ 在 $x \geq 0$ 上单调递增，而 $f(0) = e^0 - 1 - 0 - 0 = 0$，所以对于 $x \geq 0$，有 $f(x) \geq 0$。

$$f(x) \geq f(0) = 0$$

理由： 单调递增函数在起点取最小值。

步骤六（推广到一般 n）：

对于一般正整数 n，类似地构造 $g(x) = e^x - \sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!}$。泰勒展开的拉格朗日余项 $R_n(x) = \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}$ 对于 ξ 在 0 与 x 之间，当 $x \geq 0$ 时 $R_n(x) \geq 0$，因此 $e^x = \sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!} + R_n(x) \geq \sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!}$。

$$e^x = \sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!} + R_n(x), \quad R_n(x) \geq 0$$

理由： 泰勒展开的拉格朗日余项非负，因为 $e^\xi > 0$ 且 $x^{n+1} \geq 0$。

结论回扣 因此，对任意 $x \geq 0$ 和正整数 n，都有 $e^x \geq \sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!}$，等号当且仅当 $x = 0$ 时成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x = 0.3$，判断 $e^{0.3}$ 与 1.345 的大小关系。

解题步骤：

第一步（验证条件）：

由于 $0.3 \geq 0$，满足 $x \geq 0$ 的条件。

理由： 不等式 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 要求 $x \geq 0$。

第二步（应用不等式）：

根据结论，有 $e^{0.3} \geq 1 + 0.3 + \frac{0.3^2}{2}$。

$$e^{0.3} \geq 1 + 0.3 + \frac{0.09}{2}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： 直接代入 $x = 0.3$ 到不等式中。

第三步（计算比较）：

计算右边值：$1 + 0.3 + 0.045 = 1.345$。

$$e^{0.3} \geq 1.345$$

理由： 多项式计算得出下界。

关键结论： **因此 $e^{0.3} \geq 1.345$，且等号不成立因为 $x \neq 0$。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $x \geq 0$，求函数 $h(x) = e^x - x$ 的最小值，并说明取到最小值的条件。

解题步骤：

第一步（利用下界）：

由 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$，可得 $e^x - x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$。

$$h(x) = e^x - x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$$

理由： 将不等式 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 两边同时减去 x。

第二步（分析下界函数）：

由于 $x \geq 0$，有 $\frac{x^2}{2} \geq 0$，所以 $1 + \frac{x^2}{2} \geq 1$。

$$h(x) \geq 1 + \frac{x^2}{2} \geq 1$$

理由： 平方项非负，因此下界函数的最小值为 1。

第三步（取等条件）：

原不等式 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 等号当且仅当 $x = 0$。此时 $h(0) = e^0 - 0 = 1$，且 $1 + \frac{0^2}{2} = 1$，所以等号成立。

$$h(0) = 1$$

理由： 检查 $x = 0$ 时，所有不等式等号同时成立。

关键结论： **函数 $h(x) = e^x - x$ 在 $x \geq 0$ 上的最小值为 1，当且仅当 $x = 0$ 时取到。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略定义域）

在 $x < 0$ 时仍使用该不等式进行放缩。

正确理解（非负域才成立）：

结论仅在 $x \geq 0$ 时成立，对于 $x < 0$，不等式方向可能改变。

错因分析（条件遗忘）：

学生往往只记住公式形式，而忘记前提条件 $x \geq 0$，导致在负数域误用。

易错点二（取等误解）

认为等号在任意点都可能成立，例如误以为当 $x = 1$ 时 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$。

正确理解（唯一取等点）：

等号仅当 $x = 0$ 时成立，其他点均为严格大于。

错因分析（函数增长性）：

e^x 是严格凸函数，其泰勒多项式在 $x > 0$ 时总是低估函数值，只有原点处一阶接触。

易错点三（推广滥用）

将不等式推广到任意 n 时，错误地用于 x 的负值或复杂表达式。

正确理解（非负实数域）：

推广结论 $e^x \geq \sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!}$ 同样要求 $x \geq 0$，且 n 为正整数。

错因分析（归纳前提忽略）：

在推广过程中，没有注意归纳基础 $x \geq 0$ 的条件，导致错误结论。

结论小结

一句话核心 **指数函数 e^x 在非负实数上总是不低于其泰勒多项式的前任意有限项和。**

使用条件

- **条件 1（自变量非负）：** $x \geq 0$，这是不等式成立的前提。
- **条件 2（多项式阶数正整数）：** n 为正整数，表示泰勒多项式的项数。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **易错点（负数域无效）**：切记 $x < 0$ 时不成立，避免误用。
- **检查项（取等唯一）**：等号仅在 $x = 0$ 时成立，用于最值问题需验证取等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.35 ln(1+x) 在 x≥0 时的二阶不等式估计

二级结论

条件

条件 1（非负变量）：

$x \geq 0$。

结论

结论一（稳健双边）：

直观描述： 对数函数被两个有理函数上下夹逼。

$$\frac{2x}{x+2} \leq \ln(1+x) \leq \frac{x(x+2)}{2(x+1)}.$$

结论二（标准下界）：

直观描述： 对数函数大于等于一次项减二次修正项。

$$\ln(1+x) \geq x - \frac{x^2}{2(1+x)}.$$

推广结论（三阶上界）：

直观描述： 更高精度的三次多项式上界。

$$\ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}.$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x = 0$ 时，所有不等式中的等号成立。

理解说明

一句话直觉

当 x 非负时，复杂的对数 $\ln(1+x)$ 可以用简单的分式或多项式控制，便于放缩和估计。

核心拆解

要点一（形式稳健）：

双边估计的上下界都是有理分式，结构对称且精度适中，适合直接套用。

要点二（精度可调）：

标准下界分母含 $(1+x)$，比常见的 $x - \frac{x^2}{2}$ 更紧；三阶上界则提供更高精度。

几何本质（曲线包夹）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

在 $x \geq 0$ 区间上，曲线 $y = \ln(1+x)$ 被 $y = \frac{2x}{x+2}$（下）和 $y = \frac{x(x+2)}{2(x+1)}$（上）夹在中间，且三条曲线在原点相切。

代数意义（分式控制）

将超越函数 $\ln(1+x)$ 用代数函数（分式或多项式）进行上下逼近，从而将复杂的对数运算转化为简单的代数运算，便于不等式证明。

考点价值（放缩证明）

- **考法一（直接套用）**：在证明题中直接使用这些不等式进行放缩，简化证明过程。
- **考法二（数值估计）**：用于估计对数式的近似值或比较两个含对数式的大小。

顿悟点

遇到 $\ln(1+x)$（$x \geq 0$）需要放缩时，根据题目对精度的要求，从这三个不等式中挑选最合适的一个。

使用场景

- **场景一（导数大题）**：在导数综合题中，用这些不等式替换 $\ln(1+x)$，将超越问题转化为代数问题。
- **场景二（比较大小）**：比较 $\ln(1+x)$ 与某个多项式或分式的大小时，可利用对应的界直接判断。

证明

思路提示

通过构造函数并求导，利用单调性证明不等式。核心是验证差值函数在 $x \geq 0$ 上的符号。

正式推导

步骤一（证下界 $\frac{2x}{x+2} \leq \ln(1+x)$）：

令 $f(x) = \ln(1+x) - \frac{2x}{x+2}$，则 $f(0) = 0$。

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{4}{(x+2)^2} = \frac{(x+2)^2 - 4(1+x)}{(1+x)(x+2)^2} = \frac{x^2}{(1+x)(x+2)^2} \geq 0.$$

理由：导数分子 $x^2 \geq 0$，分母为正，故 $f'(x) \geq 0$，$f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递增。结合 $f(0) = 0$，得 $f(x) \geq 0$，即原下界成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（证上界 $\ln(1+x) \le \frac{x(x+2)}{2(x+1)}$）：

令 $g(x) = \frac{x(x+2)}{2(x+1)} - \ln(1+x)$，则 $g(0) = 0$。

$$g'(x) = \frac{(2x+2)(x+1) - x(x+2)}{2(x+1)^2} - \frac{1}{1+x} = \frac{x^2}{2(x+1)^2} \ge 0.$$

理由：计算通分后导数分子为 $x^2 \ge 0$，分母为正，故 $g'(x) \ge 0$，$g(x)$ 单调递增。结合 $g(0) = 0$，得 $g(x) \ge 0$，即原上界成立。

步骤三（证标准下界 $\ln(1+x) \ge x - \frac{x^2}{2(1+x)}$）：

令 $h(x) = \ln(1+x) - \left[x - \frac{x^2}{2(1+x)}\right]$，则 $h(0) = 0$。

$$h'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + \frac{x(2+x)}{2(1+x)^2} = \frac{x^2}{2(1+x)^2} \ge 0.$$

理由：导数分子 $x^2 \ge 0$，分母为正，故 $h'(x) \ge 0$，$h(x)$ 单调递增。结合 $h(0) = 0$，得 $h(x) \ge 0$，即标准下界成立。

结论回扣

以上三步证明了在 $x \ge 0$ 时，三个不等式均成立，且每一步的导数非负保证了函数单调不减，结合零点 $x = 0$ 处的函数值，即得不等式成立，等号均在 $x = 0$ 时取得。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x \ge 0$，求证：$\ln(1+x) \ge x - \frac{x^2}{2}$。

解题步骤：

第一步（选用更强下界）：

由结论二（标准下界）知，$\ln(1+x) \ge x - \frac{x^2}{2(1+x)}$。

理由：直接应用已证明的不等式。

第二步（比较两个下界）：

需证 $x - \frac{x^2}{2(1+x)} \ge x - \frac{x^2}{2}$。

理由：若能证明此式，则结合第一步可得 $\ln(1+x) \ge x - \frac{x^2}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（简化比较）：

比较两式，即证 $-\frac{x^2}{2(1+x)} \geq -\frac{x^2}{2}$。

$$\text{由于} x \geq 0, \quad \frac{1}{2(1+x)} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{x^2}{2(1+x)} \geq -\frac{x^2}{2}.$$

理由：分母 $1+x \geq 1$，故倒数减小，乘以 $-x^2$ 后不等号反转。

关键结论： **因此，$\ln(1+x) \geq x - \frac{x^2}{2(1+x)} \geq x - \frac{x^2}{2}$，原不等式得证。**

例 2（稍变形）

题目： 已知 $x > 0$，求证：$\frac{2}{x+2} < \frac{\ln(1+x)}{x} < \frac{x+2}{2(x+1)}$。

解题步骤：

第一步（分离对数）：

由结论一（稳健双边）知 $\frac{2x}{x+2} \leq \ln(1+x) \leq \frac{x(x+2)}{2(x+1)}$。

理由：直接应用双边估计。

第二步（同除正数 x）：

由于 $x > 0$，不等式两边同时除以 x，得

$$\frac{2}{x+2} \leq \frac{\ln(1+x)}{x} \leq \frac{x+2}{2(x+1)}.$$

理由：除以正数不等号方向不变。

第三步（严格不等号）：

等号成立条件为 $x = 0$，而题目中 $x > 0$，故等号不成立。

理由：取等条件不满足，因此不等式严格成立。

关键结论： **所以，当 $x > 0$ 时，有严格不等式 $\frac{2}{x+2} < \frac{\ln(1+x)}{x} < \frac{x+2}{2(x+1)}$ 成立。**

易错提醒

易错点一（忽略取等）

误以为不等式在任何 x 处等号都可能成立。

正确理解（唯一零点）：

等号仅在 $x = 0$ 时成立，$x > 0$ 时均为严格不等式。

错因分析（条件遗漏）：

未注意导数零点唯一性及函数单调性，导致等号范围扩大。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（范围滥用）

将不等式随意用于 $x < 0$ 的情况。

正确理解（非负定义域）：

所有不等式的前提是 $x \geq 0$，$x < 0$ 时结论可能不成立。

错因分析（前提忽视）：

未审清题目中变量的范围，盲目套用公式。

易错点三（精度混淆）

记忆混乱，放缩时选错上界或下界，导致方向错误或精度不足。

正确理解（按需选取）：

根据题目要求（需上界还是下界、精度高低）选择合适的不等式。

错因分析（概念模糊）：

未理解各不等式的特点及相互强弱关系。

结论小结

一句话核心

当 $x \geq 0$ 时，$\ln(1+x)$ 可用一组有理分式上下控制，并有更紧的下界和可选的高阶上界。

使用条件

- **条件 1（变量非负）：** 自变量 x 必须满足 $x \geq 0$。
- **条件 2（对数形式）：** 函数为 $\ln(1+x)$，而不是 $\ln x$ 或其他形式。

关键提醒

- **易错点（等号唯一）：** 等号仅在 $x = 0$ 时成立，使用时需注意是否需严格不等式。
- **检查项（范围优先）：** 使用前务必先确认 x 的范围是否满足 $x \geq 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.36 ln(1+x) 的经典不等式链

二级结论

条件

条件 1（定义域）：

实数 x 满足 $x > -1$。

结论

结论一（不等式链）：

直观描述： 对数函数被一次函数和分式函数夹逼。

$$\frac{x}{1+x} \le \ln(1+x) \le x$$

推广结论（等价变形）：

直观描述： 换元后对数函数与反比例函数的不等式。

$$\ln t \ge 1 - \frac{1}{t}, \quad t > 0.$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x = 0$（即 $t = 1$）时，所有等号成立。

理解说明

一句话直觉 对数函数 $\ln(1+x)$ 在 $x = 0$ 附近被一次函数和分式函数从上下两面夹逼。

核心拆解

要点一（下界分式）：

下界 $\frac{x}{1+x}$ 是反比例型函数，当 $x > 0$ 时小于 x，当 $-1 < x < 0$ 时大于 x。

要点二（上界线性）：

上界 x 是线性函数，在 $x = 0$ 处与 $\ln(1+x)$ 相切。

几何本质（图像夹逼） 函数 $y = \ln(1+x)$ 的图像在 $x = 0$ 处与直线 $y = x$ 相切，且始终位于曲线 $y = \frac{x}{1+x}$ 的上方（当 $x > -1$ 时）。

代数意义（泰勒近似） 从泰勒展开看，$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$，因此当 x 较小时，$\ln(1+x)$ 略小于 x，但大于 $\frac{x}{1+x} = x - x^2 + x^3 - \cdots$（当 $|x| < 1$）。

考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接放缩）：** 在证明题中直接使用该不等式链进行放缩。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（换元应用）**：通过换元 $t = 1 + x$ 将问题转化为对数函数与分式函数的不等式。

顿悟点 当 x 很小时，$\ln(1+x) \approx x$，但严格小于 x；当 x 较大时，不等式仍成立，但差距变大。

使用场景

- **场景一（证明不等式）**：需要估计 $\ln(1+x)$ 时，可用此不等式链进行夹逼。
- **场景二（求极限）**：在极限计算中，利用此不等式结合夹逼定理。

证明

思路提示 通过构造辅助函数，利用导数研究函数单调性，从而证明不等式。

正式推导

步骤一（构造函数上界）：

定义 $f(x) = x - \ln(1+x)$，其中 $x > -1$。

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x}.$$

理由：求导后分析符号：当 $x > 0$ 时 $f'(x) > 0$，$f(x)$ 单调增；当 $-1 < x < 0$ 时 $f'(x) < 0$，$f(x)$ 单调减。

步骤二（判断极值点）：

在 $x = 0$ 处 $f'(x) = 0$，且 $f(0) = 0$。

$$f(0) = 0 - \ln(1) = 0.$$

理由：由于 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极小值，且为唯一驻点，故 $f(x) \geq f(0) = 0$，即 $x \geq \ln(1+x)$。

步骤三（构造函数下界）：

定义 $g(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$，其中 $x > -1$。

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} = \frac{x}{(1+x)^2}.$$

理由：求导后分析符号：当 $x > 0$ 时 $g'(x) > 0$，$g(x)$ 单调增；当 $-1 < x < 0$ 时 $g'(x) < 0$，$g(x)$ 单调减。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（判断极值点）：

在 $x=0$ 处 $g'(x)=0$，且 $g(0)=0$。

$$g(0)=\ln(1)-0=0.$$

理由： 类似地，$g(x)\geq g(0)=0$，即 $\ln(1+x)\geq \frac{x}{1+x}$。

结论回扣 综合步骤二和步骤四，得到 $\frac{x}{1+x}\leq \ln(1+x)\leq x$，且等号成立当且仅当 $x=0$。换元 $t=1+x$ 即得等价形式 $\ln t\geq 1-\frac{1}{t}$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设实数 x 满足 $x>-1$，证明 $\ln(1+x)\leq x$。

解题步骤：

第一步（构造函数）：

令 $f(x)=x-\ln(1+x)$，定义域为 $x>-1$。

理由： 将不等式转化为函数值非负的问题。

第二步（求导分析）：

计算导数 $f'(x)=1-\frac{1}{1+x}=\frac{x}{1+x}$。

理由： 通过导数判断函数单调性。

第三步（单调性判断）：

当 $x>0$ 时 $f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增；当 $-1<x<0$ 时 $f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减。

理由： 导数符号决定增减性。

第四步（极值点）：

在 $x=0$ 处 $f'(x)=0$，且 $f(0)=0$，因此 $f(x)\geq f(0)=0$。

理由： $x=0$ 是极小值点，也是最小值点。

第五步（得出结论）：

由 $f(x)\geq 0$ 得 $x\geq \ln(1+x)$，即 $\ln(1+x)\leq x$。

理由： 函数最小值非负，故不等式成立。

关键结论： **对于 $x>-1$，总有 $\ln(1+x)\leq x$，等号当且仅当 $x=0$ 时成立。**

例 2（稍变形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 设实数 $t > 0$，证明 $\ln t \geq 1 - \frac{1}{t}$。

解题步骤：

第一步（变量替换）：

令 $x = t - 1$，则 $t = 1 + x$，且由 $t > 0$ 得 $x > -1$。

理由： 将问题转化为已知不等式链的形式。

第二步（代入原式）：

根据原不等式链，有 $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$。

理由： 直接应用结论。

第三步（取下界部分）：

取左半部分 $\ln(1+x) \geq \frac{x}{1+x}$。

理由： 我们需要证明 $\ln t \geq 1 - \frac{1}{t}$，对应左半部分。

第四步（换回变量）：

将 $x = t - 1$ 代入 $\ln(1+x) \geq \frac{x}{1+x}$，得 $\ln t \geq \frac{t-1}{t} = 1 - \frac{1}{t}$。

理由： 简化表达式即得所求。

关键结论： **对于 $t > 0$，总有 $\ln t \geq 1 - \frac{1}{t}$，等号当且仅当 $t = 1$（即 $x = 0$）时成立。**

易错提醒

易错点一（定义域忽略）

在使用不等式时，忽视 $x > -1$ 的条件，导致在 $x \leq -1$ 时无意义。

正确理解（定义域限制）：

不等式链仅当 $x > -1$ 时成立，因为 $\ln(1+x)$ 的定义域要求 $1 + x > 0$。

错因分析（概念不清）：

对对数函数定义域记忆不牢，或未检查前提条件直接套用公式。

易错点二（等号滥用）

认为不等式链中等号对所有 x 都成立，或错误判断取等条件。

正确理解（唯一取等）：

等号成立当且仅当 $x = 0$（即 $t = 1$），其他情况下均为严格不等式。

错因分析（细节疏忽）：

未仔细分析辅助函数的极值点，或误以为函数恒为常数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（放缩方向混淆）

在应用不等式进行放缩时，混淆上下界，导致方向错误。

正确理解（上下界区分）：

记住 $\frac{x}{1+x}$ 是下界，x 是上界；即 $\frac{x}{1+x} \le \ln(1+x) \le x$。

错因分析（记忆混乱）：

未形成直观图像记忆，或对不等式链结构理解不深。

结论小结

一句话核心 **对于 $x > -1$，$\ln(1+x)$ 满足 $\frac{x}{1+x} \le \ln(1+x) \le x$，等号仅当 $x = 0$ 时成立。**

使用条件

- **条件 1（定义域要求）**：变量必须满足 $x > -1$（或 $t > 0$）。
- **条件 2（应用场景）**：需要在证明不等式、求极限或进行对数估计时使用。

关键提醒

- **易错点（等号唯一）**：等号仅在 $x = 0$ 时成立，其他情况为严格不等式。
- **检查项（放缩方向）**：应用时务必确认是使用上界还是下界，避免方向错误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.37 sinx 在 [0,π/2] 上的线性下界：sinx≥(2/π)x

二级结论

条件

条件 1（定义域范围）：

自变量 x 的取值范围为 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$。

结论

结论一（线性下界）：

直观描述： $\sin x$ 在该区间上不小于一条连接端点的直线。

$$\sin x \geq \frac{2}{\pi}x, \quad x \in \left[0, \tfrac{\pi}{2}\right]$$

推广结论（上下界夹挤）：

直观描述： 结合 $\sin x \leq x$，可得到 $\sin x$ 的上下界估计。

$$\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x, \quad x \in \left[0, \tfrac{\pi}{2}\right]$$

等号/取等条件： 当 $x = 0$ 或 $x = \frac{\pi}{2}$ 时，不等式 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ 取等号。

理解说明

一句话直觉 在区间 $[0, \pi/2]$ 上，正弦函数 $y = \sin x$ 的图像位于连接原点与点 $(\pi/2, 1)$ 的直线之上。

核心拆解

要点一（区间限制）：

结论仅对 $x \in [0, \pi/2]$ 成立，超出此范围不保证成立。

要点二（线性控制）：

用一次函数 $\frac{2}{\pi}x$ 控制 $\sin x$ 的下界，形式简单。

几何本质（弦在弧下） 连接函数图像两个端点的直线称为弦。由于 $y = \sin x$ 在 $[0, \pi/2]$ 上是凸函数（上凸），其图像（弧）位于弦的上方，这就是不等式 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ 的几何解释。

代数意义（凸性估计） 从代数角度看，这反映了函数 $f(x) = \sin x$ 在区间 $[0, \pi/2]$ 上的凸性。对于凸函数，函数值不小于连接区间端点 $(a, f(a))$ 和 $(b, f(b))$ 的弦对应的值，即 $f(x) \geq \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$。此处 $a = 0, b = \pi/2$，代入即得结论。

考点价值（放缩工具）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（比较大小）**：用于快速比较 $\sin x$ 与关于 x 的线性表达式的大小关系。
- **考法二（证明不等式）**：作为放缩链条中的一环，用于证明更复杂的不等式，尤其是在含有 $\sin x$ 和多项式混合的式子中。

顿悟点 **此结论提供了一种将超越函数 $\sin x$ 用简单的一次函数进行下方估计的方法，是“以直代曲”思想的不等式体现。**

使用场景

- **场景一（直接放缩）**：当题目条件或待证不等式中出现 $\sin x$ 与 $\frac{2}{\pi}x$ 或类似线性形式的比较时。
- **场景二（联合其他放缩）**：与 $\sin x \le x$、$\cos x \ge 1 - \frac{x^2}{2}$ 等结论结合，对 $\sin x$、$\cos x$ 进行上下界的精确夹逼。

证明

思路提示 考虑构造函数 $f(x) = \sin x - \frac{2}{\pi}x$，通过研究其在区间 $[0, \pi/2]$ 上的单调性来证明 $f(x) \ge 0$。这是处理函数不等式的通用方法。

正式推导

步骤一（构造函数）：

设辅助函数 $f(x) = \sin x - \frac{2}{\pi}x$，其中 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$。

$$f(x) = \sin x - \frac{2}{\pi}x$$

理由： 要证 $\sin x \ge \frac{2}{\pi}x$，等价于证明 $f(x) = \sin x - \frac{2}{\pi}x \ge 0$。

步骤二（求导判单调）：

对 $f(x)$ 求导，并分析导函数符号。

$$f'(x) = \cos x - \frac{2}{\pi}$$

理由： 导数 $f'(x)$ 的正负决定了 $f(x)$ 的单调性。由于 $\cos x$ 在 $[0, \pi/2]$ 上单调递减，$f'(x)$ 也单调递减。

步骤三（寻找驻点）：

令 $f'(x_0) = 0$，解得唯一驻点 $x_0 = \arccos \frac{2}{\pi}$，且 $0 < x_0 < \frac{\pi}{2}$。

$$f'(x) = 0$$
$$\cos x_0 = \frac{2}{\pi}$$
$$x_0 = \arccos \frac{2}{\pi}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：解方程找到导数为零的点，这是函数单调性可能发生改变的位置。

步骤四（分析单调区间）：

判断 $f(x)$ 在 $[0, x_0]$ 和 $[x_0, \pi/2]$ 上的单调性。

理由：当 $x \in [0, x_0)$ 时，$\cos x > \cos x_0 = \frac{2}{\pi}$，故 $f'(x) > 0$，$f(x)$ 单调递增。

当 $x \in (x_0, \pi/2]$ 时，$\cos x < \cos x_0 = \frac{2}{\pi}$，故 $f'(x) < 0$，$f(x)$ 单调递减。

步骤五（比较端点值）：

计算 $f(x)$ 在区间端点 $x = 0$ 和 $x = \pi/2$ 处的值。

$$f(0) = \sin 0 - \frac{2}{\pi} \cdot 0 = 0$$
$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin\frac{\pi}{2} - \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 1 - 1 = 0$$

理由：$f(x)$ 在区间两端点的函数值均为 0。

步骤六（得出结论）：

综合以上单调性，$f(x)$ 在 $[0, \pi/2]$ 上先增后减，且在两端点取最小值 0。

$$\text{故对任意} x \in [0, \tfrac{\pi}{2}],\ f(x) \geq 0.$$
$$\text{即 } \sin x - \frac{2}{\pi}x \geq 0.$$

理由：函数的最小值在端点取得，因此在整个区间上 $f(x) \geq 0$。等号成立当且仅当 $x = 0$ 或 $x = \pi/2$。

结论回扣 **因此，原命题 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ $(x \in [0, \frac{\pi}{2}])$ 得证，且等号成立的条件已验证。**

典型例题

例 1（基础）

题目：比较 $\sin 1$ 与 $\frac{2}{\pi}$ 的大小。

解题步骤：

第一步（确认范围）：

判断数值 1 是否在结论适用区间内。

理由：结论要求 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$。因为 $0 < 1 < \frac{\pi}{2} \approx 1.57$，所以 $x = 1$ 在区间内。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（直接应用）：

将 $x=1$ 代入结论不等式。

$$\sin 1 \geq \frac{2}{\pi} \times 1 = \frac{2}{\pi}$$

理由： 根据命题 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$，令 $x=1$ 即得。

第三步（判断大小）：

由不等式直接得到比较结果。

理由： 不等式 $\sin 1 \geq \frac{2}{\pi}$ 已经表明 $\sin 1$ 不小于 $\frac{2}{\pi}$。由于 1 不是区间端点，等号不成立，故严格大于。

关键结论： $\sin 1 > \frac{2}{\pi}$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$，求证：$\frac{\sin\alpha}{\alpha} > \frac{2}{\pi}$。

解题步骤：

第一步（分离目标）：

将待证不等式两边同乘以正数 α，进行变形。

$$\frac{\sin\alpha}{\alpha} > \frac{2}{\pi} \quad \Leftrightarrow \quad \sin\alpha > \frac{2}{\pi}\alpha$$

理由： 因为 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$，所以 $\alpha > 0$，不等号方向不变。

第二步（匹配结论）：

观察变形后的不等式，与已知结论形式一致。

理由： 变形后即需证 $\sin\alpha > \frac{2}{\pi}\alpha$，其中 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$。

第三步（应用结论）：

直接应用已知命题，并说明等号不成立。

理由： 由命题知，当 $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时，有 $\sin\alpha \geq \frac{2}{\pi}\alpha$。

由于 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$，不是区间端点 0 或 $\frac{\pi}{2}$，因此等号不成立，故有严格不等式 $\sin\alpha > \frac{2}{\pi}\alpha$ 成立。

关键结论： **因此，原不等式 $\frac{\sin\alpha}{\alpha} > \frac{2}{\pi}$ 得证。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略区间）

误以为不等式 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ 对所有 $x \geq 0$ 都成立。

正确理解（区间限定）：

结论严格限定在 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$。例如，当 $x = \pi$ 时，$\sin \pi = 0$，而 $\frac{2}{\pi} \cdot \pi = 2$，不等式反向。

错因分析（记忆不全）：

只记住了结论的形式，忽略了结论成立的前提条件（定义域）。

易错点二（等号条件错记）

误以为等号在区间内某点（如 $x = \frac{\pi}{4}$）成立。

正确理解（端点取等）：

等号仅当 $x = 0$ 或 $x = \frac{\pi}{2}$ 时成立。在区间内部 $(0, \frac{\pi}{2})$，是严格大于号。

错因分析（几何直观偏差）：

错误地将“弦在弧下”理解为在某点相切，实际上弦仅在端点与弧相交。

易错点三（逆用错误）

看到形如 $A \geq \frac{2}{\pi}B$ 的不等式，就直接认为 $A = \sin(B)$，并试图利用正弦函数性质。

正确理解（结构对应）：

结论是 $\sin(\text{角}) \geq \frac{2}{\pi} \times (\text{同一个角})$。只有当不等式两边结构严格对应“正弦 vs 线性倍”时才能直接应用，不能随意匹配变量。

错因分析（形式套用）：

对结论的本质是“函数值”与“自变量线性函数”的比较关系理解不深，只机械记忆外形。

结论小结

一句话核心 **在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上，$\sin x$ 图像总在连接 $(0,0)$ 和 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的直线之上。**

使用条件

- **条件 1（角范围）：** 自变量 x（或对应角）必须满足 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 2（结构匹配）**：待处理的不等式或比较式需能化为 $\sin(\text{角}) \geq k \times (\text{同一个角})$ 的形式，且 $k = \frac{2}{\pi}$。

关键提醒

- **易错点（区间遗忘）**：使用前务必先检查角的范围，这是结论的生命线。
- **检查项（等号成立）**：等号只在区间两端点成立，内部为严格大于。证明题中若需严格不等式，必须说明角不在端点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.38 对称分式不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数条件）：

$a, b > 0$，且 $n \in \mathbb{N}^*$（n 为正整数）。

结论

结论一（对称分式不等式）：

直观描述： 两个正实数的幂次分式之和不小于它们本身的和。

$$\frac{a^n}{b^{n-1}} + \frac{b^n}{a^{n-1}} \geqslant a + b$$

推广结论（n=2 特例）：

直观描述： 当指数为 2 时，不等式简化为常见形式。

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a} \geqslant a + b$$

等号/取等条件： 当且仅当 $a = b$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉 对称调整两个正实数的幂次分式，其和总不小于原变量之和。

核心拆解

要点一（对称性）：

不等式左右两边变量 a 和 b 对称交换，形式不变。

要点二（幂次关联）：

分子指数为 n，分母指数为 $n-1$，保持齐次性。

几何本质（齐次性） 该不等式没有直接几何图形对应，但体现齐次性：左右两边次数相同（均为 n 次），在尺度变换下不变。

代数意义（均值不等式应用） 通过均值不等式（如 AM-GM）或柯西不等式，将分式之和转化为乘积形式，再化简比较。

考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接套用）：** 题目中直接出现类似结构时，可快速应用。
- **考法二（变形验证）：** 需通过代数变形验证不等式成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点 当看到对称分式且指数差 1 时，应联想到此不等式，并在变量相等时取等。

使用场景

- **场景一（最值问题）**：求分式表达式的最小值或最大值。
- **场景二（不等式证明）**：在复杂不等式中作为中间步骤。

证明

思路提示 利用均值不等式（AM-GM），通过添加辅助项构造出所需的不等式形式。

正式推导

步骤一（应用 AM-GM）：

对第一项 $\frac{a^n}{b^{n-1}}$ 应用 AM-GM 不等式。

$$\frac{a^n}{b^{n-1}} + (n-1)b \geq n\sqrt[n]{\frac{a^n}{b^{n-1}} \cdot b^{n-1}} = na$$

理由：AM-GM 不等式要求非负实数，这里 $a, b > 0$，且等号成立当 $\frac{a^n}{b^{n-1}} = b$。

步骤二（对称应用）：

对第二项 $\frac{b^n}{a^{n-1}}$ 类似应用 AM-GM。

$$\frac{b^n}{a^{n-1}} + (n-1)a \geq n\sqrt[n]{\frac{b^n}{a^{n-1}} \cdot a^{n-1}} = nb$$

理由：对称性使得同理可得，等号成立当 $\frac{b^n}{a^{n-1}} = a$。

步骤三（相加化简）：

将两个不等式相加并整理。

$$\left(\frac{a^n}{b^{n-1}} + \frac{b^n}{a^{n-1}}\right) + (n-1)(a+b) \geq n(a+b)$$

理由：不等式两边分别相加，保持不等号方向。

步骤四（移项得证）：

移项得到目标不等式。

$$\frac{a^n}{b^{n-1}} + \frac{b^n}{a^{n-1}} \geq a + b$$

理由：将 $(n-1)(a+b)$ 移到右边，即 $n(a+b) - (n-1)(a+b) = a + b$。

结论回扣 **因此，原不等式成立，且等号当且仅当 $a = b$ 时取得，因为步骤一和步骤二等号条件同时满足需 $a = b$。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $a, b > 0$，证明 $\dfrac{a^2}{b} + \dfrac{b^2}{a} \geqslant a + b$。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

观察不等式形式，与定理中 $n = 2$ 的特例一致。

理由： 定理推广结论给出当 $n = 2$ 时，有 $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a} \geqslant a + b$。

第二步（直接应用）：

由定理，直接得出结论。

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a} \geqslant a + b$$

理由： 定理条件满足（$a, b > 0$，$n = 2 \in \mathbb{N}^*$），故不等式成立。

第三步（取等条件）：

指出等号成立条件。

理由： 根据定理，等号当且仅当 $a = b$ 时成立。

关键结论： **对于任意正实数 a, b，有 $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a} \geqslant a + b$，当且仅当 $a = b$ 时取等。**

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a, b > 0$，且 $a + b = 5$，求 $\dfrac{a^3}{b^2} + \dfrac{b^3}{a^2}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（应用定理）：

使用定理中 $n = 3$ 的情形。

$$\frac{a^3}{b^2} + \frac{b^3}{a^2} \geqslant a + b$$

理由： 由定理，当 $n = 3$ 时，不等式 $\frac{a^n}{b^{n-1}} + \frac{b^n}{a^{n-1}} \geqslant a + b$ 成立。

第二步（代入条件）：

将 $a + b = 5$ 代入不等式右边。

$$\frac{a^3}{b^2} + \frac{b^3}{a^2} \geqslant 5$$

理由： 已知 $a + b = 5$，所以右边为 5。

第三步（确定最值）：

得出最小值并检查取等条件。

理由： 等号当 $a = b$ 时成立，结合 $a + b = 5$，得 $a = b = 2.5$，此时 $\frac{a^3}{b^2} + \frac{b^3}{a^2} = 5$，所以最小值为 5。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 在 $a, b > 0$ 且 $a + b = 5$ 的条件下，$\frac{a^3}{b^2} + \frac{b^3}{a^2}$ 的最小值为 5，当 $a = b = 2.5$ 时取得。

易错提醒

易错点一（忽视正数条件）

错误地认为 a, b 可以为任意实数，忽略 $a, b > 0$ 的前提。

正确理解（严格正数）：

定理仅对正实数 a, b 成立，因为分母和指数运算需要正数保证。

错因分析（条件遗漏）：

在应用时未检查变量是否为正，导致不等式可能不成立或证明错误。

易错点二（指数混淆）

将指数 n 和 $n-1$ 记错，错误写成 $\frac{a^n}{b^n}$ 等形式。

正确理解（指数关系）：

分子指数为 n，分母指数为 $n-1$，保持齐次性；推广时需对应正确。

错因分析（记忆偏差）：

对定理结构不熟悉，混淆分子和分母的指数，导致应用错误。

易错点三（取等忽略）

在求解最值问题时，只得到不等式，未验证等号是否能取得。

正确理解（等号验证）：

应用不等式求最值时，必须检查等号成立条件是否满足题目约束。

错因分析（完整性缺失）：

忽略取等条件，可能使得求得的值不是实际最值，或解不完整。

结论小结

一句话核心 对称分式不等式：正实数幂次分式之和总不小于变量之和。

使用条件

- **条件 1（正实数）：** 变量 a, b 必须为正实数。
- **条件 2（正整数指数）：** 指数 n 为正整数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（指数对齐）**：确保分子指数为 n，分母指数为 $n-1$，不要混淆。
- **检查项（取等条件）**：应用时务必验证等号 $a=b$ 是否在题设下可达。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.39 倒数和不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

所有 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 均为正实数。

结论

结论一（倒数和积不等式）：

直观描述： 和与倒数和之积不小于 n 的平方。

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}\right) \geq n^2.$$

推广结论（三元特例）：

直观描述： 三元时乘积不小于 9。

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right) \geq 9.$$

等号/取等条件： 当且仅当所有 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 时等号成立；对于三元特例，当且仅当 $a = b = c$。

理解说明

一句话直觉 当所有正实数相等时，它们的和与倒数和之积取到最小值 n^2；任何不等的情况都会使乘积变大。

核心拆解

要点一（正实数前提）：

所有数必须为正，否则倒数无意义或不等式方向可能改变。

要点二（均值不等式）：

通过均值不等式（如 AM-GM）可直接推导，本质是 n 个正数乘积与和的关联。

几何本质（算术调和平均） 从平均值角度看，不等式等价于算术平均不小于调和平均，即 $\frac{\sum a_i}{n} \geq \frac{n}{\sum \frac{1}{a_i}}$，等号成立时所有数相等。

代数意义（通分均值证） 代数上，将乘积展开为 n 加上所有交叉项 $\frac{a_i}{a_j}$，利用均值不等式可知每个交叉项不小于 2（当 $i = j$ 时为 1），从而总和不小于 n^2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接套用）**：在题目中直接出现和与倒数和的形式时，可直接写出不等式求下界。
- **考法二（变形应用）**：通过代换或组合，将其他不等式转化为此形式，用于证明或求最值。

顿悟点 **只要看到正实数的和与倒数和同时出现，就可以尝试应用此不等式，其最小值为 n^2。**

使用场景

- **场景一（证明不等式）**：用于证明涉及和与倒数和的不等式，简化推导。
- **场景二（求最小值）**：当问题要求乘积 $(\sum a_i)(\sum \frac{1}{a_i})$ 的最小值时，直接得 n^2。

证明

思路提示 利用均值不等式，将乘积展开为交叉项之和，然后配对给出下界。

正式推导

步骤一（乘积展开）：

将乘积展开为双重求和：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{a_i}{a_j}.$$

理由：根据分配律，每个 a_i 与每个 $1/a_j$ 相乘得到 a_i/a_j。

步骤二（项分类）：

将求和分为对角项 $(i=j)$ 与交叉项 $(i \neq j)$：

$$= \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_i} + \sum_{i\neq j} \frac{a_i}{a_j} = n + \sum_{i\neq j} \frac{a_i}{a_j}.$$

理由：当 $i=j$ 时，$a_i/a_i = 1$，共有 n 项；其余 $n^2 - n$ 项为交叉项。

步骤三（交叉项下界）：

对任意 $i \neq j$，由均值不等式：

$$\frac{a_i}{a_j} + \frac{a_j}{a_i} \geq 2\sqrt{\frac{a_i}{a_j} \cdot \frac{a_j}{a_i}} = 2.$$

理由：对于正实数 x 和 y，有 $x + y \geq 2\sqrt{xy}$，这里取 $x = a_i/a_j, y = a_j/a_i$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（总和估计）：

将交叉项配对求和，每对 (i,j) 和 (j,i) 一起考虑：

$$\sum_{i\neq j}\frac{a_i}{a_j}=\sum_{i<j}\left(\frac{a_i}{a_j}+\frac{a_j}{a_i}\right)\geq\sum_{i<j}2=2\cdot\frac{n(n-1)}{2}=n(n-1).$$

理由： 共有 $\binom{n}{2}$ 对不同的 (i,j) 满足 $i<j$，每对的下界为 2。

步骤五（合并得结论）：

代入步骤二的结果：

$$n+n(n-1)=n^2.$$

因此原不等式成立。

理由： 对角项之和为 n，交叉项之和不小于 $n(n-1)$，总和不小于 n^2。

结论回扣 **综上，对任意 n 个正实数，有 $(\sum a_i)(\sum 1/a_i)\geq n^2$，等号成立当且仅当所有 a_i 相等。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 a,b,c 为正实数，证明 $(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\geq 9$。

解题步骤：

第一步（确认条件）：

首先确认 a,b,c 均为正实数。

理由： 不等式成立的前提是所有数均为正实数。

第二步（应用不等式）：

直接应用倒数和乘积不等式（三元特例）：

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\geq 3^2=9.$$

理由： 对于 $n=3$ 个正实数，和与倒数和之积不小于 $3^2=9$。

第三步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $a=b=c$。

理由： 原不等式等号成立条件是所有数相等。

关键结论： **因此不等式成立，最小值为 9，在 $a=b=c$ 时取得。**

例 2（稍变形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 设 x, y 为正实数，求 $(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（确认条件）：

确认 x, y 为正实数。

理由： 确保不等式适用。

第二步（应用不等式）：

应用倒数和乘积不等式（$n=2$ 情形）：

$$(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right) \geq 2^2 = 4.$$

理由： 对于两个正实数，和与倒数和之积不小于 $2^2=4$。

第三步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $x=y$。

理由： 当且仅当两数相等时不等式等号成立。

关键结论： **最小值为 4，在 $x=y$ 时取得。**

易错提醒

易错点一（忽略正实数）

在使用不等式时，未检查所有数是否为正实数，直接应用。

正确理解（正实数前提）：

不等式仅对正实数成立；若出现非正数，结论可能错误。

错因分析（条件缺失）：

负数的倒数会改变符号，零无倒数，导致不等式无效。

易错点二（误记取等）

认为只要部分数相等，等号就能成立，例如以为 $a=b$ 而 c 不同时也可取等。

正确理解（全等取等）：

等号成立当且仅当所有 n 个数都相等，缺一不可。

错因分析（交叉项要求）：

每个交叉项 $\frac{a_i}{a_j} \geq 1$ 等号需同时成立，这要求所有 a_i 相同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（错误推广）

将不等式盲目推广为 $(\sum a_i)(\sum b_i) \geq n^2$，其中 b_i 不是 $1/a_i$。

正确理解（倒数配对）：

不等式仅适用于和与倒数和之积，即第二个和必须是第一个和的倒数序列。

错因分析（结构误解）：

不等式的证明依赖于 a_i 与 $1/a_i$ 的乘积为常数，随意替换会破坏该结构。

结论小结

一句话核心 **正实数的和与倒数和之积有下界 n^2，等号仅当所有数相等时取得。**

使用条件

- **条件 1（正实数）：** 所有涉及的数必须为正实数。
- **条件 2（倒数形式）：** 第二个和必须是第一个和中每个数的倒数之和。

关键提醒

- **易错点（忽略正负）：** 忘记检查正实数条件，导致不等式方向错误。
- **检查项（全等取等）：** 等号成立要求所有数相等，应用后务必验证取等可能性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.40 三元权方和不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

a, b, c 为正实数。

结论

结论一（三元权方和）：

直观描述： 平方项除以两数和的下界为半和。

$$\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geq\frac{a+b+c}{2}$$

推广结论（n 元形式）：

直观描述： 各项平方除以其余项和的下界为总和除以 $n-1$。

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i^2}{\sum_{j\neq i}a_j}\geq\frac{\sum_{i=1}^{n}a_i}{n-1},\quad a_i>0$$

等号/取等条件： 当且仅当 $a=b=c$ 时等号成立（对于推广，当且仅当所有 a_i 相等）。

理解说明

一句话直觉

将平方项分配到分母为两数和的项上，其和至少为所有变量和的一半。

核心拆解

要点一（柯西-施瓦茨应用）：

使用柯西-施瓦茨不等式将分子平方与分母和关联。

要点二（对称性简化）：

利用对称性，分母总和为 $2(a+b+c)$，简化计算。

几何本质（平衡点下界）

在三维空间中，考虑向量分量，该不等式表示加权距离的下界，当各分量相等时达到平衡。

代数意义（分式化整）

通过乘以分母和，将分式不等式转化为整式不等式，便于使用均值不等式或柯西-施瓦茨。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（对称不等式）

- **考法一（直接证明）**：作为经典不等式，要求直接证明。
- **考法二（求最值）**：在给定条件下，求类似表达式的最小值。

顿悟点

分母和恰好为 $2(a+b+c)$，从而与分子平方和匹配，导出下界 $\frac{a+b+c}{2}$。

使用场景

- **场景一（对称不等式证明）**：当题目中出现对称的分式平方和时。
- **场景二（最值问题）**：求 $\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}$ 的最小值，已知 $a,b,c>0$。

证明

思路提示

使用柯西-施瓦茨不等式，将分子平方与分母乘积关联，然后利用分母和的对称性简化。

正式推导

步骤一（柯西-施瓦茨形式）：

柯西-施瓦茨不等式说：对于实数序列 x_i, y_i，有

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right)^2.$$

理由：这是柯西-施瓦茨不等式的标准形式。

步骤二（应用序列）：

令 $x_1=\frac{a}{\sqrt{b+c}}, x_2=\frac{b}{\sqrt{c+a}}, x_3=\frac{c}{\sqrt{a+b}}$，$y_1=\sqrt{b+c}, y_2=\sqrt{c+a}, y_3=\sqrt{a+b}$。则

$$\left(\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\right)((b+c)+(c+a)+(a+b)) \geq (a+b+c)^2.$$

理由：代入柯西-施瓦茨不等式，注意 $x_i y_i = a, b, c$。

步骤三（计算分母和）：

计算分母和：$(b+c)+(c+a)+(a+b)=2(a+b+c)$。

$$\left(\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\right)\cdot 2(a+b+c) \geq (a+b+c)^2.$$

理由：直接相加得到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（整理不等式）：

由于 $a+b+c>0$，两边除以 $2(a+b+c)$ 得

$$\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geq\frac{a+b+c}{2}.$$

理由：不等式两边同除以正数，不等号方向不变。

结论回扣

因此，原不等式成立，且当且仅当柯西-施瓦茨取等时等号成立，即 $\frac{a}{\sqrt{b+c}}\propto\sqrt{b+c}$ 等，这推出 $a=b=c$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $a,b,c>0$，且 $a+b+c=1$，求 $\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（应用不等式）：

由三元权方和不等式，

$$\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geq\frac{a+b+c}{2}.$$

理由：直接应用定理。

第二步（代入条件）：

已知 $a+b+c=1$，所以

$$\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geq\frac{1}{2}.$$

理由：将条件代入不等式。

第三步（取等检查）：

当且仅当 $a=b=c$ 时等号成立，结合 $a+b+c=1$，得 $a=b=c=\frac{1}{3}$。

理由：等号成立条件为 $a=b=c$，代入条件得具体值。

关键结论： **最小值为 $\frac{1}{2}$，当 $a=b=c=\frac{1}{3}$ 时取得。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $a,b,c>0$，且 $abc=1$，证明 $\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geq\frac{3}{2}$。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（应用权方和）：

由三元权方和不等式，

$$\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geq\frac{a+b+c}{2}.$$

理由：直接应用定理。

第二步（均值不等式）：

由均值不等式，$a+b+c\geq 3\sqrt[3]{abc}=3$。

$$\frac{a+b+c}{2}\geq\frac{3}{2}.$$

理由：已知 $abc=1$，所以 $\sqrt[3]{abc}=1$，从而 $a+b+c\geq 3$。

第三步（结合得证）：

因此，

$$\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geq\frac{a+b+c}{2}\geq\frac{3}{2}.$$

理由：由第一步和第二步，传递不等式。

关键结论： **不等式成立，当且仅当 $a=b=c=1$ 时等号成立。**

易错提醒

易错点一（忽略正实条件）

误以为 a,b,c 可为任意实数。

正确理解（正实数必要）：

a,b,c 必须为正实数，否则分母可能为零或负，不等式不成立。

错因分析（条件缺失）：

未注意不等式前提条件，导致错误应用。

易错点二（取等误解）

认为只要部分变量相等即可取等。

正确理解（全等取等）：

等号成立当且仅当 $a=b=c$，所有变量必须相等。

错因分析（对称性误解）：

由于不等式对称，误以为对称条件下任意相等即可，但推导要求严格比例。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（分母不匹配）

在类似表达式中直接套用，忽略分母形式。

正确理解（形式匹配）：

只有分母为 $b+c, c+a, a+b$ 时才能直接应用此结论。

错因分析（机械套用）：

未理解不等式结构，盲目应用导致错误。

结论小结

一句话核心

对于正实数 a, b, c，平方项除以两数和的和小下界为半和。

使用条件

- **条件 1（正实数）：** $a, b, c > 0$。
- **条件 2（分母形式）：** 分母必须为 $b+c, c+a, a+b$ 的形式。

关键提醒

- **易错点（取等条件）：** 等号成立当且仅当 $a=b=c$。
- **检查项（分母匹配）：** 应用前检查分母是否匹配定理要求。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.41 循环分式不等式

二级结论

条件

条件 1（变量正实）：

变量 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 均为正实数，并约定 $a_{n+1} = a_1$。

结论

结论一（循环和不等式）：

直观描述： 循环分式和不小于变量个数。

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}} \geq n.$$

推广结论（三元特例）：

直观描述： 三变量循环和至少为 3。

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq 3.$$

等号/取等条件： 当且仅当所有变量相等，即 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$。三元特例等号成立当且仅当 $a = b = c$。

理解说明

一句话直觉 一个“分数”形式的循环求和，其最小值恰好等于循环的“圈数”，本质是均值不等式在对称循环结构中的体现。

核心拆解

要点一（结构循环）：

下标构成闭环（$a_{n+1} = a_1$），每个分式是“前一项除以后一项”。

要点二（目标定值）：

不等式右端是常数 n，即循环的项数，与变量具体大小无关。

几何本质（轮换对称） 所有变量地位平等，表达式在变量的轮换置换下保持不变（$a_1 \to a_2, a_2 \to a_3, \ldots, a_n \to a_1$）。这种高度对称性导致最小值在完全对称（所有变量相等）时取得。

代数意义（均值放缩） 利用算术-几何平均不等式（AM-GM）对 n 个分式的乘积

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

进行放缩：

$$\frac{a_1}{a_2}\cdot\frac{a_2}{a_3}\cdots\frac{a_n}{a_1}=1\le\left(\frac{\frac{a_1}{a_2}+\frac{a_2}{a_3}+\cdots+\frac{a_n}{a_1}}{n}\right)^n.$$

开 n 次方后即得结论。

考点价值（不等式工具）

- **考法一（直接应用）**：题目条件或待证式恰好是循环分式和，直接套用结论。
- **考法二（变形构造）**：将非齐次式或复杂分式通过配凑、代换转化为循环分式和结构。

顿悟点 **观察式子中所有分子和分母**：若将所有分式相乘，分子分母会完全约去，结果为 1。这个“乘积为 1”的特性是连接均值不等式的关键桥梁。

使用场景

- **场景一（证明最值）**：证明形如“$\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}\ge 3$”的循环分式最小值问题。
- **场景二（简化复杂式）**：在复杂的多元不等式证明中，识别出局部循环结构并应用此结论进行放缩。

证明

思路提示 利用算术-几何平均不等式（AM-GM），对 n 个正数 $\frac{a_1}{a_2},\frac{a_2}{a_3},\ldots,\frac{a_n}{a_1}$ 直接应用。因为它们的乘积为 1，由均值不等式可得它们的和至少为 n。

正式推导

步骤一（构造序列）：

记 $b_i=\frac{a_i}{a_{i+1}}$，其中 $i=1,2,\ldots,n$，且 $a_{n+1}=a_1$。则 $b_1,b_2,\ldots,b_n$ 均为正实数。

$$b_i>0\quad(i=1,\ldots,n).$$

理由：由条件 $a_i>0$ 可知分式值 $b_i>0$。

步骤二（计算乘积）：

计算这 n 个数的乘积。

$$\begin{aligned}b_1b_2\cdots b_n&=\left(\frac{a_1}{a_2}\right)\cdot\left(\frac{a_2}{a_3}\right)\cdots\left(\frac{a_n}{a_1}\right)\\&=\frac{a_1a_2\cdots a_n}{a_2a_3\cdots a_na_1}\\&=1.\end{aligned}$$

理由：分子分母中的 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 各出现一次，全部约去。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（应用均值）：

对 $b_1, b_2, \ldots, b_n$ 应用算术-几何平均不等式（AM-GM）。

$$\frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}{n} \geq \sqrt[n]{b_1 b_2 \cdots b_n}.$$

理由： AM-GM 不等式要求所有数为正实数，此处满足。

步骤四（代入化简）：

将乘积 $b_1 b_2 \cdots b_n = 1$ 代入右边，并两边乘以 n。

$$\frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}{n} \geq \sqrt[n]{1} = 1,$$
$$\therefore \quad b_1 + b_2 + \cdots + b_n \geq n.$$

理由： 1 的 n 次方根仍为 1，不等式方向不变。

步骤五（还原变量）：

将 b_i 代回原分式形式。

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}} = b_1 + b_2 + \cdots + b_n \geq n.$$

理由： 这是 b_i 的定义。

步骤六（分析取等）：

在 AM-GM 不等式中，等号成立当且仅当 $b_1 = b_2 = \cdots = b_n$。

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{a_2}{a_3} = \cdots = \frac{a_n}{a_1}.$$

理由： 均值不等式取等条件要求所有数相等。由这些等式可递推得 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$。反之，若所有 a_i 相等，显然等号成立。

结论回扣 因此，对于任意 n 个正实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，在约定 $a_{n+1} = a_1$ 下，必有 $\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}} \geq n$，且等号当且仅当所有变量相等时成立。特例 $n = 3$ 即得 $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq 3$，等号当且仅当 $a = b = c$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x, y, z > 0$，求证：$\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \geq 3$。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（识别结构）：

观察待证式，它是三个正数 x, y, z 的循环分式和，恰好对应定理中 $n = 3$ 的情形。

理由： 分式依次为 $\frac{x}{y}, \frac{y}{z}, \frac{z}{x}$，下标构成循环 $x \to y \to z \to x$。

第二步（直接应用）：

根据循环分式不等式（三元特例），立即有

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \geq 3.$$

理由： 定理结论的直接代入。

第三步（说明取等）：

等号成立的条件是 $x = y = z$。

理由： 定理指出，等号当且仅当三个变量相等。

关键结论： **对于任意正实数 x, y, z，恒有 $\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \geq 3$，等号成立当且仅当 $x = y = z$。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $a, b, c > 0$，求证：$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$。（提示：先利用不等式 $\frac{a}{b+c} \geq \frac{2a}{a+b+c}$）

解题步骤：

第一步（初步放缩）：

对每一项应用给定提示的不等式。

$$\frac{a}{b+c} \geq \frac{2a}{a+b+c},$$
$$\frac{b}{c+a} \geq \frac{2b}{a+b+c},$$
$$\frac{c}{a+b} \geq \frac{2c}{a+b+c}.$$

理由： 因为 $a + b + c > a$，所以 $\frac{a}{b+c} \geq \frac{a}{a+b+c}$ 不充分，提示给出了更强的系数 2，可由 $\frac{a}{b+c} = \frac{a}{b+c}$ 和 $\frac{2a}{a+b+c}$ 通分比较得到。

第二步（求和得新式）：

将三个不等式相加。

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{2a + 2b + 2c}{a+b+c} = 2.$$

理由： 同分母 $a + b + c$，分子相加为 $2(a + b + c)$。

但此结果 ≥ 2 比目标 $\geq 3/2$ 更强，说明提示放缩过强。实际上，经典证法（Nesbitt 不等式）需另寻他路。我们换一种与循环分式相关的思路。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（对称化处理）：

考虑对称化：令 $S=a+b+c$，则 $b+c=S-a$。原式可写为

$$\frac{a}{S-a}+\frac{b}{S-b}+\frac{c}{S-c}.$$

理由：统一分母为 S 减去分子，形式更对称。

第四步（构造循环和）：

尝试证明 $\frac{a}{S-a}+\frac{b}{S-b}+\frac{c}{S-c}\geq\frac{3}{2}$。

利用换元：设 $x=S-a, y=S-b, z=S-c$，则 $x,y,z>0$ 且 $x+y+z=2S$。

理由： $a=S-x$，代入原式变为 $\frac{S-x}{x}+\frac{S-y}{y}+\frac{S-z}{z}=\left(\frac{S}{x}+\frac{S}{y}+\frac{S}{z}\right)-3$。

第五步（应用循环不等式）：

注意到 $\frac{S}{x}=\frac{y+z}{x}$（因为 $S=x+y+z$），原不等式等价于

$$\frac{y+z}{x}+\frac{z+x}{y}+\frac{x+y}{z}\geq 6.$$

理由：将 $\frac{S}{x}+\frac{S}{y}+\frac{S}{z}\geq\frac{9}{2}$ 转化为上述形式。而

$$\frac{y+z}{x}+\frac{z+x}{y}+\frac{x+y}{z}=\left(\frac{y}{x}+\frac{z}{x}\right)+\left(\frac{z}{y}+\frac{x}{y}\right)+\left(\frac{x}{z}+\frac{y}{z}\right),$$

重组得

$$\left(\frac{y}{x}+\frac{x}{y}\right)+\left(\frac{z}{y}+\frac{y}{z}\right)+\left(\frac{x}{z}+\frac{z}{x}\right)\geq 2+2+2=6.$$

理由：每一对括号内均可用基本不等式 $\frac{u}{v}+\frac{v}{u}\geq 2$（$u,v>0$）得到最小值 2。这正是循环分式不等式在 $n=2$ 时的特例。

关键结论： **通过拆项和基本不等式，最终证得 $\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\geq\frac{3}{2}$，且等号当 $a=b=c$ 时成立。本题展示了如何将非标准循环式拆解为多个循环分式结构。**

易错提醒

易错点一（忽略正数条件）

未验证变量为正实数就直接套用结论。

正确理解（前提必验）：

定理成立的前提是 $a_1,a_2,\ldots,a_n>0$。若变量可为负或零，结论不成立。

错因分析（条件缺失）：

均值不等式（AM-GM）仅适用于正实数，忽略前提会导致错误结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（循环结构误判）

将非循环的分式和误判为循环结构。例如，$\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{d}$（$d$ 与 a 无关）不是循环和。

正确理解（下标闭环）：

必须满足 $a_{n+1}=a_1$，即最后一个分式的分母是第一个分式的分子。

错因分析（定义混淆）：

混淆了“轮换对称”与“循环和”的定义，后者要求严格的闭环。

易错点三（取等条件漏解）

仅写出部分取等条件，例如在 $n=3$ 时只写出 $a=b$，未写出 $b=c$。

正确理解（全部相等）：

等号成立的充要条件是所有变量相等，即 $a_1=a_2=\cdots=a_n$。

错因分析（条件递推不全）：

由 $\frac{a_1}{a_2}=\frac{a_2}{a_3}=\cdots=\frac{a_n}{a_1}$ 应递推出全部相等，不能只推出相邻相等。

结论小结

一句话核心 **正实数循环分式之和，最小值等于循环的项数，当且仅当所有数相等时取到最小值。**

使用条件

- **条件 1（变量全正）：**所有涉及的变量必须是正实数。
- **条件 2（结构循环）：**分式序列必须构成闭环，即最后一个分式的分母等于第一个分式的分子。

关键提醒

- **易错点（前提验证）：**使用前务必检查变量正负与结构循环性，两者缺一不可。
- **检查项（取等条件）：**最小值取到时，所有变量一定相等，这是等号成立的唯一情况。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.42 三元循环平方分式不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

变量 x, y, z 都是正实数。

结论

结论一（三元循环不等式）：

直观描述： 分式的平方和大于等于变量直接和。

$$\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x} \geq x+y+z.$$

推广结论（加权推广形式）：

直观描述： 每个分式项乘以正权重的推广。

$$\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x} \geq \frac{(x+y+z)^2}{x+y+z}=x+y+z.$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x=y=z$ 时，不等式取等号。

理解说明

一句话直觉 把每个变量的平方“分摊”给下一个变量作分母，这样的循环分式之和，不会小于变量自身之和。它描述了一种“循环放大”效应，但总和仍有下限。

核心拆解

要点一（结构对称）：

不等式左边三个分式呈 $x \to y \to z \to x$ 的循环对称结构。

要点二（分式降幂）：

左边每一项是二次除以一次，整体是齐一次式，右边也是齐一次式。

几何本质（旋转放缩） 可以将 $\frac{x^2}{y}$ 视为以 x 和 $\frac{x}{y}$ 为两边的矩形面积的一种度量。不等式表明，经过循环“旋转”和“伸缩”后的面积之和，总不小于原始边长之和。当三个变量相等时，这种“旋转伸缩”效应消失，达到平衡。

代数意义（柯西变形） 从代数角度看，该不等式是柯西-施瓦茨不等式一个精妙的变形。通过将 $x+y+z$ 拆分为 $\sqrt{x}\sqrt{\frac{x}{y}}\cdot\sqrt{y}+\ldots$ 等形式，并应用 $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$，可自然导出结论。它揭示了平方和与交叉项和之间的深层关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（综合应用）

- **考法一（直接证明求最值）**：作为已知结论直接用于证明其他不等式或求多元表达式的最小值。
- **考法二（变形识别应用）**：题目可能将 $\frac{x^2}{y}$ 变形为 $\frac{x^3}{xy}$ 等形式，需要逆向识别出本结构方可应用。

顿悟点 **关键在于发现 $\frac{x^2}{y}+y\geq 2x$，并对三个这样的不等式进行循环求和。**这是将非对称分式化为对称整体最常用的技巧。

使用场景

- **场景一（循环分式求和）**：当遇到 $\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}$ 这类循环分式求和求最小值时，优先考虑此结论。
- **场景二（条件最值证明）**：在已知 $x,y,z>0$ 且满足某条件（如 $xyz=1$）时，证明包含此类循环分式的不等式。

证明

思路提示 利用基本不等式 $a^2+b^2\geq 2ab$，对左边的每一项进行“配凑”，使之与右边的 x,y,z 产生联系。具体来说，为 $\frac{x^2}{y}$ 配上一个 y，就能运用均值不等式。

正式推导

步骤一（单项配凑）：

对第一个分式应用二元均值不等式。

$$\frac{x^2}{y}+y\geq 2\sqrt{\frac{x^2}{y}\cdot y}=2x.$$

理由：这里 $a=\frac{x}{\sqrt{y}}, b=\sqrt{y}$，满足 $a^2+b^2\geq 2ab$。此步将分式与一个变量配对。

步骤二（循环类推）：

同理，写出另外两个循环配对的不等式。

$$\frac{y^2}{z}+z\geq 2y,$$
$$\frac{z^2}{x}+x\geq 2z.$$

理由：完全仿照步骤一，只是将变量按 $x\to y\to z\to x$ 的顺序轮换。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（叠加求和）：

将上面得到的三式左边与右边分别相加。

$$\left(\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x}\right)+(y+z+x)\geq 2x+2y+2z.$$

理由：不等式两边分别相加，不等号方向不变。

步骤四（移项化简）：

将不等式右边的 $2(x+y+z)$ 拆开，并将一部分移到左边。

$$\left(\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x}\right)+(x+y+z)\geq 2(x+y+z)$$
$$\Rightarrow \quad \frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x}\geq (x+y+z).$$

理由：从叠加后的不等式两边同时减去 $(x+y+z)$，即得所要证明的结论。

结论回扣 **以上每一步均可逆，且均值不等式取等条件为 $\frac{x^2}{y}=y,\frac{y^2}{z}=z,\frac{z^2}{x}=x$，即 $x^2=y^2,y^2=z^2,z^2=x^2$。结合 $x,y,z>0$，推出当且仅当 $x=y=z$ 时原不等式取等号。**证明完毕。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $a,b,c>0$，证明：$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\geq a+b+c$。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

观察题目结构与已知结论完全一致。

理由：将 (x,y,z) 对应为 (a,b,c)，即为结论的直接形式。

第二步（应用结论）：

直接写出已知的不等式结论。

$$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\geq a+b+c.$$

理由：根据“三元循环平方分式不等式”，该式恒成立。

第三步（说明取等）：

指出等号成立的条件。

理由：当且仅当 $a=b=c$ 时，上述不等式取等号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 对于任意正实数 a, b, c，不等式 $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq a + b + c$ 成立，等号在 $a = b = c$ 时取得。

例 2（稍变形）

题目： 设 $x, y, z > 0$，且 $xyz = 1$。求 $\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + \frac{z^2}{x}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（应用主结论）：

直接应用已知不等式得到一个下界。

$$\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + \frac{z^2}{x} \geq x + y + z.$$

理由： 题目条件 $x, y, z > 0$ 满足不等式应用前提。

第二步（利用条件放缩）：

在 $xyz = 1$ 的条件下，对 $x + y + z$ 进一步使用均值不等式。

$$x + y + z \geq 3\sqrt[3]{xyz} = 3.$$

理由： 三个正数的算术平均数不小于几何平均数，且 $xyz = 1$。

第三步（得到最小值）：

结合前两步，得出原式的最小值。

$$\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + \frac{z^2}{x} \geq x + y + z \geq 3.$$

理由： 不等式具有传递性。因此原式的最小值不小于 3。

第四步（验证可达到）：

检查等号能否同时成立。

理由： 第一个不等式取等需 $x = y = z$，第二个不等式取等也需 $x = y = z$。结合 $xyz = 1$，得 $x = y = z = 1$。此时原式值为 3。故最小值为 3。

关键结论： 在 $x, y, z > 0$ 且 $xyz = 1$ 的条件下，$\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + \frac{z^2}{x}$ 的最小值为 3，当 $x = y = z = 1$ 时取得。

易错提醒

易错点一（忽略正实数条件）

错误地认为 x, y, z 可以是任意实数或零。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（严格正性）：

结论成立的前提是 $x, y, z > 0$。若变量为负或为零，则均值不等式步骤可能失效或分母无意义。

错因分析（条件遗忘）：

忽视不等式成立的基本前提，将特殊结论盲目推广到一般情况。

易错点二（取等条件误用）

在复杂问题中，认为只要 $x = y = z$ 就一定能使所有相关不等式同时取等。

正确理解（链条检验）：

当结论是通过多个不等式链推导得到时，必须验证每个不等式的取等条件能否同时满足。

错因分析（逻辑混淆）：

混淆了单个不等式取等与整个不等式链取等的逻辑关系。

易错点三（形式误用）

看到形如 $\frac{a^2}{b}$ 的项就套用结论，未注意是否是 $a \to b \to c \to a$ 的循环结构。

正确理解（结构对称）：

结论要求分子是变量的平方，分母是下一个变量，且三个项循环对称。对于 $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a} + \frac{c^2}{d}$ 等不对称结构不适用。

错因分析（模式错配）：

机械记忆结论形式，缺乏对变量间循环对称关系的识别能力。

结论小结

一句话核心 **正实数循环平方分式之和，不小于变量本身之和。**这是连接分式结构与一次和的重要桥梁。

使用条件

- **条件 1（变量正性）：**所有涉及的变量必须是正实数 (> 0)。
- **条件 2（循环对称）：**表达式必须是 $\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + \frac{z^2}{x}$ 或其轮换对称形式。

关键提醒

- **易错点（取等验证）：**牢记取等条件是 $x = y = z$。在复杂推导中，需验证该条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

能否使链条中每个不等式同时取等。

- **检查项（结构匹配）**：应用前务必检查分式项是否构成严格的 $a \to b \to c \to a$ 循环，避免形式类似的错误套用。

4 平面几何

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.1 P01 圆外一点到圆上点的最大/最小距离

二级结论

P01 圆外一点到圆的距离极值结论

设圆 O 的半径为 R，点 P 在圆外，且 $OP = d\,(d > R)$。

则点 P 到圆上各点距离的：

- 最小值为 $d - R$;
- 最大值为 $d + R$。

最小距离在 OP 与圆的交点处取得，最大距离在 OP 的反向延长线与圆的交点处取得。



Nearest distance (最近距离)



Farthest distance (最远距离)

理解说明

从点 P 出发，到圆上不同点连线，长度是不断变化的。

直观地看：

- 离 P 最近的圆上点，一定在" 正对着 P 的那一侧";
- 离 P 最远的圆上点，一定在" 背对着 P 的那一侧"。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

也就是说，距离的极值一定出现在 **直线 OP 与圆的交点**上，而不会出现在侧面。

证明

设圆上任意一点为 A, 连接 PA、OA。
在 $\triangle OPA$ 中，由三角形两边之和大于第三边，有：

$$|OP - OA| \leq PA \leq OP + OA$$

又因为 $OA = R$,$OP = d$，故

$$d - R \leq PA \leq d + R$$

当 A 在直线 OP 上，且位于

- O 与 P 之间时，$PA = d - R$;
- O 的反向延长线上时，$PA = d + R$。

因此结论成立。

典型例题

例：
已知圆 O 的半径为 3, 点 P 满足 $OP = 5$, 求点 P 到该圆的最小距离和最大距离。
解：
由于 $5 > 3$，点 P 在圆外，

$$\text{最小距离} = 5 - 3 = 2, \quad \text{最大距离} = 5 + 3 = 8$$

易错提醒

- 该结论**只适用于点在圆外**的情形；
- 若点在圆内，最小距离为 $R - d$，最大距离仍为 $R + d$；
- 极值点**不在任意位置**，而只在 OP 方向上；
- 不要误以为" 垂线最短" 可以直接使用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

圆外一点到圆距离极值记忆口诀：

”外点看圆心，加减半径就行”

- 最近：$OP - R$；
- 最远：$OP + R$；
- 位置：都在直线 OP 上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.2 P02 圆内一点到圆上点的最大/最小距离

二级结论

P02 圆内一点到圆的距离极值结论

设圆 O 的半径为 R, 点 P 在圆内，且 $OP = d\,(0 \le d < R)$。
则点 P 到圆上各点距离的：

- 最小值为 $R - d$;
- 最大值为 $R + d$。

最小距离在 OP 的反向延长线与圆的交点处取得，最大距离在 OP 与圆的交点处取得。

理解说明

点 P 在圆内时，从 P 出发连到圆上的各点，长度同样是不断变化的。
直观理解：

- 离 P 最近的圆上点，一定在" 靠近圆心相反方向" 的那一侧；
- 离 P 最远的圆上点，一定在" 从圆心指向 P 再向外" 的那一侧。

换句话说，无论点在圆内还是圆外，**极值点都只会出现在直线 OP 上**。

证明

设圆上任意一点为 A, 连接 PA、OA。
在 $\triangle OPA$ 中，由三角形两边之和大于第三边，有：

$$|OP - OA| \le PA \le OP + OA$$

因为 $OA = R$,$OP = d$, 且 $d < R$，故

$$R - d \le PA \le R + d$$

当点 A 在直线 OP 上，且位于 O 的反向延长线方向时，$PA = R - d$;
当点 A 在直线 OP 上，且位于 P 指向圆外方向时，$PA = R + d$。
因此结论成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例：

已知圆 O 的半径为 5, 点 P 满足 $OP = 2$, 求点 P 到该圆的最小距离和最大距离。

解：

由于 $2 < 5$，点 P 在圆内，

$$\text{最小距离} = 5 - 2 = 3, \quad \text{最大距离} = 5 + 2 = 7$$

易错提醒

- 不要误认为" 点在圆内就没有最小距离"；
- 圆内、圆外的公式形式不同，**但本质来自同一个三角形不等式**；
- 极值点仍然只出现在 OP 所在直线上；
- 注意区分 $R - d$ 与 $d - R$ 的正负。

结论小结

圆与点距离极值统一记忆法：

" 最大一律加，最小看位置"

- 点在圆外：最小 $= OP - R$；
- 点在圆内：最小 $= R - OP$；
- 最大距离统一为 $OP + R$；
- 极值点一定在直线 OP 上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.3 P03 圆上一点到圆的距离极值

二级结论

P03 圆上一点到圆的距离极值结论

设圆 O 的半径为 R，点 P 在圆上，即 $OP = R$。

则点 P 到圆上各点距离的：

- 最小值为 0；
- 最大值为 $2R$。

最小距离在 P 点本身取得，最大距离在圆上与 P 直径相对的点处取得。

理解说明

当点 P 在圆上时，它本身就是圆上的一个点，因此最小距离显然为 0。

而最远的圆上点，一定在通过圆心 O 的直线 OP 的反方向，也就是与 P 成直径相对的位置。

证明

对任意圆上点 A, 在 $\triangle OPA$ 中有

$$|OP - OA| \leq PA \leq OP + OA$$

由于 $OP = OA = R$, 故

$$0 \leq PA \leq 2R$$

等号成立情况显然成立，故结论成立。

典型例题

例：

已知圆半径为 4, 点 P 在圆上，则 P 到圆上各点距离的最大值为多少？

解：最大距离为 $2R = 8$

易错提醒

- 圆上一点属于特殊情形，不能套圆内或圆外公式；
- 最大距离一定是直径长度，而不是半径；
- 极值点仍在 OP 所在直线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

圆上一点模型：

- 最近：0；
- 最远：$2R$；
- 本质：直径模型。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.4 P04 点到圆距离极值的统一模型

二级结论

P04 点到圆距离极值的统一模型

设圆半径为 R，点 P 到圆心距离为 d, 则点 P 到圆上点距离的极值满足：

$$|d-R| \le PA \le d+R$$

该不等式同时适用于点在圆内、圆上、圆外三种情形。

理解说明

无论点 P 在哪里，距离问题都可以统一转化为 $\triangle OPA$ 中的三角形不等式。
区别只在于：

- $d < R$（圆内）；
- $d = R$（圆上）；
- $d > R$（圆外）。

模型不变，位置决定结果。

证明

由三角形不等式

$$|OP-OA| \le PA \le OP+OA$$

代入 $OP=d, OA=R$ 即得结论。

典型例题

例：

已知 $OP=d$，圆半径为 R, 请写出点 P 到圆距离的取值范围。

解：

$$|d-R| \le PA \le d+R$$

易错提醒

- 统一模型是**不等式范围**，不是具体数值；
- 不要忽略绝对值；
- 极值点始终在 OP 直线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话总结：

点到圆距离极值，本质就是三角形不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.5 P05 直线与圆的距离极值

二级结论

P05 直线与圆的距离极值结论

设圆心 O 到直线 l 的距离为 d, 圆的半径为 R。

则直线 l 上点到圆的最小距离为：

$$|d-R|$$

当 $d<R$ 时，直线与圆有公共点，最小距离为 0。

理解说明

研究直线与圆的距离，本质上是研究：**直线上哪些点，离圆最近**。

距离最短的情形，一定发生在：

- 圆心 O 向直线 l 作垂线；
- 垂足所在方向与圆的关系。

因此问题可以完全转化为圆心到直线的距离 d 与半径 R 的比较。

证明

设点 A 为直线 l 上任意一点，连接 OA。

由于点到直线的距离最短为垂线段，故 $OA \geq d$。

点 A 到圆的最小距离，即 OA 与 R 的差的最小值，因此最小距离为

$$|d-R|$$

当 $d<R$ 时，直线与圆相交，存在公共点，故最小距离为 0。

典型例题

例：

已知圆半径为 4, 圆心到直线 l 的距离为 6, 求直线 l 到圆的最小距离。

解：

由于 $6>4$, 直线在圆外，

$$\text{最小距离} = 6-4=2$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- 该结论只讨论**最小距离**，不存在最大距离；
- 不要忘记分 $d < R$ 与 $d \geq R$ 两种情况；
- ”直线到圆的距离”指的是**直线上点到圆的最小值**。

结论小结

直线与圆距离极值口诀：

”圆心量出来，减半径”

- $d > R$：最小距离 $= d - R$；
- $d = R$：相切，距离为 0；
- $d < R$：相交，距离为 0。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.6 P06 两圆之间的距离极值

二级结论

P06 两圆之间的距离极值结论

设两圆圆心分别为 O_1, O_2, 半径分别为 R_1, R_2, 圆心距为 d。
则两圆上点之间距离的取值范围为：

$$|d-(R_1+R_2)| \leq AB \leq d+R_1+R_2$$

理解说明

两圆之间的距离问题，本质是把" 点到圆" 的模型升级为" 圆到圆"。
最短距离：

- 一定发生在两圆心连线方向；
- 对应的是两半径的" 迎面" 或" 相交" 情况。

最长距离：

- 一定发生在两圆心连线的反方向；
- 相当于两半径在同一直线上" 拉开"。

证明

取圆 O_1 上点 A, 圆 O_2 上点 B, 在 $\triangle O_1ABO_2$ 中，
由三角形不等式，有

$$|O_1O_2-(O_1A+O_2B)| \leq AB \leq O_1O_2+O_1A+O_2B$$

代入

$$O_1O_2=d, \quad O_1A=R_1, \quad O_2B=R_2,$$

即得结论。

典型例题

例：
已知两圆半径分别为 2 与 3, 圆心距为 10, 求两圆上点之间距离的最大值和最小值。
解：

$$\text{最小值}=10-(2+3)=5, \quad \text{最大值}=10+2+3=15$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- 若 $d < R_1 + R_2$，两圆相交，最小距离为 0；
- 若 $d = R_1 + R_2$，两圆外切；
- 不要误把 $|d - (R_1 + R_2)|$ 写成 $|d - R_1 - R_2|$；
- 极值点一定位于圆心连线上。

结论小结

两圆距离极值统一记忆：

- 最近：圆心距减" 半径和"；
- 最远：圆心距加" 半径和"；
- 相交或内含：最小距离为 0。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料