

二次函数的三种解析式形式

二级结论

条件

条件 1（系数非零）：

二次项系数 $a \neq 0$ 。

结论

结论一（顶点式变换）：

直观描述：通过配方将一般式化为顶点式，直接得到顶点坐标及对称轴。

$$f(x) = a(x - h)^2 + k, \quad h = -\frac{b}{2a}, \quad k = \frac{4ac - b^2}{4a}.$$

结论二（两根式分解）：

直观描述：当判别式非负时，函数可分解为两个一次因式，直接显示零点与根的和积。

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2), \quad x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

推广结论（判别式与零点）：

直观描述：判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 的符号决定零点个数： $\Delta > 0$ 两个不同实零点， $\Delta = 0$ 一个重零点， $\Delta < 0$ 无实零点。

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

理解说明

一句话直觉 二次函数的三种形式就像是同一个人的身份证、全身照和指纹，从不同侧面刻画自身，方便不同场景下的使用。

核心拆解

要点一（配方法）：

通过配方将一般式转为顶点式，关键操作是 $ax^2 + bx = a(x + \frac{b}{2a})^2 - \frac{b^2}{4a}$ 。

要点二（因式分解）：

利用求根公式 $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ 分解为两根式，前提是 $\Delta \geq 0$ 。

要点三（参数映射）：

一般式系数 a, b, c 与顶点坐标 (h, k) 、两根和积 $x_1 + x_2, x_1 x_2$ 之间存在对应

关系，可以互相推导。

几何本质（图形信息） 顶点式直接给出抛物线顶点位置和开口方向，两根式直接显示与 x 轴的交点，体现图象的几何特征。

代数意义（形式转换） 三种形式本质上是同一个二次多项式的不同代数表示，通过代数变换（配方、因式分解）相互转化，体现了代数等价的灵活性。

考点价值（解题选择）

- **考法一（设顶点式）**：已知顶点或对称轴时设顶点式 $f(x) = a(x - h)^2 + k$ 。
- **考法二（设两根式）**：已知与 x 轴交点时设两根式 $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ 。
- **考法三（设一般式）**：已知任意三点时设一般式 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 解方程组。

顿悟点 配方法与求根公式是转化的核心工具，熟练掌握配方法可快速求得顶点坐标，求根公式则用于分解因式。

使用场景

- **场景一（已知顶点）**：直接设顶点式，待定 a 通过其他条件求出。
- **场景二（已知交点）**：直接设两根式，待定 a 通过其他条件求出。

证明

思路提示 二次函数一般式通过配方可得顶点式，再利用求根公式可分解为两根式，并由此得到根与系数的关系。

正式推导

步骤一（配方变形）：

$$\begin{aligned}f(x) &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c \\&= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}.\end{aligned}$$

理由：这是配方法的标准步骤，在括号内加上并减去 $\frac{b^2}{4a^2}$ 再乘以 a ，整理后得到顶点式。

步骤二（顶点坐标）：

$$f(x) = a(x - h)^2 + k, \quad h = -\frac{b}{2a}, \quad k = \frac{4ac - b^2}{4a}.$$

理由：对比上一步， $h = -\frac{b}{2a}$ ， $k = c - \frac{b^2}{4a}$ ，通分即得 k 的表达式。

步骤三（求根公式）：

当 $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$ 时，求解方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 得到两根

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

理由：直接应用一元二次方程的求根公式。

步骤四（两根式分解）：

根据因式定理，将两根代入分解式

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2).$$

理由：若 x_1, x_2 是 $f(x) = 0$ 的根，则 $f(x)$ 可被 $(x - x_1)(x - x_2)$ 整除，且二次项系数为 a 。

步骤五（和积关系）：

展开两根式并与一般式对比系数

$$(x - x_1)(x - x_2) = x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2,$$

于是得

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1x_2 = \frac{c}{a}.$$

理由：展开后与 $ax^2 + bx + c$ 除以 a 后的二次项系数、一次项系数、常数项对应相等。

结论回扣 以上推导证实了二次函数的一般式、顶点式、两根式三种形式等价，并给出具体的坐标公式与根与系数关系，解题时可灵活选用。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知二次函数 $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$ ，求顶点坐标、对称轴方程，并判断 Δ 符号及零点情况。 **解题步骤：**

第一步（识别系数）：

$$a = 2, b = -4, c = 1.$$

理由：从一般式读出系数。

第二步（计算顶点）：

$$h = -\frac{b}{2a} = 1, \quad k = \frac{4ac-b^2}{4a} = \frac{8-16}{8} = -1。$$

理由：代入顶点坐标公式。

第三步（判别与零点）：

$$\Delta = b^2 - 4ac = 16 - 8 = 8 > 0, \quad \text{零点 } x = \frac{4 \pm \sqrt{8}}{4} = 1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}。$$

理由：判别式为正值表明有两个不同实零点，直接代入求根公式。

关键结论： 顶点坐标 $(1, -1)$ ，对称轴 $x = 1$ ， $\Delta = 8 > 0$ ，零点 $x = 1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

例 2（稍变形） 题目： 已知二次函数的图象与 x 轴交于 $(1, 0)$ 、 $(3, 0)$ ，且过点 $(2, -1)$ ，求解析式。**解题步骤：**

第一步（设两根式）：

$$\text{设 } f(x) = a(x-1)(x-3)。$$

理由：与 x 轴交点已知，设两根式。

第二步（代入求 a ）：

$$\text{将 } (2, -1) \text{ 代入得 } -1 = a(2-1)(2-3) = a \cdot 1 \cdot (-1), \quad a = 1。$$

理由：代入解得 a 。

第三步（展开得一般式）：

$$f(x) = (x-1)(x-3) = x^2 - 4x + 3。$$

理由：展开即得一般式，也可保留两根式。

关键结论： $f(x) = x^2 - 4x + 3$ 。

例 3（综合应用） 题目： 已知二次函数 $f(x)$ 满足 $f(1) = 0$ ， $f(3) = 0$ ，且最大值为 2，求解析式。**解题步骤：**

第一步（设两根式）：

$$\text{由零点设 } f(x) = a(x-1)(x-3)。$$

理由：根为 1 和 3，可设两根式。

第二步（对称轴与最值）：

$$\text{对称轴 } x = \frac{1+3}{2} = 2, \quad \text{最大值 } f(2) = 2。$$

理由：二次函数对称轴为两根中点，且 $a < 0$ 才有最大值。

第三步（代入求 a ）：

$$f(2) = a(2-1)(2-3) = a \cdot 1 \cdot (-1) = -a = 2, \quad \text{得 } a = -2。$$

理由：代入顶点值，解出 a 。

第四步（展开得一般式）：

$$\begin{aligned}f(x) &= -2(x-1)(x-3) \\&= -2(x^2 - 4x + 3) \\&= -2x^2 + 8x - 6.\end{aligned}$$

理由：展开得一般表达式。

关键结论： $f(x) = -2x^2 + 8x - 6$ 。

易错提醒**易错点一（忽略二次项）**

易错将 $a = 0$ 的情况也当作二次函数处理，导致错误。

正确理解（定义前提）：

二次函数必须 $a \neq 0$ ，否则退化为一次函数或常数。

错因分析（惯性思维）：

看到 x^2 项就默认二次，未检查系数是否为零。

易错点二（判别式条件）

在 $\Delta < 0$ 时仍然尝试将二次函数写成两根式。

正确理解（判别式非负）：

两根式只在 $\Delta \geq 0$ 时有实数意义。

错因分析（机械记忆）：

只记形式，忽略成立条件。

易错点三（公式记错）

记错顶点纵坐标 $k = \frac{b^2-4ac}{4a}$ 或 $k = -\frac{b^2-4ac}{4a}$ 。

正确理解（正确公式）：

$k = \frac{4ac-b^2}{4a}$ ，可通过配方验证。

错因分析（死记硬背）：

缺乏推导理解，符号混淆。

结论小结

一句话核心 二次函数有三种等价形式，顶点式给出顶点坐标 $h = -\frac{b}{2a}, k = \frac{4ac-b^2}{4a}$ ；
两根式给出零点与根和积 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ 。

使用条件

- 条件 1（二次项非零）： $a \neq 0$ 。
- 条件 2（判别式非负）：两根式需要 $\Delta \geq 0$ 。

关键提醒

- 易错点（公式记忆）：顶点坐标分母 $2a$ ， k 分子勿混淆符号；和积注意负号。
- 检查项（前提检验）：使用两根式前检验 Δ 是否非负。