

R002 排列数按 n 递推公式

二级结论

条件

条件 1（整数范围）：

n, m 为正整数，且 $1 \leq m < n$.

条件 2（固定取法）：

递推时保持取出个数 m 不变，只把元素总数从 $n - 1$ 增加到 n .

结论

结论一（按 n 递推）：

直观描述：排列数 A_n^m 可由 A_{n-1}^m 乘以比例因子 $\frac{n}{n-m}$ 得到.

$$A_n^m = \frac{n}{n-m} A_{n-1}^m.$$

等价形式（比值公式）：

直观描述：两个相邻下标排列数的比值为

$$\frac{A_n^m}{A_{n-1}^m} = \frac{n}{n-m}.$$

基础公式（阶乘表达）：

直观描述：排列数也可写成阶乘形式

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}.$$

边界提醒：当 $m = 1$ 时， $A_n^1 = n$ ，递推化为

$$n = \frac{n}{n-1} (n-1),$$

仍然成立；当 $m = n$ 时，本递推不能使用，因为 A_{n-1}^n 不存在且分母 $n - m = 0$.

理解说明

一句话直觉

固定取出个数 m ，当可选元素总数从 $n - 1$ 增加到 n 时，排列数会乘上一个比例因子 $\frac{n}{n-m}$.

核心拆解

要点一（递推方向）：

本公式是“按 n 递推”：上标 m 不变，下标从 $n-1$ 变为 n 。

要点二（因子来源）：

系数 $\frac{n}{n-m}$ 来自两个阶乘表达式的比值：

$$\frac{A_n^m}{A_{n-1}^m} = \frac{\frac{n!}{(n-m)!}}{\frac{(n-1)!}{(n-1-m)!}} = \frac{n}{n-m}.$$

要点三（计数本质）：

从 $n-1$ 个元素增加到 n 个元素时，新增加的元素会带来一部分新排列；这个增量最终表现为总数按比例 $\frac{n}{n-m}$ 放大。

计数本质（增量视角）

把第 n 个元素看成“新加入的元素”。所有 A_n^m 个排列可分成两类：

- 不含新元素：共有 A_{n-1}^m 个；
- 含新元素：先确定新元素所在位置，有 m 种选择；其余 $m-1$ 个位置从原来的 $n-1$ 个元素中排列，共 A_{n-1}^{m-1} 种。

因此

$$A_n^m = A_{n-1}^m + mA_{n-1}^{m-1}.$$

又因为

$$A_{n-1}^m = (n-m)A_{n-1}^{m-1},$$

所以

$$A_n^m = (n-m)A_{n-1}^{m-1} + mA_{n-1}^{m-1} = nA_{n-1}^{m-1} = \frac{n}{n-m}A_{n-1}^m.$$

这说明 $\frac{n}{n-m}$ 不是硬记出来的，而是“原有排列 + 新元素贡献”的结果。

代数意义（阶乘桥梁）

该递推把 A_n^m 与 A_{n-1}^m 联系起来，适合处理相邻下标排列数的比值、递推求值和参数方程。

考点价值（考向分析）

- 考法一（直接求值）：已知 A_{n-1}^m 和 n, m ，快速计算 A_n^m 。
- 考法二（比值判断）：遇到 $\frac{A_n^m}{A_{n-1}^m}$ ，直接化为 $\frac{n}{n-m}$ 。
- 考法三（逆向求参）：已知两个相邻排列数的比值，反求 n 或 m 。

顿悟点

本公式的关键不是“把新元素插入旧排列”这么简单，而是固定 m ，比较 A_n^m 与 A_{n-1}^m 的整体比例。

使用场景

- 场景一（相邻求值）：已知 A_{n-1}^m ，一步求 A_n^m 。
- 场景二（比值化简）：化简含有 A_n^m 与 A_{n-1}^m 的式子。
- 场景三（参数求解）：根据相邻排列数的比例建立方程。

证明**思路提示**

利用排列数的阶乘公式，把 A_n^m 与 A_{n-1}^m 都写出来，再求二者的比值。

正式推导**步骤一（写出阶乘形式）：**

由排列数定义，

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}, \quad A_{n-1}^m = \frac{(n-1)!}{(n-1-m)!}.$$

理由：因为 $1 \leq m < n$ ，所以上面两个排列数都有定义，且 $n-m \geq 1$ 。

步骤二（计算比值）：

$$\frac{A_n^m}{A_{n-1}^m} = \frac{\frac{n!}{(n-m)!}}{\frac{(n-1)!}{(n-1-m)!}} = \frac{n!}{(n-m)!} \cdot \frac{(n-1-m)!}{(n-1)!}.$$

理由：除以一个分式，等于乘以它的倒数。

步骤三（化简阶乘）：

将 $n!$ 与 $(n-m)!$ 展开一层：

$$n! = n(n-1)!, \quad (n-m)! = (n-m)(n-1-m)!.$$

因此

$$\frac{A_n^m}{A_{n-1}^m} = \frac{n(n-1)!}{(n-m)(n-1-m)!} \cdot \frac{(n-1-m)!}{(n-1)!} = \frac{n}{n-m}.$$

理由：消去相同因子 $(n-1)!$ 与 $(n-1-m)!$ 。

步骤四（回代得递推）：

由

$$\frac{A_n^m}{A_{n-1}^m} = \frac{n}{n-m}$$

得

$$A_n^m = \frac{n}{n-m} A_{n-1}^m.$$

理由：两边同乘 A_{n-1}^m .

结论回扣

在 n, m 为正整数且 $1 \leq m < n$ 的条件下，排列数按 n 递推公式

$$A_n^m = \frac{n}{n-m} A_{n-1}^m$$

成立.

典型例题

例 1（基础）

题目：已知 $A_5^2 = 20$ ，利用递推公式求 A_6^2 .

解题步骤：

第一步（识别参数）：

这里要从 A_5^2 推到 A_6^2 ，所以 $n = 6, m = 2$.

理由：递推公式 $A_n^m = \frac{n}{n-m} A_{n-1}^m$ 中，下标从 $n-1$ 变为 n .

第二步（代入公式）：

$$A_6^2 = \frac{6}{6-2} A_5^2 = \frac{6}{4} \times 20.$$

理由：固定 $m = 2$ ，把 $n = 6$ 代入.

第三步（计算结果）：

$$A_6^2 = \frac{3}{2} \times 20 = 30.$$

理由：保留分数计算，比写成小数更稳.

关键结论： $A_6^2 = 30$. 也可用定义验证： $A_6^2 = 6 \times 5 = 30$.

例 2（比值化简）

题目：化简 $\frac{A_8^3}{A_7^3}$.

解题步骤:

第一步 (识别结构):

分子分母是 A_n^m 与 A_{n-1}^m 的形式, 其中 $n = 8, m = 3$.

理由: 上标 $m = 3$ 不变, 下标相差 1.

第二步 (套用比值公式):

$$\frac{A_8^3}{A_7^3} = \frac{8}{8-3} = \frac{8}{5}.$$

理由: 由 $\frac{A_n^m}{A_{n-1}^m} = \frac{n}{n-m}$.

关键结论: $\frac{A_8^3}{A_7^3} = \frac{8}{5}$.

例 3 (综合应用)

题目: 已知 $A_n^2 = 20$, $A_{n-1}^2 = 12$, 求正整数 n .

解题步骤:

第一步 (建立方程):

由递推公式

$$A_n^2 = \frac{n}{n-2} A_{n-1}^2,$$

代入已知, 得

$$20 = \frac{n}{n-2} \times 12.$$

理由: 此处 $m = 2$, 且需要 $n > 2$.

第二步 (解方程):

$$\frac{20}{12} = \frac{n}{n-2} \Rightarrow \frac{5}{3} = \frac{n}{n-2}.$$

交叉相乘:

$$5(n-2) = 3n,$$

故 $5n - 10 = 3n$, 解得 $n = 5$.

理由: 按分式方程正常求解.

第三步 (检验):

当 $n = 5$ 时,

$$A_5^2 = 5 \times 4 = 20, \quad A_4^2 = 4 \times 3 = 12,$$

与题设一致.

理由: 代回原排列数检验, 避免只满足方程但不满足题意.

关键结论： $n = 5$.

易错提醒

易错点一（忽略范围）

忘记 $1 \leq m < n$ ，直接把 $m = n$ 或 $m > n$ 代入公式.

正确理解（条件限制）：

本公式中分母是 $n - m$ ，所以必须 $m < n$ ；同时 A_{n-1}^m 也要求 $m \leq n - 1$.

错因分析（只看 A_n^m ）：

当 $m = n$ 时， A_n^n 本身有定义，但 A_{n-1}^n 没有定义，且 $\frac{n}{n-m}$ 分母为 0，所以不能套用本递推.

易错点二（方向记反）

把公式错写成

$$A_{n-1}^m = \frac{n}{n-m} A_n^m.$$

正确理解（公式形式）：

正确公式是

$$A_n^m = \frac{n}{n-m} A_{n-1}^m,$$

如果反过来表示，应为

$$A_{n-1}^m = \frac{n-m}{n} A_n^m.$$

错因分析（分子分母混淆）：

从 $n-1$ 推到 n 时排列数变大，应乘以大于 1 的 $\frac{n}{n-m}$ ；反向时才乘以小于 1 的 $\frac{n-m}{n}$.

易错点三（混淆两种递推）

把本公式与另一个排列数递推

$$A_n^m = (n - m + 1) A_n^{m-1}$$

混淆.

正确理解（看谁在变）：

本讲公式是“上标不变、下标变化”：

$$A_n^m = \frac{n}{n-m} A_{n-1}^m.$$

另一个公式是“下标不变、上标变化”：

$$A_n^m = (n - m + 1) A_n^{m-1}.$$

错因分析（只背名字）：

两个都叫“排列数递推公式”，必须根据题目中变化的是 n 还是 m 来选择.

易错点四（乱约分）

把 $\frac{n}{n-m}$ 错误约分，甚至误认为它等于 $\frac{1}{1-m}$.

正确理解（整体分母）：

$n-m$ 是一个整体，不能把分子中的 n 与分母中的 n 单独消去.

错因分析（代数习惯错误）：

只有公因式才能约去， n 不是 $n-m$ 的公因式.

结论小结

一句话核心

排列数按 n 递推公式

$$A_n^m = \frac{n}{n-m} A_{n-1}^m$$

表示：固定取出个数 m ，把元素总数从 $n-1$ 增加到 n 时，排列数按比例 $\frac{n}{n-m}$ 放大.

使用条件

- 条件 1（整数要求）： n, m 为正整数，且 $1 \leq m < n$.
- 条件 2（递推方向）：用 A_{n-1}^m 推 A_n^m ，上标 m 保持不变.

关键提醒

- 先看谁变：如果变的是下标 n ，用 $A_n^m = \frac{n}{n-m} A_{n-1}^m$.
- 注意分母：必须 $m < n$ ，否则分母 $n-m$ 为 0 或相关排列数不存在.
- 不要倒置：反向表达时应写成 $A_{n-1}^m = \frac{n-m}{n} A_n^m$.