

## I003 糖水不等式

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（正实数）：

$a, b, m \in \mathbb{R}^+$ （均为正实数）。

## 条件 2（大小关系）：

$a < b$ 。

## 条件 3（减糖前提）：

对于减糖原理，需额外满足  $b > m$ 。

## 结论

## 结论一（加糖原理）：

直观描述：分子分母同加正数，分式值增大。

$$\frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m}$$

## 结论二（减糖原理）：

直观描述：分子分母同减正数，分式值减小。

$$\frac{a}{b} > \frac{a-m}{b-m}$$

## 推广结论（倒数形式）：

直观描述：原分式倒数大于加糖后倒数。

$$\frac{b}{a} > \frac{b+m}{a+m}$$

## 理解说明

一句话直觉 当糖水浓度较低时，加入更多糖会变甜；同理，从较淡糖水中取出糖会变淡。

## 核心拆解

## 要点一（加糖变甜）：

分子分母同时加上同一个正数，分式值变大，相当于糖水变甜。

## 要点二（减糖变淡）：

分子分母同时减去同一个正数（且分母大于减数），分式值变小，相当于糖

水变淡。

**几何本质（单调函数）** 考虑函数  $f(x) = \frac{a+x}{b+x}$ ，其中  $a < b$ 。该函数在  $x > 0$  时单调递增，因此加糖（ $x = m > 0$ ）使函数值增大，减糖（ $x = -m$  且  $b > m$ ）使函数值减小。

**代数意义（差值比较）** 通过通分比较差值： $\frac{a+m}{b+m} - \frac{a}{b} = \frac{m(b-a)}{b(b+m)} > 0$ ，因为  $b > a > 0$  且  $m > 0$ ，从而证明加糖原理。类似可证减糖原理。

**考点价值（分式比较）**

- **考法一（直接应用）**：直接比较两个分数大小，如判断  $\frac{3}{5}$  与  $\frac{4}{7}$  的大小。
- **考法二（变形证明）**：结合其他不等式进行综合证明，或用于放缩求范围。

**顿悟点** 糖水不等式的核心在于原分式是否小于 1：当  $\frac{a}{b} < 1$  时，加糖使值趋近 1，减糖使值远离 1；反之若  $\frac{a}{b} > 1$ ，结论反向。但这里  $a < b$  保证原分式小于 1。

**使用场景**

- **场景一（分数比较）**：需要快速比较两个分数，无需通分直接应用。
- **场景二（不等式放缩）**：在证明链中作为中间步骤，进行分式放大或缩小。

## 证明

**思路提示** 通过作差法比较两个分式的大小，利用条件  $a < b$  和  $m > 0$  判断差值的正负。

**正式推导**

**步骤一（写出差值）**：

计算加糖前后分式的差值。

$$\Delta = \frac{a+m}{b+m} - \frac{a}{b}$$

**理由**：要证明  $\frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m}$ ，只需证  $\Delta > 0$ 。

**步骤二（通分合并）**：

将差值通分为一个分式。

$$\begin{aligned}\Delta &= \frac{(a+m)b - a(b+m)}{b(b+m)} \\ &= \frac{ab + bm - ab - am}{b(b+m)} \\ &= \frac{m(b-a)}{b(b+m)}\end{aligned}$$

理由：通分后合并同类项，简化分子。

步骤三（判断符号）：

分析分子分母的符号。

由于  $a, b, m > 0$  且  $a < b$ , 有  $b - a > 0$ .

理由：因此分子  $m(b - a) > 0$ , 分母  $b(b + m) > 0$ , 所以  $\Delta > 0$ 。

步骤四（得证加糖）：

由  $\Delta > 0$  推出原不等式。

$$\frac{a+m}{b+m} - \frac{a}{b} > 0 \Rightarrow \frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m}$$

理由：差值正意味着加糖后分式更大。

步骤五（减糖原理）：

类似地，考虑减糖情形。

$$\Delta' = \frac{a}{b} - \frac{a-m}{b-m} = \frac{m(b-a)}{b(b-m)}$$

理由：此时需  $b > m > 0$  保证分母为正，且  $b - a > 0$ , 故  $\Delta' > 0$ , 即  $\frac{a}{b} > \frac{a-m}{b-m}$ 。

步骤六（倒数形式）：

由加糖原理直接推导倒数形式。

$$\frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m} \Rightarrow \frac{b}{a} > \frac{b+m}{a+m}$$

理由：不等式两边取倒数，不等号反向，因为所有数为正。

**结论回扣** 因此，在给定条件下，糖水不等式的三个结论均成立。证明过程突出了作差法和符号分析，确保每一步都可追溯。

### 典型例题

#### 例 1（基础）

题目：比较  $\frac{3}{8}$  与  $\frac{5}{10}$  的大小，不直接计算分母。

解题步骤：

**第一步（识别结构）：**

注意到  $\frac{5}{10}$  可视为  $\frac{3+2}{8+2}$ 。

理由：分子分母同时加了  $m = 2$ ，符合加糖原理条件。

**第二步（应用加糖）：**

根据加糖原理，由于  $3 < 8$  且  $2 > 0$ ，有

$$\frac{3}{8} < \frac{3+2}{8+2} = \frac{5}{10}$$

理由：直接代入糖水不等式结论一。

**第三步（得出结论）：**

因此， $\frac{3}{8} < \frac{5}{10}$ 。

理由：无需通分计算，直接由不等式得到结果。

**关键结论：** 加糖原理允许快速比较分数，避免繁琐通分。

**例 2（稍变形）**

**题目：** 已知  $0 < x < y$ ，证明  $\frac{y}{x} > \frac{y+1}{x+1}$ 。

**解题步骤：**

**第一步（倒数转换）：**

考虑原不等式的倒数形式。

理由：目标式形如糖水不等式的推广结论，但变量顺序需调整。

**第二步（应用加糖）：**

由  $0 < x < y$ ，令  $a = x, b = y, m = 1$ ，则  $a < b$  且  $m > 0$ ，根据加糖原理：

$$\frac{x}{y} < \frac{x+1}{y+1}$$

理由：直接代入结论一，注意这里  $\frac{x}{y} < 1$ 。

**第三步（取倒数）：**

对上述不等式两边取倒数，不等号反向。

$$\frac{y}{x} > \frac{y+1}{x+1}$$

理由：由于  $x, y, x+1, y+1$  均为正，取倒数保持不等号反向。

**关键结论：** 通过倒数转换，将问题化归为标准糖水不等式，简化证明。

## 易错提醒

## 易错点一（忽略正数条件）

误以为  $a, b, m$  可为任意实数，直接应用结论。

## 正确理解（全为正数）：

必须保证  $a, b, m \in \mathbb{R}^+$ ，即所有变量为正实数。

## 错因分析（符号反转）：

若  $m$  为负数或变量为负，通分后差值符号可能改变，导致不等式方向错误。

## 易错点二（减糖前提遗漏）

应用减糖原理时，忽略  $b > m$  的条件。

## 正确理解（分母大于减数）：

减糖原理要求  $b > m$ ，否则分母  $b - m$  可能非正，分式无意义或不等号不成立。

## 错因分析（分母符号）：

若  $b \leq m$ ，则  $b - m \leq 0$ ，分式值可能为负或无穷，无法直接比较。

## 易错点三（倒数形式混淆）

错误地认为  $\frac{b}{a} > \frac{b+m}{a+m}$  与加糖原理无关，导致记忆负担。

## 正确理解（逻辑推导）：

倒数形式是加糖原理的直接推论，可通过取倒数得到，无需单独记忆。

## 错因分析（机械记忆）：

死记硬背多个公式，未理解其内在联系，在变形时容易出错。

## 结论小结

一句话核心 糖水不等式描述了分式分子分母同加减同数时，分式值的变化规律：加糖增大，减糖减小。

## 使用条件

- 条件 1（全为正数）： $a, b, m > 0$ 。
- 条件 2（原式小于 1）： $a < b$ （保证原分式  $\frac{a}{b} < 1$ ）。
- 条件 3（减糖额外）：应用减糖时需  $b > m$ 。

#### 关键提醒

- 易错点（符号检查）：务必先检查所有变量为正，否则结论可能失效。
- 检查项（倒数关联）：推广结论可由加糖原理取倒数导出，减少记忆量。