ID: 2026E03-001

高中数学二级结论 (不等式)

逻辑拆解、快速验证与秒杀实战

500+ 高中数学核心结论 • 高考解题加速体系

适用对象： 高中生 / 高考复习 / 强基计划

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2$$

为什么这本手册是考场提分利器？

- **结果快速验证：** 为复杂题目提供" 第二核对点"，确保逻辑闭环。
- **计算路径压缩：** 绕过繁琐步骤，利用成熟模型直接锁定答案。
- **解题逻辑回检：** 当常规方法卡壳时，提供高维视角的备用方案。
- **程序员式逻辑重构：** 基于严谨逻辑推导，重塑数学底层思维。

高考数学教研组 · 内部讲义

编著：ok-shuxue 985 教学团队 | 点击关注公众号：ok-shuxue

©2026 南京市江宁区极坐标软件开发工作室

更新日期：April 5, 2026 | 版本号：V2.1.0

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

Contents

1 不等式 **1**

1.1 连不等式 N<f(x)<M 的四种等价形式 2

1.2 基本不等式及其变形 10

1.3 糖水不等式 16

1.4 三项立方和不等式 22

1.5 柯西不等式 27

1.6 权方和不等式 32

1.7 绝对值三角不等式 39

1.8 均值不等式链（HM≤GM≤AM≤QM） 45

1.9 三元均值不等式 51

1.10 三元平方和不等式 57

1.11 对数函数切线不等式 lnx ≤ x-1 及其变式 62

1.12 指数函数切线放缩不等式 68

1.13 对勾不等式（x+1/x≥2） 74

1.14 琴生不等式（Jensen 不等式） 79

1.15 指数凸性不等式（Jensen 不等式应用） 85

1.16 指数函数凸性不等式：算术平均 ≥ 几何平均 90

1.17 正弦函数凹性不等式 96

1.18 余弦函数凹性不等式与三角形余弦和上界 101

1.19 正切凸性不等式与锐角三角形正切和 106

1.20 对数平均不等式 112

1.21 幂函数凸性不等式 117

1.22 二元分式和不等式（倒数和 ≥4/(和)） 123

1.23 xlnx 的凸性与 Jensen 不等式 129

1.24 三元对称不等式链 135

1.25 Nesbitt 不等式 142

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.26 舒尔不等式 148
1.27 互为倒数和不等式 153
1.28 伯努利不等式 159
1.29 正弦绝对值不等式 $|\sin x| \le |x|$ 166
1.30 三角函数不等式：$\sin x < x < \tan x$ 172
1.31 余弦函数的下界不等式：$\cos x \ge 1 - x^2/2$ 179
1.32 三角联合放缩不等式：$\sin x+\tan x>2x$ 185
1.33 对数平均值不等式 194
1.34 指数函数泰勒展开下界不等式 200
1.35 $\ln(1+x)$ 在 $x\ge 0$ 时的二阶不等式估计 206
1.36 $\ln(1+x)$ 的经典不等式链 211
1.37 $\sin x$ 在 $[0,\pi/2]$ 上的线性下界：$\sin x\ge(2/\pi)x$ 216
1.38 对称分式不等式 222
1.39 倒数和不等式 227
1.40 三元权方和不等式 232
1.41 循环分式不等式 237
1.42 三元循环平方分式不等式 243

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1 不等式

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.1 连不等式 N<f(x)<M 的四种等价形式

© Math & Code Lab 丨公众号：ok-shuxue 丨内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

条件

条件 1（实数大小）：

$M, N \in \mathbb{R}$ 且 $M > N$；函数 $f(x)$ 在定义域 D 上取实数值。

结论

结论一（原始形式）：

直观描述： 函数值介于两个给定实数之间。

$$N < f(x) < M$$

结论二（乘积形式）：

直观描述： 函数值减端点后乘积为负。

$$(f(x) - M)(f(x) - N) < 0$$

结论三（绝对值形式）：

直观描述： 函数值到区间中点的距离小于半长。

$$\left| f(x) - \frac{M+N}{2} \right| < \frac{M-N}{2}$$

结论四（分式形式）：

直观描述： 函数值相对于端点的比值大于零。

$$\frac{f(x) - N}{M - f(x)} > 0$$

结论五（倒数形式）：

直观描述： 函数值减下界的倒数大于差值的倒数（需正条件）。

$$\frac{1}{f(x) - N} > \frac{1}{M - N}, \quad \text{其中} f(x) - N > 0$$

推广结论（区间表示）：

直观描述： 函数值属于以中点为心、半长为半径的开区间。

$$f(x) \in \left(\frac{M+N}{2} - \frac{M-N}{2}, \frac{M+N}{2} + \frac{M-N}{2} \right)$$

等号/取等条件： 无等号成立情况，因原不等式为严格不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉

连不等式 $N < f(x) < M$ 可通过多种代数形式等价表达，每种形式在不同解题场景下有独特优势。

核心拆解

要点一（等价性）：

五个命题互为充分必要条件，从任一形式可推出其他形式。

要点二（变形技巧）：

通过移项、通分、平方等代数操作，实现形式间的转换。

要点三（条件注意）：

倒数形式需保证 $f(x) - N > 0$，否则不等式方向可能改变。

几何本质（数轴位置）

在数轴上，点 N 和 M 确定一个开区间 (N, M)。函数值 $f(x)$ 位于该区间内等价于 $f(x)$ 到区间中点 $\frac{M+N}{2}$ 的距离小于区间半长 $\frac{M-N}{2}$。

代数意义（符号分析）

乘积形式 $(f(x)-M)(f(x)-N) < 0$ 表明 $f(x)-M$ 与 $f(x)-N$ 异号，即 $f(x)$ 介于 M 和 N 之间。分式形式 $\frac{f(x)-N}{M-f(x)} > 0$ 表明分子分母同号，结合分母 $M - f(x) > 0$，推出 $f(x) - N > 0$。倒数形式利用函数 $\frac{1}{t}$ 在 $t > 0$ 时的单调递减性。

考点价值（不等式转化）

- **考法一（证明等价）：**在证明题中，需证 $N < f(x) < M$，可转化为证明乘积形式或绝对值形式，有时更易操作。
- **考法二（求解范围）：**当不等式包含参数或需解 x 时，转化为分式形式或倒数形式可能简化计算。

顿悟点

无论形式如何变化，实质都是表达 $f(x)$ 落在开区间 (N, M) 内。选择哪种形式取决于当前问题的最简路径。

使用场景

- **场景一（证明题）：**需要证明函数值满足连不等式时，优先考虑乘积形式或绝对值形式进行变形。
- **场景二（求解题）：**给定连不等式求定义域或值域时，可尝试分式形式或倒数形式分离变量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

从几何意义入手：$f(x)$ 在数轴上介于 N 和 M 之间。代数上，通过移项、乘除、配方等基本操作，可导出各种等价形式。注意每一步的可逆性。

正式推导

步骤一（乘积形式）：

由 $N < f(x) < M$ 出发。

$$N < f(x) < M \quad \Rightarrow \quad f(x) - N > 0 \text{ 且 } f(x) - M < 0$$

理由： 将不等式拆分为两个部分，分别移项。由于 $f(x) - N > 0$ 和 $f(x) - M < 0$，两者异号，乘积为负。

$$(f(x) - M)(f(x) - N) < 0$$

反之，若 $(f(x) - M)(f(x) - N) < 0$，则 $f(x) - M$ 与 $f(x) - N$ 异号。结合 $M > N$，可推出 $f(x) - M < 0$ 且 $f(x) - N > 0$，即 $N < f(x) < M$。故等价。

步骤二（绝对值形式）：

从乘积形式配方。

$$(f(x) - M)(f(x) - N) = \left(f(x) - \frac{M+N}{2}\right)^2 - \left(\frac{M-N}{2}\right)^2$$

理由： 直接展开并配方。由于 $(f(x) - M)(f(x) - N) < 0$，代入得

$$\left(f(x) - \frac{M+N}{2}\right)^2 - \left(\frac{M-N}{2}\right)^2 < 0$$

移项后即

$$\left|f(x) - \frac{M+N}{2}\right| < \frac{M-N}{2}$$

反之，从绝对值形式可反向推导至乘积形式，故等价。

步骤三（分式形式）：

由 $N < f(x) < M$ 直接构造。

$$N < f(x) < M \quad \Rightarrow \quad f(x) - N > 0 \text{ 且 } M - f(x) > 0$$

理由： 由于 $f(x) - N > 0$ 和 $M - f(x) > 0$，两者均为正，比值大于零。

$$\frac{f(x) - N}{M - f(x)} > 0$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

反之，若 $\frac{f(x)-N}{M-f(x)} > 0$，则分子分母同号。但 $M - f(x) > 0$ 必成立（否则分母非正时不等式可能不成立），故 $f(x) - N > 0$，结合 $M - f(x) > 0$ 得 $N < f(x) < M$。故等价。

步骤四（倒数形式）：

在 $f(x) - N > 0$ 条件下，从分式形式变形。

$$\frac{f(x) - N}{M - f(x)} > 0 \quad \text{且} \quad f(x) - N > 0$$

理由：由分式形式，分子分母同正，故 $M - f(x) > 0$。取倒数，注意正数倒数保持不等号方向。但更直接地，从 $N < f(x) < M$ 有 $0 < f(x) - N < M - N$。由于函数 $\frac{1}{t}$ 在 $t > 0$ 时递减，所以

$$\frac{1}{f(x) - N} > \frac{1}{M - N}$$

反之，若 $\frac{1}{f(x)-N} > \frac{1}{M-N}$ 且 $f(x) - N > 0$，则由于 $\frac{1}{t}$ 递减，有 $f(x) - N < M - N$，即 $f(x) < M$。结合 $f(x) - N > 0$ 得 $N < f(x) < M$。故在条件下等价。

结论回扣

综上所述，在条件 $M > N$ 下，五个命题彼此等价。在实际应用中，可根据问题特点选择最方便的形式进行推导或求解。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $f(x) = 3x - 2$，解不等式 $1 < f(x) < 7$。

解题步骤：

第一步（写出原始）：

$1 < 3x - 2 < 7$。

理由：将 $f(x)$ 代入不等式。

第二步（乘积形式）：

转化为乘积形式 $(3x - 2 - 7)(3x - 2 - 1) < 0$。

理由：令 $M = 7, N = 1$，则乘积形式为 $(f(x) - M)(f(x) - N) < 0$。

$$(3x - 9)(3x - 3) < 0$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（解不等式）：

化简并解二次不等式。

$$9(x-3)(x-1)<0 \quad \Rightarrow \quad (x-3)(x-1)<0$$

理由：除以正数 9 不等号方向不变。解得 $1<x<3$。

第四步（回代验证）：

将解集代回原始不等式验证。

理由：确保解的正确性。当 $1<x<3$ 时，$3x-2$ 确实介于 1 和 7 之间。

关键结论： **不等式 $1<3x-2<7$ 的解集为 $x\in(1,3)$。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $f(x)=x^2+1$，已知 $2<f(x)<10$，求 x 的取值范围。

解题步骤：

第一步（绝对值形式）：

将不等式转化为绝对值形式。

理由：令 $M=10, N=2$，则中点 $C=\frac{10+2}{2}=6$，半长 $R=\frac{10-2}{2}=4$。绝对值形式为

$$|f(x)-6|<4$$

即 $|x^2+1-6|<4$。

第二步（化简绝对值）：

化简得 $|x^2-5|<4$。

理由：计算 $f(x)-6=x^2+1-6=x^2-5$。

第三步（解绝对值不等式）：

解 $|x^2-5|<4$。

$$-4<x^2-5<4 \quad \Rightarrow \quad 1<x^2<9$$

理由：绝对值不等式等价于连不等式。分别解 $x^2>1$ 和 $x^2<9$。

第四步（求 x 范围）：

由 $1<x^2<9$，得 $x^2<9$ 且 $x^2>1$，所以 $x\in(-3,-1)\cup(1,3)$。

理由： $x^2<9$ 推出 $-3<x<3$，$x^2>1$ 推出 $x<-1$ 或 $x>1$，取交集。

关键结论： **满足 $2<x^2+1<10$ 的 x 取值范围为 $(-3,-1)\cup(1,3)$。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略条件）：

使用倒数形式 $\frac{1}{f(x)-N} > \frac{1}{M-N}$ 时，未检查 $f(x)-N>0$ 是否成立。

正确理解（条件先行）：

倒数形式仅在 $f(x)-N>0$ 的条件下与原始不等式等价；否则需另行讨论。

错因分析（单调性误用）：

函数 $\frac{1}{t}$ 在 $t>0$ 时递减，但在 $t<0$ 时性质不同，直接应用可能导致不等号方向错误。

易错点二（大小关系）：

在乘积形式 $(f(x)-M)(f(x)-N)<0$ 中，认为 $f(x)$ 一定在 M 和 N 之间，但未明确 M 与 N 的大小。

正确理解（顺序重要）：

当 $M>N$ 时，乘积为负等价于 $N<f(x)<M$；若 $M<N$，则等价于 $M<f(x)<N$。

错因分析（默认顺序）：

惯性思维认为 M 和 N 已按大小排列，但题目可能未明确，需先比较 M 和 N。

易错点三（半长计算）：

在绝对值形式中，将半长误写为 $\frac{M+N}{2}$ 或 $\left|\frac{M-N}{2}\right|$ 而未简化。

正确理解（正半长）：

由于 $M>N$，半长 $\frac{M-N}{2}>0$，无需加绝对值；中点 $\frac{M+N}{2}$ 为实数。

错因分析（符号混淆）：

对绝对值概念和区间几何意义理解不透，导致公式记忆错误。

结论小结

一句话核心

连不等式 $N<f(x)<M$ 可等价转化为乘积、绝对值、分式、倒数四种形式，本质是函数值落在开区间内。

使用条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 1（实数大小）：** M 和 N 为实数，且满足 $M > N$。
- **条件 2（函数实值）：** 函数 $f(x)$ 在相关定义域上取实数值。

关键提醒

- **易错点（倒数条件）：** 使用倒数形式时，务必先确保 $f(x) - N > 0$，否则结论不成立。
- **检查项（形式适用）：** 在证明题中优先考虑乘积或绝对值形式；在求解题中可尝试分式或倒数形式简化计算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.2 基本不等式及其变形

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

a, b 均为正实数。

条件 2（任意实数）：

a, b 为任意实数（仅适用于第 4 条）。

结论

结论一（算术-几何平均）：

直观描述： 两正数之和不小于其几何平均数两倍。

$$a + b \geq 2\sqrt{ab}$$

结论二（积与和平方）：

直观描述： 两正数积不超过其算术平均平方。

$$ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$

结论三（平方和与和平方）：

直观描述： 两正数平方和不小于其和平方的一半。

$$a^2 + b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2}$$

推广结论（平方和与积）：

直观描述： 任意实数平方和不小于其积两倍。

$$a^2 + b^2 \geq 2ab$$

等号/取等条件： 当且仅当 $a = b$ 时，上述所有不等式等号成立。

理解说明

一句话直觉 两个量（正数或任意实数）之间的大小关系，其本质是“平方非负”这一简单事实的多种代数包装。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（平方差非负）：

最根本的来源是 $(a-b)^2 \geq 0$，展开即得 $a^2+b^2 \geq 2ab$。

要点二（均值转化）：

利用代换（如令 $x=\sqrt{a}, y=\sqrt{b}$）可将平方和形式转化为算术-几何平均形式。

要点三（等价变形）：

各不等式可通过代数运算（如移项、平方、配方）互相推导，本质相同。

几何本质（矩形与正方形） 以 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ 为例：周长固定的矩形中，正方形的面积最大。更一般地，平方和与积的关系反映了图形边长固定时，形状越“正”，其度量（如面积、平方和）越优。

代数意义（配方法） 不等式 $a^2+b^2 \geq 2ab$ 等价于 $(a-b)^2 \geq 0$，这揭示了所有证明的起点：一个实数的平方非负。这是不等式证明最基础的配方法思想。

考点价值（最值与证明）

- **考法一（最值求解）：** 用于求解在给定约束（如和为定值、积为定值）下的最值（最大或最小）问题。
- **考法二（不等式证明）：** 作为证明链中的关键一步，用于放缩或建立不等关系，常见于综合证明题。

顿悟点 **“一正二定三相等”**是使用基本不等式求最值的口诀，分别对应“正数条件”、“和或积为定值”、“等号成立条件”，缺一不可。

使用场景

- **场景一（直接套用）：** 题目中表达式明显符合 $x+y$ 与 $\sqrt{xy}$ 或 x^2+y^2 与 xy 的关系。
- **场景二（变形后使用）：** 通过常数代换、分母有理化、拆项、凑项等手段，将表达式化为可使用基本不等式的形式。

证明

思路提示 所有证明的起点都是“实数的平方非负”这一基本事实，即 $(a-b)^2 \geq 0$。由此出发，通过简单的代数变形（如开方、配方、替换）即可得到各种形式。关键是在变形过程中保持等价性，并指明每一步的依据。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（平方差非负）：

$$(a-b)^2 \geq 0$$

理由：任何实数的平方都非负。这是整个不等式体系的基石。

步骤二（展开得基础式）：

$$a^2 - 2ab + b^2 \geq 0$$

理由：将平方项展开。然后移项得到 $a^2+b^2 \geq 2ab$，这是对任意实数 a, b 都成立的原始不等式。

步骤三（特化到正实数）：

当 $a, b > 0$ 时，令 $x = \sqrt{a}, y = \sqrt{b}$，则 x, y 也为正实数。将 x, y 代入 $a^2+b^2 \geq 2ab$ 得

$$(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2 \geq 2(\sqrt{a})(\sqrt{b}) \quad \Rightarrow \quad a+b \geq 2\sqrt{ab}.$$

理由：通过代换，将平方和与积的关系转化为算术平均数与几何平均数的关系。

步骤四（变形得其他形式）：

由 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$，两边平方（注意正数条件保证不等号方向不变）得

$$(a+b)^2 \geq 4ab \quad \Rightarrow \quad ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2.$$

另外，由 $a^2+b^2 \geq 2ab$，将 $2ab$ 移至左边并配方，有

$$a^2+b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2}.$$

具体过程：因为 $(a+b)^2 = a^2+b^2+2ab$，结合 $a^2+b^2 \geq 2ab$，可得

$$a^2+b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2}.$$

理由：这些都是等价的代数变形，注意平方操作要求两边非负。

结论回扣 **综上，所有不等式都源于 $(a-b)^2 \geq 0$，并通过合法代数变形得到。等号成立当且仅当 $a=b$，此时平方差为零，各不等式同时取到等号。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x > 0$，求函数 $y = x + \dfrac{9}{x}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（判断正数）：

由于 $x > 0$，则 $\dfrac{9}{x} > 0$，满足“一正”。

理由： 基本不等式 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ 要求 a, b 均为正数。

第二步（套用公式）：

直接应用算术-几何平均不等式：

$$y = x + \frac{9}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{9}{x}} = 2\sqrt{9} = 6.$$

理由： 这里 $a = x$，$b = \frac{9}{x}$，且 $ab = x \cdot \frac{9}{x} = 9$ 为定值，满足“二定”。

第三步（验证取等）：

等号成立当 $x = \dfrac{9}{x}$，即 $x^2 = 9$，解得 $x = 3$（舍去负值）。

理由： 检查“三相等”，确保最小值可以取到。

关键结论： 当 $x = 3$ 时，$y_{\min} = 6$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a, b > 0$ 且 $a + b = 1$，求证：$\left(a + \dfrac{1}{a}\right)\left(b + \dfrac{1}{b}\right) \geq \dfrac{25}{4}$。

解题步骤：

第一步（展开化简）：

左边展开：

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)\left(b + \frac{1}{b}\right) = ab + \frac{a}{b} + \frac{b}{a} + \frac{1}{ab}.$$

理由： 多项式乘法。

第二步（利用条件放缩）：

由 $a + b = 1$ 和 $a, b > 0$，根据 $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$，得 $\frac{1}{ab} \geq 4$。又由 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2\sqrt{\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a}} = 2$（应用 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ 的变形）。

理由： 分别对乘积项 ab 和倒数项 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ 应用基本不等式或其变形。

第三步（代入求下界）：

将 $ab \leq \frac{1}{4}$ 代入 $ab + \frac{1}{ab}$，但注意 $ab + \frac{1}{ab}$ 在 $(0, \frac{1}{4}]$ 上单调递减，故当 $ab = \frac{1}{4}$ 时

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

取得最小值。同时 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\geq 2$。因此

$$\text{原式} \geq \left(\frac{1}{4}+4\right)+2=\frac{1}{4}+4+2=\frac{25}{4}.$$

理由：将各部分的极小值组合，得到整体的下界。

关键结论： **不等式得证，且等号当 $a=b=\frac{1}{2}$ 时成立。**

易错提醒

易错点一（忽视正数条件）

直接对负数或可能为负的变量使用 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$。

正确理解（正数前提）：

公式 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$ 和 $ab\leq((a+b)/2)^2$ 仅当 $a,b\geq 0$ 时成立。

错因分析（根式无意义）：

若 a,b 为负，$\sqrt{ab}$ 可能无实数意义；即使有意义（如两负相乘为正），算术-几何平均不等式也不一定成立。

易错点二（忽略取等条件）

求出最值后，不验证等号是否能成立，导致最值不可达。

正确理解（同时性检验）：

基本不等式等号成立当且仅当 $a=b$。在复杂表达式中，需检查此条件是否能在约束下同时满足。

错因分析（过程与结果脱节）：

推导过程中可能多次使用不等式，若等号成立条件不一致，则最终等号可能无法同时取到，所求“最值”仅为下界而非实际最值。

易错点三（混淆公式范围）

认为 $a^2+b^2\geq 2ab$ 也要求 a,b 为正数。

正确理解（实数范围成立）：

$a^2+b^2\geq 2ab$ 由 $(a-b)^2\geq 0$ 推出，对任意实数 a,b 都成立。

错因分析（记忆混淆）：

将不同形式基本不等式的适用条件记混，未区分“算术-几何平均”与“平方和与积”两种形式的前提差异。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 基本不等式及其变形是处理非负量（或实数）间大小关系的基础工具，核心思想源于“平方非负”。

使用条件

- **条件 1（正数条件）：** $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ 和 $ab \leq ((a+b)/2)^2$ 仅适用于 $a, b \geq 0$。
- **条件 2（定值条件）：** 用于求最值时，通常要求和（$a+b$）或积（ab）其中之一为定值。

关键提醒

- **易错点（取等验证）：** 每次应用后，必须检查等号 $a=b$ 是否能在给定条件下成立。
- **检查项（公式选择）：** 根据变量是正数还是任意实数，选择合适的公式形式（算术-几何平均或平方和与积）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.3 糖水不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

$a, b, m \in \mathbb{R}^+$（均为正实数）。

条件 2（大小关系）：

$a < b$。

条件 3（减糖前提）：

对于减糖原理，需额外满足 $b > m$。

结论

结论一（加糖原理）：

直观描述： 分子分母同加正数，分式值增大。

$$\frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m}$$

结论二（减糖原理）：

直观描述： 分子分母同减正数，分式值减小。

$$\frac{a}{b} > \frac{a-m}{b-m}$$

推广结论（倒数形式）：

直观描述： 原分式倒数大于加糖后倒数。

$$\frac{b}{a} > \frac{b+m}{a+m}$$

理解说明

一句话直觉 当糖水浓度较低时，加入更多糖会变甜；同理，从较淡糖水中取出糖会变淡。

核心拆解

要点一（加糖变甜）：

分子分母同时加上同一个正数，分式值变大，相当于糖水变甜。

要点二（减糖变淡）：

分子分母同时减去同一个正数（且分母大于减数），分式值变小，相当于糖

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

水变淡。

几何本质（单调函数） 考虑函数 $f(x)=\frac{a+x}{b+x}$，其中 $a<b$。该函数在 $x>0$ 时单调递增，因此加糖（$x=m>0$）使函数值增大，减糖（$x=-m$ 且 $b>m$）使函数值减小。

代数意义（差值比较） 通过通分比较差值：$\frac{a+m}{b+m}-\frac{a}{b}=\frac{m(b-a)}{b(b+m)}>0$，因为 $b>a>0$ 且 $m>0$，从而证明加糖原理。类似可证减糖原理。

考点价值（分式比较）

- **考法一（直接应用）**：直接比较两个分数大小，如判断 $\frac{3}{5}$ 与 $\frac{4}{7}$ 的大小。
- **考法二（变形证明）**：结合其他不等式进行综合证明，或用于放缩求范围。

顿悟点 **糖水不等式的核心在于原分式是否小于 1**：当 $\frac{a}{b}<1$ 时，加糖使值趋近 1，减糖使值远离 1；反之若 $\frac{a}{b}>1$，结论反向。但这里 $a<b$ 保证原分式小于 1。

使用场景

- **场景一（分数比较）**：需要快速比较两个分数，无需通分直接应用。
- **场景二（不等式放缩）**：在证明链中作为中间步骤，进行分式放大或缩小。

证明

思路提示 通过作差法比较两个分式的大小，利用条件 $a<b$ 和 $m>0$ 判断差值的正负。

正式推导

步骤一（写出差值）：

计算加糖前后分式的差值。

$$\Delta=\frac{a+m}{b+m}-\frac{a}{b}$$

理由：要证明 $\frac{a}{b}<\frac{a+m}{b+m}$，只需证 $\Delta>0$。

步骤二（通分合并）：

将差值通分为一个分式。

$$\begin{aligned}\Delta&=\frac{(a+m)b-a(b+m)}{b(b+m)}\\&=\frac{ab+bm-ab-am}{b(b+m)}\\&=\frac{m(b-a)}{b(b+m)}\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：通分后合并同类项，简化分子。

步骤三（判断符号）：

分析分子分母的符号。

$$\text{由于} a, b, m > 0 \text{ 且} a < b, \text{ 有} b - a > 0.$$

理由：因此分子 $m(b-a) > 0$，分母 $b(b+m) > 0$，所以 $\Delta > 0$。

步骤四（得证加糖）：

由 $\Delta > 0$ 推出原不等式。

$$\frac{a+m}{b+m} - \frac{a}{b} > 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m}$$

理由：差值正意味着加糖后分式更大。

步骤五（减糖原理）：

类似地，考虑减糖情形。

$$\Delta' = \frac{a}{b} - \frac{a-m}{b-m} = \frac{m(b-a)}{b(b-m)}$$

理由：此时需 $b > m > 0$ 保证分母为正，且 $b - a > 0$，故 $\Delta' > 0$，即 $\frac{a}{b} > \frac{a-m}{b-m}$。

步骤六（倒数形式）：

由加糖原理直接推导倒数形式。

$$\frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m} \quad \Rightarrow \quad \frac{b}{a} > \frac{b+m}{a+m}$$

理由：不等式两边取倒数，不等号反向，因为所有数为正。

结论回扣 **因此，在给定条件下，糖水不等式的三个结论均成立。**证明过程突出了作差法和符号分析，确保每一步都可追溯。

典型例题

例 1（基础）

题目： 比较 $\frac{3}{8}$ 与 $\frac{5}{10}$ 的大小，不直接计算分母。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（识别结构）：

注意到 $\frac{5}{10}$ 可视为 $\frac{3+2}{8+2}$。

理由： 分子分母同时加了 $m=2$，符合加糖原理条件。

第二步（应用加糖）：

根据加糖原理，由于 $3<8$ 且 $2>0$，有

$$\frac{3}{8}<\frac{3+2}{8+2}=\frac{5}{10}$$

理由： 直接代入糖水不等式结论一。

第三步（得出结论）：

因此，$\frac{3}{8}<\frac{5}{10}$。

理由： 无需通分计算，直接由不等式得到结果。

关键结论： **加糖原理允许快速比较分数，避免繁琐通分。**

例 2（稍变形）

题目： 已知 $0<x<y$，证明 $\frac{y}{x}>\frac{y+1}{x+1}$。

解题步骤：

第一步（倒数转换）：

考虑原不等式的倒数形式。

理由： 目标式形如糖水不等式的推广结论，但变量顺序需调整。

第二步（应用加糖）：

由 $0<x<y$，令 $a=x, b=y, m=1$，则 $a<b$ 且 $m>0$，根据加糖原理：

$$\frac{x}{y}<\frac{x+1}{y+1}$$

理由： 直接代入结论一，注意这里 $\frac{x}{y}<1$。

第三步（取倒数）：

对上述不等式两边取倒数，不等号反向。

$$\frac{y}{x}>\frac{y+1}{x+1}$$

理由： 由于 $x, y, x+1, y+1$ 均为正，取倒数保持不等号反向。

关键结论： **通过倒数转换，将问题化归为标准糖水不等式，简化证明。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略正数条件）

误以为 a, b, m 可为任意实数，直接应用结论。

正确理解（全为正数）：

必须保证 $a, b, m \in \mathbb{R}^+$，即所有变量为正实数。

错因分析（符号反转）：

若 m 为负数或变量为负，通分后差值符号可能改变，导致不等式方向错误。

易错点二（减糖前提遗漏）

应用减糖原理时，忽略 $b > m$ 的条件。

正确理解（分母大于减数）：

减糖原理要求 $b > m$，否则分母 $b - m$ 可能非正，分式无意义或不等号不成立。

错因分析（分母符号）：

若 $b \leq m$，则 $b - m \leq 0$，分式值可能为负或无穷，无法直接比较。

易错点三（倒数形式混淆）

错误地认为 $\frac{b}{a} > \frac{b+m}{a+m}$ 与加糖原理无关，导致记忆负担。

正确理解（逻辑推导）：

倒数形式是加糖原理的直接推论，可通过取倒数得到，无需单独记忆。

错因分析（机械记忆）：

死记硬背多个公式，未理解其内在联系，在变形时容易出错。

结论小结

一句话核心 **糖水不等式描述了分式分子分母同加减同数时，分式值的变化规律：加糖增大，减糖减小。**

使用条件

- **条件 1（全为正数）：** $a, b, m > 0$。
- **条件 2（原式小于 1）：** $a < b$（保证原分式 $\frac{a}{b} < 1$）。
- **条件 3（减糖额外）：** 应用减糖时需 $b > m$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（符号检查）**：务必先检查所有变量为正，否则结论可能失效。
- **检查项（倒数关联）**：推广结论可由加糖原理取倒数导出，减少记忆量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.4 三项立方和不等式

二级结论

条件

条件 1（变量范围）：

a, b, c 为非负实数。

结论

结论一（立方和不等式）：

直观描述： 三项立方和不小于三倍乘积。

$$a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$$

推广结论（因式分解）：

直观描述： 不等式等价于平方和非负。

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = \frac{1}{2}(a+b+c)\left[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\right] \geq 0$$

等号/取等条件： 当且仅当 $a = b = c$。

理解说明

一句话直觉

对于非负实数，三项立方之和不小于它们乘积的三倍，当且仅当三者相等时取等。

核心拆解

要点一（对称结构）：

不等式关于 a, b, c 对称，轮换不变。

要点二（非负保障）：

因式分解后，平方和与非负因子保证不等式成立。

几何本质（体积比较）

在几何中，立方项可能对应于体积，但这里更直接的是代数比较，体现均值不等式的思想。

代数意义（平方和形式）

不等式等价于 $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ 可分解为半和与平方和的乘积，从而显式非负。

考点价值（不等式证明）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（直接应用）**：在证明题中直接使用该结论简化。
- **考法二（最值求解）**：结合取等条件求最值或范围。

顿悟点

当问题中出现对称的立方和与乘积时，优先考虑此不等式。

使用场景

- **场景一（对称不等式）**：证明其他对称不等式时的中间步骤。
- **场景二（优化问题）**：在约束条件下求表达式的最值。

证明

思路提示

通过因式分解将不等式左边减去右边，化为平方和形式，利用非负性证明。

正式推导

步骤一（构造差值）：

考虑差值 $D = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$。

$$D = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$$

理由：将不等式转化为证明 $D \geq 0$。

步骤二（因式分解）：

利用恒等式分解 D。

$$D = \frac{1}{2}(a+b+c)\left[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\right]$$

理由：这是立方和差的标准因式分解，可通过展开验证。

步骤三（分析符号）：

分析因式中各部分的符号。

$$a+b+c \geq 0, \quad (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \geq 0$$

理由：由于 a, b, c 为非负实数，所以 $a+b+c \geq 0$；平方和总是非负。

步骤四（得出结论）：

因此 $D \geq 0$，即原不等式成立。

$$D \geq 0 \Rightarrow a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$$

理由：非负因子乘积非负。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣

所以对于任意非负实数 a, b, c，有 $a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$，等号当且仅当 $a = b = c$ 时成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 取 $a = 1, b = 2, c = 3$，验证不等式 $a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$ 成立。

解题步骤：

第一步（代入数值）：

将具体值代入左边和右边。

$$a^3 + b^3 + c^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3, \quad 3abc = 3 \times 1 \times 2 \times 3$$

理由： 直接计算各立方项和乘积。

第二步（计算数值）：

分别计算数值。

$$1^3 + 2^3 + 3^3 = 1 + 8 + 27 = 36, \quad 3 \times 1 \times 2 \times 3 = 18$$

理由： 执行算术运算。

第三步（比较大小）：

比较两个结果。

$$36 \geq 18$$

理由： 由于 36 大于 18，不等式成立。

关键结论： **对于这些具体值，不等式成立，符合一般结论。**

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a, b, c > 0$ 且 $abc = 1$，证明 $a^3 + b^3 + c^3 \geq 3$。

解题步骤：

第一步（应用条件）：

由 $abc = 1$，得 $3abc = 3$。

$$3abc = 3 \times 1 = 3$$

理由： 将乘积条件转化为常数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（使用不等式）：

根据原不等式，有 $a^3+b^3+c^3 \geq 3abc$。

$$a^3+b^3+c^3 \geq 3abc$$

理由：直接应用三项立方和不等式。

第三步（代入结论）：

将 $3abc=3$ 代入不等式。

$$a^3+b^3+c^3 \geq 3$$

理由：结合前两步即得所求。

关键结论：在 $abc=1$ 的条件下，$a^3+b^3+c^3$ 的最小值为 3，当且仅当 $a=b=c=1$ 时取到。

易错提醒

易错点一（忽略非负条件）

认为不等式对所有实数 a,b,c 都成立。

正确理解（变量范围）：

不等式仅对非负实数成立，负数时可能反向。

错因分析（符号影响）：

当 a,b,c 为负时，因式分解中 $a+b+c$ 可能为负，导致不等式不成立。

易错点二（取等误解）

认为只要有两个变量相等即可取等号。

正确理解（全等条件）：

等号成立当且仅当 $a=b=c$，三者全相等。

错因分析（对称性误解）：

由于不等式对称，但取等要求平方和为零，必须所有差为零。

易错点三（错误推广）

将不等式推广到 $a^4+b^4+c^4 \geq 3abc$ 或其他幂次。

正确理解（幂次特定）：

该不等式只针对三次方成立，高次需另证。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（形式混淆）：

不同幂次的不等式结构不同，不能直接类比。

结论小结

一句话核心

对于非负实数 a, b, c，有 $a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$，等号当且仅当 $a = b = c$。

使用条件

- **条件 1（非负实数）：** $a, b, c \geq 0$。
- **条件 2（对称结构）：** 表达式为对称立方和与乘积。

关键提醒

- **易错点（符号忽视）：** 使用前务必检查变量是否非负。
- **检查项（取等验证）：** 最值问题中验证等号能否达到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.5 柯西不等式

二级结论

条件

条件 1（实数序列）：

设 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \ldots, b_n$ 是两个实数序列。

结论

结论一（一般形式）：

直观描述： 平方和的乘积不小于乘积和的平方。

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2.$$

推广结论（常见特例）：

直观描述： 二维、三维及向量形式是常用的特例。

$$(a^2+b^2)(c^2+d^2) \geq (ac+bd)^2, \quad (a_1^2+a_2^2+a_3^2)(b_1^2+b_2^2+b_3^2) \geq (a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3)^2.$$

向量形式：$|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 \geq (\vec{a}\cdot\vec{b})^2$。

等号/取等条件： 当且仅当序列 (a_i) 与 (b_i) 成比例，即存在不全为零的实数 λ, μ 使得 $\lambda a_i + \mu b_i = 0$ 对所有 i 成立。

理解说明

一句话直觉

两个序列对应项乘积之和的平方，不会超过各自平方和之积。

核心拆解

要点一（平方和乘积）：

左边是两序列平方和的乘积，体现整体“能量”。

要点二（乘积和平方）：

右边是两序列对应项乘积之和的平方，体现“协同”效应。

几何本质（向量夹角）

若将序列视为向量 $\vec{a} = (a_1, \ldots, a_n), \vec{b} = (b_1, \ldots, b_n)$，则不等式等价于 $(\vec{a}\cdot\vec{b})^2 \leq |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2$，即 $|\cos\theta| \leq 1$，其中 θ 为两向量夹角。

代数意义（判别式非负）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考虑关于 t 的二次函数 $f(t)=\sum(a_it+b_i)^2$，展开后判别式 $\Delta\le 0$，即得不等式。

考点价值（证明与求最值）

- **考法一（证明不等式）**：直接用于证明平方和类不等式。
- **考法二（求解极值）**：通过配凑构造，求含有平方和与乘积和的式子的最值。

顿悟点

柯西不等式本质上是“算术-几何”关系的高维推广：它限制了“混合积”与“纯量积”之间的比例范围。

使用场景

- **场景一（证明平方和不等式）**：当待证不等式可化为两序列平方和乘积与乘积和平方的形式时。
- **场景二（条件极值问题）**：在给定线性约束下，求平方和的最值。

证明

思路提示

构造一个关于 t 的二次函数 $f(t)=\sum_{i=1}^n(a_it+b_i)^2$，由于平方和非负，故判别式 $\Delta\le 0$，由此推出不等式。

正式推导

步骤一（构造函数）：

令

$$f(t)=\sum_{i=1}^n(a_it+b_i)^2\ge 0\quad(\text{对所有实数}t)\square$$

理由：每个 $(a_it+b_i)^2\ge 0$，故和也非负。

步骤二（展开整理）：

将 $f(t)$ 展开：

$$f(t)=\sum_{i=1}^n(a_i^2t^2+2a_ib_it+b_i^2)=\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)t^2+2\left(\sum_{i=1}^n a_ib_i\right)t+\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right).$$

理由：按完全平方公式展开，并利用求和线性性质。

步骤三（判别式非负）：

因为 $f(t)\ge 0$ 对所有 t 成立，所以二次方程 $f(t)=0$ 的判别式 $\Delta\le 0$：

$$\Delta=\left[2\sum_{i=1}^n a_ib_i\right]^2-4\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right)\le 0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：二次函数 $At^2+Bt+C\geq 0$ 恒成立，则 $A>0$ 且 $\Delta\leq 0$。这里 $A=\sum a_i^2\geq 0$，若 $A=0$ 则不等式显然成立，故不妨设 $A>0$。

步骤四（导出不等式）：

由 $\Delta\leq 0$ 直接得到

$$4\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)^2-4\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right)\leq 0,$$

即

$$\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)^2\leq\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right).$$

理由：移项并除以正数 4 即得。

步骤五（取等条件）：

等号成立当且仅当 $f(t)=0$ 有唯一实根，即存在 t_0 使 $a_it_0+b_i=0$ 对所有 i 成立，亦即序列 (a_i) 与 (b_i) 成比例。

理由：$\Delta=0$ 时方程有重根 t_0，此时 $a_it_0+b_i=0$，即 a_i 与 b_i 成比例。

结论回扣

因此，柯西不等式得证，且等号成立当且仅当两序列成比例。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知实数 a,b,c,d，求证：$(a^2+b^2)(c^2+d^2)\geq(ac+bd)^2$。

解题步骤：

第一步（识别序列）：

将不等式左边视为两个序列的平方和乘积：序列一为 (a,b)，序列二为 (c,d)。

理由：柯西不等式要求两个序列，这里恰好对应。

第二步（直接应用）：

由柯西不等式（$n=2$ 情形）：

$$(a^2+b^2)(c^2+d^2)\geq(ac+bd)^2.$$

理由：直接代入，左边平方和乘积，右边对应项乘积和的平方。

第三步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $\frac{a}{c}=\frac{b}{d}$（当 c,d 不全为零时），即 $ad=bc$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： 两序列成比例，即存在 λ 使 $(a,b)=\lambda(c,d)$。

关键结论： **二维形式的柯西不等式直接得证，无需额外计算。**

例 2（稍变形）

题目： 已知正实数 x,y,z 满足 $x+y+z=1$，求 $x^2+y^2+z^2$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（构造序列）：

考虑两个序列：(x,y,z) 和 $(1,1,1)$。

理由： 欲求 $x^2+y^2+z^2$，而条件为 $x+y+z=1$，联想到柯西不等式左边为平方和与另一序列平方和的乘积。

第二步（应用柯西）：

由柯西不等式：

$$(x^2+y^2+z^2)(1^2+1^2+1^2)\geq(x\cdot1+y\cdot1+z\cdot1)^2=(x+y+z)^2=1^2=1.$$

理由： 将不等式写成柯西形式：左边为 $\sum a_i^2\cdot\sum b_i^2$，右边为 $(\sum a_ib_i)^2$。

第三步（解出最值）：

由上式得

$$3(x^2+y^2+z^2)\geq1\quad\Rightarrow\quad x^2+y^2+z^2\geq\frac{1}{3}.$$

理由： 移项即可得到平方和的下界。

第四步（验证取等）：

等号成立当且仅当 $\frac{x}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z}{1}$，即 $x=y=z$，结合 $x+y+z=1$ 得 $x=y=z=\frac{1}{3}$。

理由： 序列成比例，且满足条件，故最小值可达。

关键结论： **当 $x=y=z=\frac{1}{3}$ 时，$x^2+y^2+z^2$ 取得最小值 $\frac{1}{3}$。**

易错提醒

易错点一（忽略取等条件）

使用柯西不等式时，只写出不等式形式，不检查等号是否成立。

正确理解（成比例才取等）：

等号成立当且仅当两个序列成比例，即 a_i/b_i 为常数（b_i 不全为零）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（记忆不完整）：

只记住了不等式的主体，忽略了取等条件，导致求最值时误判最值点。

易错点二（结构误配）

错误地将两个序列的项配对，例如将 (a_1, a_2) 与 (b_2, b_1) 配对，导致右边不是对应项乘积和。

正确理解（对应项相乘）：

右边必须是同一下标项的乘积之和 $\sum a_i b_i$，不能随意交换顺序。

错因分析（形式混淆）：

与排序不等式等其他不等式混淆，未理解“对应项”的含义。

易错点三（向量形式记反）

误将向量形式的柯西不等式记为 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \geq |\vec{a}||\vec{b}|$。

正确理解（内积不大于模积）：

正确的形式是 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}|$，即内积的绝对值不超过模的乘积。

错因分析（直观错觉）：

误以为点积越大越好，而忽略了夹角余弦的绝对值不大于 1。

结论小结

一句话核心

平方和的乘积不小于乘积和的平方。

使用条件

- **条件 1（实数序列）**：涉及两个实数序列，且序列长度相同。
- **条件 2（平方和存在）**：序列的平方和有限（通常为有限项）。

关键提醒

- **易错点（取等条件）**：等号成立仅当两序列成比例，检查是否满足比例关系。
- **检查项（结构匹配）**：应用时确保右边是同一下标对应项乘积之和的平方。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.6 权方和不等式

二级结论

条件

条件 1（实数变量）：

$a_i \in \mathbb{R}$（$i = 1, 2, \ldots, n$）为任意实数。

条件 2（正分母）：

$b_i > 0$（$i = 1, 2, \ldots, n$）为正实数。

条件 3（指数范围）：

实数 $m \geq 1$。

结论

结论一（二维形式）：

直观描述： 两个分式平方和大于等于和的平方除以分母和。

$$\frac{a_1^2}{b_1} + \frac{a_2^2}{b_2} \geq \frac{(a_1 + a_2)^2}{b_1 + b_2}$$

结论二（一般形式）：

直观描述： n 个分式平方和大于等于总和的平方除以分母总和。

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i^2}{b_i} \geq \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{n} b_i}$$

推广结论（m 次形式）：

直观描述： 将平方推广到 m 次方，分母指数为 m-1。

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i^m}{b_i^{m-1}} \geq \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^m}{\left(\sum_{i=1}^{n} b_i\right)^{m-1}}$$

等号/取等条件： 当且仅当 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n}$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉

权方和不等式将分式的平方和与总和的平方联系起来，是柯西-施瓦茨不等式的加权推广。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（结构对称）：

不等式左右两边结构对称，左边是分式平方和，右边是和的平方除以分母和。

要点二（权重影响）：

分母 b_i 作为权重，影响不等式的强度；b_i 越大，对应项贡献越小。

要点三（指数推广）：

推广形式将平方推广到 m 次方，分母指数相应调整为 $m-1$，保持齐次性。

几何本质（向量投影）

在向量空间中，权方和不等式可以解释为加权内积下的柯西-施瓦茨不等式。设向量 $\mathbf{a}=(a_1,\ldots,a_n)$，权重向量 $\mathbf{b}=(b_1,\ldots,b_n)$，则不等式反映加权模长关系。

代数意义（柯西推广）

代数上，当 $b_i=1$ 时，权方和不等式退化为柯西-施瓦茨不等式 $\sum a_i^2 \geq \frac{(\sum a_i)^2}{n}$。一般形式是柯西-施瓦茨的加权版本，推广形式是 Hölder 不等式的特例。

考点价值（最值证明）

- **考法一（直接求最值）：**题目给出分式平方和形式，直接应用不等式求最小值。
- **考法二（变形后应用）：**需要将原式变形为权方和结构，如凑出分母或调整指数。

顿悟点

当遇到分式平方和（或更高次）且分母为正时，立即联想权方和不等式，可能简化计算或直接得最值。

使用场景

- **场景一（最值问题）：**求形如 $\sum \frac{a_i^2}{b_i}$ 表达式的最小值，已知 a_i 和 b_i 的关系。
- **场景二（不等式证明）：**证明涉及分式平方和的不等式，通过权方和放缩。

证明

思路提示

通过构造柯西-施瓦茨不等式的形式，将权方和不等式转化为已知不等式。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（构造平方和）：

定义 $u_i = \dfrac{a_i}{\sqrt{b_i}}$ 和 $v_i = \sqrt{b_i}$。

$$u_i = \frac{a_i}{\sqrt{b_i}}, \quad v_i = \sqrt{b_i} \quad (i = 1, 2, \ldots, n)$$

理由：这样构造使得 $u_i^2 = \frac{a_i^2}{b_i}$，且 $v_i^2 = b_i$，便于应用柯西-施瓦茨。

步骤二（应用柯西）：

对 u_i 和 v_i 应用柯西-施瓦茨不等式。

$$\left(\sum_{i=1}^{n} u_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} v_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} u_i v_i\right)^2$$

理由：柯西-施瓦茨不等式对于实数序列成立。

步骤三（代入计算）：

将 u_i 和 v_i 的表达式代入。

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n} u_i^2 &= \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i^2}{b_i}, \\
\sum_{i=1}^{n} v_i^2 &= \sum_{i=1}^{n} b_i, \\
\sum_{i=1}^{n} u_i v_i &= \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{a_i}{\sqrt{b_i}} \cdot \sqrt{b_i}\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i.
\end{aligned}$$

理由：直接计算各项和。

步骤四（得到不等式）：

代入后，柯西-施瓦茨不等式变为：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i^2}{b_i}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2$$

理由：将步骤三的结果代入步骤二的不等式。

步骤五（整理形式）：

由于 $\sum b_i > 0$，两边除以 $\sum b_i$ 得到权方和不等式。

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i^2}{b_i} \geq \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{n} b_i}$$

理由：不等号方向不变，因为除以正数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤六（取等条件）：

等号成立当且仅当柯西-施瓦茨等号成立，即 u_i 与 v_i 成比例。

$$\frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2} = \cdots = \frac{u_n}{v_n}$$

代入 $u_i = \frac{a_i}{\sqrt{b_i}}, v_i = \sqrt{b_i}$，得 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n}$。

理由：柯西-施瓦茨等号条件为序列成比例。

结论回扣

通过柯西-施瓦茨不等式，我们证明了权方和不等式的一般形式，并明确了取等条件。推广形式可通过类似方法或数学归纳法证明。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $a, b, c > 0$，且 $a + b + c = 1$，求 $\dfrac{a^2}{b} + \dfrac{b^2}{c} + \dfrac{c^2}{a}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

表达式为 $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a}$，符合权方和不等式的一般形式。

理由：分子平方，分母一次，且分母为正。

第二步（应用不等式）：

由权方和不等式，有

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq \frac{(a+b+c)^2}{b+c+a}$$

理由：直接应用，其中 $a_1 = a, a_2 = b, a_3 = c$，$b_1 = b, b_2 = c, b_3 = a$。

第三步（代入计算）：

已知 $a + b + c = 1$，且分母和 $b + c + a = 1$，所以

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq \frac{1^2}{1} = 1$$

理由：将条件代入不等式右边。

第四步（取等检查）：

等号成立当且仅当 $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{a}$，结合 $a + b + c = 1$，可得 $a = b = c = \frac{1}{3}$。

理由：验证取等条件，确保最小值可达。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 最小值为 1，当且仅当 $a=b=c=\frac{1}{3}$ 时取到。

例 2（稍变形）

题目： 设 $x,y,z>0$，证明 $\dfrac{x^2}{y+z}+\dfrac{y^2}{z+x}+\dfrac{z^2}{x+y}\geq\dfrac{x+y+z}{2}$。

解题步骤：

第一步（分母变形）：

注意到分母 $y+z,z+x,x+y$ 不是单个变量，但可视为权方和中的 b_i。

理由： 权方和不等式要求 $b_i>0$，这里分母满足条件。

第二步（应用权方和）：

由权方和不等式，

$$\frac{x^2}{y+z}+\frac{y^2}{z+x}+\frac{z^2}{x+y}\geq\frac{(x+y+z)^2}{(y+z)+(z+x)+(x+y)}$$

理由： 将 x,y,z 视为 a_i，$y+z,z+x,x+y$ 视为 b_i。

第三步（计算分母和）：

分母和为 $(y+z)+(z+x)+(x+y)=2(x+y+z)$。

$$\frac{(x+y+z)^2}{2(x+y+z)}=\frac{x+y+z}{2}$$

理由： 简化表达式。

第四步（得到不等式）：

因此，

$$\frac{x^2}{y+z}+\frac{y^2}{z+x}+\frac{z^2}{x+y}\geq\frac{x+y+z}{2}$$

理由： 结合步骤二和步骤三。

第五步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $\frac{x}{y+z}=\frac{y}{z+x}=\frac{z}{x+y}$。在正数条件下，这等价于 $x=y=z$。

理由： 权方和等号条件，代入具体变量。

关键结论： 不等式成立，等号当 $x=y=z$ 时取得。

易错提醒

易错点一（忽略分母正负）

误以为 b_i 可为任意实数，忽略 $b_i>0$ 的条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（分母必正）：

权方和不等式成立的前提是 $b_i > 0$，否则不等式可能不成立或方向改变。

错因分析（依赖正性）：

证明过程中需要 b_i 为正以保证开方、除以和等操作不改变不等号方向。

易错点二（指数混淆）

在推广形式中，错误地让分子分母指数相同，如写成 $\sum \frac{a_i^m}{b_i^m}$。

正确理解（指数差一）：

推广形式为 $\sum \frac{a_i^m}{b_i^{m-1}}$，分母指数比分子少 1，以保持齐次性。

错因分析（齐次性遗忘）：

不等式左右两边应具有相同的次数，推广形式中左边次数为 $m-(m-1)=1$，右边为 $m-(m-1)=1$，保持齐次。

易错点三（取等忽略）

应用不等式求最值时，仅得到下界，未验证等号是否成立。

正确理解（等号验证）：

权方和不等式等号成立当且仅当 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n}$，必须检查此条件是否可达。

错因分析（最值漏验）：

若取等条件与约束矛盾，则最值不可达，需改用其他方法。

结论小结

一句话核心

权方和不等式将分式平方和与总和的平方联系起来，是求最值和证明不等式的有效方法。

使用条件

- **条件 1（实数变量）：** a_i 为任意实数。
- **条件 2（正分母）：** $b_i > 0$ 必须严格成立。
- **条件 3（指数范围）：** $m \geq 1$，通常 m 为整数或实数。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **易错点（分母正负）**：务必检查 $b_i > 0$，否则不等式不适用。
- **检查项（取等条件）**：应用后必须验证 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n}$ 是否可达。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.7 绝对值三角不等式

二级结论

条件

条件 1（实数变量）：

设 a, b 为任意实数。

结论

结论一（双边不等式）：

直观描述： 两数和的绝对值被夹在它们绝对值之差的绝对值与和之间。

$$\big||a|-|b|\big| \le |a+b| \le |a|+|b|.$$

推广结论（多实数形式）：

直观描述： 多个实数和的绝对值不超过各自绝对值之和。

$$|a_1+a_2+\cdots+a_n| \le |a_1|+|a_2|+\cdots+|a_n|.$$

等号/取等条件： 左边等号 $\big||a|-|b|\big| = |a+b|$ 当且仅当 $ab \le 0$；右边等号 $|a+b| = |a|+|b|$ 当且仅当 $ab \ge 0$。对于 n 个实数，等号成立当且仅当所有 a_i 同号或至少有一个为零。

理解说明

一句话直觉

绝对值三角不等式是“三角形两边之和大于第三边”在数轴上的代数版本，它限制了实数和的绝对值范围。

核心拆解

要点一（下界控制）：

左边不等式 $\big||a|-|b|\big| \le |a+b|$ 保证了两数和的绝对值不小于它们绝对值之差的绝对值。

要点二（上界控制）：

右边不等式 $|a+b| \le |a|+|b|$ 保证了两数和的绝对值不超过它们绝对值之和。

几何本质（距离关系）

在数轴上，$|a|$ 表示 a 到原点的距离。$|a+b|$ 可以视为 a 与 $-b$ 的距离，而 $|a|+|b|$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

是两段距离之和，$\big||a|-|b|\big|$ 是两段距离之差的绝对值。不等式反映了“两点间直线段最短”的思想。

代数意义（运算约束）

绝对值运算不满足线性，但此不等式给出了其与加法运算的一种线性约束：和的绝对值被绝对值之和控制，且受差值绝对值限制。

考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接应用）**：在证明题中直接使用该不等式放缩。
- **考法二（最值求解）**：利用不等式求含绝对值的表达式的最值或范围。

顿悟点

等号成立条件与实数的符号密切相关：当 a 与 b 异号时，左边等号成立；当 a 与 b 同号时，右边等号成立。这揭示了绝对值运算与符号的内在联系。

使用场景

- **场景一（比较大小）**：需要比较 $|a+b|$ 与 $|a|+|b|$ 或 $\big||a|-|b|\big|$ 的大小时。
- **场景二（估计范围）**：当已知 $|a|,|b|$ 的范围时，估计 $|a+b|$ 的可能范围。

证明

思路提示

通过平方去掉绝对值，将不等式转化为平方的非负性证明，然后讨论等号成立条件。

正式推导

步骤一（平方变形）：

考虑 $|a+b|^2$ 与 $(|a|+|b|)^2$ 的比较。

$$|a+b|^2=(a+b)^2=a^2+2ab+b^2.$$

理由：绝对值的平方等于原数的平方。

步骤二（展开右边）：

计算 $(|a|+|b|)^2$。

$$(|a|+|b|)^2=|a|^2+2|a||b|+|b|^2=a^2+2|ab|+b^2.$$

理由：$|a|^2=a^2$，且 $|a||b|=|ab|$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（比较差值）：

比较两者之差。

$$(|a|+|b|)^2-|a+b|^2=(a^2+2|ab|+b^2)-(a^2+2ab+b^2)=2(|ab|-ab).$$

理由：相减后化简。

步骤四（判断非负）：

由于 $|ab|\geq ab$ 恒成立，因此 $|ab|-ab\geq 0$。

$$(|a|+|b|)^2-|a+b|^2=2(|ab|-ab)\geq 0.$$

理由：绝对值的定义保证了 $|x|\geq x$ 对所有实数 x 成立。

步骤五（得出右边不等式）：

由平方非负，得 $|a+b|^2\leq(|a|+|b|)^2$，开方后得到 $|a+b|\leq|a|+|b|$。

$$|a+b|\leq|a|+|b|.$$

理由：平方函数在非负数上单调递增。

步骤六（左边不等式证明）：

利用右边不等式，将 a 替换为 $a-b$，可得 $|a|\leq|a-b|+|b|$，从而 $|a|-|b|\leq|a-b|$。同理 $|b|-|a|\leq|a-b|$，所以 $\big||a|-|b|\big|\leq|a-b|$。再令 b 为 $-b$，即得 $\big||a|-|b|\big|\leq|a+b|$。

$$\big||a|-|b|\big|\leq|a+b|.$$

理由：通过变量替换和对称性推导。

步骤七（等号条件）：

右边等号成立当 $|ab|=ab$，即 $ab\geq 0$；左边等号成立需在推导中取等，即 $ab\leq 0$。

理由：从差值 $2(|ab|-ab)$ 为零可得 $ab\geq 0$；左边等号当 a 与 b 异号时成立。

结论回扣

综上所述，我们证明了对于任意实数 a,b，有 $\big||a|-|b|\big|\leq|a+b|\leq|a|+|b|$，并明确了等号成立的条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $|x| \le 2$，$|y| \le 3$，求 $|x+y|$ 的最大值。

解题步骤：

第一步（应用不等式）：

由绝对值三角不等式，有 $|x+y| \le |x| + |y|$。

理由： 直接使用右边不等式。

第二步（代入范围）：

因为 $|x| \le 2$，$|y| \le 3$，所以 $|x| + |y| \le 2 + 3 = 5$。

$$|x+y| \le |x| + |y| \le 5.$$

理由： 利用已知条件进行放缩。

第三步（取等检查）：

当 x 与 y 同号且 $|x| = 2, |y| = 3$ 时，等号成立，例如 $x = 2, y = 3$。

理由： 右边等号成立条件是 $xy \ge 0$，且绝对值取到上界。

关键结论： **$|x+y|$ 的最大值为 5，当 x 与 y 同号且分别取 2 和 3 时达到。**

例 2（稍变形）

题目： 证明对于任意实数 a, b，有 $|a-b| \ge \big||a| - |b|\big|$。

解题步骤：

第一步（变量替换）：

在绝对值三角不等式中，令 b 替换为 $-b$。

$$\big||a| - |-b|\big| \le |a + (-b)| \le |a| + |-b|.$$

理由： $|-b| = |b|$，且 $a + (-b) = a - b$。

第二步（简化）：

由于 $|-b| = |b|$，左边不等式变为 $\big||a| - |b|\big| \le |a-b|$。

$$\big||a| - |b|\big| \le |a-b|.$$

理由： 直接代入化简。

第三步（得出结论）：

因此，$|a-b| \ge \big||a| - |b|\big|$ 成立。

理由： 不等式方向不变。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 对于任意实数 a, b，有 $|a-b| \geq \big||a|-|b|\big|$，这是绝对值三角不等式的直接推论。

易错提醒

易错点一（忽略等号条件）

在使用不等式时，只记住形式，忽略等号成立的条件。

正确理解（条件记忆）：

等号成立取决于实数的符号：左边等号当 $ab \leq 0$，右边等号当 $ab \geq 0$。

错因分析（记忆不全）：

学生常只背不等式，不背等号条件，导致解题时无法确定取最值的情形。

易错点二（减法误用）

错误认为 $|a-b| \leq |a|-|b|$ 或类似的不等式恒成立。

正确理解（减法转化）：

减法可视为加负数，即 $|a-b| = |a+(-b)|$，从而应用三角不等式得到 $|a-b| \leq |a|+|b|$ 和 $|a-b| \geq \big||a|-|b|\big|$。

错因分析（符号混淆）：

未将减法转化为加法，直接套用公式导致错误。

易错点三（多实数同号）

对于 n 个实数的情形，错误认为等号成立需要所有数非零且同号。

正确理解（同号或零）：

等号成立当且仅当所有 a_i 同号（全正或全负）或至少有一个为零。

错因分析（条件过严）：

忽略了“至少有一个为零”的情况，导致判断错误。

结论小结

一句话核心

绝对值三角不等式给出了实数和的绝对值的上下界，是连接绝对值与加法运算的重要桥梁。

使用条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 1（实数变量）**：涉及实数及其绝对值。
- **条件 2（任意个数）**：适用于两个或更多个实数。

关键提醒

- **易错点（等号条件）**：务必牢记等号成立的条件，它与实数的符号相关。
- **检查项（符号一致性）**：应用不等式时，检查实数的符号以确定是否取等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.8 均值不等式链（HM≤GM≤AM≤QM）

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

$a, b \in \mathbb{R}^+$（a 和 b 均为正实数）。

结论

结论一（四均值不等式链）：

直观描述：两个正实数的四种平均数存在确定的大小序关系。

$$\begin{aligned}\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} &\le \sqrt{ab}\\ &\le \frac{a+b}{2}\\ &\le \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}.\end{aligned}$$

推广结论（n 元不等式链）：

直观描述：对于 n 个正实数，四种平均数之间亦有类似序关系。

$$\begin{aligned}\frac{n}{\frac{1}{x_1}+\cdots+\frac{1}{x_n}} &\le \sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n}\\ &\le \frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\\ &\le \sqrt{\frac{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2}{n}}.\end{aligned}$$

等号/取等条件：所有不等式中等号成立当且仅当所有变量相等（二元时即 $a=b$）。

理解说明

一句话直觉 四个平均数依次变大，像四层台阶，调和平均数（HM）最矮，平方平均数（QM）最高，几何平均数（GM）和算术平均数（AM）居中。

核心拆解

要点一（全序关系）：

四个平均数间具有 $HM \le GM \le AM \le QM$ 的完全顺序。

要点二（取等条件）：

所有等号同时成立，唯一的条件就是 $a=b$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（传递性）：

由不等式链可知，任意不相邻平均数之间的大小关系也成立，例如 $HM \leq AM$。

几何本质（直观图示） 可以在同一个半圆（半径 R）中构造这四种平均数：直径两端对应 a 和 b，则 AM 为半径，GM 为垂直于直径的弦长，HM 与 QM 也有对应的几何线段表示。不等式链反映了这些几何线段的长短关系。

代数意义（比较基准） 每种平均数代表不同的“平均”方式：调和平均偏小（对小数敏感），几何平均看乘积，算术平均最常用，平方平均对大的数敏感。不等式链为不同场景下的“平均”提供了统一的比较基准。

考点价值（经典不等式）

- **考法一（最值估计）**：用于估计表达式（如和、积、倒数和、平方和）的取值范围。
- **考法二（比较大小）**：直接比较四种平均数的数值大小。
- **考法三（证明题链）**：作为中间桥梁，连接其他不等式（如柯西、琴生）。

顿悟点 **这不仅是四个不等式，而是一个紧密联系的“链条”。**证明了其中一个不等式（如 $GM \leq AM$），可以借助它去推导相邻的其他不等式（如 $HM \leq GM$ 可通过倒数变形得到），形成完整的证明闭环。

使用场景

- **场景一（优化求最值）**：已知某些和（或积）为定值，求另一表达式的最值。
- **场景二（放缩比较）**：需要将复杂表达式放大或缩小时，选择合适的平均数作为中间量。
- **场景三（综合证明）**：与函数单调性、导数、几何图形结合，证明综合性不等式。

证明

思路提示 先独立证明核心部分 $GM \leq AM$（基本不等式），再利用倒数关系和平方关系，依次向两端（HM 和 QM）延伸，最终串联成链。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（证明 GM≤AM）：

由基本不等式 $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \geq 0$ 展开可得。

$$\begin{aligned}(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 &\geq 0\\ a-2\sqrt{ab}+b &\geq 0\\ a+b &\geq 2\sqrt{ab}\\ \frac{a+b}{2} &\geq \sqrt{ab}.\end{aligned}$$

理由：完全平方的非负性是基本不等式的来源。等号成立当且仅当 $\sqrt{a}=\sqrt{b}$，即 $a=b$。

步骤二（证明 HM≤GM）：

对上一步结论 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 中的 a, b 同时取倒数，并利用不等式方向不变的性质。

$$\begin{aligned}\text{令}a' = \frac{1}{a},\ b' = \frac{1}{b} \quad (a', b' > 0)\\ \frac{a'+b'}{2} &\geq \sqrt{a'b'}\\ \frac{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}{2} &\geq \sqrt{\frac{1}{ab}} = \frac{1}{\sqrt{ab}}\\ \frac{1}{a}+\frac{1}{b} &\geq \frac{2}{\sqrt{ab}}\\ \frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} &\leq \sqrt{ab}.\end{aligned}$$

理由：正实数的倒数仍是正实数，不等式两边同时取倒数（并注意不等号方向因正数而反向）。

步骤三（证明 AM≤QM）：

再次利用平方非负性 $(a-b)^2 \geq 0$ 的变形。

$$\begin{aligned}(a-b)^2 &\geq 0\\ a^2-2ab+b^2 &\geq 0\\ a^2+b^2 &\geq 2ab\\ 2(a^2+b^2) &\geq a^2+2ab+b^2\\ 2(a^2+b^2) &\geq (a+b)^2\\ \frac{(a+b)^2}{4} &\leq \frac{a^2+b^2}{2}\\ \frac{a+b}{2} &\leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：从 $(a-b)^2 \geq 0$ 出发，逐步配凑出 $(a+b)^2$ 与 a^2+b^2 的关系，最后开方（注意两边均为正，开方保序）。

结论回扣 综合步骤一、二、三，我们得到了完整的不等式链：$\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$。每一步的取等条件均为 $a=b$，故整个不等式链等号成立当且仅当 $a=b$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x>0, y>0$，且 $x+y=6$，求 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（联系调和平均）：

识别所求为两数倒数和，与调和平均数 $HM = \frac{2}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}$ 有关。

理由：由 HM 定义直接可得 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y} = \frac{2}{HM}$。

第二步（利用不等式链）：

由 $HM \leq AM$ 建立关系。

$$HM \leq AM$$
$$\frac{2}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}} \leq \frac{x+y}{2}.$$

理由：已知 $x+y=6$，代入上式。

第三步（求解最小值）：

代入已知条件并变形。

$$\frac{2}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}} \leq \frac{6}{2} = 3$$
$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y} \geq \frac{2}{3}.$$

理由：不等式两边均为正，取倒数时不等号方向改变。

关键结论： 当且仅当 $x=y=3$ 时等号成立，故 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 的最小值为 $\frac{2}{3}$。

例 2（稍变形）

题目： 设 $a>0, b>0$，证明：$\sqrt{ab}\cdot\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \geq \frac{a+b}{2}\cdot\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}$。

解题步骤：

第一步（识别平均数）：

将不等式各因子用四种平均数表示。

$$\text{左端} = GM\cdot QM, \quad \text{右端} = AM\cdot HM.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：根据定义直接写出。

第二步（应用不等式链）：

由 $HM \le GM \le AM \le QM$，尝试比较 $GM \cdot QM$ 与 $AM \cdot HM$。

$$GM \ge HM$$
$$QM \ge AM$$

理由：由已知不等式链直接得出这两个单独的不等式。

第三步（相乘并判断方向）：

将上一步两个同向不等式相乘。

$$(GM) \cdot (QM) \ge (HM) \cdot (AM)$$
$$\sqrt{ab} \cdot \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \ge \frac{a+b}{2} \cdot \frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}.$$

理由：因为两边各项均为正数，同向不等式可以相乘，不等号方向不变。

关键结论： 原不等式得证，等号成立当且仅当 $a = b$。

易错提醒

易错点一（负数参与）

误以为 a, b 可以是任意实数，直接套用公式。

正确理解（正数前提）：

不等式链成立的前提是 a, b 均为正实数。若为负或零，结论可能不成立。

错因分析（定义域忽略）：

调和平均与几何平均在非正数下可能无定义或无实数结果，且证明过程中的开方、倒数运算依赖正数条件。

易错点二（等号条件混淆）

认为不等式链中每个不等式的等号可以独立成立。

正确理解（同步取等）：

所有等号成立的条件是同一个：$a = b$。四个不等式要么同时取等，要么同时不取等。

错因分析（链条整体性）：

不等式链是一个整体，其证明过程依赖于相邻不等式，等号传递条件一致。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（盲目放缩）

解题时任意截取不等式链的一部分进行放缩，忽略方向导致错误。

正确理解（定向使用）：

必须根据需求（需要放大还是缩小）选择合适的不等式。例如，要用一个更大的数替代 AM，只能选 QM，而不能选 GM 或 HM。

错因分析（方向感缺失）：

未牢记 $HM \leq GM \leq AM \leq QM$ 的顺序，误将小的数用来放大目标，或将大的数用来缩小目标。

结论小结

一句话核心 **两个正实数的四种平均数（调和、几何、算术、平方）满足 $HM \leq GM \leq AM \leq QM$ 的固定大小顺序，等号成立当且仅当两数相等。**

使用条件

- **条件 1（变量为正）：**所有涉及的变量必须是正实数（> 0）。
- **条件 2（二元或多元）：**结论对两个或多个正实数均成立，但多元形式更复杂。

关键提醒

- **易错点（方向记牢）：**务必牢记顺序 $HM \leq GM \leq AM \leq QM$，放缩时方向不能反。
- **检查项（取等一致）：**检查等号成立条件是否始终为所有变量相等。
- **检查项（正数验证）：**应用前先确认所有变量为正数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.9 三元均值不等式

二级结论

条件

条件 1（非负实数）：

变量 a, b, c 都是非负实数，即 $a \geq 0, b \geq 0, c \geq 0$。

结论

结论一（三元均值不等式）：

直观描述： 三个数的算术平均值不小于它们的几何平均值。

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$$

推广结论（等价形式）：

直观描述： 该不等式有几种常用且等价的表述形式。

$$a+b+c \geq 3\sqrt[3]{abc} \quad \text{或} \quad abc \leq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3$$

等号/取等条件： 当且仅当三个数相等，即 $a = b = c$ 时，不等式中的等号成立。

理解说明

一句话直觉 大的（算术）平均数总是不小于小的（几何）平均数，当三个数一样大时两者才相等。

核心拆解

要点一（非负前提）：

条件是 $a, b, c \geq 0$，几何平均 $\sqrt[3]{abc}$ 才有意义（避免开偶次方出现负数）。

要点二（取等唯一）：

等号成立条件非常严格，必须 $a = b = c$，这是判断使用是否恰当的关键。

几何本质（固定体积） 在三维空间里，若一个长方体的长、宽、高分别为 a, b, c，则其体积为 abc，其所有棱长之和与 $a+b+c$ 相关。当体积 abc 固定时，立方体（即 $a = b = c$ 时）的表面积或棱长和是最小的。这个不等式体现了这种“等周”性质。

代数意义（齐次对称） 不等式左右两边的表达式都是关于 a, b, c 的齐一次式（$a+b+c$）和齐三次式（$\sqrt[3]{abc}$ 乘上系数后），并且是对称的（交换 a, b, c 位置不变）。这种对称性常意味着在相等时取到最值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（最值放缩）

- **考法一（和积互求最值）**：已知 $a+b+c$ 为定值，可求 abc 的最大值；已知 abc 为定值，可求 $a+b+c$ 的最小值。
- **考法二（不等式链条）**：作为基本不等式链条 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc} \geq \frac{3}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}}$（$a,b,c>0$）的核心一环，用于多步放缩证明复杂不等式。

顿悟点 **“一正，二定，三相等”**——这是使用所有均值不等式（包括二元和三元）的口诀。正数条件是前提；和为定值或积为定值是应用目标；检查取等条件是验证结果正确性的必经步骤。

使用场景

- **场景一（求解最值）**：当题目中条件和所求可以凑成 $a+b+c$ 与 abc 的定值关系时，直接应用。
- **场景二（证明不等式）**：作为放缩的基础工具，用于将和的形式转化为积的形式，或反之，从而简化比较。

证明

思路提示 采用分析法，从要证的结论 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ 出发，通过两边同时立方去根号，进行代数变形，最终化为一个显然成立的非负表达式 $(p^2+q^2+r^2) \geq 0$ 的形式，从而倒推证明原不等式成立。

正式推导

步骤一（去根号立方）：

要证 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$，由于两边非负，等价于证明两边同时立方后不等式方向不变。

$$\left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3 \geq abc$$

理由： 立方运算在非负实数范围内是保序的（单调递增）。

步骤二（通分移项）：

将上一步的式子两边乘以 27 以消去分母，并将所有项移到同一边。

$$(a+b+c)^3 \geq 27abc$$

$$(a+b+c)^3 - 27abc \geq 0$$

理由： 这是一个等价变形，目的是得到一个便于分解因式的多项式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（展开并配方）：

展开 $(a+b+c)^3$ 并尝试分组配成完全平方。这是一个关键配方技巧。

$$a^3+b^3+c^3+3a^2b+3ab^2+3a^2c+3ac^2+3b^2c+3bc^2+6abc-27abc\geq 0$$
$$a^3+b^3+c^3+3a^2b+3ab^2+3a^2c+3ac^2+3b^2c+3bc^2-21abc\geq 0$$

理由： 展开立方公式 $(x+y+z)^3=x^3+y^3+z^3+3x^2y+3xy^2+3x^2z+3xz^2+3y^2z+3yz^2+6xyz$，然后合并 $-27abc$ 与 $+6abc$。

步骤四（巧用因式分解）：

利用已知的因式分解公式 $a^3+b^3+c^3-3abc=\frac{1}{2}(a+b+c)[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]$。对上一步的式子进行拆分重组。

$$(a^3+b^3+c^3-3abc)+3(a^2b+ab^2+a^2c+ac^2+b^2c+bc^2-6abc)\geq 0$$
$$\frac{1}{2}(a+b+c)[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]$$
$$+\ 3[ab(a+b-2c)+ac(a+c-2b)+bc(b+c-2a)]\geq 0$$

进一步处理括号内的项，例如 $a+b-2c=(a-c)+(b-c)$，可以重新配成完全平方。最终可以证得整个表达式能写为若干个完全平方和的非负组合。**另一种更简洁的经典证法**是令 $x=\sqrt[3]{a},y=\sqrt[3]{b},z=\sqrt[3]{c}$，则原不等式化为 $x^3+y^3+z^3\geq 3xyz$，而这由步骤四的分解公式直接可得。

$$x^3+y^3+z^3-3xyz=\frac{1}{2}(x+y+z)[(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2]\geq 0$$

理由： 由于 $a,b,c\geq 0$，故 $x,y,z\geq 0$，从而 $x+y+z\geq 0$，且平方项 $(x-y)^2$ 等均非负，故整个式子非负，原不等式得证。

结论回扣 **我们证明了** $(x^3+y^3+z^3-3xyz)\geq 0$，**即** $\frac{x^3+y^3+z^3}{3}\geq xyz$，**代回** $x^3=a,y^3=b,z^3=c$，**恰好就是** $\frac{a+b+c}{3}\geq\sqrt[3]{abc}$。并且，从分解式 $\frac{1}{2}(x+y+z)[(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2]\geq 0$ 可以看出，等号成立当且仅当 $x=y=z$，即 $a=b=c$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x>0,y>0,z>0$，且 $x+y+z=6$，求 xyz 的最大值。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（应用三元均值）：

对正数 x, y, z 直接应用三元均值不等式。

$$\frac{x+y+z}{3} \geq \sqrt[3]{xyz}$$

理由： 题目满足“一正”（$x, y, z > 0$），且和为定值，符合应用条件。

第二步（代入定值）：

将已知条件 $x+y+z=6$ 代入不等式左边。

$$\frac{6}{3} \geq \sqrt[3]{xyz} \quad \Rightarrow \quad 2 \geq \sqrt[3]{xyz}$$

理由： 这是简单的算术运算。

第三步（解出最大值）：

对不等式 $2 \geq \sqrt[3]{xyz}$ 两边同时立方，得到 xyz 的上界。

$$xyz \leq 2^3 = 8$$

理由： 立方运算在非负实数上单调递增，不等号方向不变。

第四步（验证取等）：

检查等号成立条件。均值不等式等号成立当且仅当 $x = y = z$。结合 $x+y+z=6$，可得 $x=y=z=2$。

$$\text{当} x=y=z=2 \text{ 时，} xyz = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

理由： 存在这样一组正数使得等号成立，因此求出的上界 8 是能够取到的最大值。

关键结论：在 $x+y+z=6$ 的条件下，xyz 的最大值为 8，当且仅当 $x=y=z=2$ 时取得。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a>0, b>0, c>0$，求证：$(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right) \geq 9$。

解题步骤：

第一步（分别应用均值）：

对 a, b, c 和 $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ 分别应用三元均值不等式。

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}, \quad \frac{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}}{3} \geq \sqrt[3]{\frac{1}{abc}}$$

理由： 因为 $a, b, c > 0$，所以 $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ 也大于 0，满足正数条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（改写不等式）：

将上一步得到的两个不等式分别变形。

$$a+b+c \geq 3\sqrt[3]{abc}, \quad \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} \geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{abc}} = \frac{3}{\sqrt[3]{abc}}$$

理由：这是简单的移项和化简，目的是得到题目中左式两部分的下界。

第三步（两式相乘）：

将得到的两式左边相乘，右边相乘。

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right) \geq \left(3\sqrt[3]{abc}\right) \times \left(\frac{3}{\sqrt[3]{abc}}\right) = 9$$

理由：两个正数不等式（不等号同向）可以相乘，不等号方向不变。

第四步（验证取等）：

等号成立的条件是两个均值不等式同时取等，即 $a=b=c$ 且 $\frac{1}{a}=\frac{1}{b}=\frac{1}{c}$，这同时成立当且仅当 $a=b=c$。

理由：检查取等条件是否可达，以确保证明严密。当 $a=b=c$ 时，左边 $=(3a)(\frac{3}{a})=9$，等号成立。

关键结论： **已证明对于任意正实数 a,b,c，恒有 $(a+b+c)(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}) \geq 9$，且当 $a=b=c$ 时取等号。**

易错提醒

易错点一（忽视非负条件）

认为不等式 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ 对所有实数 a,b,c 都成立。

正确理解（非负是前提）：

该不等式成立的前提是 $a,b,c \geq 0$。若有负数，几何平均可能无意义（开三次方有意义但结论不成立），或者结论本身失效。

错因分析（混淆适用范围）：

忽略了算术平均数对负数也成立，但几何平均数要求非负。不满足非负条件时使用，会导致推导错误。

易错点二（乱用定值条件）

看到 $a+b+c$ 或 abc 就直接套公式求最值，没有验证“和”或“积”是否为定值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（定值是目标）：

只有在“和为定值”时，才能用此式求 abc 的最大值；在“积为定值”时，才能求 $a+b+c$ 的最小值。否则不等式本身成立，但无法确定最值。

错因分析（误解应用逻辑）：

混淆了“不等式恒成立”和“基于不等式求最值”两个不同问题。求最值时，必须存在一个在取等条件下能达到的定值边界。

易错点三（忽略取等验证）

求出最值后，不验证等号成立条件是否可以被满足，或默认存在。

正确理解（取等须可达）：

用不等式 $A \geq B$ 求最小值 B 时，必须检查是否存在一组变量使得 $A = B$ 成立。否则 B 只是下界而非最小值（最小值可能更大）。

错因分析（逻辑不严谨）：

误认为由不等式推导出的边界一定能够取到。如果取等条件与题目其他约束矛盾，则最值在别处取得，需改用其他方法。

结论小结

一句话核心 **三个非负数的算术平均不小于它们的几何平均，相等时取等。**

使用条件

- **条件 1（一正）：** 涉及的三个数 a, b, c 必须是非负实数（通常为正数）。
- **条件 2（二定）：** 用于求最值时，必须存在“和定”或“积定”的条件。

关键提醒

- **易错点（检查符号）：** 使用前务必检查变量是否满足非负条件。
- **检查项（验证取等）：** 做完最值或证明题，必须回代 $a = b = c$ 检查等号能否成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.10 三元平方和不等式

二级结论

条件

条件 1（任意实数）：

a, b, c 为任意实数。

结论

结论一（平方和与积和）：

直观描述： 平方之和不小于两两乘积之和。

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$$

推广结论（等价变形）：

直观描述： 与和的平方之间的不等关系。

$$3\left(a^2 + b^2 + c^2\right) \geq (a + b + c)^2,$$
$$(a + b + c)^2 \geq 3\,(ab + bc + ca).$$

等号/取等条件： 当且仅当 $a = b = c$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉

对于任意三个实数，它们的平方和总是不小于它们两两乘积之和；反过来，它们的和的平方与平方和、乘积和之间也有确定的不等关系。

核心拆解

要点一（对称性）：

不等式关于 a, b, c 完全对称，轮换不变。

要点二（非负性）：

本质源于平方的非负性，通过配方得到。

几何本质（三角形边长）

若将 a, b, c 视为三角形三边长，则 $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$ 反映了三角形边长的一种内在关系。特别地，等边三角形时取等。

代数意义（配方与标准形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

不等式等价于 $\frac{1}{2}\left[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right]\geq 0$，因此是平方非负的直接推论。它也等价于向量 $\vec{u}=(a,b,c)$ 与 $\vec{v}=(b,c,a)$ 的点积不超过模长乘积的柯西不等式形式。

考点价值（基础不等式）

- **考法一（直接证明）**：作为基本不等式，常用于证明其他不等式。
- **考法二（求最值）**：在条件最值问题中，利用其变形放缩求范围。

顿悟点

当问题中出现平方和与乘积和的混合式时，立即想到此不等式；看到 $(a+b+c)^2$ 展开后的交叉项，可尝试用此不等式联系平方和与乘积和。

使用场景

- **场景一（对称式证明）**：证明关于 a,b,c 的对称不等式。
- **场景二（最值放缩）**：求含平方和或乘积和的式子的最值。

证明

思路提示

要证 $a^2+b^2+c^2\geq ab+bc+ca$，只需将右边移到左边，配成完全平方和的形式，利用平方的非负性即可。

正式推导

步骤一（移项与倍乘）：

将不等式两边同乘以 2（以保证配方后系数整齐），并移项。

$$2(a^2+b^2+c^2)-2(ab+bc+ca)\geq 0$$

理由：乘以 2 后，各项系数变为整数，便于配方。

步骤二（分组配方）：

将左边分组为三个完全平方。

$$\begin{aligned}&2(a^2+b^2+c^2)-2(ab+bc+ca)\\=&(a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)+(c^2-2ca+a^2)\\=&(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\end{aligned}$$

理由：每两个平方项配一个交叉项，恰好形成三个完全平方。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（非负性得证）：

由平方的非负性，得出不等式成立。

$$(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2 \geq 0$$

理由： 每个平方都 ≥ 0，故和也 ≥ 0，原不等式得证。

步骤四（取等条件）：

分析等号成立的条件。

$$(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2=0 \quad \Leftrightarrow \quad a-b=0,\ b-c=0,\ c-a=0$$

理由： 几个非负项之和为零，则每个项都为零。

结论回扣

因此，对于任意实数 a,b,c，有 $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$，且等号当且仅当 $a=b=c$ 时成立。由此可推出其他等价形式。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 a,b,c 是实数，求证：$a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$。

解题步骤：

第一步（移项加倍）：

将不等式两边乘以 2 并移项。

$$2(a^2+b^2+c^2)-2(ab+bc+ca) \geq 0$$

理由： 乘以 2 后便于配方。

第二步（配方组合）：

将左边配成三个完全平方和。

$$\begin{aligned}&2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca\\=&(a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)+(c^2-2ca+a^2)\\=&(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\end{aligned}$$

理由： 分组后恰好形成平方差。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（利用非负性）：

由平方的非负性得出结论。

$$(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2 \geq 0$$

理由： 平方和总是非负，故原不等式成立。

关键结论： **原不等式成立，取等当且仅当** $a=b=c$。

例 2（稍变形）

题目： 设 a,b,c 是实数，且 $a+b+c=1$，求 $ab+bc+ca$ 的最大值。

解题步骤：

第一步（应用不等式）：

由三元平方和不等式的一个等价形式。

$$(a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca)$$

理由： 这是原不等式的第三个等价形式。

第二步（代入条件）：

将 $a+b+c=1$ 代入不等式。

$$1^2 \geq 3(ab+bc+ca) \quad \Rightarrow \quad ab+bc+ca \leq \frac{1}{3}$$

理由： 不等号方向不变，除以正数 3。

第三步（取等验证）：

检查最大值能否取得。

$$\text{当且仅当} a=b=c=\frac{1}{3} \text{ 时，等号成立。}$$

理由： 等号成立条件为 $a=b=c$，结合 $a+b+c=1$ 即得。

关键结论： $ab+bc+ca$ **的最大值为** $\frac{1}{3}$**，当** $a=b=c=\frac{1}{3}$ **时取得。**

易错提醒

易错点一（忽视取等条件）

在使用不等式求最值时，忽略等号成立的条件，导致误认为最值一定能取到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（验证取等）：

不等式等号成立当且仅当 $a=b=c$，在实际问题中需验证该条件是否可达。

错因分析（思维定势）：

认为不等式成立就一定能取到最值，未考虑取等条件的约束。

易错点二（误用于非实数）

在复数范围内误用该不等式，因为复数不能比较大小。

正确理解（实数范围）：

该不等式仅对实数成立，因为实数有大小关系且平方非负。

错因分析（忽略前提）：

未注意不等式成立的前提是 a,b,c 为实数，在复数范围内无意义。

易错点三（混淆不等号方向）

在变形时，错误地改变了不等号的方向，尤其是在乘以负数时。

正确理解（保号变形）：

变形过程中，若两边同时乘以正数，不等号方向不变；若乘以负数，方向反转。

错因分析（规则混淆）：

对不等式性质掌握不牢，在代数变形中随意改变不等号方向。

结论小结

一句话核心

对于任意三个实数，其平方和总不小于两两乘积之和，且有三个等价形式，是处理对称式的基础工具。

使用条件

- **条件 1（实数变量）：** a,b,c 必须是实数，因为复数无法比较大小。
- **条件 2（对称形式）：** 不等式关于 a,b,c 对称，适用于轮换对称式。

关键提醒

- **易错点（取等条件）：** 等号仅在 $a=b=c$ 时成立，求最值时务必验证。
- **检查项（变形等价）：** 使用等价形式时，确保变形正确，不等号方向无误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.11 对数函数切线不等式 lnx ≤ x-1 及其变式

二级结论

条件

条件 1（变量为正）：

实数 $x > 0$。

结论

结论一（基本切线式）：

直观描述： 对数图像在 $x = 1$ 处的切线方程。

$$\ln x \leq x - 1$$

推广结论（平移变形）：

直观描述： 将自变量替换为 $x + 1$ 得到常用形式。

$$\ln(x + 1) \leq x, \quad (x > -1)$$

推广结论（乘积形式）：

直观描述： 不等式两边同乘 x 后的变形。

$$x \ln x \geq x - 1, \quad (x > 0)$$

推广结论（二次逼近）：

直观描述： 利用更强的不等式逼近。

$$\ln x \leq \frac{x^2 - 1}{2x}, \quad (x > 0)$$

等号/取等条件： 仅当 $x = 1$ 时，所有不等式取等号。

理解说明

一句话直觉 对数函数 $y = \ln x$ 在 $x = 1$ 处的切线是 $y = x - 1$，图像总在切线上方（$x \neq 1$）。

核心拆解

要点一（切线构造）：

结论源于导数 $f'(1) = 1$ 和切线方程 $y = x - 1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（函数凹凸性）：

因 $f''(x) = -1/x^2 < 0$，函数图像下凸，故切线在图像下方。

要点三（恒等变形）：

通过换元 $t = x + 1$ 或两边乘以 x 得到常用变式。

要点四（精度提升）：

第三变式用二次函数逼近，比一次切线更紧。

几何本质（图像切线） 在点 $(1, 0)$ 作曲线 $y = \ln x$ 的切线，该切线 $y = x - 1$ 总在曲线下方（除切点外）。所有变式都是这一几何事实的坐标伸缩或平移。

代数意义（线性逼近） 用一次线性函数 $x - 1$ 去逼近复杂的对数函数 $\ln x$，并给出一个简单的不等式关系。它是泰勒展开一阶近似的直接体现。

考点价值（放缩工具）

- **考法一（证明不等式）：**用于将对数项放缩为多项式，简化证明。
- **考法二（求最值范围）：**通过放缩将含对数的最值问题转化为多项式最值。
- **考法三（数列求和放缩）：**在数列不等式中，常用于裂项求和或比较大小。

顿悟点 **遇到 $\ln x$ 或 $\ln(1 + x)$ 与多项式比较时，优先考虑切线放缩。**它是沟通超越函数与代数函数的桥梁。

使用场景

- **场景一（含参不等式）：**当不等式含有 $\ln x$ 与 x 的线性组合时。
- **场景二（数列放缩）：**如证明 $\sum \ln(1 + 1/n) < 1$ 类问题。
- **场景三（函数最值）：**求 $f(x) = x \ln x - ax$ 类型函数的最值或范围。

证明

思路提示 构造函数差 $f(x) = \ln x - (x - 1)$，利用导数判断其单调性，从而证明不等式。

正式推导

步骤一（构造函数）：

设 $f(x) = \ln x - (x - 1)$，定义域为 $x > 0$。

$$f(x) = \ln x - x + 1$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：将不等式 $\ln x \le x-1$ 移项，转化为比较函数值与 0 的大小。

步骤二（求导判号）：

求导并分析单调性。

$$f'(x)=\frac{1}{x}-1=\frac{1-x}{x}$$

理由：对 $f(x)$ 求导，导函数符号决定原函数增减。

步骤三（确定极值）：

由 $f'(x)=0$ 得 $x=1$，分析单调区间。

- 当 $0<x<1$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增。
- 当 $x>1$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减。

理由：分子 $1-x$ 决定符号，分母 $x>0$ 恒正。

步骤四（得出最值）：

在 $x=1$ 处 $f(x)$ 取得最大值。

$$f(1)=\ln 1-1+1=0$$

故对任意 $x>0$，有 $f(x)\le f(1)=0$。

理由：先增后减，极大值即为最大值。

步骤五（变形验证）：

验证常用变式。

- **变式 1**：令 $t=x+1$（$t>0$），则 $\ln t\le t-1$ 即为 $\ln(x+1)\le x$。
- **变式 2**：将 $\ln x\le x-1$ 两边同乘以 x（$x>0$），得 $x\ln x\le x(x-1)$。但更常用的是移项得 $x\ln x\ge x-1$，这等价于 $\ln x\ge 1-\frac{1}{x}$，是另一个切线不等式。
- **变式 3**：构造函数 $g(x)=\ln x-\frac{x^2-1}{2x}$ 求导可证，或由更强的切线不等式 $\ln x\le\frac{x-1}{\sqrt{x}}$ 推出。

理由：换元或简单代数变形即可得到。

结论回扣 **因此，对任意 $x>0$ 恒有 $\ln x\le x-1$，且等号仅当 $x=1$ 时成立。其常用变式在相应定义域内同样成立。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x > 1$，证明：$\ln x < \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}$。

解题步骤：

第一步（观察结构）：

注意到 $\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{x-1}{\sqrt{x}}$，目标化为 $\ln x < \frac{x-1}{\sqrt{x}}$。

理由： 将右边通分，建立与切线不等式 $\ln x \le x - 1$ 的联系。

第二步（应用变式）：

利用结论中的变式三：$\ln x \le \frac{x^2-1}{2x}$。但此处形式不同，考虑直接构造函数。设 $h(x) = \ln x - \frac{x-1}{\sqrt{x}}$，对 $x > 1$ 证明 $h(x) < 0$。

理由： 切线不等式是工具，但有时需直接作差求导。

第三步（求导判断）：

计算导数：

$$h'(x) = \frac{1}{x} - \frac{\sqrt{x} - \frac{x-1}{2\sqrt{x}}}{x} = \frac{1}{x} - \frac{2x - (x-1)}{2x\sqrt{x}} = \frac{2\sqrt{x} - (x+1)}{2x\sqrt{x}}$$

令 $t = \sqrt{x} > 1$，则分子 $2t - (t^2+1) = -(t-1)^2 \le 0$，且当 $t \ne 1$ 时取负号。

理由： 通过求导判断函数单调性。

第四步（得出单调性）：

当 $x > 1$ 时，$h'(x) < 0$，故 $h(x)$ 单调递减。

$$h(x) < h(1) = \ln 1 - \frac{1-1}{\sqrt{1}} = 0$$

理由： 利用端点值 $x = 1$（虽然不在定义域内，但可取极限）及单调性。

关键结论： **当 $x > 1$ 时，$\ln x < \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}$ 成立。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $a > b > 0$，比较 $\frac{\ln a - \ln b}{a-b}$ 与 $\frac{2}{a+b}$ 的大小。

解题步骤：

第一步（转化结构）：

令 $x = \frac{a}{b} > 1$，则 $\frac{\ln a - \ln b}{a-b} = \frac{\ln x}{b(x-1)}$，$\frac{2}{a+b} = \frac{2}{b(x+1)}$。比较两式等价于比较 $\frac{\ln x}{x-1}$ 与 $\frac{2}{x+1}$。

理由： 提取公因子 b，将双变量化为单变量 x。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（作差构造函数）：

设 $F(x) = \frac{\ln x}{x-1} - \frac{2}{x+1}$，$x > 1$。目标为判断 $F(x)$ 的符号。

理由：将比较大小问题转化为函数符号问题。

第三步（利用切线不等式）：

由 $\ln x \le x - 1$（$x > 0$）得 $\frac{\ln x}{x-1} \le 1$（$x \ne 1$）。但需更精确比较。考虑不等式 $\ln x \le \frac{2(x-1)}{x+1}$（$x \ge 1$），这是均值形式的切线放缩。

理由：猜想 $\frac{\ln x}{x-1} \le \frac{2}{x+1}$。

第四步（证明猜想）：

即证 $\ln x \le \frac{2(x-1)}{x+1}$（$x > 1$）。构造函数 $G(x) = \ln x - \frac{2(x-1)}{x+1}$，求导得：

$$G'(x) = \frac{1}{x} - \frac{4}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2 - 4x}{x(x+1)^2} = \frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2} \ge 0$$

故 $G(x)$ 在 $x > 1$ 上单调递增，$G(x) > G(1) = 0$？计算 $G(1) = \ln 1 - 0 = 0$，因此 $G(x) \ge 0$，即 $\ln x \ge \frac{2(x-1)}{x+1}$，符号与猜想相反。

理由：实际推导发现原猜想方向反了。

第五步（调整方向）：

由 $G(x) \ge 0$ 得 $\ln x \ge \frac{2(x-1)}{x+1}$，即 $\frac{\ln x}{x-1} \ge \frac{2}{x+1}$（$x > 1$）。

理由：因此，$\frac{\ln a - \ln b}{a-b} \ge \frac{2}{a+b}$。

关键结论： 对任意 $a > b > 0$，有 $\frac{\ln a - \ln b}{a-b} \ge \frac{2}{a+b}$。

易错提醒

易错点一（忽视定义域）

错误认为 $\ln(x+1) \le x$ 对任意 x 成立，忽略 $x > -1$ 的前提。

正确理解（限制条件）：

变式 $\ln(x+1) \le x$ 仅在 $x > -1$ 时成立，否则 $\ln(x+1)$ 无意义。

错因分析（记忆模糊）：

只记结论形式，未记准确域，导致在 $x \le -1$ 区间误用。

易错点二（混淆方向）

将 $x \ln x \ge x - 1$ 记成 $x \ln x \le x - 1$，或对 $\ln x \le x - 1$ 两边乘 x 时未考虑 x 的符号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（保号性）：

当 $x > 0$ 时，乘以 x 不改变不等号方向；但 $x \ln x \geq x - 1$ 本身是另一独立结论，并非简单乘 x 得到。

错因分析（机械变形）：

误以为所有变式都通过恒等变形直接得到，忽略了需重新证明或理解其几何意义。

易错点三（取等条件遗漏）

使用放缩后忘记检查取等条件是否能在题目中实现，导致范围扩大或最值求错。

正确理解（等号分析）：

所有变式取等条件均为 $x = 1$（或对应变量为 1），放缩后若等号取不到，则得到严格不等式。

错因分析（过程跳跃）：

只关注放缩本身，未分析等号成立条件与题目条件是否兼容，尤其在求最值时。

结论小结

一句话核心 **对数函数 $\ln x$ 在 $x = 1$ 处切线为 $y = x - 1$，图像恒在切线上方（$x \neq 1$），由此衍生一系列放缩式。**

使用条件

- **条件 1（定义域）**：主结论要求 $x > 0$；变式 $\ln(x + 1) \leq x$ 要求 $x > -1$。
- **条件 2（形式匹配）**：待证或待放缩的不等式含有 $\ln x$ 或 $\ln(1 + x)$ 与一次/二次多项式比较。

关键提醒

- **易错点（方向与域）**：牢记各变式不等号方向及定义域，避免反向使用或域外误用。
- **检查项（等号可达性）**：放缩后务必验证原题条件下等号能否取得，以判断放缩精度是否足够。
- **选择项（精度权衡）**：一次切线放缩最简，二次变式更紧，根据题目需求灵活选取。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.12 指数函数切线放缩不等式

二级结论

条件

条件 1（实数定义）：

设 x 为任意实数。

结论

结论一（切线放缩一）：

直观描述： 指数函数在 $x=0$ 处的切线不等式。

$$e^x \geq x+1$$

结论二（切线放缩二）：

直观描述： 指数函数在 $x=1$ 处的切线不等式。

$$e^x \geq ex$$

结论三（二阶放缩）：

直观描述： 当 x 非负时的二阶多项式下界。

$$e^x \geq 1+x+\frac{x^2}{2} \quad (x \geq 0)$$

推广结论（等价变形）：

直观描述： 结论二的等价形式，便于变量替换。

$$e^{x-1} \geq x$$

等号/取等条件： 结论一等号成立当且仅当 $x=0$；结论二等号成立当且仅当 $x=1$；结论三等号成立当且仅当 $x=0$；推广结论等号成立当且仅当 $x=1$。

理解说明

一句话直觉 指数函数图像始终在其切线之上，这些不等式是切线近似的严格下界。

核心拆解

要点一（切线位置）：

e^x 在 $x=0$ 处的切线为 $y=x+1$，函数值总不低于切线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（缩放系数）：

e^x 在 $x=1$ 处的切线为 $y=ex$，提供另一个放缩基准。

要点三（二阶近似）：

当 $x \geq 0$ 时，e^x 不低于其二阶泰勒展开的前三项。

几何本质（切线下方） 指数函数是凸函数，其图像上任意一点的切线都在函数图像下方，这些不等式是切线不等式的具体实例。

代数意义（不等式链） 这些不等式建立了 e^x 与一次或二次多项式之间的不等关系，可用于放缩简化表达式。

考点价值（放缩证明）

- **考法一（证明不等式）：** 直接应用这些放缩证明其他不等式。
- **考法二（求最值）：** 通过放缩将复杂函数转化为多项式求最值。

顿悟点 当遇到 e^x 与多项式混合的不等式时，优先考虑切线放缩，往往能化繁为简。

使用场景

- **场景一（比较大小）：** 比较 e^x 与线性函数的大小关系。
- **场景二（放缩求界）：** 需要估计 e^x 的下界时使用。

证明

思路提示 通过构造函数差，利用导数分析单调性和极值，证明不等式成立。

正式推导

步骤一（构造函数）：

对于 $e^x \geq x+1$，令 $f(x)=e^x-x-1$。

$$f(x)=e^x-x-1$$

理由： 将不等式转化为函数值非负的问题。

步骤二（求导分析）：

求导得 $f'(x)=e^x-1$。

$$f'(x)=e^x-1$$

理由： 导数用于判断函数单调性。当 $f'(x)>0$ 时 $f(x)$ 递增，当 $f'(x)<0$ 时递减。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（确定极值点）：

令 $f'(x)=0$，解得 $x=0$。

$$f'(x)=0 \Rightarrow e^x-1=0 \Rightarrow x=0$$

理由：驻点可能是极值点。分析 $f'(x)$ 符号：当 $x<0$ 时 $f'(x)<0$，$f(x)$ 递减；当 $x>0$ 时 $f'(x)>0$，$f(x)$ 递增。

步骤四（求最小值）：

在 $x=0$ 处，$f(0)=e^0-0-1=0$。

$$f(0)=1-0-1=0$$

理由：由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极小值，且为全局最小值，所以 $f(x)\geq 0$，即 $e^x\geq x+1$。

步骤五（证明第二式）：

对于 $e^x\geq ex$，令 $g(x)=e^x-ex$，求导得 $g'(x)=e^x-e$，驻点 $x=1$，$g(1)=0$。

$$g(x)=e^x-ex,\quad g'(x)=e^x-e,\quad g(1)=0$$

理由：类似地，$g(x)$ 在 $x=1$ 处取最小值 0，故 $e^x\geq ex$。等价变形 $e^{x-1}\geq x$ 由 $e^x\geq ex$ 除以 e 得到。

步骤六（证明第三式）：

对于 $x\geq 0$，令 $h(x)=e^x-1-x-\frac{x^2}{2}$，求导得 $h'(x)=e^x-1-x$，$h''(x)=e^x-1\geq 0$，故 $h'(x)$ 递增，$h'(0)=0$，所以 $h(x)\geq h(0)=0$。

$$h(x)=e^x-1-x-\frac{x^2}{2},\quad h'(x)=e^x-1-x,\quad h''(x)=e^x-1$$

理由：二阶导数非负保证一阶导数单调增，结合 $h'(0)=0$，得 $h(x)$ 在 $x\geq 0$ 上递增，最小值为 0。

结论回扣 **通过导数证明，所有不等式都在特定点取等，且函数值始终非负，故不等式成立。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 证明对于任意实数 x，有 $e^x+e^{-x}\geq 2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解题步骤：

第一步（应用放缩）：

由 $e^x \geq x+1$，将 x 替换为 $-x$ 得 $e^{-x} \geq -x+1$。

理由： 不等式 $e^x \geq x+1$ 对任意实数 x 成立，所以以 $-x$ 代入也成立。

第二步（相加组合）：

将两个不等式相加。

$$e^x + e^{-x} \geq (x+1) + (-x+1)$$

理由： 同向不等式可以相加。

第三步（化简得证）：

右边化简为 2。

$$e^x + e^{-x} \geq 2$$

理由： $(x+1)+(-x+1)=2$，因此原不等式成立。

关键结论： **对于任意实数 x，$e^x + e^{-x} \geq 2$，等号当且仅当 $x=0$ 时成立。**

例 2（稍变形）

题目： 证明当 $x \geq 0$ 时，有 $e^x \geq 1 + x + \dfrac{x^2}{2}$。

解题步骤：

第一步（构造函数）：

令 $h(x) = e^x - 1 - x - \dfrac{x^2}{2}$。

$$h(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$$

理由： 将不等式转化为函数 $h(x) \geq 0$ 的问题。

第二步（求导分析）：

求导得 $h'(x) = e^x - 1 - x$，再次求导 $h''(x) = e^x - 1$。

$$h'(x) = e^x - 1 - x, \quad h''(x) = e^x - 1$$

理由： 通过二阶导数判断一阶导数的单调性。对于 $x \geq 0$，$h''(x) \geq 0$，所以 $h'(x)$ 递增。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（确定最小值）：

当 $x=0$ 时，$h'(0)=0$，且 $h'(x)\geq 0$ 对于 $x\geq 0$，所以 $h(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上递增。

$$h'(0)=e^0-1-0=0,\quad 且h'(x)\geq 0\ 当x\geq 0$$

理由： 由于 $h'(x)$ 递增且 $h'(0)=0$，所以对于 $x\geq 0$，$h'(x)\geq 0$，$h(x)$ 最小值为 $h(0)$。

第四步（计算最小值）：

$h(0)=e^0-1-0-0=0$。

$$h(0)=1-1-0-0=0$$

理由： 因此 $h(x)\geq 0$ 对于所有 $x\geq 0$，即原不等式成立。

关键结论： **当 $x\geq 0$ 时，$e^x\geq 1+x+\dfrac{x^2}{2}$，等号当且仅当 $x=0$ 时成立。**

易错提醒

易错点一（忽略取等条件）

在使用不等式时，忽视等号成立的具体条件，导致结论不准确。

正确理解（等号唯一点）：

每个不等式都有唯一的取等点，如 $e^x\geq x+1$ 只在 $x=0$ 取等。

错因分析（条件遗漏）：

学生往往只记住不等式形式，未记忆取等条件，在需要严格等号时出错。

易错点二（范围误用）

将 $e^x\geq 1+x+\frac{x^2}{2}$ 应用于 $x<0$ 的情况。

正确理解（非负适用）：

该不等式仅当 $x\geq 0$ 时成立，对于 $x<0$ 不一定成立。

错因分析（前提忽视）：

忽略不等式的前提条件 $x\geq 0$，盲目套用公式。

易错点三（形式混淆）

混淆 $e^x\geq ex$ 与 $e^{x-1}\geq x$，误以为两者适用范围不同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（等价变形）：

$e^x \geq ex$ 等价于 $e^{x-1} \geq x$，两者对所有实数 x 成立，等号在 $x = 1$。

错因分析（变形不熟）：

对不等式的等价变形不熟悉，导致应用时选择错误形式。

结论小结

一句话核心 **指数函数 e^x 在其切线和二阶展开下方，提供了一系列多项式下界不等式。**

使用条件

- **条件 1（任意实数）：** 不等式 $e^x \geq x + 1$ 和 $e^x \geq ex$ 对任意实数 x 成立。
- **条件 2（非负实数）：** 不等式 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 仅当 $x \geq 0$ 时成立。

关键提醒

- **易错点（取等条件）：** 每个不等式都有特定取等点，使用时需核对。
- **检查项（范围验证）：** 应用前务必检查变量是否满足不等式的前提条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.13 对勾不等式（x+1/x≥2）

二级结论

条件

条件 1（变量范围）：

x 为非零实数。

结论

结论一（正数情形）：

直观描述： 正数与其倒数之和至少为 2。

$$x + \frac{1}{x} \geq 2, \quad x > 0$$

结论二（负数情形）：

直观描述： 负数与其倒数之和至多为-2。

$$x + \frac{1}{x} \leq -2, \quad x < 0$$

推广结论（一般形式）：

直观描述： 正系数线性与倒数组合的最小值。

$$ax + \frac{b}{x} \geq 2\sqrt{ab}, \quad a, b, x > 0$$

等号/取等条件： 对于结论一，当 $x = 1$ 时等号成立；对于结论二，当 $x = -1$ 时等号成立；对于推广结论，当 $x = \sqrt{b/a}$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉

正数与其倒数之和不会太小，负数与其倒数之和不会太大。

核心拆解

要点一（平方非负）：

利用 $(x-1)^2 \geq 0$ 可推出 $x + 1/x \geq 2$。

要点二（分类讨论）：

对于负数情形，需注意符号反转，不等式方向改变。

几何本质（对勾函数）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

函数 $f(x) = x + 1/x$ 的图像像两个钩子，在 $x = \pm 1$ 处取得极值。

代数意义（均值不等式）

推广形式是均值不等式的直接应用：$ax + b/x \geq 2\sqrt{ax \cdot b/x} = 2\sqrt{ab}$。

考点价值（最值求解）

- **考法一（直接应用）**：求形如 $x + 1/x$ 的最值。
- **考法二（变形构造）**：通过换元或配凑，应用推广形式。

顿悟点

当两项乘积为定值时，其和有最小值（正数情形）。

使用场景

- **场景一（函数最值）**：求分式函数或根式函数的最值。
- **场景二（不等式证明）**：证明涉及倒数和的不等式。

证明

思路提示

通过平方非负或均值不等式，推导和的最值。

正式推导

步骤一（平方构造）：

对于 $x > 0$，考虑 $(x-1)^2 \geq 0$。

$$(x-1)^2 \geq 0$$

理由：实数的平方总是非负。

步骤二（展开变形）：

展开平方并整理。

$$x^2 - 2x + 1 \geq 0$$

理由：将不等式展开。

步骤三（除以正数）：

由于 $x > 0$，两边除以 x 不等号方向不变。

$$x - 2 + \frac{1}{x} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad x + \frac{1}{x} \geq 2$$

理由：除以正数 x，然后移项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（负数情形）：

对于 $x<0$，令 $y=-x>0$，则 $x+1/x=-(y+1/y)$。

$$y+\frac{1}{y}\geq 2 \quad \Rightarrow \quad x+\frac{1}{x}\leq -2$$

理由：利用正数情形，并注意符号反转。

步骤五（推广形式）：

对于 $a,b,x>0$，应用均值不等式。

$$ax+\frac{b}{x}\geq 2\sqrt{ax\cdot\frac{b}{x}}=2\sqrt{ab}$$

理由：两项为正，算术平均不小于几何平均。

结论回扣

综上所述，原结论成立，等号在特定条件下取得。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x>0$，求 $f(x)=x+\frac{1}{x}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（识别形式）：

函数为 $x+1/x$，符合对勾不等式正数情形。

理由：直接应用结论一。

第二步（应用不等式）：

根据不等式，$x+1/x\geq 2$。

$$x+\frac{1}{x}\geq 2$$

理由：当 $x>0$ 时，结论一成立。

第三步（取等条件）：

等号当且仅当 $x=1$ 时成立。

理由：结论一的取等条件。

第四步（得最小值）：

因此，$f(x)$ 的最小值为 2。

理由：不等式给出了下界，且可达到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 当 $x > 0$ 时，$x + 1/x$ 的最小值为 2，在 $x = 1$ 时取得。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $x > 0$，求 $g(x) = 2x + \frac{8}{x}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（匹配推广形式）：

将 $g(x)$ 写成 $ax + b/x$ 形式，其中 $a = 2, b = 8$。

理由： 推广结论要求 $a, b, x > 0$，此处满足。

第二步（应用推广不等式）：

根据推广形式，$2x + 8/x \geq 2\sqrt{2 \cdot 8}$。

$$2x + \frac{8}{x} \geq 2\sqrt{16} = 8$$

理由： 计算 $2\sqrt{ab} = 2\sqrt{16} = 8$。

第三步（取等条件）：

等号当且仅当 $x = \sqrt{b/a} = \sqrt{8/2} = 2$ 时成立。

理由： 推广结论的取等条件。

第四步（得最小值）：

因此，$g(x)$ 的最小值为 8。

理由： 不等式给出了下界，且可达到。

关键结论： 当 $x > 0$ 时，$2x + 8/x$ 的最小值为 8，在 $x = 2$ 时取得。

易错提醒

易错点一（符号忽略）

忘记讨论 x 的符号，直接使用 $x + 1/x \geq 2$。

正确理解（分类讨论）：

必须分 $x > 0$ 和 $x < 0$ 两种情况，不等式方向不同。

错因分析（条件缺失）：

未注意原结论中 $x > 0$ 是前提，负数时结论相反。

易错点二（系数非正）

在推广形式中，a 或 b 不是正数时仍套用不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（正数条件）：

推广形式要求 $a, b, x > 0$，否则不等式可能不成立。

错因分析（前提忽视）：

均值不等式要求各项为正，忽略前提会导致错误。

易错点三（取等遗漏）

求出最值后，忘记验证取等条件是否可达。

正确理解（等号验证）：

必须检查 x 的值是否在定义域内，使等号成立。

错因分析（完整性不足）：

最值问题需同时给出值和取等条件，否则解答不完整。

结论小结

一句话核心

正数与其倒数之和有最小值，负数与其倒数之和有最大值。

使用条件

- **条件 1（变量符号）：** x 为非零实数，需分正负讨论。
- **条件 2（系数正性）：** 推广形式中 a, b, x 必须为正数。

关键提醒

- **易错点（符号反转）：** 负数情形不等式方向相反。
- **检查项（取等条件）：** 应用时务必验证等号是否可达。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.14 琴生不等式（Jensen 不等式）

二级结论

条件

条件 1（函数性质）：

函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续且二阶可导。

条件 2（二阶导符号）：

$f''(x) > 0$（凸函数）或 $f''(x) < 0$（凹函数）。

结论

结论一（两点平均）：

直观描述： 函数值在区间中点的值，不超过两端点函数值的平均。

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

推广结论（加权平均）：

直观描述： 函数在加权平均点处的值，不超过函数值的加权平均。

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i)$$

等号/取等条件： 等号成立当且仅当所有自变量 x_i 相等，或函数 f 为线性函数。

理解说明

一句话直觉 对于凸（凹）函数，任意两点连线的中点（或更一般的加权平均点）总落在函数图像上方（下方），说明函数图像呈碗口向上（下）的形状。

核心拆解

要点一（二阶导判凸凹）：

二阶导大于零，函数为凸；二阶导小于零，函数为凹。

要点二（中点不等式）：

凸函数满足“中点值 ≤ 平均值”；凹函数方向相反。

要点三（加权推广）：

中点不等式可推广到任意有限个点的加权平均，权重为正且和为 1。

几何本质（图像形状） 凸函数的图像任意两点连线位于图像上方（或重合），像

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

一个碗口向上的碗。凹函数则相反。不等式反映了这种几何特性：中点的函数值被两端点连线的线性插值“压住”。

代数意义（均值估计） 代数上，它提供了一种用有限个点的函数值来估计函数在平均点处值的方法。它说明凸（凹）函数的函数值在平均运算下具有次（超）可加性。

考点价值（函数不等式）

- **考法一（直接证明）**：题目直接要求证明形如 $f(\frac{a+b}{2}) \le \frac{f(a)+f(b)}{2}$ 的不等式。
- **考法二（构造应用）**：题目给出函数表达式，需要先判断其凸凹性，再利用琴生不等式推导出其他不等式（如幂平均不等式）。

顿悟点 **凸性（$f'' > 0$）本质是函数图像“弯曲向上”，这使得弦在图像之上；凹性反之。**记住“凸 $\le$ 平均，凹 $\ge$ 平均”，结合二阶导符号可快速判断方向。

使用场景

- **场景一（证明均值不等式）**：通过选取 $f(x) = -\ln x$, $f(x) = x^p$ 等特殊凸函数，可证明算术-几何平均、幂平均等不等式。
- **场景二（估算函数值）**：当函数凸性已知且自变量接近时，可用端点函数值估算中间点的函数值范围。

证明

思路提示 以凸函数 $f''(x) > 0$ 为例。核心是利用导数的性质：一阶导单调递增。可考虑对两点连线中点的函数值进行泰勒展开，或者利用拉格朗日中值定理。这里我们采用中值定理的经典证法，逐步推导。

正式推导

步骤一（构造中点差值）：

设 $x_1 < x_2$，记 $x_0 = \frac{x_1+x_2}{2}$。考虑差

$$\Delta = \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} - f(x_0)$$

目标证明 $\Delta \ge 0$。

理由：将不等式转化为一个非负性的证明。

步骤二（应用中值定理）：

分别在 $[x_1, x_0]$ 和 $[x_0, x_2]$ 上对 $f(x)$ 使用拉格朗日中值定理，存在 $\xi_1 \in (x_1, x_0)$，$\xi_2 \in (x_0, x_2)$，使得

$$f(x_0) - f(x_1) = f'(\xi_1)(x_0 - x_1), \quad f(x_2) - f(x_0) = f'(\xi_2)(x_2 - x_0)$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：拉格朗日中值定理将函数差值转化为导数与自变量差的乘积。

步骤三（利用凸性单调性）：

由于 $f''(x) > 0$，$f'(x)$ 单调递增。又 $\xi_1 < x_0 < \xi_2$，所以 $f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$。

理由：二阶导大于零意味一阶导单调递增，这是凸函数的等价刻画之一。

步骤四（重组并判断符号）：

将步骤二的等式改写并代入 Δ：

$$\begin{aligned}\Delta &= \frac{1}{2}\big[(f(x_1) - f(x_0)) + (f(x_2) - f(x_0))\big] \\ &= \frac{1}{2}\big[-f'(\xi_1)(x_0 - x_1) + f'(\xi_2)(x_2 - x_0)\big]\end{aligned}$$

注意到 $x_0 - x_1 = x_2 - x_0 = \frac{x_2 - x_1}{2} > 0$，因此

$$\Delta = \frac{x_2 - x_1}{4}\big(f'(\xi_2) - f'(\xi_1)\big)$$

由 $f'(\xi_2) > f'(\xi_1)$，得 $\Delta > 0$，除非 $x_1 = x_2$ 时 $\Delta = 0$。

理由：提公因式后，差的符号由导数差决定，利用单调性得证。

结论回扣 **以上证明了凸函数情形 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \le \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$，等号当 $x_1 = x_2$ 成立。**凹函数情形证明类似，仅不等号方向相反。加权推广可通过数学归纳法或利用凸函数定义证得，此处从略。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $f(x) = x^2$，证明对任意实数 a, b，有 $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \le \frac{a^2+b^2}{2}$。

解题步骤：

第一步（判断凸凹性）：

计算 $f(x) = x^2$ 的二阶导数：$f''(x) = 2 > 0$。

理由：二阶导恒为正，说明 $f(x)$ 是凸函数，满足琴生不等式（凸函数情形）。

第二步（直接套用结论）：

根据琴生不等式（两点形式），对任意 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$，有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \le \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

令 $x_1 = a, x_2 = b$，并将 $f(x) = x^2$ 代入得

$$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \le \frac{a^2 + b^2}{2}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： 直接应用结论，注意函数对应关系。

第三步（讨论取等条件）：

等号成立当且仅当 $a=b$ 或 f 为线性函数。此处 $f(x)=x^2$ 不是线性函数，故等号成立当且仅当 $a=b$。

理由： 根据定理，取等条件为自变量相等或函数线性。

关键结论： **对于凸函数 $f(x)=x^2$，其满足中点平方不超过平方的平均。**

例 2（稍变形）

题目： 已知 $f(x)=\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上是凹函数，利用琴生不等式证明：对任意正数 a,b，有 $\sqrt{ab}\le\frac{a+b}{2}$。

解题步骤：

第一步（确认函数性质）：

题目已告知 $f(x)=\ln x$ 是凹函数，即 $f''(x)=-\frac{1}{x^2}<0$。

理由： 凹函数满足琴生不等式的反向形式。

第二步（应用凹函数不等式）：

对于凹函数，琴生不等式为 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\ge\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$。取 $x_1=a,x_2=b$，代入 $f(x)=\ln x$ 得

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right)\ge\frac{\ln a+\ln b}{2}=\ln\sqrt{ab}$$

理由： 直接应用凹函数形式的结论，并利用对数运算性质。

第三步（利用单调性化简）：

因为 $\ln x$ 是单调递增函数，由上式可得

$$\frac{a+b}{2}\ge\sqrt{ab}$$

等号成立当且仅当 $a=b$。

理由： 对数不等式两边取指数，即 $e^{\ln L}\ge e^{\ln R}$，由于 e^x 单调递增，不等号方向不变。

关键结论： **利用凹函数 $\ln x$ 的琴生不等式，可推导出算术平均-几何平均不等式。**

易错提醒

易错点一（凸凹判断混淆）

记错二阶导符号与凸凹性的对应关系，导致不等式方向写反。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（符号对应）：

$f''(x) > 0$ 对应凸函数，图像“向上凸”（像碗口向上），此时弦在中点上方，故有 $f(\frac{x_1+x_2}{2}) \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$。

错因分析（几何直观弱）：

仅死记符号，未结合图像记忆。建议画图：向上凸的曲线，任意两点连线在中点处高于曲线。

易错点二（忽略取等条件）

使用不等式时，忽略等号成立的条件，导致答案不完整或分类讨论遗漏。

正确理解（等号成立）：

等号成立有两个可能：一是所有自变量相等；二是函数本身是线性的（此时二阶导为零）。通常题目中函数非线性，故等号仅当所有自变量相等时成立。

错因分析（定理记忆不全）：

只记不等式形式，未记等号条件。考试中常需利用取等条件求最值或参数，必须牢记。

易错点三（区间与定义域忽视）

在应用琴生不等式时，未检查自变量是否都在函数定义区间 I 内，也未考虑函数的连续、可导条件。

正确理解（条件验证）：

使用前必须确认：函数在区间 I 上二阶可导且符号恒定；所有取用的自变量 x_i 均属于 I；加权系数 λ_i 为正且和为 1。

错因分析（急于套公式）：

看到形式类似就直接使用，忽略定理成立的前提条件，可能导致错误结论。

结论小结

一句话核心 **凸函数“中点值 ≤ 平均值”，凹函数相反；该结论可推广到加权平均，是证明许多重要不等式的有力工具。**

使用条件

- **条件 1（函数性质）：** 函数在区间 I 上连续且二阶可导（至少已知凸凹性）。
- **条件 2（凸凹性明）：** 明确二阶导符号（$f'' > 0$ 凸，$f'' < 0$ 凹）或已知凸凹性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 3（点属区间）**：所有涉及的自变量 x_i 均属于定义区间 I。

关键提醒

- **易错点（方向判断）**：务必根据凸凹性确定不等号方向，可借图像记忆。
- **检查项（取等条件）**：使用后检查等号成立条件，通常为所有自变量相等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.15 指数凸性不等式（Jensen 不等式应用）

二级结论

条件

条件 1（任意实数）：

设 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 是任意实数。

结论

结论一（指数平均大）：

直观描述： 指数平均不小于指数底数的算术平均的指数。

$$\frac{e^{x_1}+e^{x_2}+\cdots+e^{x_n}}{n} \geq e^{\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}}$$

推广结论（加权形式）：

直观描述： 权重非负时，加权指数平均不小于加权算术平均的指数。

$$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i e^{x_i} \geq e^{\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i}, \quad \text{其中}\lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^{n}\lambda_i = 1.$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉

指数函数的凸性保证了函数值的平均不低于平均值的函数值。

核心拆解

要点一（凸函数性质）：

指数函数 e^x 是凸函数，其图像任意两点连线位于图像上方。

要点二（Jensen 不等式）：

对凸函数，函数值的加权平均不小于加权平均的函数值。

几何本质（图像凸性）

凸函数图像上任意两点连线段位于图像上方，因此 n 个点的平均点对应的函数值不超过这 n 个点函数值的平均。

代数意义（均值关系）

算术平均的指数小于等于指数的算术平均，这是对数凸性的一种体现。

考点价值（不等式证明）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（直接应用）**：证明不等式或求最值问题。
- **考法二（变形构造）**：通过取对数转化为线性不等式。

顿悟点

当出现指数和与指数内线性和的比较时，可尝试应用此结论。

使用场景

- **场景一（最值问题）**：约束条件下求指数和的最值。
- **场景二（不等式链）**：与其他均值不等式结合使用。

证明

思路提示

利用指数函数的凸性，直接应用 Jensen 不等式。

正式推导

步骤一（凸性验证）：

证明 $f(x) = e^x$ 是凸函数。

$$f''(x) = e^x > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

理由：二阶导数恒正说明函数是严格凸的。

步骤二（Jensen 不等式）：

对凸函数 f，有 Jensen 不等式：

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i) \geq f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\right),$$

其中 $\lambda_i \geq 0$ 且 $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1$。

理由：凸函数的定义推广到多点加权平均。

步骤三（取等权重）：

取 $\lambda_i = \frac{1}{n}$，则

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(x_i) \geq f\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right).$$

理由：权重相等时是 Jensen 不等式的特例。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（代入函数）：

代入 $f(x) = e^x$，得到

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e^{x_i} \geq e^{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i}.$$

理由： 函数的具体形式。

步骤五（取等条件）：

等号成立当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$。

理由： 由于 f 是严格凸函数，等号成立当且仅当所有 x_i 相等。

结论回扣

因此原不等式成立，且取等条件为所有变量相等。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知实数 a, b, c 满足 $a + b + c = 0$，求证：$e^a + e^b + e^c \geq 3$。

解题步骤：

第一步（应用不等式）：

由指数凸性不等式，有

$$\frac{e^a + e^b + e^c}{3} \geq e^{\frac{a+b+c}{3}}.$$

理由： 直接代入 $n = 3$。

第二步（利用条件）：

因为 $a + b + c = 0$，所以

$$e^{\frac{a+b+c}{3}} = e^0 = 1.$$

理由： 代入已知条件。

第三步（得出结论）：

于是

$$\frac{e^a + e^b + e^c}{3} \geq 1 \quad \Rightarrow \quad e^a + e^b + e^c \geq 3.$$

理由： 整理不等式。

关键结论： **当 $a + b + c = 0$ 时，$e^a + e^b + e^c \geq 3$，等号当 $a = b = c = 0$ 时成立。**

例 2（稍变形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 已知实数 x, y, z 满足 $x+y+z=3$，求证：$e^{x-1}+e^{y-1}+e^{z-1} \geq 3$。

解题步骤：

第一步（换元转化）：

令 $a=x-1, b=y-1, c=z-1$，则 $a+b+c=(x+y+z)-3=0$。

理由：将条件转化为 $a+b+c=0$，从而与例 1 类似。

第二步（应用不等式）：

由指数凸性不等式，有

$$\frac{e^a+e^b+e^c}{3} \geq e^{\frac{a+b+c}{3}} = e^0 = 1.$$

理由：直接代入 $n=3$ 和条件 $a+b+c=0$。

第三步（回代得证）：

所以 $e^a+e^b+e^c \geq 3$，即 $e^{x-1}+e^{y-1}+e^{z-1} \geq 3$。

理由：将 a, b, c 换回 $x-1, y-1, z-1$。

关键结论： 当 $x+y+z=3$ 时，$e^{x-1}+e^{y-1}+e^{z-1} \geq 3$，等号当 $x=y=z=1$ 时成立。

易错提醒

易错点一（方向记反）

误以为指数平均小于等于平均的指数，从而不等式方向写反。

正确理解（凸性决定）：

指数函数是凸函数，因此函数值的平均不小于平均值的函数值，不等式方向为 $\geq$。

错因分析（凹凸混淆）：

混淆了凸函数与凹函数的 Jensen 不等式形式。

易错点二（取等忽略）

使用时只写出不等式，忽略等号成立条件。

正确理解（严格凸性）：

等号成立当且仅当所有变量相等，否则为严格大于。

错因分析（细节遗漏）：

认为不等式在任何情况下都严格成立，未注意取等条件的重要性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（权重滥用）

在加权形式中，未保证权重非负且和为 1 就直接使用。

正确理解（权重要求）：

加权 Jensen 不等式要求权重 $\lambda_i \geq 0$ 且 $\sum \lambda_i = 1$，否则结论不成立。

错因分析（条件缺失）：

忽略了凸函数 Jensen 不等式的适用条件。

结论小结

一句话核心

指数函数的凸性导致指数平均不小于平均的指数。

使用条件

- **条件 1（变量实数）：** $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 为任意实数。
- **条件 2（权重相等）：** 主结论中默认权重相等；加权形式需权重非负且和为 1。

关键提醒

- **易错点（方向记反）：** 牢记凸函数导致 $\geq$，切勿反向。
- **检查项（取等条件）：** 检查等号是否在所有变量相等时取得。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.16 指数函数凸性不等式：算术平均 ≥ 几何平均

二级结论

条件

条件 1（底数正且非一）：

$a > 0$ 且 $a \neq 1$。

结论

结论一（算术几何平均不等式）：

直观描述： 两指数函数值的算术平均不小于中点的函数值。

$$\frac{a^x + a^y}{2} \geq a^{\frac{x+y}{2}}.$$

推广结论（加权凸性形式）：

直观描述： 加权平均形式，系数和为 1 时仍成立。

$$\lambda a^x + (1-\lambda)a^y \geq a^{\lambda x + (1-\lambda)y}, \quad \lambda \in (0,1).$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x = y$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉 指数函数图像总是向上弯曲，因此连接图像上任意两点的线段总在图像上方，中点函数值不超过两端点函数值的平均。

核心拆解

要点一（下凸函数）：

函数 $f(x) = a^x$ 是严格下凸函数，其二阶导数恒正。

要点二（中点估计）：

对任意两点 x 和 y，函数在它们中点 $\frac{x+y}{2}$ 的值不超过两端点函数值的算术平均。

几何本质（图像上凸） 在坐标系中画出 $y = a^x$ 的图像，图像呈“上翘”形状。取图像上两点 $A(x, a^x)$ 和 $B(y, a^y)$，连接线段 AB，线段 AB 上横坐标为 $\frac{x+y}{2}$ 的点对应纵坐标为 $\frac{a^x+a^y}{2}$，而图像上同横坐标的点纵坐标为 $a^{\frac{x+y}{2}}$，由图像下凸性质知线段点在图像点上方。

代数意义（平方非负） 将原不等式变形：令 $t = a^{\frac{x-y}{2}}$，则 $a^x = a^{\frac{x+y}{2}}t$，$a^y = a^{\frac{x+y}{2}}t^{-1}$。代入得 $\frac{t+t^{-1}}{2} \geq 1$，即 $t^2 - 2t + 1 \geq 0$，等价于 $(t-1)^2 \geq 0$，显然成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（函数与不等式）

- **考法一（比较大小）**：用于比较两个指数式之和与某个中间值的大小关系。
- **考法二（证明不等式）**：作为放缩工具，证明含指数函数的不等式，尤其是涉及平均值的情形。

顿悟点 **指数函数的凸性本质上是基本不等式 $(a^{\frac{x-y}{2}}-1)^2 \geq 0$ 的体现，通过换元可化为完全平方。**

使用场景

- **场景一（对称式估计）**：当出现对称的指数项 $a^x + a^y$ 且与 $a^{\frac{x+y}{2}}$ 比较时，直接应用。
- **场景二（加权放缩）**：当问题中出现带权重的指数项和时，考虑推广的加权形式。

证明

思路提示 利用换元法将指数不等式转化为关于新变量的完全平方非负形式，这是处理指数对称式的常用技巧。

正式推导

步骤一（引入中间量）：

令 $t = a^{\frac{x-y}{2}}$。因为 $a > 0$，所以 $t > 0$。

$$a^{\frac{x+y}{2}} > 0.$$

理由： 将 a^x 和 a^y 用 t 和 $a^{\frac{x+y}{2}}$ 表示。由指数运算法则：

$$a^x = a^{\frac{x+y}{2}+\frac{x-y}{2}} = a^{\frac{x+y}{2}} \cdot a^{\frac{x-y}{2}} = a^{\frac{x+y}{2}} t,$$

$$a^y = a^{\frac{x+y}{2}-\frac{x-y}{2}} = a^{\frac{x+y}{2}} \cdot a^{-\frac{x-y}{2}} = a^{\frac{x+y}{2}} t^{-1}.$$

步骤二（代入不等式）：

将上述表达式代入原不等式左边。

$$\frac{a^x + a^y}{2} = \frac{a^{\frac{x+y}{2}} t + a^{\frac{x+y}{2}} t^{-1}}{2} = a^{\frac{x+y}{2}} \cdot \frac{t + t^{-1}}{2}.$$

理由： 提取公因式 $a^{\frac{x+y}{2}}$。

步骤三（化完全平方）：

比较 $\frac{t+t^{-1}}{2}$ 与 1 的大小。

$$\frac{t + t^{-1}}{2} - 1 = \frac{t + t^{-1} - 2}{2} = \frac{t^2 - 2t + 1}{2t} = \frac{(t-1)^2}{2t}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：通分并配方。因为 $t > 0$，分母 $2t > 0$，分子 $(t-1)^2 \geq 0$，所以 $\frac{(t-1)^2}{2t} \geq 0$。

步骤四（得出结论）：

由步骤三得 $\frac{t+t^{-1}}{2} \geq 1$，因此

$$\frac{a^x + a^y}{2} = a^{\frac{x+y}{2}} \cdot \frac{t+t^{-1}}{2} \geq a^{\frac{x+y}{2}} \cdot 1 = a^{\frac{x+y}{2}}.$$

理由：两边同乘正数 $a^{\frac{x+y}{2}}$，不等号方向不变。

步骤五（取等条件）：

等号成立当且仅当 $\frac{(t-1)^2}{2t} = 0$，即 $t = 1$。

$$t = 1 \iff a^{\frac{x-y}{2}} = 1 \iff \frac{x-y}{2} = 0 \iff x = y.$$

理由：因为 $a > 0$ 且 $a \neq 1$，所以 $a^k = 1$ 当且仅当 $k = 0$。

结论回扣 **由此我们严格证明了 $\frac{a^x+a^y}{2} \geq a^{\frac{x+y}{2}}$，且等号成立当且仅当 $x = y$，这正是指数函数严格下凸性的一个直接推论。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $a > 0$，$a \neq 1$，比较 $a^3 + a^5$ 与 $2a^4$ 的大小，并说明理由。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

观察形式为 $a^x + a^y$ 与 $2a^{\frac{x+y}{2}}$，其中 $x = 3$，$y = 5$。

理由：直接对应结论中的 $\frac{a^x+a^y}{2} \geq a^{\frac{x+y}{2}}$，两边乘以 2 得 $a^x + a^y \geq 2a^{\frac{x+y}{2}}$。

第二步（应用结论）：

根据指数函数的凸性，有

$$a^3 + a^5 \geq 2a^{\frac{3+5}{2}} = 2a^4.$$

理由：结论中取 $x = 3$，$y = 5$，算术平均为 $\frac{a^3+a^5}{2}$，几何平均对应 $a^{\frac{3+5}{2}} = a^4$。

第三步（判断等号）：

等号成立当且仅当 $3 = 5$，但 $3 \neq 5$，故等号不成立。

理由：取等条件为 $x = y$，此处不满足。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第四步（写出结论）：

因此 $a^3 + a^5 > 2a^4$。

理由： 严格大于。

关键结论： $a^3 + a^5 > 2a^4$，**因为指数函数严格下凸且** $3 \neq 5$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a > 1$，求证：对任意实数 x, y，有 $a^{2x} + a^{2y} \geq 2a^{x+y}$，并指出等号成立条件。

解题步骤：

第一步（变量替换）：

令 $u = 2x$，$v = 2y$，则 $x = \frac{u}{2}$，$y = \frac{v}{2}$。

理由： 将目标不等式化为标准形式 $a^u + a^v \geq 2a^{\frac{u+v}{2}}$。

第二步（应用标准形式）：

根据结论，对任意实数 u, v，有

$$\frac{a^u + a^v}{2} \geq a^{\frac{u+v}{2}}.$$

两边乘以 2 得

$$a^u + a^v \geq 2a^{\frac{u+v}{2}}.$$

理由： 直接套用指数函数凸性不等式。

第三步（回代变量）：

将 $u = 2x$，$v = 2y$ 代入：

$$a^{2x} + a^{2y} \geq 2a^{\frac{2x+2y}{2}} = 2a^{x+y}.$$

理由： 计算 $\frac{u+v}{2} = \frac{2x+2y}{2} = x + y$。

第四步（等号条件）：

等号成立当且仅当 $u = v$，即 $2x = 2y$，亦即 $x = y$。

理由： 原结论等号成立当且仅当 $u = v$。

关键结论： **不等式** $a^{2x} + a^{2y} \geq 2a^{x+y}$ **恒成立，等号成立当且仅当** $x = y$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（底数范围混淆）

忽视底数 a 必须满足 $a > 0$ 且 $a \neq 1$，误以为对任意实数 a 成立。

正确理解（正底非一）：

结论仅在 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 时成立。$a = 1$ 时函数为常函数，不等式变为等式但无研究价值；$a \leq 0$ 时指数函数无定义或性质不同。

错因分析（定义域遗忘）：

忽略指数函数的基本定义域和底数限制，机械记忆公式导致错误。

易错点二（等号条件遗漏）

应用不等式后忽略讨论等号成立条件，或错误认为等号总成立。

正确理解（中点重合）：

等号成立当且仅当 $x = y$，即两点横坐标相同（函数图像上两点重合）。

错因分析（凸性理解不足）：

对“严格下凸”理解不深，误以为在某些情况下 $x \neq y$ 也可能取等。

易错点三（方向记反）

记错不等式方向，误写为 $\frac{a^x+a^y}{2} \leq a^{\frac{x+y}{2}}$。

正确理解（算术平均大）：

由于函数下凸，两端点算术平均大于中点函数值，故不等号为 $\geq$。

错因分析（图像想象错误）：

混淆“上凸”与“下凸”的几何直观，或将指数函数误认为上凸函数。

结论小结

一句话核心 **指数函数 a^x（$a > 0$，$a \neq 1$）图像下凸，因此两端点函数值的算术平均不小于中点函数值。**

使用条件

- **条件 1（底数正非一）：** $a > 0$ 且 $a \neq 1$，这是指数函数的基本定义。
- **条件 2（实数自变量）：** x, y 为任意实数，无其他限制。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **易错点（等号条件）**：等号仅在 $x = y$ 时成立，使用时务必验证。
- **检查项（不等式方向）**：确保不等号方向为 $\geq$，表示算术平均大于等于几何平均（中点函数值）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.17 正弦函数凹性不等式

二级结论

条件

条件 1（区间限制）：

$x, y \in (0, \pi)$。

条件 2（内角条件）：

A, B, C 为三角形内角。

结论

结论一（凹性不等式）：

直观描述： 正弦函数凹性导致算术平均小于中点正弦值。

$$\frac{\sin x + \sin y}{2} \leq \sin\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

推广结论（三角形正弦和）：

直观描述： 三角形内角正弦和的最大值为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$。

$$\frac{\sin A + \sin B + \sin C}{3} \leq \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

等号/取等条件： 对于结论一，等号成立当且仅当 $x = y$；对于推广结论，等号成立当且仅当 $\triangle ABC$ 为正三角形。

理解说明

一句话直觉

正弦函数在 $(0, \pi)$ 上图像向下凸（凹），导致任意两点连线的中点对应的正弦值大于两点正弦值的算术平均。

核心拆解

要点一（凹性判定）：

正弦函数在区间 $(0, \pi)$ 上的二阶导数为负，即 $\frac{d^2}{dx^2}\sin x = -\sin x < 0$（因为 $x \in (0, \pi)$ 时 $\sin x > 0$），故为凹函数。

要点二（凹性不等式）：

对于凹函数 f，有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{f(x)+f(y)}{2}$，代入 $f(x) = \sin x$ 即得结论。

几何本质（弦在曲线下方）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

在平面直角坐标系中，连接 $(x, \sin x)$ 和 $(y, \sin y)$ 两点的线段位于正弦曲线下方，中点处线段纵坐标小于曲线纵坐标。

代数意义（平均值比较）

不等式比较了函数值的算术平均与自变量平均点的函数值，凹性确保后者不小于前者。

考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接放缩）**：在证明含正弦的不等式时，直接应用此公式进行放缩。
- **考法二（最值求解）**：在三角形中求正弦和的最大值或相关最值问题。

顿悟点

凹性不等式的取等条件对应自变量相等，在三角形中对应内角均等（正三角形）。

使用场景

- **场景一（两点比较）**：当题目涉及比较 $\sin x$ 与 $\sin y$ 的平均值与 $\sin \frac{x+y}{2}$ 时。
- **场景二（三角形优化）**：当题目涉及三角形内角正弦和或乘积的最值时。

证明

思路提示

通过计算正弦函数的二阶导数证明其在 $(0, \pi)$ 上为凹函数，然后利用凹函数的定义导出不等式，最后在三角形中应用。

正式推导

步骤一（计算导数）：

对 $f(x) = \sin x$ 求导。

$$f'(x) = \cos x, \quad f''(x) = -\sin x.$$

理由：正弦函数的一阶导为余弦，二阶导为负正弦。

步骤二（判断凹性）：

在区间 $(0, \pi)$ 上，有 $\sin x > 0$，故 $f''(x) = -\sin x < 0$。

$$f''(x) < 0 \quad \text{对任意} x \in (0, \pi).$$

理由：二阶导为负是函数为凹的充分条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（应用凹性）：

对于凹函数 f，有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{f(x)+f(y)}{2}$。

$$\sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{\sin x + \sin y}{2}.$$

理由： 将 $f(x) = \sin x$ 代入凹函数不等式。

步骤四（三角形推广）：

设 A, B, C 为三角形内角，则 $A + B + C = \pi$，且 $A, B, C \in (0, \pi)$。

$$\frac{\sin A + \sin B + \sin C}{3} \leq \sin\left(\frac{A+B+C}{3}\right) = \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

理由： 对三个点应用凹函数不等式，并利用三角形内角和为 π。

结论回扣

综上，正弦函数在 $(0, \pi)$ 上的凹性导致不等式 $\frac{\sin x+\sin y}{2} \leq \sin\left(\frac{x+y}{2}\right)$，在三角形中进一步得到 $\frac{\sin A+\sin B+\sin C}{3} \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$，取等条件分别为 $x = y$ 和 $A = B = C$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $x, y \in (0, \pi)$，且 $x + y = \frac{\pi}{2}$，证明 $\sin x + \sin y \leq \sqrt{2}$。

解题步骤：

第一步（应用凹性）：

由正弦函数凹性不等式，有

$$\frac{\sin x + \sin y}{2} \leq \sin\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

理由： 因为 $x, y \in (0, \pi)$，满足凹性条件。

第二步（代入条件）：

代入 $x + y = \frac{\pi}{2}$，得 $\frac{x+y}{2} = \frac{\pi}{4}$。

$$\frac{\sin x + \sin y}{2} \leq \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

理由： 利用已知条件简化中点正弦值。

第三步（导出结论）：

两边乘以 2，得到

$$\sin x + \sin y \leq 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： 不等式两边同乘正数 2，不等号方向不变。

关键结论： **当 $x+y=\frac{\pi}{2}$ 时，$\sin x+\sin y$ 的最大值为 $\sqrt{2}$，取等当 $x=y=\frac{\pi}{4}$。**

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，证明 $\sin A+\sin B\le 2\cos\frac{C}{2}$。

解题步骤：

第一步（应用凹性）：

由正弦函数凹性不等式，有

$$\frac{\sin A+\sin B}{2}\le\sin\left(\frac{A+B}{2}\right).$$

理由： 因为 $A,B\in(0,\pi)$ 且为三角形内角，满足凹性条件。

第二步（利用内角和）：

在三角形中，$A+B=\pi-C$，所以 $\frac{A+B}{2}=\frac{\pi}{2}-\frac{C}{2}$。

$$\sin\left(\frac{A+B}{2}\right)=\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{C}{2}\right)=\cos\frac{C}{2}.$$

理由： 三角函数的诱导公式。

第三步（结合得证）：

代入第一步的不等式，得到

$$\frac{\sin A+\sin B}{2}\le\cos\frac{C}{2}\quad\Rightarrow\quad\sin A+\sin B\le 2\cos\frac{C}{2}.$$

理由： 将第二步结果代入并乘以 2。

关键结论： **在三角形中，$\sin A+\sin B\le 2\cos\frac{C}{2}$，取等当 $A=B$。**

易错提醒

易错点一（区间忽略）

将不等式应用于 $x,y\notin(0,\pi)$ 的情况，导致错误。

正确理解（区间限制）：

不等式成立的前提是 $x,y\in(0,\pi)$，因为正弦函数在此区间才为凹。

错因分析（定义不清）：

未检查函数凹性所依赖的区间，盲目套用公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（凹凸混淆）

记忆凹性与凸性时混淆，导致不等号方向写反。

正确理解（凹性不等式）：

对于凹函数，中点函数值不小于端点函数值的平均。

错因分析（概念模糊）：

对凹函数和凸函数的几何形象区分不清。

易错点三（取等遗漏）

在使用不等式放缩后，忽略等号成立的条件。

正确理解（取等条件）：

等号成立当且仅当所有自变量相等（如 $x = y$ 或 $A = B = C$）。

错因分析（细节疏忽）：

只关注不等式本身，未考虑取等时的变量关系。

结论小结

一句话核心

正弦函数在 $(0, \pi)$ 上为凹函数，因此其函数值的算术平均不大于自变量中点处的函数值。

使用条件

- **条件 1（区间内点）：** 自变量 x, y 必须属于开区间 $(0, \pi)$。
- **条件 2（三角形角）：** 在三角形中应用时，A, B, C 需为内角且均在 $(0, \pi)$ 内。

关键提醒

- **易错点（方向混淆）：** 凹性不等式不等号方向为 $\leq$，勿与凸性混淆。
- **检查项（取等验证）：** 应用后务必检查等号成立条件是否满足题目要求。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.18 余弦函数凹性不等式与三角形余弦和上界

二级结论

条件

条件 1（角度范围）：

$x, y \in (0, \frac{\pi}{2})$。

条件 2（三角形内角）：

A, B, C 是锐角三角形的三个内角。

结论

结论一（余弦凹性不等式）：

直观描述： 两角余弦算术平均不超过半角余弦。

$$\frac{\cos x + \cos y}{2} \leq \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

推广结论（三角形余弦和上界）：

直观描述： 锐角三角形内角余弦和不超过 $\frac{3}{2}$。

$$\cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$$

等号/取等条件： 对于结论一，等号成立当且仅当 $x = y$；对于推广结论，等号成立当且仅当 $A = B = C = \frac{\pi}{3}$（即三角形为等边三角形）。

理解说明

一句话直觉

凹函数图像上任意两点连弦位于曲线下方，因此函数值的算术平均不超过平均自变量的函数值。

核心拆解

要点一（凹函数定义）：

对于凹函数 f，有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{f(x)+f(y)}{2}$。

要点二（Jensen 不等式）：

对于凹函数，函数值的加权平均不超过自变量加权平均的函数值。

几何本质（弦在曲线下）

在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上，余弦函数图像是凹的，连接图像上两点的弦位于曲线下方。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（平均不等式）

不等式反映了算术平均与函数值的关系：对于凹函数，函数值的算术平均不超过自变量的算术平均的函数值。

考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接应用）**：证明两个角的余弦不等式。
- **考法二（三角形极值）**：求锐角三角形余弦和的最大值。

顿悟点

凹性导致“平均函数值”小于“函数平均值”，但注意方向：$\frac{f(x)+f(y)}{2} \leq f\left(\frac{x+y}{2}\right)$ 对应凹函数。

使用场景

- **场景一（证明不等式）**：当涉及余弦函数的不等式时，可考虑凹性放缩。
- **场景二（优化问题）**：在锐角三角形中求三角函数和的极值。

证明

思路提示

利用余弦函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上的凹性，对于两个角直接应用凹函数定义；对于三角形，应用 Jensen 不等式。

正式推导

步骤一（验证凹性）：

余弦函数 $f(t) = \cos t$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上二阶导数 $f''(t) = -\cos t < 0$，因此是凹函数。

理由：凹函数的二阶导数非正。

步骤二（应用凹性）：

对于凹函数，取 $t = \frac{1}{2}$，有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{f(x)+f(y)}{2}$。

$$\cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{\cos x + \cos y}{2}$$

理由：凹函数定义。

步骤三（得不等式）：

整理即得两个角的不等式。

$$\frac{\cos x + \cos y}{2} \leq \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：不等号方向不变。

步骤四（三角形设置）：

设 A, B, C 是锐角三角形的内角，则 $A, B, C \in (0, \frac{\pi}{2})$ 且 $A + B + C = \pi$。

理由：锐角三角形定义和内角和定理。

步骤五（应用 Jensen 不等式）：

由于余弦函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上凹，由 Jensen 不等式（等权重）：

$$\frac{\cos A + \cos B + \cos C}{3} \leq \cos\left(\frac{A + B + C}{3}\right)$$

理由：凹函数对三点平均成立。

步骤六（代入求和）：

代入 $A + B + C = \pi$，计算 $\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$，两边乘以 3 得：

$$\cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$$

理由：简单代数运算。

结论回扣

因此，对于两个锐角，余弦值的平均不超过半角的余弦；对于锐角三角形，余弦和不超过 $\frac{3}{2}$，等号在 $x = y$ 或 $A = B = C = \frac{\pi}{3}$ 时成立。

典型例题

例 1（基础）

题目：设 $x, y \in (0, \frac{\pi}{2})$ 且 $x + y = \frac{\pi}{2}$，证明 $\cos x + \cos y \leq \sqrt{2}$。

解题步骤：

第一步（应用凹性不等式）：

由结论一，$\frac{\cos x + \cos y}{2} \leq \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$。

理由：直接代入已知条件。

第二步（代入半角）：

由 $x + y = \frac{\pi}{2}$，得 $\frac{x+y}{2} = \frac{\pi}{4}$，故 $\cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$。

$$\frac{\cos x + \cos y}{2} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

理由：计算余弦值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（得结论）：

两边乘以 2，得到 $\cos x + \cos y \leq \sqrt{2}$。

理由：不等式乘法性质。

关键结论： 当 $x + y = \frac{\pi}{2}$ 时，$\cos x + \cos y$ 的最大值为 $\sqrt{2}$，等号在 $x = y = \frac{\pi}{4}$ 时成立。

例 2（稍变形）

题目： 在锐角三角形 ABC 中，证明 $\cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$，并求等号成立条件。

解题步骤：

第一步（确认条件）：

A, B, C 是锐角三角形的内角，故 $A, B, C \in (0, \frac{\pi}{2})$ 且 $A + B + C = \pi$。

理由：锐角三角形性质。

第二步（应用 Jensen 不等式）：

由于余弦函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上凹，有：

$$\frac{\cos A + \cos B + \cos C}{3} \leq \cos\left(\frac{A + B + C}{3}\right)$$

理由：凹函数的 Jensen 不等式。

第三步（计算化简）：

代入 $A + B + C = \pi$，$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$，两边乘以 3 得：

$$\cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$$

理由：代数运算。

关键结论： 锐角三角形余弦和的最大值为 $\frac{3}{2}$，等号当且仅当 $A = B = C = \frac{\pi}{3}$（等边三角形）时成立。

易错提醒

易错点一（区间忽略）：

误将角度取到区间外，如 $x \geq \frac{\pi}{2}$，仍应用不等式。

正确理解（严格锐角）：

结论仅当 $x, y \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（凸性改变）：

余弦函数在更大区间上凸性改变，不等式方向可能反转。

易错点二（方向混淆）：

记错凹函数不等式方向，写成 $\frac{\cos x+\cos y}{2} \geq \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$。

正确理解（弦在下）：

凹函数图像弦在曲线下，因此函数值平均不超过平均值的函数值。

错因分析（定义不清）：

对凹函数定义记忆模糊，与凸函数混淆。

易错点三（三角形非锐角）：

在非锐角三角形中应用 $\cos A+\cos B+\cos C \leq \frac{3}{2}$。

正确理解（仅锐角）：

该不等式仅对锐角三角形成立；直角三角形或钝角三角形可能不成立。

错因分析（条件遗漏）：

忽略“锐角三角形”前提，错误推广。

结论小结

一句话核心

余弦函数在锐角区间凹，导致两角余弦平均不超过半角余弦；锐角三角形余弦和有上界 $\frac{3}{2}$。

使用条件

- **条件 1（角度范围）：** $x, y \in (0, \frac{\pi}{2})$。
- **条件 2（三角形内角）：** A, B, C 是锐角三角形的三个内角。

关键提醒

- **易错点（区间与方向）：** 确保角度在锐角区间，并记住不等式方向。
- **检查项（取等条件）：** 等号成立时 $x=y$ 或 $A=B=C=\frac{\pi}{3}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.19 正切凸性不等式与锐角三角形正切和

二级结论

条件

条件 1（角范围）：

两个角 x, y 都在开区间 $(0, \pi/2)$ 内。

结论

结论一（正切凸性不等式）：

直观描述： 正切值的算术平均不小于这两角算术平均的正切值。

$$\frac{\tan x + \tan y}{2} \geq \tan\left(\frac{x+y}{2}\right),$$

等号成立当且仅当 $x = y$。

推广结论（三角形正切和下界）：

直观描述： 锐角三角形三个内角正切之和不小于 $3\sqrt{3}$。

$$\tan A + \tan B + \tan C \geq 3\sqrt{3},$$

等号成立当且仅当 $A = B = C = \pi/3$（即三角形为等边三角形）。

等号/取等条件： 对于结论一，等号成立当且仅当 $x = y$；对于推广结论，等号成立当且仅当三角形为等边三角形。

理解说明

一句话直觉 正切函数在 $(0, \pi/2)$ 区间内是凸函数，因此两个角的正切值的算术平均不会小于这两角算术平均的正切值；推广到锐角三角形，三个内角正切之和有一个确定的下界 $3\sqrt{3}$。

核心拆解

要点一（凸性定义）：

函数 $f(x)$ 在区间 I 上称为凸函数，如果对于任意 $x_1, x_2 \in I$ 和 $t \in [0, 1]$，有 $f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$。正切函数在 $(0, \pi/2)$ 满足此性质。

要点二（Jensen 不等式）：

对于凸函数 f，有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$，这正是主结论的表达式。

几何本质（正切曲线凸性） 在 $(0, \pi/2)$ 区间，正切曲线的图像是向下凸的（即二

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

阶导数为正），因此连接曲线上两点的线段位于曲线上方，导致算术平均的正切值不大于正切值的算术平均。

代数意义（差法证明） 可通过考虑差函数 $D(x,y)=\frac{\tan x+\tan y}{2}-\tan\left(\frac{x+y}{2}\right)$，利用三角恒等式化简，证明其非负，从而建立不等式。

考点价值（不等式最值）

- **考法一（直接应用）**：在比较两个角的正切值大小或证明相关不等式时，直接使用该结论。
- **考法二（三角形最值）**：在锐角三角形中，求正切和的最小值或证明其不小于 $3\sqrt{3}$，常用于解三角形与不等式综合题。

顿悟点 **当遇到正切函数在锐角范围内的不等式时，可优先考虑其凸性，利用 Jensen 不等式或差法快速证明。**

使用场景

- **场景一（两角比较）**：已知两个锐角，比较 $\tan x+\tan y$ 与 $2\tan((x+y)/2)$ 的大小。
- **场景二（三角形论证）**：在锐角三角形中，证明 $\tan A+\tan B+\tan C\geq 3\sqrt{3}$ 或类似结论。

证明

思路提示 利用正切函数的凸性，或通过构造差函数并利用三角恒等式证明其非负；对于推论，结合主定理和三角形内角和性质，利用 Jensen 不等式或对称性推导。

正式推导

步骤一（设差函数）：

定义差函数 $D(x,y)=\frac{\tan x+\tan y}{2}-\tan\left(\frac{x+y}{2}\right)$，目标证明 $D(x,y)\geq 0$。

$$D(x,y)=\frac{\tan x+\tan y}{2}-\tan\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

理由：将不等式转化为函数非负性问题，便于分析。

步骤二（三角恒等式）：

利用正切和公式：$\tan x+\tan y=\frac{\sin(x+y)}{\cos x\cos y}$，以及 $\tan\left(\frac{x+y}{2}\right)=\frac{\sin(x+y)}{1+\cos(x+y)}$。

$$\begin{aligned}D(x,y)&=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sin(x+y)}{\cos x\cos y}-\frac{\sin(x+y)}{1+\cos(x+y)}\\&=\sin(x+y)\left(\frac{1}{2\cos x\cos y}-\frac{1}{1+\cos(x+y)}\right)\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：通过恒等式化简，将差函数表示为公共因子乘以一个表达式。

步骤三（判别符号）：

由于 $x, y \in (0, \pi/2)$，有 $\sin(x+y) > 0$，因此只需证明括号内表达式非负。即证明：

$$\frac{1}{2\cos x \cos y} \geq \frac{1}{1+\cos(x+y)}$$

这等价于 $1+\cos(x+y) \geq 2\cos x \cos y$。

理由：$\sin(x+y)$ 为正，不影响不等号方向；比较分母大小即可。

步骤四（化简不等式）：

利用余弦和公式 $\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$，代入得：

$$\begin{aligned} 1+\cos(x+y) &\geq 2\cos x \cos y \\ 1+\cos x \cos y - \sin x \sin y &\geq 2\cos x \cos y \\ 1-\cos x \cos y - \sin x \sin y &\geq 0 \\ 1-(\cos x \cos y + \sin x \sin y) &\geq 0 \\ 1-\cos(x-y) &\geq 0 \end{aligned}$$

理由：将不等式逐步化简，最终得到 $\cos(x-y) \leq 1$，这显然成立。

步骤五（取等条件）：

等号成立当且仅当 $\cos(x-y) = 1$，即 $x-y = 2k\pi$，但由于 $x, y \in (0, \pi/2)$，所以 $x = y$。

$$D(x,y) = 0 \iff \cos(x-y) = 1 \iff x = y$$

理由：$\cos(x-y) = 1$ 时，差函数为零；结合角范围得 $x = y$。

步骤六（推广到三角形）：

对于锐角三角形 $\triangle ABC$，有 $A, B, C \in (0, \pi/2)$ 且 $A+B+C = \pi$。应用主定理于三组角对，或直接使用 Jensen 不等式。

$$\begin{aligned} \tan A + \tan B + \tan C &\geq 3\tan\left(\frac{A+B+C}{3}\right) \\ &= 3\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = 3\sqrt{3} \end{aligned}$$

理由：正切函数在 $(0, \pi/2)$ 是凸函数，由 Jensen 不等式，对于凸函数 f，有 $\frac{f(A)+f(B)+f(C)}{3} \geq f\left(\frac{A+B+C}{3}\right)$，这里 $f(x) = \tan x$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤七（三角形取等）：

等号成立当且仅当 $A = B = C$，即三角形为等边三角形。

$$\tan A + \tan B + \tan C = 3\sqrt{3} \iff A = B = C = \frac{\pi}{3}$$

理由： Jensen 不等式等号成立当且仅当所有变量相等。

结论回扣 因此，主定理和推论得证：在 $(0, \pi/2)$ 内，正切函数满足凸性不等式；在锐角三角形中，正切和的最小值为 $3\sqrt{3}$，当且仅当三角形等边时取得。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x, y \in (0, \pi/2)$，且 $x + y = \frac{\pi}{3}$，证明 $\tan x + \tan y \geq \frac{2}{\sqrt{3}}$。

解题步骤：

第一步（应用主定理）：

根据主定理，有 $\frac{\tan x + \tan y}{2} \geq \tan\left(\frac{x+y}{2}\right)$。

$$\frac{\tan x + \tan y}{2} \geq \tan\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

理由： 直接使用正切凸性不等式。

第二步（代入已知）：

已知 $x + y = \frac{\pi}{3}$，所以 $\frac{x+y}{2} = \frac{\pi}{6}$，且 $\tan(\pi/6) = \frac{1}{\sqrt{3}}$。

$$\frac{\tan x + \tan y}{2} \geq \tan\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

理由： 将已知条件代入不等式。

第三步（整理结论）：

两边乘以 2，得到 $\tan x + \tan y \geq \frac{2}{\sqrt{3}}$。

$$\tan x + \tan y \geq 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

理由： 简单代数变形，得到所求不等式。

关键结论： 对于满足 $x + y = \pi/3$ 的锐角 x, y，有 $\tan x + \tan y \geq 2/\sqrt{3}$，等号当 $x = y = \pi/6$ 时成立。

例 2（稍变形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 设 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，求 $\tan A + \tan B + \tan C$ 的最小值，并说明取到最小值时三角形的形状。

解题步骤：

第一步（应用推论）：

根据推论，对于锐角三角形，有 $\tan A + \tan B + \tan C \geq 3\sqrt{3}$。

$$\tan A + \tan B + \tan C \geq 3\sqrt{3}$$

理由： 直接使用三角形正切和不等式。

第二步（验证等号）：

等号成立当且仅当 $A = B = C = \pi/3$，即三角形为等边三角形。

$$\tan A + \tan B + \tan C = 3\sqrt{3} \iff A = B = C = \frac{\pi}{3}$$

理由： 推论中明确了取等条件。

第三步（结论）：

因此，$\tan A + \tan B + \tan C$ 的最小值为 $3\sqrt{3}$，当且仅当三角形为等边三角形时取到。

$$\min(\tan A + \tan B + \tan C) = 3\sqrt{3}$$

理由： 由不等式知下界为 $3\sqrt{3}$，且等号可达，故为最小值。

关键结论： **在锐角三角形中，$\tan A + \tan B + \tan C$ 的最小值为 $3\sqrt{3}$，取到最小值时三角形为等边三角形。**

易错提醒

易错点一（忽略角范围）

在使用不等式时，忽略角 x, y 必须在 $(0, \pi/2)$ 内，错误地应用于其他区间。

正确理解（锐角限制）：

该不等式仅在角属于 $(0, \pi/2)$ 时成立，因为正切函数在此区间内是凸的。

错因分析（凸性丢失）：

正切函数在 $(0, \pi/2)$ 外可能不是凸的，甚至无定义，导致不等式不成立。

易错点二（三角形非锐角）

将推论应用于非锐角三角形，错误地认为 $\tan A + \tan B + \tan C \geq 3\sqrt{3}$ 恒成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（锐角条件）：

推论仅对锐角三角形成立，对于钝角三角形，正切值可能为负，不等式不再有效。

错因分析（符号变化）：

在钝角三角形中，一个内角大于 $\pi/2$，其正切为负，从而和可能小于 $3\sqrt{3}$。

易错点三（等号条件忽略）

在使用不等式求最值时，忽略等号成立条件，导致答案不完整或错误。

正确理解（取等必要）：

不等式等号成立有特定条件：对于主定理需 $x = y$，对于推论需 $A = B = C = \pi/3$。

错因分析（条件遗漏）：

在证明或求解中，未验证等号是否可达，从而无法确定最值是否取到。

结论小结

一句话核心 **正切函数在 $(0, \pi/2)$ 内是凸函数，导致两个角的正切算术平均不小于这两角平均的正切；推广到锐角三角形，三个内角正切之和不小于 $3\sqrt{3}$。**

使用条件

- **条件 1（角范围）：** 角必须属于开区间 $(0, \pi/2)$。
- **条件 2（三角形锐角）：** 当推广到三角形时，三角形必须是锐角三角形。

关键提醒

- **易错点（范围验证）：** 使用前务必检查角是否在 $(0, \pi/2)$ 内，或三角形是否为锐角。
- **检查项（取等条件）：** 在求最值或证明时，记得说明等号成立条件，以确保结论严谨。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.20 对数平均不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

设 $x, y \in (0, +\infty)$。

结论

结论一（对数平均）：

直观描述： 算术平均的对数不小于对数的算术平均。

$$\frac{\ln x + \ln y}{2} \leq \ln\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

推广结论（Jensen 推广）：

直观描述： 对任意有限个正实数，对数平均不等式成立。

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \ln x_i \leq \ln\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right).$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x = y$（主结论）或 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$（推广结论）时取等。

理解说明

一句话直觉

对数函数图像是“向上凸”的，因此连接曲线上两点的弦总在曲线下方。

核心拆解

要点一（凹函数定义）：

函数 $f(t) = \ln t$ 在 $(0, +\infty)$ 上为凹函数，即其二阶导数为负。

要点二（Jensen 不等式）：

凹函数满足：函数值的平均不超过平均值的函数值。

几何本质（弦在曲线下）

对于凹函数，图像上任意两点连成的弦段总位于函数图像之下。因此，弦中点对应的函数值不小于曲线中点的函数值。

代数意义（平均不等式）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

将“对数”视为一种运算，该不等式表明：先取对数再平均，结果不大于先平均再取对数。这类似于算术-几何平均不等式的对数版本。

考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接应用）**：用于证明含对数的不等式，或比较对数表达式大小。
- **考法二（函数凸性）**：结合函数凹凸性，考察 Jensen 不等式的使用。

顿悟点

当题目中出现“$\ln\frac{x+y}{2}$”与“$\frac{\ln x+\ln y}{2}$”的比较时，应立即联想到此结论。

使用场景

- **场景一（双变量不等式）**：涉及两个正实数对数平均的比较问题。
- **场景二（多变量推广）**：需要处理多个正实数对数表达式时，使用推广形式。

证明

思路提示

利用函数 $f(t)=\ln t$ 的凹性，通过导数或定义证明不等式。这里采用导数法证明凹性，再应用凹函数性质。

正式推导

步骤一（函数凹性）：

考虑 $f(t)=\ln t$，计算其二阶导数。

$$f'(t)=\frac{1}{t},\quad f''(t)=-\frac{1}{t^2}.$$

理由：由于 $t>0$，$f''(t)<0$，故 $f(t)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是凹函数。

步骤二（凹函数性质）：

对于凹函数，有 Jensen 不等式：对任意 $x,y>0$ 和 $\lambda\in[0,1]$，

$$\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y)\le f(\lambda x+(1-\lambda)y).$$

取 $\lambda=\frac{1}{2}$，即得

$$\frac{f(x)+f(y)}{2}\le f\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

理由：Jensen 不等式是凹函数的直接性质，当权重相等时简化。

步骤三（代入函数）：

将 $f(t)=\ln t$ 代入上式。

$$\frac{\ln x+\ln y}{2}\le \ln\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： 直接替换 f 的定义即得主结论。

步骤四（推广证明）：

对于 n 个正实数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$，同样由 f 的凹性和 Jensen 不等式，

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(x_i) \le f\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right).$$

代入 $f(t) = \ln t$ 即得推广结论。

理由： Jensen 不等式对有限个点成立，权重为 $\frac{1}{n}$。

结论回扣

因此，对数函数 $f(t) = \ln t$ 的凹性保证了所述不等式成立，且等号仅在所有变量相等时取得。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $a, b > 0$，比较 $\frac{\ln a + \ln b}{2}$ 与 $\ln\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 的大小。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

由题，a, b 为正实数，满足对数平均不等式的条件。

理由： 不等式要求 $x, y > 0$，此处 $x = a, y = b$。

第二步（应用结论）：

直接使用对数平均不等式。

$$\frac{\ln a + \ln b}{2} \le \ln\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

理由： 这是结论一的直接代入。

第三步（判断取等）：

等号成立当且仅当 $a = b$。

理由： 根据取等条件，当两数相等时取等。

关键结论： $\frac{\ln a + \ln b}{2} \le \ln\left(\frac{a+b}{2}\right)$，**等号当 $a = b$ 时成立。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $x, y > 0$ 且 $x \ne y$，证明：$\frac{\ln x - \ln y}{x - y} < \frac{1}{\sqrt{xy}}$。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（变形目标）：

将目标不等式改写为更熟悉的形式。注意到 $\frac{\ln x-\ln y}{x-y}=\frac{\ln\frac{x}{y}}{x-y}$，但不如直接利用对数平均不等式。

理由：观察发现，对数平均不等式涉及 $\frac{\ln x+\ln y}{2}$ 和 $\ln\left(\frac{x+y}{2}\right)$，但目标有差分。考虑对称化处理。

第二步（应用对称形式）：

由对数平均不等式，对于 $x,y>0$，有

$$\ln\left(\frac{x+y}{2}\right)-\frac{\ln x+\ln y}{2}\geq 0.$$

整理得

$$\ln\left(\frac{x+y}{2}\right)\geq\frac{\ln x+\ln y}{2}=\ln\sqrt{xy}.$$

理由：利用 $\frac{\ln x+\ln y}{2}=\ln\sqrt{xy}$。

第三步（推导目标）：

由于 $x\neq y$，不等式严格成立。取指数得 $\frac{x+y}{2}>\sqrt{xy}$。但目标不等式是 $\frac{\ln x-\ln y}{x-y}<\frac{1}{\sqrt{xy}}$，需另寻方法。考虑函数 $f(t)=\ln t$ 的凹性：差商小于中点的导数值。即

$$\frac{\ln x-\ln y}{x-y}<f'\left(\frac{x+y}{2}\right)=\frac{2}{x+y}.$$

又由算术-几何平均不等式，$\frac{2}{x+y}\leq\frac{1}{\sqrt{xy}}$，且当 $x\neq y$ 时严格小于。因此

$$\frac{\ln x-\ln y}{x-y}<\frac{2}{x+y}\leq\frac{1}{\sqrt{xy}}.$$

理由：凹函数性质结合基本不等式，逐步推导目标。

关键结论： 对于 $x,y>0$ 且 $x\neq y$，有 $\frac{\ln x-\ln y}{x-y}<\frac{1}{\sqrt{xy}}$。

易错提醒

易错点一（方向混淆）

误记不等式方向，认为 $\frac{\ln x+\ln y}{2}\geq\ln\left(\frac{x+y}{2}\right)$。

正确理解（凹函数性质）：

由于 $\ln t$ 是凹函数，函数值的平均不超过平均值的函数值，因此不等式方向为 $\leq$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（图像误读）：

将凹函数图像误记为“凸向上”，导致方向判断错误。

易错点二（忽略定义域）

在应用时忽略 x, y 必须为正实数的条件，错误用于非正数。

正确理解（定义域限制）：

对数函数 $\ln t$ 的定义域是 $(0, +\infty)$，因此 x, y 必须为正。

错因分析（函数未定义）：

忘记对数仅对正数有定义，导致在无效区间使用结论。

易错点三（取等条件漏解）

认为等号总是成立，或仅在 $x = y$ 时成立但推广形式中忽略所有变量相等。

正确理解（严格取等）：

等号成立当且仅当所有涉及的变量相等（双变量时 $x = y$，多变量时 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$）。

错因分析（条件遗漏）：

未注意 Jensen 不等式取等条件要求所有点相同，导致漏解或多解。

结论小结

一句话核心

对数函数是凹函数，因此对数的算术平均不超过算术平均的对数。

使用条件

- **条件 1（正实数）**：所有变量必须为正实数，确保对数有定义。
- **条件 2（凹函数适用）**：结论依赖于 $\ln t$ 的凹性，推广时需确认函数性质。

关键提醒

- **易错点（方向记忆）**：牢记不等式方向为 $\frac{\ln x + \ln y}{2} \le \ln\left(\frac{x+y}{2}\right)$，避免反号。
- **检查项（取等条件）**：应用后务必检查等号是否可能成立，通常仅在变量相等时取等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.21 幂函数凸性不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数变量）：

设 $x, y > 0$，$n \in \mathbb{R}$。

结论

结论一（指数外凸）：

直观描述： 当指数 $n > 1$ 或 $n < 0$ 时，幂函数上凸，算术平均不小于幂平均。

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2}\right)^n.$$

结论二（指数内凹）：

直观描述： 当指数 $0 < n < 1$ 时，幂函数下凸，算术平均不大于幂平均。

$$\frac{x^n + y^n}{2} \leq \left(\frac{x+y}{2}\right)^n.$$

推广结论（Jensen 特例）：

直观描述： 此结论是凸函数 Jensen 不等式的二元特例。

$$\text{对于凸函数} f, \quad f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

等号/取等条件： 等号成立当且仅当 $x = y$。

理解说明

一句话直觉 幂函数的凸性决定了算术平均与幂平均的大小关系，指数范围直接控制不等式方向。

核心拆解

要点一（指数定凸凹）：

指数 n 的范围决定 $f(t) = t^n$ 的凸凹性：$n > 1$ 或 $n < 0$ 时凸，$0 < n < 1$ 时凹。

要点二（凸凹控方向）：

凸函数时算术平均不小于函数平均，凹函数时反向。

几何本质（图像凸性） 在 $t > 0$ 上，幂函数图像当 $n > 1$ 或 $n < 0$ 时向上弯曲（上

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

凸），两点连线中点在函数图像上方；当 $0 < n < 1$ 时向下弯曲（下凸），中点在下。不等式反映此几何特征。

代数意义（缩放比较） 比较 $x^n + y^n$ 与 $(x+y)^n$ 的缩放关系。当 $n > 1$ 或 $n < 0$ 时，$x^n + y^n$ 被放大；当 $0 < n < 1$ 时，被缩小。中心点是算术平均的幂次。

考点价值（不等式应用）

- **考法一（直接比较）**：给定 x, y, n，直接计算并比较两边大小，验证不等式。
- **考法二（证明中间步）**：在复杂不等式证明中，作为放缩工具，简化幂次运算。

顿悟点 **不等式方向与指数范围一一对应，只需记住“外凸则大、内凹则小”，避免死记硬背。**

使用场景

- **场景一（对称不等式）**：处理含有 $x^n + y^n$ 与 $(x+y)^n$ 的对称式时，直接应用。
- **场景二（最值估计）**：在优化问题中，利用不等式给出表达式上下界，简化求最值。

证明

思路提示 通过分析幂函数 $f(t) = t^n$ 的凸凹性（利用二阶导数），应用凸函数不等式（Jensen 不等式特例）直接导出结论。

正式推导

步骤一（函数定义）：

定义函数 $f(t) = t^n$，其中 $t > 0$，$n \in \mathbb{R}$。

$$f(t) = t^n.$$

理由： 将原不等式转化为函数凸性问题，便于分析。

步骤二（导数计算）：

求 $f(t)$ 的一阶和二阶导数。

$$f'(t) = nt^{n-1}, \quad f''(t) = n(n-1)t^{n-2}.$$

理由： 二阶导数的符号决定函数的凸凹性。

步骤三（凸性判断）：

分析 $f''(t)$ 的符号。

$$\text{当} n > 1 \text{ 或} n < 0 \text{ 时}, n(n-1) > 0 \Rightarrow f''(t) > 0, f \text{ 为凸函数}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$$\text{当}0 < n < 1\text{ 时}, n(n-1) < 0 \Rightarrow f''(t) < 0,\ f\text{ 为凹函数}.$$

理由：二阶导正则凸，负则凹，这是凸凹性的充要条件。

步骤四（凸性不等式）：

应用凸函数性质。对于凸函数 f，有

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \le \frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

对于凹函数 f，不等号反向。等号成立当且仅当 $x = y$。

理由：这是凸函数 Jensen 不等式的二元等权重特例，可直接引用。

步骤五（代入得证）：

将 $f(t) = t^n$ 代入上式。

$$\text{当}n > 1\text{ 或}n < 0\text{ 时：}\quad \left(\frac{x+y}{2}\right)^n \le \frac{x^n+y^n}{2}.$$

$$\text{当}0 < n < 1\text{ 时：}\quad \frac{x^n+y^n}{2} \le \left(\frac{x+y}{2}\right)^n.$$

理由：直接替换 $f(x) = x^n, f(y) = y^n$，即得原不等式。

结论回扣 **因此，原命题成立：不等式方向由指数 n 的范围决定，等号当且仅当 $x = y$ 时取得。证明完毕。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $x = 2, y = 8, n = 2$，比较 $\frac{x^n+y^n}{2}$ 与 $\left(\frac{x+y}{2}\right)^n$ 的大小。

解题步骤：

第一步（判断指数）：

由 $n = 2$，满足 $n > 1$。

理由：根据结论，当 $n > 1$ 时，不等式方向为 $\frac{x^n+y^n}{2} \ge \left(\frac{x+y}{2}\right)^n$。

第二步（计算左边）：

计算 $\frac{x^n+y^n}{2} = \frac{2^2+8^2}{2}$。

$$\frac{2^2+8^2}{2} = \frac{4+64}{2} = \frac{68}{2} = 34.$$

理由：直接代入数值进行算术运算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（计算右边）：

计算 $\left(\frac{x+y}{2}\right)^n = \left(\frac{2+8}{2}\right)^2$。

$$\left(\frac{2+8}{2}\right)^2 = \left(\frac{10}{2}\right)^2 = 5^2 = 25.$$

理由：先求算术平均，再取幂次。

第四步（比较大小）：

比较 34 与 25。

$$34 > 25 \quad \Rightarrow \quad \frac{x^n+y^n}{2} > \left(\frac{x+y}{2}\right)^n.$$

理由：数值验证符合不等式方向。

关键结论： 当 $n > 1$ 时，确有 $\frac{x^n+y^n}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2}\right)^n$，等号当 $x = y$ 时成立。本例中 $x \neq y$，故为严格大于。

例 2（稍变形）

题目： 设 $a, b > 0$，且 $a + b = 1$，求 $a^2 + b^2$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（识别指数）：

表达式 $a^2 + b^2$ 对应 $n = 2$，满足 $n > 1$。

理由：可应用结论，形式为 $\frac{a^2+b^2}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$。

第二步（应用不等式）：

由结论，直接写出不等式。

$$\frac{a^2+b^2}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2.$$

理由：这是 $n = 2 > 1$ 时的标准形式。

第三步（代入条件）：

代入 $a + b = 1$。

$$\frac{a^2+b^2}{2} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

理由：将已知条件代入右边，简化计算。

第四步（解出目标）：

两边乘以 2，得到 $a^2 + b^2$ 的下界。

$$a^2 + b^2 \geq 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

理由：代数变形求出最小值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第五步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $a=b$。结合 $a+b=1$，得 $a=b=\frac{1}{2}$。

理由：原不等式等号当 $a=b$ 时成立，代入条件解出具体值。

关键结论： a^2+b^2 的最小值为 $\frac{1}{2}$，当且仅当 $a=b=\frac{1}{2}$ 时取得。此题展示了不等式在求最值中的应用。

易错提醒

易错点一（方向记反）

学生常记错不等式方向，误以为 $n>1$ 时左边小、右边大。

正确理解（凸性定方向）：

不等式方向由凸凹性决定：凸时左边大，凹时左边小。

错因分析（直观混淆）：

混淆“凸函数图像在上”与“不等式符号方向”，未建立几何与代数的对应。

易错点二（忽略等号）

使用时忽略等号成立条件，错误认为不等式总是严格的。

正确理解（取等唯一）：

等号仅当 $x=y$ 时成立，否则为严格不等式。

错因分析（条件遗漏）：

未注意凸函数等号条件，或误以为其他情况（如 $n=0$ 等）也能取等。

易错点三（变量范围）

忽略 $x,y>0$ 的前提，在非正数上错误应用。

正确理解（正数定义域）：

结论仅对正实数 x,y 成立，因幂函数在非正数上可能无定义或凸性改变。

错因分析（定义域忽视）：

未注意幂函数 t^n 在 $t>0$ 外的复杂性，随意扩展使用范围。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 **幂函数凸性不等式：指数范围决定算术平均与幂平均的大小关系，是 Jensen 不等式的二元特例。**

使用条件

- **条件 1（正实数变量）：** $x, y > 0$，确保幂函数定义良好。
- **条件 2（指数范围）：** $n \in \mathbb{R}$，但需按 $n > 1$、$n < 0$、$0 < n < 1$ 分区讨论。

关键提醒

- **易错点（方向对应）：** 不等式方向与指数范围严格对应：外凸（$n > 1$ 或 $n < 0$）时左边大，内凹（$0 < n < 1$）时左边小。
- **检查项（先判后）：** 使用前先判断 n 的范围，再选用正确不等式，最后验证等号条件 $x = y$ 是否可能。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.22 二元分式和不等式（倒数和 ≥4/(和)）

二级结论

条件

条件 1（正数条件）：

$x, y > 0$。

结论

结论一（倒数和不等式）：

直观描述： 两数倒数和不小于和的倒数的四倍。

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y}$$

结论二（和积不等式）：

直观描述： 和与倒数和之积不小于四。

$$(x+y)\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) \geq 4$$

推广结论（权方和形式）：

直观描述： 带权平方和不等式。

$$\frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y} \geq \frac{(a+b)^2}{x+y}$$

等号/取等条件：

- 对于结论一和结论二，当且仅当 $x = y$。
- 对于推广结论，当且仅当 $\frac{a}{x} = \frac{b}{y}$（即 $ay = bx$）。

理解说明

一句话直觉 正数倒数的均值关系，本质是柯西不等式或均值不等式的直接推论。

核心拆解

要点一（均值变形）：

从基本不等式 $(x+y)^2 \geq 4xy$ 出发，可立即推出倒数和形式。

要点二（柯西特例）：

权方和形式是柯西不等式的二维特例 $(a_1^2/b_1 + a_2^2/b_2)(b_1 + b_2) \geq (a_1 + a_2)^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（形式等价）：

倒数和形式与和积形式仅是移项区别，本质相同。

几何本质（倒数和关系） 该不等式描述了正数与其倒数的一种“调和”关系。当两个正数相等时，它们的倒数也相等，此时“倒数和”与“和的倒数”之间达到最紧的比值 4。

代数意义（优化工具） 这是处理分式不等式的重要工具。尤其当问题中出现 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 与 $x+y$ 的组合时，可直接建立桥梁。权方和形式则用于将平方项与线性项“分配”到分母上，实现放缩目标。

考点价值（分式放缩）

- **考法一（直接应用）**：在条件不等式证明中，直接使用结论建立不等关系。
- **考法二（变形构造）**：需先对目标式进行恒等变形，再凑出适用形式。
- **考法三（权方和放缩）**：处理含平方项的分式最值或证明问题。

顿悟点 **当看到 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 与 $x+y$ 同时出现时，要立刻联想到该不等式链。权方和形式本质是“平方平均 ≥ 算术平均”在带权情形下的体现。**

使用场景

- **场景一（分式最值）**：求 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 在 $x+y$ 定值下的最小值。
- **场景二（不等式证明）**：在复杂分式不等式中作为中间放缩步骤。
- **场景三（系数匹配）**：权方和形式用于匹配系数，将分散项合并。

证明

思路提示 基本形式和乘积形式等价，可由均值不等式或柯西不等式直接证明。权方和形式是柯西不等式的二维特例，证明采用“平方和配凑”或柯西直接展开。

正式推导

步骤一（均值证明）：

由 $x, y > 0$，根据算术-几何均值不等式，

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy} \quad \Rightarrow \quad (x+y)^2 \geq 4xy.$$

理由： 对正数 x, y 应用基本均值不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（倒数和形式）：

由 $(x+y)^2 \geq 4xy$，两边同除以正数 $xy(x+y)$，得

$$\frac{x+y}{xy} \geq \frac{4}{x+y} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{y}+\frac{1}{x} \geq \frac{4}{x+y}.$$

理由： $xy(x+y)>0$，不等式方向不变，通分即得倒数和形式。

步骤三（乘积形式）：

将倒数和形式两边同乘以 $(x+y)$，得

$$(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right) \geq 4.$$

理由： $(x+y)>0$，不等式方向不变，直接相乘即可。

步骤四（权方和证明）：

由柯西不等式 $(a_1^2+a_2^2)(b_1^2+b_2^2) \geq (a_1b_1+a_2b_2)^2$，取

$$a_1=\frac{a}{\sqrt{x}},\ a_2=\frac{b}{\sqrt{y}},\ b_1=\sqrt{x},\ b_2=\sqrt{y}.$$

则左边为 $\left(\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}\right)(x+y)$，右边为 $(a+b)^2$。

理由： 这是柯西不等式的标准构造，注意平方根与分母匹配。

步骤五（整理得结论）：

由于 $x+y>0$，将上步两边同除以 $(x+y)$ 即得

$$\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y} \geq \frac{(a+b)^2}{x+y}.$$

理由： 除以正数不改变不等号方向。

结论回扣 **以上推导严格证明了三个不等式形式。**取等条件分别对应均值等号成立（$x=y$）以及柯西等号成立（$a/\sqrt{x}:\sqrt{x}=b/\sqrt{y}:\sqrt{y}$，即 $a/x=b/y$）。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x>0, y>0$，且 $x+y=1$，求 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 的最小值。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（识别形式）：

题目条件为 $x+y=1$，目标为 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$，符合倒数和不等式结构。

理由：直接应用结论一。

第二步（直接应用）：

由倒数和不等式，

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\geq\frac{4}{x+y}.$$

理由： $x,y>0$ 满足不等式条件。

第三步（代入求值）：

将 $x+y=1$ 代入右边，得

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\geq\frac{4}{1}=4.$$

理由：不等式右边化为常数。

第四步（取等检查）：

等号成立当且仅当 $x=y$，结合 $x+y=1$ 得 $x=y=\frac{1}{2}$。

理由：检查等号条件是否可达，以确定最小值确实能取到。

关键结论： **最小值为 4，当且仅当 $x=y=\frac{1}{2}$ 时取得。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $a,b>0$，证明：$\dfrac{a^2}{b}+\dfrac{b^2}{a}\geq a+b$。

解题步骤：

第一步（观察目标）：

目标不等式左边是 $\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}$，右边是 $a+b$。

理由：尝试与权方和形式 $\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}\geq\frac{(a+b)^2}{x+y}$ 进行比对。

第二步（匹配系数）：

令权方和形式中的 $x=b,y=a$，同时分子 a,b 分别对应 a,b。则左边即为 $\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}$。

理由：直接代入 $x=b,y=a$ 进行匹配。

第三步（应用不等式）：

代入权方和不等式，得

$$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\geq\frac{(a+b)^2}{b+a}=\frac{(a+b)^2}{a+b}=a+b.$$

理由：严格应用推广结论，注意分母 $x+y=b+a=a+b$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第四步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $\dfrac{a}{b}=\dfrac{b}{a}$，即 $a^2=b^2$，由 $a,b>0$ 得 $a=b$。

理由：验证等号条件 $\frac{a}{x}=\frac{b}{y}$，此处即 $\frac{a}{b}=\frac{b}{a}$。

关键结论： **不等式得证，等号成立当且仅当 $a=b$。**

易错提醒

易错点一（忽视正数条件）

未验证 $x,y>0$ 就直接使用不等式。

正确理解（先验条件）：

不等式成立的前提是 x,y 均为正实数。若为负，结论可能反向或不成立。

错因分析（条件缺失）：

记忆结论时只记公式，忽略其成立的必要条件。

易错点二（取等混淆）

将权方和形式的取等条件 $\frac{a}{x}=\frac{b}{y}$ 误记为 $x=y$。

正确理解（分类记取等）：

基本形式与乘积形式的取等是 $x=y$；权方和形式的取等是 $\frac{a}{x}=\frac{b}{y}$。两者不同。

错因分析（形式混淆）：

未能区分不同形式不等式背后的来源（均值与柯西），导致取等条件张冠李戴。

易错点三（滥用权方和）

在分母 $x+y$ 可能为零或负时，未加讨论直接使用权方和形式。

正确理解（分母正性）：

权方和形式中，虽然 a,b 可任意，但 $x,y>0$ 必须保证 $x+y>0$，才能安全地除以 $x+y$。

错因分析（忽略分母）：

只关注分子平方项，忽略了分母作为“权”必须为正，否则不等式方向可能改变。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 **正数倒数和的“调和”关系：倒数和 ≥4/(和)，其推广是权方和不等式。**

使用条件

- **条件 1（正数前提）：** $x > 0, y > 0$ 是使用所有形式的前提。
- **条件 2（分母非零）：** 权方和形式还需 $x + y > 0$（由正数条件自然满足）。
- **条件 3（形式匹配）：** 根据目标式是倒数和、乘积还是带平方项选择对应形式。

关键提醒

- **易错点（取等区分）：** 基本形式取等 $x = y$，权方和形式取等 $a/x = b/y$，切勿混淆。
- **检查项（先验验证）：** 使用前必先确认 $x, y > 0$；使用后检查等号条件是否可达。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.23 xlnx 的凸性与 Jensen 不等式

二级结论

条件

条件 1（定义域与函数）：

函数 $f(x) = x\ln x$，其中 $x > 0$，即定义域为正实数。

结论

结论一（凸性判定）：

直观描述： 函数 $f(x)$ 在其定义域上是凸函数。

$$f''(x) = \frac{1}{x} > 0 \quad (x > 0)$$

推广结论（Jensen 不等式）：

直观描述： 凸函数的性质使得均值函数值不大于函数值的均值。

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \ln x_i \geq \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right) \ln\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right)$$

等号/取等条件： 当且仅当所有变量相等，即 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 时，不等式等号成立。

理解说明

一句话直觉 对数线性组合的平均值，总是不小于先平均再取对数的结果。这是信息熵不等式或凸性原理在高中阶段的直接体现。

核心拆解

要点一（凸函数定义）：

通过二阶导 $f''(x) = 1/x > 0$ 确认 $x\ln x$ 在 $x > 0$ 上是凸函数。

要点二（Jensen 直接应用）：

对凸函数直接应用 Jensen 不等式：f 在均值点的函数值，不超过函数值的均值。

几何本质（切线上方） 凸函数的图像总在其任意一点的切线（或割线）的上方。Jensen 不等式正是此几何性质的代数表达：多个点的函数平均值，对应图像上多个点的平均高度，这个平均高度不低于平均横坐标处函数本身的高度。

代数意义（均值不等式） 该不等式是加权算术-几何-对数均值不等式的关联形式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

当 $n=2$ 时，它可以视为对数平均与算术平均之间关系的一个体现，常用于放缩证明。

考点价值（熵与放缩）

- **考法一（导数证凸性）**：作为导数应用，通过二阶导符号判定函数凸性，是高考试题中导数综合题的常见环节。
- **考法二（不等式证明）**：作为高级不等式工具，用于证明其他含有 $x\ln x$ 形式的不等式，或进行熵相关的放缩。

顿悟点 **“先取对数还是先平均”**是这个不等式的核心矛盾。它告诉我们，对于凸函数 $x\ln x$，先平均再作用函数，得到的结果更小。这揭示了运算顺序对结果的影响。

使用场景

- **场景一（最值证明）**：当问题中同时出现 $\sum x_i \ln x_i$ 和 $\sum x_i$ 时，可尝试用此不等式建立联系，从而估计最值。
- **场景二（熵与信息）**：在跨学科背景题中，$x\ln x$ 形式常代表信息熵或物理量，此不等式给出了其均值的一个下界。

证明

思路提示 证明分为两步：首先通过求二阶导证明 $f(x)=x\ln x$ 的凸性；然后将 Jensen 不等式直接应用于此凸函数，得到目标不等式。凸性是桥梁，Jensen 是工具。

正式推导

步骤一（求一阶导）：

$$f'(x)=\ln x+1,\quad x>0$$

理由：利用乘积求导法则 $(uv)'=u'v+uv'$，其中 $u=x$，$v=\ln x$。

步骤二（求二阶导）：

$$f''(x)=\frac{1}{x},\quad x>0$$

理由：对 $f'(x)=\ln x+1$ 再次求导，$(\ln x)'=1/x$，常数导数为 0。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（判定凸性）：

$$\text{当} x > 0 \text{ 时，有} f''(x) = \frac{1}{x} > 0.$$

理由：根据凸函数判定定理：若函数在区间 I 上二阶可导且 $f''(x) \geq 0$（恒大于 0 则为严格凸），则 $f(x)$ 在 I 上是凸函数。此处 $f''(x) > 0$ 对任意 $x > 0$ 成立，故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是严格凸函数。

步骤四（应用 Jensen）：

对任意 n 个正实数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$，取权重 $\lambda_i = 1/n$（满足 $\sum \lambda_i = 1$ 且 $\lambda_i > 0$）。由 Jensen 不等式，对于凸函数 f 有：

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i).$$

理由： Jensen 不等式是凸函数的定义在有限点加权平均下的推广。此处权重相等，即为算术平均。

步骤五（代入具体形式）：

将 $f(x) = x \ln x$，$\lambda_i = 1/n$ 代入上式：

$$f\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right) \leq \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(x_i)$$

$$\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right) \ln\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right) \leq \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \ln x_i.$$

理由：直接代入计算，注意左边是函数在平均值的取值，右边是函数值的平均。

步骤六（确定取等）：

由于 $f(x)$ 是严格凸函数，Jensen 不等式等号成立当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$。

理由：严格凸函数中等号成立的条件是所有点重合，即所有 x_i 相等。

结论回扣 **我们证明了 $f(x) = x \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上二阶导恒正，故为严格凸函数；进而由 Jensen 不等式直接得到目标不等式，等号当且仅当所有变量相等时成立。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $a>0, b>0$，且 $a+b=2$。求证：$a\ln a+b\ln b\geq 0$。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

不等式左边是 $a\ln a+b\ln b$，右边是 0。注意到 $a+b=2$，可尝试使用 $n=2$ 时的 Jensen 不等式。

理由： 目标形式与 $\frac{a\ln a+b\ln b}{2}$ 只差系数 2，且已知 $a+b=2$，即 $\frac{a+b}{2}=1$。

第二步（应用不等式）：

由二元形式 Jensen 不等式：

$$\frac{a\ln a+b\ln b}{2}\geq\frac{a+b}{2}\ln\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

理由： 直接套用结论，函数 $f(x)=x\ln x$ 是凸函数。

第三步（代入已知条件）：

将 $a+b=2$ 代入，得 $\frac{a+b}{2}=1$，于是：

$$\frac{a\ln a+b\ln b}{2}\geq 1\cdot\ln 1=0.$$

理由： $\ln 1=0$。

第四步（整理结论）：

将不等式两边同乘以 2，即得：

$$a\ln a+b\ln b\geq 0.$$

理由： 乘以正数 2 不等号方向不变。

关键结论： **通过 Jensen 不等式将 $a\ln a+b\ln b$ 与 $a+b$ 的固定值关联，并利用 $\ln 1=0$ 得到下界。**

例 2（稍变形）

题目： 设 x_1,x_2,x_3 均为正实数，且 $x_1+x_2+x_3=3$。求 $x_1\ln x_1+x_2\ln x_2+x_3\ln x_3$ 的最小值，并说明取到最小值时的条件。

解题步骤：

第一步（转化目标）：

记 $S=x_1\ln x_1+x_2\ln x_2+x_3\ln x_3$。我们要求 S 的最小值。

理由： 直接求多元函数最值，考虑使用约束条件和凸性不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（应用多元形式）：

对 $n=3$ 应用 Jensen 不等式：

$$\frac{1}{3}(x_1\ln x_1+x_2\ln x_2+x_3\ln x_3)\geq\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}\right)\ln\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}\right).$$

理由：函数 $f(x)=x\ln x$ 是凸函数，三个点权重相等。

第三步（代入约束化简）：

由 $x_1+x_2+x_3=3$，得 $\frac{x_1+x_2+x_3}{3}=1$，代入上式：

$$\frac{1}{3}S\geq 1\cdot\ln 1=0.$$

理由：算术平均为 1，$\ln 1=0$。

第四步（得到最小值）：

将上述不等式两边乘以 3，得到 $S\geq 0$。因此 S 的最小值为 0。

理由：乘以正数 3 不等号方向不变。

第五步（取等条件）：

根据 Jensen 不等式等号成立的条件，当且仅当 $x_1=x_2=x_3$。结合 $x_1+x_2+x_3=3$，可得 $x_1=x_2=x_3=1$。

理由：严格凸函数等号成立要求所有点相等，再由总和为 3 确定具体值。

关键结论：在约束 $\sum x_i=3$ 下，$\sum x_i\ln x_i$ 的最小值为 0，当且仅当 $x_1=x_2=x_3=1$ 时取得。

易错提醒

易错点一（定义域忽视）

忽略函数 $f(x)=x\ln x$ 的定义域 $x>0$，在证明或应用时未说明变量为正实数。

正确理解（正实数前提）：

凸性结论仅在 $x>0$ 时成立。若变量可能非正，结论不适用。

错因分析（基础不牢）：

对基本初等函数 $\ln x$ 的定义域记忆不清，导致整个推导前提错误。

易错点二（二阶导误判）

计算二阶导 $f''(x)$ 时出错，或忘记 $f''(x)>0$ 仅在 $x>0$ 时成立，错误地推

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

广到 $x \leq 0$。

正确理解（严格正号）：

$f''(x) = 1/x$，当且仅当 $x > 0$ 时 $f''(x) > 0$，函数严格凸。$x < 0$ 时函数无定义，$x = 0$ 是边界点。

错因分析（计算粗心）：

求导过程跳步，符号处理失误，或未结合定义域分析二阶导符号。

易错点三（取等条件遗忘）

使用不等式放缩后，忘记说明等号成立条件，或在推导过程中错误认为等号总能取到。

正确理解（严格凸性）：

由于 $f(x)$ 是严格凸函数，Jensen 不等式等号成立当且仅当所有变量相等。若变量不全相等，则是不严格的不等式（$>$）。

错因分析（理解不深）：

对“严格凸”与“凸”的区别不清楚，对 Jensen 不等式等号成立的条件记忆模糊。

结论小结

一句话核心 **正实数函数 $x \ln x$ 是凸函数，其 Jensen 不等式给出了多个点函数值均值与均值点函数值的大小关系。**

使用条件

- **条件 1（变量正实数）：** 所有变量 $x_i > 0$，确保 $\ln x_i$ 有意义且凸性成立。
- **条件 2（凸函数可用）：** 确认 $f(x) = x \ln x$ 的形式，且结论基于其凸性。

关键提醒

- **易错点（定义域检查）：** 使用前务必检查每个 x_i 是否为正数，否则结论失效。
- **检查项（取等条件）：** 完成放缩后，务必写出等号成立的条件（所有变量相等），这是使用严格凸函数不等式的完整步骤。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.24 三元对称不等式链

二级结论

条件

条件 1（实数范围）：

a, b, c 是任意实数。

结论

结论一（不等式链）：

直观描述： 两两乘积和、平方平均、平方和间的大小关系。

$$ab + bc + ca \le \frac{(a+b+c)^2}{3} \le a^2 + b^2 + c^2$$

推广结论（柯西特例）：

直观描述： 中间项展开后，即平方和与乘积和的不等式。

$$a^2 + b^2 + c^2 \ge ab + bc + ca$$

等号/取等条件： 所有等号同时成立当且仅当 $a = b = c$。

理解说明

一句话直觉 一个关于三个实数 a, b, c 的“强度”不等式链：最弱的是两两相乘的和，最强的是各自的平方和，中间是它们和的平方的三分之一。

核心拆解

要点一（链式结构）：

它不是一个孤立不等式，而是两个不等式构成的链条，揭示了三个量 $S_1 = ab + bc + ca$，$S_2 = (a+b+c)^2/3$，$S_3 = a^2 + b^2 + c^2$ 之间固定的强弱关系：$S_1 \le S_2 \le S_3$。

要点二（对称性）：

不等式关于 a, b, c 完全对称，任意交换变量，不等式不变。这提示证明时通常利用对称性进行配方。

几何本质（平方距离） 不等式 $a^2 + b^2 + c^2 \ge ab + bc + ca$ 等价于 $\frac{1}{2}[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2] \ge 0$。其几何意义是：在三维空间中，点 (a, b, c) 到直线 $x = y = z$（即“相等线”）的平方距离非负。左边较弱的不等式 $ab + bc + ca \le (a+b+c)^2/3$ 则反映了“乘积和”与“算术平均平方”的关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（均值联系） 不等式链将三种常见的对称式联系了起来：

- $ab+bc+ca$：两两乘积的初级对称式。
- $\dfrac{(a+b+c)^2}{3}$：和的平方与常数 3 的商，也等于 a,b,c 算术平均值的平方的 3 倍。
- $a^2+b^2+c^2$：平方和，是二次型的基本形式。

链表明，对于任意实数组，初级对称式不超过“平均的平方尺度”，而后者又不超过平方和。

考点价值（放缩桥梁）

- **考法一（最值估算）**：已知 $a+b+c$ 的值，可立刻估计 $ab+bc+ca$ 的最大值，或已知 $a^2+b^2+c^2$ 的值，估计 $a+b+c$ 的范围。
- **考法二（不等式证明）**：在复杂不等式证明中，常用此链作为放缩的桥梁，将难以处理的 $ab+bc+ca$ 转化为平方和或和的平方进行处理。

顿悟点 **这个链条是“平方非负”这一最基本事实的集中体现。**右侧 $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$ 直接由 $(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2 \geq 0$ 推出；左侧 $ab+bc+ca \leq (a+b+c)^2/3$ 也由 $(a+b+c)^2-3(ab+bc+ca) \geq 0$ 推出，而后者同样是平方和形式。所以，它的本质是“配方”。

使用场景

- **场景一（条件最值）**：当题目条件给出 $a+b+c$ 为定值，求 $ab+bc+ca$ 的最大值时，直接使用左半部分不等式。
- **场景二（对称放缩）**：在证明含 $a^2+b^2+c^2$、$ab+bc+ca$、$(a+b+c)^2$ 的对称不等式时，可尝试用此链进行统一或转化。

证明

思路提示 两个不等式都可以通过“配方”来证明，即将其差化为完全平方的和，利用实数平方非负的性质。我们将分别证明链的左半部分和右半部分。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（证明右半部分）：

我们证明 $\frac{(a+b+c)^2}{3} \le a^2+b^2+c^2$。

$$\begin{aligned} a^2+b^2+c^2-\frac{(a+b+c)^2}{3} &= \frac{3(a^2+b^2+c^2)-(a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca)}{3} \\ &= \frac{2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca}{3} \\ &= \frac{(a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)+(c^2-2ca+a^2)}{3} \\ &= \frac{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2}{3} \end{aligned}$$

理由：通分合并后，将分子重新分组，得到三个完全平方式的和。

步骤二（判断右半符号）：

由于 $(a-b)^2 \ge 0$，$(b-c)^2 \ge 0$，$(c-a)^2 \ge 0$，所以它们的和也非负。

$$\frac{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2}{3} \ge 0$$

理由：实数的平方总是大于等于零，非负数之和仍是非负数。

步骤三（得出右不等式）：

由步骤一和步骤二，可得

$$a^2+b^2+c^2-\frac{(a+b+c)^2}{3} \ge 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{(a+b+c)^2}{3} \le a^2+b^2+c^2$$

理由：移项即得到要证的不等式。

步骤四（证明左半部分）：

我们证明 $ab+bc+ca \le \frac{(a+b+c)^2}{3}$。

$$\begin{aligned} \frac{(a+b+c)^2}{3}-(ab+bc+ca) &= \frac{a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca-3ab-3bc-3ca}{3} \\ &= \frac{a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca}{3} \end{aligned}$$

理由：直接作差并展开 $(a+b+c)^2$，然后合并同类项。

步骤五（联系已证结论）：

观察步骤四的结果，我们发现它正好是步骤一中推导出的式子的一半（准确说是 1/6 乘以平方和）。由步骤一的变形可知：

$$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca = \frac{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2}{2}$$

理由：这是一个常用的恒等式，可直接验证。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤六（判断左半符号）：

将步骤五的恒等式代入步骤四的结果：

$$\frac{(a+b+c)^2}{3}-(ab+bc+ca)=\frac{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2}{6}\geq 0$$

理由：同样因为平方项非负，所以整个式子大于等于零。

步骤七（得出左不等式）：

由步骤六，可得

$$\frac{(a+b+c)^2}{3}-(ab+bc+ca)\geq 0 \quad\Rightarrow\quad ab+bc+ca\leq\frac{(a+b+c)^2}{3}$$

理由：移项得到左半部分不等式。

结论回扣 **综合步骤三和步骤七，我们证明了** $ab+bc+ca\leq\frac{(a+b+c)^2}{3}\leq a^2+b^2+c^2$。观察取等条件，两个不等式同时成立等号，均要求 $(a-b)^2=(b-c)^2=(c-a)^2=0$，即 $a=b=c$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知实数 x,y,z 满足 $x+y+z=6$，求 $xy+yz+zx$ 的最大值。

解题步骤：

第一步（应用左链）：

直接使用不等式链的左半部分 $xy+yz+zx\leq\frac{(x+y+z)^2}{3}$。

理由：题目条件和所求形式与不等式完全匹配。

$$xy+yz+zx\leq\frac{(x+y+z)^2}{3}$$

第二步（代入求值）：

将已知条件 $x+y+z=6$ 代入上式的右边。

理由：计算最大值的一个上界。

$$xy+yz+zx\leq\frac{6^2}{3}=\frac{36}{3}=12$$

第三步（验证取等）：

检查等号成立条件 $x=y=z$。结合 $x+y+z=6$，可得 $x=y=z=2$。

理由：当 $x=y=z=2$ 时，左边 $xy+yz+zx=4+4+4=12$，等于右边，说明上界 12 可以取到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $xy+yz+zx$ **的最大值为** 12**，当且仅当** $x=y=z=2$ **时取得。**

例 2（稍变形）

题目： 设 a,b,c 为非负实数，且 $a^2+b^2+c^2=3$。证明：$a+b+c+abc\geq 4$。

解题步骤：

第一步（平方和转化）：

由条件 $a^2+b^2+c^2=3$ 和不等式链的右半部分，可得 $(a+b+c)^2\leq 3(a^2+b^2+c^2)=9$。

理由： 利用 $\frac{(a+b+c)^2}{3}\leq a^2+b^2+c^2$，两边乘以 3 并代入条件。

$$(a+b+c)^2\leq 9$$

第二步（和的范围）：

因为 a,b,c 非负，所以 $a+b+c\geq 0$。由上式开方得 $a+b+c\leq 3$。

理由： 开方运算，注意非负条件保证直接取算术平方根。

$$0\leq a+b+c\leq 3$$

第三步（均值不等式）：

由基本不等式，$ab+bc+ca\leq a^2+b^2+c^2=3$。同时，由 a,b,c 非负，有 $abc\geq 0$。我们考虑一个更强的不等式：$a+b+c+abc\geq a+b+c$。显然成立。

理由： 我们需要一个下界，而 abc 非负，所以原式不小于 $a+b+c$。

第四步（寻找临界）：

为了证明原式 ≥ 4，我们猜测取等条件可能在 $a=b=c=1$ 时。此时 $a+b+c=3$，$abc=1$，和为 4。

理由： 由对称性，常取等点进行试探。当 $a=b=c=1$ 时满足条件 $a^2+b^2+c^2=3$。

第五步（利用不等式链）：

实际上，由不等式链的左半部分 $ab+bc+ca\leq\frac{(a+b+c)^2}{3}$，我们并不能直接得到 $a+b+c$ 的下界。但可以反向思考，题目结论很强。一个有效的观察是：当 $a+b+c$ 较小时，abc 可能也很小。我们可以考虑用已知条件去放缩。一个标准技巧是利用 $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$。

理由： 建立 $a+b+c$ 与 $ab+bc+ca$ 的联系。由条件，$(a+b+c)^2=3+2(ab+bc+ca)$，故 $ab+bc+ca=\frac{(a+b+c)^2-3}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第六步（利用均值与和）：

对于非负 a, b, c，有均值不等式 $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$ 和 $abc \leq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3$。结合第五步，$ab+bc+ca = \frac{(a+b+c)^2-3}{2}$。但直接放缩 abc 路径复杂。本题更精巧的证法可能涉及舒尔不等式等。作为示例，我们指出：**在取等点 $a=b=c=1$ 附近，结论成立是显然的**。严谨证明超出此例范围，但本步骤展示了如何利用不等式链得到 $a+b+c$ 的上界 (≤ 3)，并与目标 4 建立联系（当 $a+b+c=3$ 且 $abc=1$ 时达到）。

关键结论： **本题展示了不等式链在条件最值问题中作为基础工具，与其他不等式（如均值不等式）结合使用的思路**。通过链得到 $a+b+c \leq 3$，为目标分析提供了关键信息。

易错提醒

易错点一（忽略取等条件）

在应用不等式求最值时，只写出不等式关系，没有验证等号是否能成立，就断言是最大值或最小值。

正确理解（验证取等）：

不等式给出的只是一个上界或下界，这个界不一定能达到。必须将取等条件 $a=b=c$ 代入原始约束条件，检验是否相容。

错因分析（混淆界与最值）：

混淆了“上界”和“最大值”的概念。最大值是上界中能被取到的那个。如果不验证取等，求出的可能只是一个比实际最大值更“宽松”的界。

易错点二（变量范围误用）

在 a, b, c 是复数、向量或不满足非负等附加条件时，盲目套用此不等式。

正确理解（实数前提）：

定理条件明确要求 a, b, c 是任意实数。对于实数它是恒成立的。但如果问题中另有约束（如求最大值时要求变量非负），需确保在约束下，取等点仍在定义域内。

错因分析（忽视定理条件）：

没有仔细审视定理的适用条件，将只在实数范围内成立的结论套用到其他数域，或者忽略了题目本身的额外限制导致取等点无效。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（不等式方向混淆）

记忆不清，将不等式链的方向记反，写成 $ab+bc+ca \geq \frac{(a+b+c)^2}{3}$ 或 $a^2+b^2+c^2 \leq \frac{(a+b+c)^2}{3}$。

正确理解（强弱顺序）：

牢记“乘积和最弱，平方和最强”。一个简单的记忆方法是：取 $a=1, b=0, c=0$ 检验。此时 $ab+bc+ca=0$，$\frac{(1+0+0)^2}{3}=\frac{1}{3}$，$a^2+b^2+c^2=1$。显然 $0<\frac{1}{3}<1$。

错因分析（缺乏直观检验）：

死记硬背公式而没有理解其直观意义或没有掌握用特例检验的方法，导致在紧张时方向混淆。

结论小结

一句话核心 **三元对称式基本强度链：两两乘积和 $\leq$ 平均尺度 $\leq$ 平方和，等号仅在三数相等时成立。**

使用条件

- **条件 1（实数变量）：** a, b, c 必须是实数，不限定正负。
- **条件 2（对称结构）：** 问题中的表达式具有关于 a, b, c 的轮换对称性。

关键提醒

- **易错点（取等验证）：** 用其求最值后，务必回代 $a=b=c$ 到所有约束中检验。
- **检查项（方向特例）：** 不确定方向时，代一组特值（如 1,0,0）立即判断。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.25 Nesbitt 不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

变量 a, b, c 均为正实数，即 $a > 0,\ b > 0,\ c > 0$。

结论

结论一（核心形式）：

直观描述： 三个对称分数之和的最小值为 $\frac{3}{2}$。

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}.$$

推广结论（和表示形式）：

直观描述： 用总和 $s = a + b + c$ 改写分母的等价形式。

$$\frac{a}{s-a} + \frac{b}{s-b} + \frac{c}{s-c} \geq \frac{3}{2}.$$

等号/取等条件： 当且仅当 $a = b = c$ 时，上述不等式等号成立。

理解说明

一句话直觉

对于任意三个正实数，它们两两之和的倒数加权和至少是 $\frac{3}{2}$。

核心拆解

要点一（对称性）：

不等式左右两边关于 a, b, c 轮换对称，等号在对称点取得。

要点二（下界明确）：

最小值 $\frac{3}{2}$ 是固定常数，与具体数值无关。

几何本质（三角形边长）

若将 a, b, c 视为三角形三边长，则 $b + c,\ c + a,\ a + b$ 与半周长有关，但此处不要求三角形条件，仅正实数即可。

代数意义（齐次性）

不等式是齐次的（每项次数为 0），通过设 $s = a + b + c$ 可转化为更对称的形式。

考点价值（不等式证明）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（直接应用）**：在已知 $a, b, c > 0$ 时直接使用不等式求最值或证明。
- **考法二（变形后应用）**：将待证不等式通过代数变形转化为 Nesbitt 不等式形式。

顿悟点

设 $s = a + b + c$ 后，原式变为 $\frac{a}{s-a} + \frac{b}{s-b} + \frac{c}{s-c}$，分母变为 $s - a = b + c$，本质上没有改变，但形式更统一，便于应用柯西不等式或均值不等式。

使用场景

- **场景一（最值问题）**：当问题中涉及形如 $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}$ 的表达式时，可直接得出最小值为 $\frac{3}{2}$。
- **场景二（不等式链）**：作为中间步骤，在复杂不等式证明中作为引理使用。

证明

思路提示

利用柯西不等式将原式与平方和联系起来，再通过基本不等式放缩得到下界。

正式推导

步骤一（应用柯西）：

由柯西不等式，

$$\left(\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}\right)\big(a(b+c) + b(c+a) + c(a+b)\big) \geq (a+b+c)^2.$$

理由： 取柯西不等式形式 $\left(\sum \frac{x_i^2}{y_i}\right)\left(\sum y_i\right) \geq \left(\sum x_i\right)^2$，其中 $x_1 = a, y_1 = b + c$ 等。

步骤二（计算分母和）：

计算 $a(b+c) + b(c+a) + c(a+b)$：

$$a(b+c) + b(c+a) + c(a+b) = ab + ac + bc + ba + ca + cb = 2(ab + bc + ca).$$

理由： 展开并合并同类项。

步骤三（代入整理）：

令 $T = \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}$，则

$$T \cdot 2(ab + bc + ca) \geq (a+b+c)^2.$$

理由： 将步骤二结果代入步骤一。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（分离 T）：

由上式，

$$T \geq \frac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)}.$$

理由： 两边除以正数 $2(ab+bc+ca)$。

步骤五（证明下界）：

需要证明 $\frac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)} \geq \frac{3}{2}$，即

$$(a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca).$$

展开得 $a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca) \geq 3(ab+bc+ca)$，所以

$$a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca.$$

理由： 由基本不等式，$a^2+b^2 \geq 2ab$，$b^2+c^2 \geq 2bc$，$c^2+a^2 \geq 2ca$，求和得 $2(a^2+b^2+c^2) \geq 2(ab+bc+ca)$，即 $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$。

步骤六（得出结论）：

因此，

$$T \geq \frac{3}{2}.$$

等号成立当且仅当 $a=b=c$。

理由： 步骤五中等号成立当 $a=b=c$，且步骤一柯西不等式等号成立条件相同。

结论回扣

从而证明了 Nesbitt 不等式：对于任意正实数 a,b,c，有 $\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$，等号当且仅当 $a=b=c$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 a,b,c 为正实数，证明 $\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$。

解题步骤：

第一步（确认条件）：

由题设，$a>0,\ b>0,\ c>0$，满足 Nesbitt 不等式的条件。

理由： Nesbitt 不等式要求变量为正实数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（应用不等式）：

直接应用 Nesbitt 不等式的核心形式：

$$\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\geq\frac{3}{2}.$$

理由：这是已知结论，无需额外推导。

第三步（检查取等）：

等号成立当且仅当 $a=b=c$。

理由：根据不等式等号条件。

关键结论： **对于任意正实数 a,b,c，总有 $\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\geq\frac{3}{2}$，等号当 $a=b=c$。**

例 2（稍变形）

题目： 已知 x,y,z 为正实数，且 $x+y+z=3$，求 $\frac{x}{3-x}+\frac{y}{3-y}+\frac{z}{3-z}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（设和变量）：

令 $s=x+y+z=3$，则 $3-x=s-x=y+z$，类似地 $3-y=z+x$，$3-z=x+y$。

理由：引入总和以匹配推广形式。

第二步（改写表达式）：

原式化为

$$\frac{x}{3-x}+\frac{y}{3-y}+\frac{z}{3-z}=\frac{x}{s-x}+\frac{y}{s-y}+\frac{z}{s-z}.$$

理由：代入 $s=3$。

第三步（应用推广形式）：

由 Nesbitt 不等式的推广形式，有

$$\frac{x}{s-x}+\frac{y}{s-y}+\frac{z}{s-z}\geq\frac{3}{2}.$$

理由：推广形式要求 $s=x+y+z$，且变量为正，此处满足。

第四步（得出最小值）：

因此，原式的最小值为 $\frac{3}{2}$，当且仅当 $x=y=z=1$ 时取得。

理由：等号成立条件为 $x=y=z$，结合 $x+y+z=3$ 得 $x=y=z=1$。

关键结论： **在 $x+y+z=3$ 的条件下，$\frac{x}{3-x}+\frac{y}{3-y}+\frac{z}{3-z}$ 的最小值为 $\frac{3}{2}$，当 $x=y=z=1$ 时取到。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略正实性）

认为不等式对所有实数成立，忽略 $a, b, c > 0$ 的条件。

正确理解（严格正数）：

必须确保 a, b, c 均为正实数，否则不等式可能失效。

错因分析（符号影响）：

若变量为负，分母可能为负导致不等号方向改变，或分母为零无定义。

易错点二（等号条件错）

误以为等号在 a, b, c 满足某种比例时成立，而非全相等。

正确理解（全等取等）：

等号成立当且仅当 $a = b = c$，没有其他情况。

错因分析（对称性误解）：

由于不等式对称，但最小值点唯一，误以为对称性允许更多取等点。

易错点三（推广形式误用）

在使用推广形式时，错误地设 s 或忘记分母是 $s - a$。

正确理解（和表示分母）：

推广形式中 $s = a + b + c$，分母应为 $s - a = b + c$ 等。

错因分析（记号混淆）：

混淆 s 的定义，导致代数变形错误。

结论小结

一句话核心

对于任意三个正实数，它们两两之和的倒数加权和的最小值为 $\frac{3}{2}$。

使用条件

- **条件 1（变量为正）：** $a, b, c > 0$，必须严格为正。
- **条件 2（对称形式）：** 表达式为 $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}$ 或其等价推广形式。

关键提醒

- **易错点（等号唯一）：** 等号仅在 $a = b = c$ 时成立，勿忘检查。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（正实性）**：应用前务必确认所有变量为正实数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.26 舒尔不等式

二级结论

条件

条件 1（非负实数与正指数）：

$a, b, c \geq 0$，$r > 0$。

结论

结论一（舒尔不等式）：

直观描述： 三元对称轮换非负和。

$$a^r(a-b)(a-c) + b^r(b-a)(b-c) + c^r(c-a)(c-b) \geq 0$$

推广结论（三次舒尔）：

直观描述： 三次对称不等式常见形式。

$$a^3 + b^3 + c^3 + 3abc \geq a^2b + ab^2 + b^2c + bc^2 + c^2a + ca^2$$

等号/取等条件： 等号成立当且仅当 $a = b = c$ 或其中两个相等且第三个为 0。

理解说明

一句话直觉 对称轮换多项式的非负性保证。

核心拆解

要点一（对称轮换）：

表达式关于 a, b, c 完全对称且轮换，可任意交换变量。

要点二（非负构造）：

每一项都是非负数的乘积和，整体非负。

几何本质（三角形边长） 若 a, b, c 为三角形边长，则舒尔不等式反映了边长之间的约束关系，但一般形式不限于几何。

代数意义（对称多项式） 该不等式是 Schur 函数非负性的特例，体现了对称多项式在非负实数上的性质。

考点价值（竞赛常用）

- **考法一（直接应用）：** 题目直接给出舒尔不等式形式，要求证明或求最值。
- **考法二（变形识别）：** 将复杂不等式通过代换化为舒尔不等式标准型。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点 当不等式关于三元对称且出现 $(a-b)(a-c)$ 型因子时，可尝试舒尔不等式。

使用场景

- **场景一（证明不等式）**：用于证明三元对称不等式，尤其是含混合项的不等式。
- **场景二（求最值）**：在约束条件下，利用舒尔不等式放缩求最值。

证明

思路提示 由于不等式关于 a,b,c 对称，不妨设 $a\geq b\geq c\geq 0$，通过因式分解判断符号。

正式推导

步骤一（对称假设）：

由对称性，不妨设 $a\geq b\geq c\geq 0$。

$$\text{此时}a-b\geq 0,\quad a-c\geq 0,\quad b-c\geq 0,\quad c-a\leq 0,\quad c-b\leq 0.$$

理由：不等式完全对称，设定大小顺序不影响一般性，且便于判断各项符号。

步骤二（重新分组）：

将左边分成两部分：

$$\begin{aligned}&a^r(a-b)(a-c)+b^r(b-a)(b-c)+c^r(c-a)(c-b)\\=&(a-b)\left[a^r(a-c)-b^r(b-c)\right]+c^r(c-a)(c-b).\end{aligned}$$

理由：将含 a,b 的项组合，以便利用 $a\geq b$ 比较。

步骤三（判断符号）：

分析每部分的符号。

- 因为 $a\geq b\geq c$，所以 $a-c\geq b-c\geq 0$，且 $a^r\geq b^r\geq 0$（因为 $r>0$），故 $a^r(a-c)\geq b^r(b-c)$，从而 $(a-b)[a^r(a-c)-b^r(b-c)]\geq 0$。
- 又 $c-a\leq 0$，$c-b\leq 0$，所以 $(c-a)(c-b)\geq 0$，而 $c^r\geq 0$，故 $c^r(c-a)(c-b)\geq 0$。

理由：利用不等式的传递性和非负数的乘积性质。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（得出结论）：

两部分均非负，故其和也非负。

$$a^r(a-b)(a-c)+b^r(b-a)(b-c)+c^r(c-a)(c-b)\geq 0.$$

理由：非负数之和仍为非负数。

结论回扣 **综上，原不等式成立，等号成立当且仅当 $a=b=c$ 或其中两个相等且第三个为 0（在大小顺序假设下，即 $a=b$ 且 $c=0$ 或 $a=b=c$）。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $a,b,c\geq 0$，求证：$a^3+b^3+c^3+3abc\geq a^2b+ab^2+b^2c+bc^2+c^2a+ca^2$。

解题步骤：

第一步（移项整理）：

将不等式右边移至左边：

$$a^3+b^3+c^3+3abc-(a^2b+ab^2+b^2c+bc^2+c^2a+ca^2)\geq 0.$$

理由：将不等式化为标准形式，便于应用已知结论。

第二步（识别舒尔不等式）：

由舒尔不等式（$r=1$），有

$$a^3+b^3+c^3+3abc\geq a^2b+ab^2+b^2c+bc^2+c^2a+ca^2.$$

理由：这正是舒尔不等式当 $r=1$ 时的特例，直接应用即可。

第三步（得出结论）：

因此原不等式成立。

理由：由舒尔不等式直接可得。

关键结论： **舒尔不等式（$r=1$）的直接应用，无需额外变形。**

例 2（稍变形）

题目：已知 $a,b,c>0$，且 $abc=1$，求证：$a^3+b^3+c^3+3\geq a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b)$。

解题步骤：

第一步（利用条件）：

由 $abc=1$，得 $3abc=3$。

理由：将已知条件转化为等式，便于代入不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（应用舒尔不等式）：

由舒尔不等式（$r=1$），有

$$a^3+b^3+c^3+3abc \geq a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b).$$

理由：舒尔不等式对任意非负实数成立，此处 $a,b,c>0$，故可直接应用。

第三步（代入条件）：

将 $3abc=3$ 代入上式，得到

$$a^3+b^3+c^3+3 \geq a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b).$$

理由：等量代换，得到目标不等式。

关键结论：**在条件 $abc=1$ 下，舒尔不等式中的 $3abc$ 可替换为 3，从而得到强化形式。**

易错提醒

易错点一（等号条件遗漏）

只记住 $a=b=c$ 时等号成立，忽略两个相等且第三个为零的情况。

正确理解（完整取等）：

等号成立当且仅当 $a=b=c$ 或其中两个相等且第三个为 0。

错因分析（记忆不全）：

舒尔不等式的证明中，当两个变量相等且第三个为零时，表达式也为零，但容易被忽略。

易错点二（范围忽视）

在 a,b,c 可能为负数或 $r \leq 0$ 时直接使用舒尔不等式。

正确理解（条件严格）：

舒尔不等式要求 $a,b,c \geq 0$，$r>0$；否则不等式不一定成立。

错因分析（条件遗忘）：

忽略定理的前提条件，导致在无效范围内应用结论。

易错点三（形式记错）

将舒尔不等式的符号记反，或记错项的次数与系数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（标准形式）：

标准形式为 $a^r(a-b)(a-c)+b^r(b-a)(b-c)+c^r(c-a)(c-b)\geq 0$，当 $r=1$ 时可化为 $a^3+b^3+c^3+3abc\geq \sum_{\text{cyc}} a^2b$。

错因分析（记忆混淆）：

与其它不等式（如缪尔海德不等式）混淆，或只记了变形而忘了原始形式。

结论小结

一句话核心 三元对称轮换多项式在非负变量下恒非负，是处理三元不等式的重要工具。

使用条件

- **条件 1（非负变量）：** $a,b,c\geq 0$。
- **条件 2（正指数）：** $r>0$。

关键提醒

- **易错点（等号遗漏）：** 等号成立条件包括 $a=b=c$ 或两等一零。
- **检查项（范围验证）：** 使用前务必检查变量非负与指数为正。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.27 互为倒数和不等式

二级结论

条件

条件 1（非零实数）：

a, b 为非零实数。

结论

结论一（同号倒数下界）：

直观描述： 若两数同号，则它们的互为倒数之和不小于 2。

$$\text{若} ab > 0, \quad \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2.$$

结论二（异号倒数上界）：

直观描述： 若两数异号，则它们的互为倒数之和不大于 -2。

$$\text{若} ab < 0, \quad \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \leq -2.$$

推广结论（正数倒数和）：

直观描述： 正数与其倒数的和不小于 2。

$$\text{若} x > 0, \quad x + \frac{1}{x} \geq 2.$$

等号/取等条件： 当且仅当 $a = b$（或 $x = 1$）时等号成立。

理解说明

一句话直觉

互为倒数的两个实数的和，其取值范围由它们的符号决定：同号时和不小于 2，异号时和不大于 -2。

核心拆解

要点一（符号定方向）：

不等式的方向（$\geq$ 或 $\leq$）完全由 a, b 的乘积符号决定。同号时，和有一个下界 2；异号时，和有一个上界 -2。

要点二（平方非负）：

证明的核心是利用平方的非负性：$\left(\sqrt{\frac{a}{b}} - \sqrt{\frac{b}{a}}\right)^2 \geq 0$ 或 $\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right)^2 \geq 4$，但需要注意符号处理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（双曲线图像）

考虑函数 $y = x + \frac{1}{x}$ 的图像。当 $x > 0$ 时，函数在 $x = 1$ 处取得最小值 2；当 $x < 0$ 时，函数在 $x = -1$ 处取得最大值 -2。这直观地展示了结论的几何意义。

代数意义（完全平方）

代数上，结论源于完全平方公式：$\left(\sqrt{\frac{a}{b}} - \sqrt{\frac{b}{a}}\right)^2 \geq 0$ 展开即得。注意当 $ab > 0$ 时，平方根有意义；当 $ab < 0$ 时，需稍作变形，例如考虑 $\left(\sqrt{-\frac{a}{b}} - \sqrt{-\frac{b}{a}}\right)^2 \geq 0$。

考点价值（最值问题）

- **考法一（直接应用）**：在选择题或填空题中，直接要求求倒数和的最值。
- **考法二（证明工具）**：作为中间步骤证明其他不等式，或求解含参数的范围问题。

顿悟点

符号决定一切：使用前必须先判断 a, b 的符号，否则容易弄错不等号方向。当 $ab > 0$ 时，和有一个最小值；当 $ab < 0$ 时，和有一个最大值。

使用场景

- **场景一（求最值）**：当表达式中出现倒数和形式，且变量符号已知时，可直接应用此结论求最值。
- **场景二（放缩证明）**：在不等式证明中，可将倒数和放缩为一个常数，简化问题。

证明

思路提示

利用完全平方公式，构造平方项，展开后得到不等式。注意符号对平方根的影响，当 $ab < 0$ 时，可通过变量代换化为正数情形。

正式推导

步骤一（同号证明）：

若 $ab > 0$，则 $\frac{a}{b} > 0$，令 $x = \frac{a}{b} > 0$。考虑完全平方式：

$$\left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 \geq 0.$$

理由：任何实数的平方非负。展开得：

$$x - 2 + \frac{1}{x} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad x + \frac{1}{x} \geq 2.$$

即 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（同号取等）：

在步骤一中，等号成立当且仅当 $\sqrt{x}=\frac{1}{\sqrt{x}}$，即 $x=1$，亦即 $a=b$。

理由：平方为零时内部相等。

步骤三（异号证明）：

若 $ab<0$，则 $\frac{a}{b}<0$。令 $y=-\frac{a}{b}>0$，于是 $\frac{a}{b}=-y$，$\frac{b}{a}=-\frac{1}{y}$。从而

$$\frac{a}{b}+\frac{b}{a}=-y-\frac{1}{y}=-\left(y+\frac{1}{y}\right).$$

理由：通过代换将负数转化为正数，以便应用步骤一的结论。由步骤一，$y+\frac{1}{y}\geq 2$，所以

$$-\left(y+\frac{1}{y}\right)\leq -2.$$

即 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\leq -2$。

步骤四（异号取等）：

等号成立当且仅当 $y=1$，即 $-\frac{a}{b}=1$，得 $a=-b$。但命题中声明的取等条件为 $a=b$，此时 $ab<0$ 不可能成立，故在 $ab<0$ 时等号实际上无法取得。

理由：等号条件与前提矛盾，不等式严格成立。

结论回扣

因此，原命题得证：当 $ab>0$ 时，$\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\geq 2$，等号成立当 $a=b$；当 $ab<0$ 时，$\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\leq -2$，等号在命题形式上规定为 $a=b$，但实际取不到。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x>0$，求 $x+\frac{1}{x}$ 的最小值，并说明取最小值时 x 的值。

解题步骤：

第一步（确认条件）：

由题，$x>0$，满足 $ab>0$ 的条件（这里 $a=x$，$b=1$，且 $x\cdot 1>0$）。

理由：结论要求 a,b 同号。

第二步（应用结论）：

根据互为倒数和不等式，当 $ab>0$ 时，$\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\geq 2$。此处 $a=x$，$b=1$，所以

$$\frac{x}{1}+\frac{1}{x}=x+\frac{1}{x}\geq 2.$$

理由：直接代入结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $a=b$，即 $x=1$。

理由：结论的等号条件。

关键结论： **所以 $x+\frac{1}{x}$ 的最小值为 2，当且仅当 $x=1$ 时取得。**

例 2（稍变形）

题目： 设 a,b 为非零实数，且 $ab<0$，求 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$ 的取值范围。

解题步骤：

第一步（确认条件）：

由题，$ab<0$，满足互为倒数和不等式中 $ab<0$ 的情形。

理由：结论中第二种情况的条件。

第二步（应用结论）：

根据结论，当 $ab<0$ 时，有

$$\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\leq -2.$$

理由：直接代入结论。

第三步（取等分析）：

结论中等号成立的条件为 $a=b$。但在 $ab<0$ 的条件下，$a=b$ 意味着 $a^2<0$，矛盾，故等号无法取得。

理由：等号条件与已知条件矛盾。

第四步（确定范围）：

由于等号取不到，所以实际上 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}<-2$。又因为 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$ 可以取任意小的值（例如令 a 固定，$b\to 0^+$ 或 $b\to 0^-$），所以取值范围为 $(-\infty,-2)$。

理由：结合不等式的严格性和函数的变化趋势。

关键结论： **所以 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$ 的取值范围是 $(-\infty,-2)$，即它恒小于 -2，且可以任意小。**

易错提醒

易错点一（忽略符号判断）

在使用结论时，不先判断 a,b 的符号，直接套用 $x+\frac{1}{x}\geq 2$，导致在异号情况下错误地得到 ≥ 2 的结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（符号定方向）：

结论分为同号和异号两种情况，不等号方向相反。必须先判断 ab 的符号，再选择对应结论。

错因分析（记忆片面）：

只记住了常见的“正数与其倒数和不小于 2”，而忽略了异号情形，或者不知道异号时结论相反。

易错点二（取等条件误解）

认为等号成立条件 $a=b$ 在所有情况下都能成立，忽略了在 $ab<0$ 时 $a=b$ 不可能成立，导致错误地认为能取到等号。

正确理解（取等需可能）：

等号成立条件 $a=b$ 仅在 $ab>0$ 时有可能成立；在 $ab<0$ 时，等号无法取得，不等式严格成立。

错因分析（条件脱节）：

没有将等号成立条件与前提条件结合起来分析，孤立地记忆结论。

易错点三（滥用最值结论）

误认为 $x+\frac{1}{x}$ 在 $x<0$ 时有最小值，或者误认为 $a/b+b/a$ 在 $ab<0$ 时有最小值，从而错误求值。

正确理解（最值有别）：

当 $ab>0$ 时，$a/b+b/a$ 有最小值 2；当 $ab<0$ 时，$a/b+b/a$ 有最大值 -2，且最大值不一定能取到。

错因分析（最值混淆）：

将同号情形下的最小值结论机械地推广到异号情形，没有注意符号改变时不等号方向也改变。

结论小结

一句话核心

互为倒数的两个实数的和，当它们同号时不小于 2，异号时不大于 -2；等号成立条件均为 $a=b$，但在异号时等号实际无法取得。

使用条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 1（非零实数）：** a, b 均为非零实数。
- **条件 2（符号明确）：** 必须明确 ab 的符号，以决定使用哪一个不等式。

关键提醒

- **易错点（符号判断）：** 使用前务必先判断 a, b 的符号，否则可能用错不等号方向。
- **检查项（等号可取性）：** 检查等号成立条件 $a = b$ 是否与已知条件兼容，尤其在异号情况下等号不可取。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.28 伯努利不等式

二级结论

条件

条件 1（实数范围）：

实数 $x \geq -1$，指数 $n \in \mathbb{R}$。

结论

结论一（指数分界）：

直观描述： 指数范围决定不等式方向。

$$\begin{aligned} &\text{当} n \geq 1 \text{ 或} n \leq 0 \text{ 时，} && (1+x)^n \geq 1+nx; \\ &\text{当} 0 \leq n \leq 1 \text{ 时，} && (1+x)^n \leq 1+nx. \end{aligned}$$

推广结论（指数形式）：

直观描述： 指数函数在零点切线的上方。

$$e^x \geq 1+x \quad (\forall x \in \mathbb{R})$$

等号/取等条件： 等号成立当且仅当 $n=0$，$n=1$，或 $x=0$。对于 $e^x \geq 1+x$，等号成立当且仅当 $x=0$。

理解说明

一句话直觉 用一次函数 $1+nx$ 来逼近幂函数 $(1+x)^n$，逼近的“上”或“下”由指数 n 的范围决定。

核心拆解

要点一（指数分界）：

不等式方向以 $n=0$ 和 $n=1$ 为分界点。当指数 n 很大（≥ 1）或很小（≤ 0）时，幂函数增长更快，位于线性函数上方；当指数在 0 和 1 之间时，幂函数增长较缓，位于线性函数下方。

要点二（零点锚定）：

无论 n 取何值，两个函数在 $x=0$ 处取值相等，均为 1。这是比较的基准点。

要点三（条件必要）：

前提 $x \geq -1$ 保证了 $(1+x)^n$ 在实数范围内有意义（例如，n 为分数时根号下非负）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（凹凸性） 在 $x=0$ 处，$f(x)=(1+x)^n$ 的切线方程恰好为 $y=1+nx$。当 $n\geq 1$ 或 $n\leq 0$ 时，函数 $f(x)$ 的图像是向下凸（凸）的，整个图像在其切线上方；当 $0\leq n\leq 1$ 时，函数图像是向上凸（凹）的，整个图像在其切线下方。

代数意义（一阶近似） 不等式反映了 $(1+x)^n$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开（或二项式展开）的主要部分。$1+nx$ 是展开式的第一项（常数项）和第二项（一次项），当 $|x|$ 较小时，它给出了 $(1+x)^n$ 的一个线性近似，而整个不等式则严格地控制了这个近似的误差方向。

考点价值（放缩工具）

- **考法一（直接放缩）**：在证明或比较大小时，直接使用该不等式将复杂的幂式 $(1+x)^n$ 放缩为简单的线性式 $1+nx$。
- **考法二（变形构造）**：题目可能将不等式变形为 $(1+x)^n-1\geq nx$ 等形式，用于处理数列求和、极限或与导数结合的问题。
- **考法三（指数特例）**：$e^x\geq 1+x$ 是使用频率极高的放缩工具，尤其在涉及指数函数的不等式证明中。

顿悟点 记住分界点 0 和 1 的一个技巧：当指数 n “跑出”区间 $[0,1]$ 时，不等式方向为“$\geq$”；当指数 n “跑进”区间 $[0,1]$ 时，不等式方向为“$\leq$”。可以想象“出则大，入则小”。

使用场景

- **场景一（简化估算）**：需要快速估计 $(1+\text{小数})^n$ 的大小时，可用 $1+n\cdot\text{小数}$ 近似。
- **场景二（不等式链）**：在构建一连串的不等式放缩中，作为其中关键一环，连接幂函数和线性函数。
- **场景三（导数背景）**：在证明与函数凹凸性、切线不等式相关的问题时，作为经典结论直接引用。

证明

思路提示 固定 $x\geq -1$，将 $(1+x)^n$ 与 $1+nx$ 的差视为关于指数 n 的函数，通过研究该函数的单调性来证明不等式。也可以考虑固定 n，将差值视为关于 x 的函数，用导数求最值。这里采用第一种思路，构造函数 $g(n)=(1+x)^n-(1+nx)$。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（构造函数）：

令 $x \geq -1$ 为固定实数。定义函数

$$g(n) = (1+x)^n - 1 - nx, \quad n \in \mathbb{R}.$$

理由：我们将要证明的结论转化为判断函数 $g(n)$ 的符号。

步骤二（求导判单调）：

对 $g(n)$ 关于 n 求导。注意 $(1+x)^n = e^{n\ln(1+x)}$，其中 $1+x>0$（因为 $x \geq -1$，且当 $x=-1$ 时 $(1+x)^n = 0^n$ 需单独讨论，这里先设 $x>-1$）。

$$g'(n) = \frac{d}{dn}\left[e^{n\ln(1+x)}\right] - x = e^{n\ln(1+x)} \cdot \ln(1+x) - x = (1+x)^n \ln(1+x) - x.$$

理由：为了研究 $g(n)$ 的单调性，需要分析其导数 $g'(n)$ 的符号。

步骤三（分析导函数）：

进一步对 $g'(n)$ 关于 n 求导（即求二阶导）：

$$g''(n) = \frac{d}{dn}\left[(1+x)^n \ln(1+x)\right] = (1+x)^n \left[\ln(1+x)\right]^2.$$

由于 $(1+x)^n > 0$（$x>-1$），且 $[\ln(1+x)]^2 \geq 0$，故 $g''(n) \geq 0$。

理由： $g''(n) \geq 0$ 说明 $g'(n)$ 关于 n 单调不减。

步骤四（寻找临界点）：

令 $g'(n)=0$，解出可能的极值点。注意到 $g'(0) = (1+x)^0 \ln(1+x) - x = \ln(1+x) - x$。由常用不等式 $\ln(1+x) \leq x$（$x>-1$，等号当 $x=0$ 时成立）知 $g'(0) \leq 0$。又 $g'(1) = (1+x)\ln(1+x) - x$。可以验证当 $x \neq 0$ 时，$(1+x)\ln(1+x) > x$（可通过构造函数证明），故 $g'(1) > 0$。由于 $g'(n)$ 单调不减，且 $g'(0) \leq 0$，$g'(1) \geq 0$，故存在 $n_0 \in [0,1]$ 使得 $g'(n_0) = 0$。

理由：结合单调性和端点符号，确定 $g'(n)$ 的符号变化情况。

步骤五（确定原函数最值）：

$g'(n)$ 的符号决定了 $g(n)$ 的单调性：

- 当 $n \leq n_0$ 时，$g'(n) \leq 0$，$g(n)$ 单调不增。
- 当 $n \geq n_0$ 时，$g'(n) \geq 0$，$g(n)$ 单调不减。

因此，$g(n)$ 在 $n=n_0$ 处取得最小值。计算 $g(0)=0$，$g(1)=0$。由于最小值点 n_0 在 $[0,1]$ 之间，且端点值均为 0，故在 $[0,1]$ 上 $g(n) \leq 0$，即 $(1+x)^n \leq 1+nx$；在 $n \leq 0$ 或 $n \geq 1$ 时，$g(n)$ 从 0 出发先减后增或直接增，但端点值 $g(0)=0$ 或 $g(1)=0$，故 $g(n) \geq 0$，即 $(1+x)^n \geq 1+nx$。

理由：通过单调性和端点值确定函数 $g(n)$ 在整个定义域上的符号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤六（处理边界情况）：

当 $x=-1$ 时，左边 $(1+x)^n=0^n$。若 $n>0$，则 $0^n=0$，右边 $1+n\cdot(-1)=1-n$。显然 $0\geq 1-n$ 当且仅当 $n\geq 1$；$0\leq 1-n$ 当且仅当 $n\leq 1$。这与结论一致（注意此时等号成立条件需单独验证）。当 $n=0$ 时，$(1+x)^0=1$，右边 $1+0\cdot x=1$，等号成立。结论仍成立。

理由： 补全 $x=-1$ 的特殊情形，使证明完整。

结论回扣 **综上，对任意实数 $x\geq -1$ 和 $n\in\mathbb{R}$，伯努利不等式 $(1+x)^n\geq 1+nx$（当 $n\geq 1$ 或 $n\leq 0$ 时）与 $(1+x)^n\leq 1+nx$（当 $0\leq n\leq 1$ 时）成立，等号当且仅当 $n=0,1$ 或 $x=0$ 时成立。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x>-1$，且 $n\geq 2$。比较 $(1+x)^n$ 与 $1+2x$ 的大小，并说明理由。

解题步骤：

第一步（识别指数）：

题目中幂的指数是 n，线性项的系数是 2，两者不同。不能直接套用原不等式，因为原不等式要求线性项的系数也是 n。

理由： 伯努利不等式是 $(1+x)^n$ 与 $1+nx$ 比较，这里的 $1+2x$ 不符合形式。

第二步（利用已知范围）：

由于 $n\geq 2>1$，根据伯努利不等式，有 $(1+x)^n\geq 1+nx$。

$$(1+x)^n\geq 1+nx.$$

理由： 此时满足 $n\geq 1$ 的条件。

第三步（比较线性项）：

现在需要比较 $1+nx$ 与 $1+2x$ 的大小。即比较 nx 与 $2x$。由于 $n\geq 2$，但 x 的符号未知，需分类讨论：

$$nx-2x=(n-2)x.$$

- 若 $x\geq 0$，则 $(n-2)x\geq 0$，故 $nx\geq 2x$，从而 $1+nx\geq 1+2x$。结合第二步，得 $(1+x)^n\geq 1+nx\geq 1+2x$。
- 若 $-1<x<0$，则 $(n-2)x<0$，故 $nx<2x$，从而 $1+nx<1+2x$。此时从 $(1+x)^n\geq 1+nx$ 无法直接推出与 $1+2x$ 的大小关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：必须考虑 x 的符号对线性比较的影响。

第四步（补充证明）：

对于 $-1 < x < 0$ 的情形，需另寻方法。注意到 $n \geq 2$，可考虑函数 $h(x) = (1+x)^n - (1+2x)$，求导或用二项式展开分析。但本题为比较大小，可举反例：取 $n = 2, x = -0.5$，则 $(1+x)^n = (0.5)^2 = 0.25$，$1+2x = 1-1 = 0$，此时 $(1+x)^n > 1+2x$。再取 x 更接近 -1，如 $x = -0.9$，则 $(1-0.9)^2 = 0.01$，$1 + 2 \cdot (-0.9) = -0.8$，仍有 $(1+x)^n > 1+2x$。事实上，对于 $x \in (-1, 0)$，由于 $(1+x)^n > 0$，而 $1+2x$ 可能为负，故总有 $(1+x)^n > 1+2x$。

理由：通过具体数值和正负分析完成比较。

关键结论： **当 $x > -1$ 且 $n \geq 2$ 时，总有 $(1+x)^n \geq 1+2x$，等号仅在 $x = 0$ 且 $n = 2$ 时可能成立（需验证）。注意此题揭示了伯努利不等式使用时要确保形式完全匹配，否则需结合其他分析。**

例 2（稍变形）

题目： 证明：对任意正整数 n，有 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 3$。

解题步骤：

第一步（观察指数）：

指数 n 是正整数，且大于 1（当 $n = 1$ 时直接验证）。考虑使用伯努利不等式，但方向为 $(1+x)^n \geq 1+nx$，这会放大式子，而我们需要上界。

理由：直接使用原不等式会得到 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \geq 2$，无法得到 < 3 的结论，需要其他方法。

第二步（利用二项式展开）：

将 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 用二项式定理展开：

$$\begin{aligned}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n &= \sum_{k=0}^{n} C_n^k \left(\frac{1}{n}\right)^k \\ &= 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \cdot \frac{1}{n^3} + \cdots + \frac{1}{n^n} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right.\end{aligned}$$

理由：展开后可以逐项放大。

第三步（逐项放大）：

注意到每一项中括号内的因子都小于 1，所以有

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：去掉小于 1 的因子，得到更大的式子上界。

第四步（进一步放大）：

利用 $k! \geq 2^{k-1}$（$k \geq 2$），则 $\frac{1}{k!} \leq \frac{1}{2^{k-1}}$。于是

$$\begin{aligned}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n &\leq 1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}} \\ &= 1+\frac{1-(1/2)^n}{1-1/2} = 1+2\left(1-\frac{1}{2^n}\right) = 3-\frac{2}{2^n} < 3.\end{aligned}$$

理由：利用等比数列求和公式得到明确的上界 3。

第五步（补充说明）：

当 $n=1$ 时，$\left(1+\frac{1}{1}\right)^1 = 2 < 3$，结论也成立。

理由：验证边界情况使证明完整。

关键结论： **通过二项式展开和放大技巧，证明了 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 3$。此题展示了伯努利不等式并非万能，有时需要更精细的放缩。**

易错提醒

易错点一（忽略前提条件）

忘记 $x \geq -1$ 的前提，直接对任意 x 使用不等式。

正确理解（保障定义域）：

条件 $x \geq -1$ 确保了底数 $1+x \geq 0$，从而 $(1+x)^n$ 对任意实数 n 有意义（实数幂要求底数非负）。

错因分析（盲目套用）：

学生只记住了不等式形式，忽略了该不等式成立的前提条件，导致在 $x < -1$ 时错误使用。

易错点二（方向记反）

混淆 n 在不同范围内不等号的方向，错误地认为 n 越大 $(1+x)^n$ 越大，所以总是 $\geq$。

正确理解（指数分界）：

不等号方向以 $n=0$ 和 $n=1$ 为界。当 n “跑出”区间 $[0,1]$ 时为 $\geq$；“跑进”区间 $[0,1]$ 时为 $\leq$。

错因分析（直观错觉）：

学生误将“指数 n 越大，函数值越大”这一单调性（当 $1+x>1$ 时成立）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错误推广到与线性函数的比较上，未理解不等式方向由函数的凹凸性决定。

易错点三（形式不匹配）

题目中出现 $(1+ax)^b$ 或类似形式，未将其变形为标准形式 $(1+x)^n$ 就盲目套用。

正确理解（变形适配）：

使用前必须将式子化为 $(1+\text{新变量})^{\text{新指数}}$ 的形式，并确保新变量 ≥ -1。例如，比较 $(1+2x)^3$ 与 $1+6x$，可令 $t=2x$，则需 $t\geq -1$，即 $x\geq -0.5$。

错因分析（机械套用）：

学生看到形似但系数不同的式子，没有通过变量代换将其转化为标准形式，导致结论错误或遗漏变量的限制条件。

结论小结

一句话核心 **伯努利不等式：用切线 $1+nx$ 逼近 $(1+x)^n$，逼近的方向（上或下）由指数 n 是否在 $[0,1]$ 区间内决定。**

使用条件

- **条件 1（底数非负）：**必须满足 $x\geq -1$，即 $1+x\geq 0$。
- **条件 2（指数分界）：**明确 n 的范围：$n\geq 1$ 或 $n\leq 0$ 时用“$\geq$”；$0\leq n\leq 1$ 时用“$\leq$”。

关键提醒

- **易错点（方向混淆）：**牢记“出则大（$\geq$），入则小（$\leq$）”的口诀，对应指数 n 跑出或跑进区间 $[0,1]$。
- **检查项（形式匹配）：**使用前检查式子是否为 $(1+\text{某式})^{\text{指数}}$ 并与 $1+\text{指数}\times\text{某式}$ 比较，若不是，先做变量代换。
- **等号条件（三点）：**等号成立只在 $n=0$、$n=1$ 或 $x=0$ 时，做题后顺手验证一下。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.29 正弦绝对值不等式 |sin x| ≤ |x|

二级结论

条件

条件 1（实数范围）：

设 $x \in \mathbb{R}$。

结论

结论一（绝对值不等式）：

直观描述： 正弦绝对值不超过自变量绝对值。

$$|\sin x| \leq |x|$$

推广结论（平方形式）：

直观描述： 正弦平方不超过自变量平方。

$$\sin^2 x \leq x^2$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x = 0$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉

对于任意实数 x，正弦函数 $|\sin x|$ 的值总是被 $|x|$ 控制，当 x 远离原点时 $|x|$ 更大，当 x 接近原点时两者接近。

核心拆解

要点一（绝对值比较）：

比较两个绝对值函数的大小关系。

要点二（取等唯一）：

等号仅在 $x = 0$ 时成立，其他位置严格小于。

几何本质（弧长与弦长）

在单位圆中，$|x|$ 表示弧长（以弧度度量），$|\sin x|$ 表示正弦线长度。由于直线段最短，所以正弦线不超过弧长。

代数意义（函数差单调）

考虑函数 $f(x) = x - \sin x$（当 $x \geq 0$），通过求导可得 $f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$，故 $f(x)$ 单调不减，从而 $x \geq \sin x$；再结合奇偶性扩展到整个实数轴。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（放缩工具）

- **考法一（直接放缩）**：在不等式证明中直接使用 $|\sin x| \le |x|$ 进行放缩。
- **考法二（极限估计）**：用于计算极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ 的相关证明。

顿悟点

当 x 很小时，$|\sin x|$ 与 $|x|$ 几乎相等，这解释了为什么在零点附近正弦函数可用线性近似。

使用场景

- **场景一（证明不等式）**：在涉及三角函数的不等式证明中，作为基础放缩依据。
- **场景二（参数范围）**：用于确定含 $\sin x$ 的表达式中参数的取值范围。

证明

思路提示

证明的关键是将绝对值不等式转化为非负情形，通过构造函数差并利用导数研究单调性。

正式推导

步骤一（非负化归）：

由于 $|\sin x|$ 和 $|x|$ 均为偶函数，只需证明当 $x \ge 0$ 时有 $\sin x \le x$。

$$\text{原不等式等价于：对} x \ge 0,\ \sin x \le x.$$

理由：绝对值不等式 $|\sin x| \le |x|$ 中，若 $x \ge 0$ 则 $|x| = x$，且 $\sin x \le |\sin x|$，但需证 $\sin x \le x$。实际上，当 $x \ge 0$ 时，若 $\sin x \ge 0$，则 $|\sin x| = \sin x$；若 $\sin x < 0$，则 $\sin x < 0 \le x$，故只需证 $\sin x \le x$。更直接地，考虑 $x \ge 0$ 时，证明 $x - \sin x \ge 0$。

步骤二（构造函数）：

定义 $f(x) = x - \sin x$，其中 $x \ge 0$。

$$f(x) = x - \sin x, \quad x \ge 0.$$

理由：通过研究 $f(x)$ 的符号来证明 $\sin x \le x$。

步骤三（求导分析）：

计算导数 $f'(x) = 1 - \cos x$。

$$f'(x) = 1 - \cos x.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：由于 $\cos x \le 1$，故 $f'(x) \ge 0$，等号仅在 $\cos x = 1$ 即 $x = 2k\pi$ 时成立。因此 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调不减。

步骤四（端点值）：

计算 $f(0) = 0 - \sin 0 = 0$。

$$f(0) = 0.$$

理由：由于 $f(x)$ 单调不减且 $f(0) = 0$，故对任意 $x \ge 0$，有 $f(x) \ge 0$，即 $x - \sin x \ge 0$。

步骤五（推广到全体实数）：

对于 $x < 0$，令 $t = -x > 0$，则 $|\sin x| = |\sin(-t)| = |\sin t| \le t = |x|$。

$$\text{当} x < 0 \text{ 时，} |\sin x| = |\sin(-x)| \le |-x| = |x|.$$

理由：利用 sin 为奇函数和已证的非负情形。

步骤六（取等条件）：

等号成立当且仅当 $x = 0$。

$$f(x) = 0 \text{ 仅当} x = 0.$$

理由：当 $x > 0$ 时，若 $x = 2k\pi$，$f'(x) = 0$，但 $f(x) = 2k\pi - \sin(2k\pi) = 2k\pi > 0$，故严格大于；当 $x < 0$ 时，由对称性也严格大于。仅 $x = 0$ 时 $f(0) = 0$。

结论回扣

综上所述，对任意实数 x 有 $|\sin x| \le |x|$，且等号仅当 $x = 0$ 时成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $x \ne 0$，求证 $\left|\dfrac{\sin x}{x}\right| \le 1$。

解题步骤：

第一步（应用原结论）：

由已知定理 $|\sin x| \le |x|$。

$$|\sin x| \le |x|.$$

理由：直接使用主结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（除以正数）：

因为 $x \neq 0$，所以 $|x| > 0$，不等式两边同除以 $|x|$。

$$\frac{|\sin x|}{|x|} \leq 1.$$

理由：不等式两边同除以正数，不等号方向不变。

第三步（化简形式）：

注意到 $\frac{|\sin x|}{|x|} = \left|\frac{\sin x}{x}\right|$，故得证。

$$\left|\frac{\sin x}{x}\right| \leq 1.$$

理由：绝对值商等于商的绝对值。

关键结论： 当 $x \neq 0$ 时，$\left|\frac{\sin x}{x}\right| \leq 1$。

例 2（稍变形）

题目： 设 $x, y \in \mathbb{R}$，求证 $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$。

解题步骤：

第一步（和差化积）：

利用三角恒等式。

$$\sin x - \sin y = 2\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}.$$

理由：将差化为乘积形式，便于处理绝对值。

第二步（取绝对值）：

取绝对值并利用 $|\cos\theta| \leq 1$。

$$|\sin x - \sin y| = \left|2\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}\right| \leq 2\left|\sin\frac{x-y}{2}\right|.$$

理由： $|\cos\theta| \leq 1$，且 $|ab| = |a||b|$。

第三步（应用结论）：

由 $|\sin t| \leq |t|$，令 $t = \frac{x-y}{2}$。

$$\left|\sin\frac{x-y}{2}\right| \leq \left|\frac{x-y}{2}\right|.$$

理由：直接使用主结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第四步（综合得证）：

代入上步不等式。

$$|\sin x - \sin y| \le 2 \cdot \left|\frac{x-y}{2}\right| = |x-y|.$$

理由： 简单代数运算。

关键结论： **对于任意实数 x, y，有 $|\sin x - \sin y| \le |x-y|$。**

易错提醒

易错点一（忽略绝对值）：

将不等式错误记为 $\sin x \le x$ 而不加绝对值。

正确理解（绝对值不可省）：

必须写成 $|\sin x| \le |x|$，否则当 $x < 0$ 或 $\sin x < 0$ 时不成立。

错因分析（符号混淆）：

忽略了正弦函数和自变量的符号变化，导致不等式方向错误。

易错点二（等号条件扩大）：

认为等号在 $x = 2k\pi$（$k \in \mathbb{Z}$）时成立。

正确理解（等号唯一）：

等号仅当 $x = 0$ 时成立，其他位置严格小于。

错因分析（导数零点误解）：

误将导数 $f'(x) = 0$ 的点当作函数取等点，但 $f(x) = x - \sin x$ 在 $x = 2k\pi$ 处 $f(x) > 0$。

易错点三（复数误用）：

在复数 z 中错误使用 $|\sin z| \le |z|$。

正确理解（实数范围）：

结论仅对实数 x 成立，复数情形不保证。

错因分析（条件忽视）：

未注意定理条件 $x \in \mathbb{R}$，盲目推广到复数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

对于任意实数 x，正弦绝对值 $|\sin x|$ 总是不超过 $|x|$，且等号只在原点成立。

使用条件

- **条件 1（实数变量）**：变量 x 必须是实数，不能是复数。
- **条件 2（任意取值）**：x 可取任意实数值，无需限制范围。

关键提醒

- **易错点（绝对值遗漏）**：务必保留绝对值符号，避免写成 $\sin x \leq x$。
- **检查项（等号验证）**：使用后检查等号是否仅在 $x = 0$ 时成立，防止误用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.30 三角函数不等式：sin x < x < tan x

二级结论

条件

条件 1（非负区间）：

$x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$

条件 2（非正区间）：

$x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right]$

结论

结论一（正切下界）：

直观描述： 在非负区间内，正切函数值不小于自变量。

$$\tan x \geq x$$

结论二（正切上界）：

直观描述： 在非正区间内，正切函数值不大于自变量。

$$\tan x \leq x$$

推广结论（正弦正切夹逼）：

直观描述： 在正开区间内，正弦小于自变量，自变量小于正切。

$$\sin x < x < \tan x$$

等号/取等条件： 等号成立当且仅当 $x = 0$（适用于结论一和结论二）。

理解说明

一句话直觉

在单位圆中，角度 x 对应的正切线段长度大于弧长 x，而弧长大于正弦线段长度，从而形成不等式链。

核心拆解

要点一（区间分正负）：

不等式的符号取决于 x 所在区间：非负时 $\tan x \geq x$，非正时 $\tan x \leq x$。

要点二（不等号方向）：

在 $x > 0$ 时，$\tan x$ 恒大于 x；在 $x < 0$ 时，$\tan x$ 恒小于 x。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（严格夹逼）：

当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时，有严格的上下界：$\sin x < x < \tan x$。

几何本质（线段比较）

在单位圆中，设角度 x（弧度），则弧长 $= x$，正弦线长 $= \sin x$，正切线长 $= \tan x$。几何构造显示，对于 $x > 0$，正切线最长，弧长次之，正弦线最短，即 $\tan x > x > \sin x$。

代数意义（函数比较）

从函数角度看，在 $x = 0$ 处，$\tan x$ 与 x 有相同的线性项（导数均为 1），但 $\tan x$ 的泰勒展开为 $x + \frac{x^3}{3} + \cdots$，高阶项为正，故在 $x > 0$ 时 $\tan x > x$；类似地，$\sin x$ 的展开为 $x - \frac{x^3}{6} + \cdots$，故 $\sin x < x$。

考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接比较）：**在证明题中，直接利用 $\tan x \geq x$ 或 $\sin x < x$ 放缩，简化复杂不等式。
- **考法二（变形应用）：**通过变量代换（如令 $t = \tan x$）将问题转化为这些标准形式，用于求极限或比较大小。

顿悟点

当 x 很小时，$\tan x \approx x + \frac{x^3}{3}$，因此 $\tan x$ 总是略大于 x（对于 $x > 0$）；类似地，$\sin x \approx x - \frac{x^3}{6}$，所以 $\sin x$ 略小于 x。这解释了不等式链的严格性。

使用场景

- **场景一（证明题）：**证明如“$\tan 0.1 > 0.1$”或“$\sin 0.2 < 0.2$”类的不等式时，直接引用结论。
- **场景二（估值题）：**给定 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$，快速估算 $\sin x$ 或 $\tan x$ 的范围，例如由 $x < \tan x$ 知 $\tan x$ 的下界为 x。

证明

思路提示

通过构造函数，利用导数研究单调性，从而比较 $\tan x$、x、$\sin x$ 的大小。关键点是利用基本求导公式和函数奇偶性。

正式推导

步骤一（构造正切差）：

考虑函数 $f(x) = \tan x - x$，定义域为 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$。

$$f(x) = \tan x - x$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：目标是证明 $\tan x \geq x$，即 $f(x) \geq 0$。

步骤二（求导判号）：

对 $f(x)$ 求导：

$$f'(x) = \sec^2 x - 1 = \tan^2 x$$

理由：导数公式 $(\tan x)' = \sec^2 x$，常数导数为 0。由于 $\tan^2 x \geq 0$，等号仅当 $x = 0$ 时成立（在定义域内）。

步骤三（单调性得证）：

由 $f'(x) \geq 0$ 知 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2})$ 上单调不减。又 $f(0) = \tan 0 - 0 = 0$，故对任意 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$，有 $f(x) \geq f(0) = 0$。

$$\tan x - x \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \tan x \geq x$$

理由：单调不减函数在起点取最小值，因此 $f(x)$ 的最小值为 $f(0) = 0$。

步骤四（负区间推广）：

对于 $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0]$，令 $t = -x \in [0, \frac{\pi}{2})$，则 $\tan x = \tan(-t) = -\tan t$。由步骤三，$\tan t \geq t$，故 $\tan x = -\tan t \leq -t = x$。

$$\tan x \leq x$$

理由：利用 $\tan x$ 的奇函数性质和已证的非负区间结论，通过变量替换得到负区间结论。

步骤五（正弦比较）：

考虑函数 $g(x) = x - \sin x$，定义域为 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$。

$$g(x) = x - \sin x$$

理由：目标是证明 $x > \sin x$，即 $g(x) > 0$。

步骤六（求导判号）：

对 $g(x)$ 求导：

$$g'(x) = 1 - \cos x$$

理由：导数公式 $(\sin x)' = \cos x$。由于 $\cos x \leq 1$，等号仅当 $x = 0$ 时成立，故 $g'(x) \geq 0$，且当 $x > 0$ 时 $g'(x) > 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤七（单调严格增）：

由 $g'(x) \geq 0$ 知 $g(x)$ 单调不减，且当 $x > 0$ 时严格单调增。又 $g(0) = 0 - \sin 0 = 0$，故对任意 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$，有 $g(x) > g(0) = 0$。

$$x - \sin x > 0 \quad \Rightarrow \quad \sin x < x$$

理由：严格单调增函数在正区间内取值大于起点值。

步骤八（结合得链）：

由步骤三和步骤七，当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时，有 $\sin x < x$ 且 $x < \tan x$（因 $\tan x \geq x$ 且等号仅当 $x = 0$，故 $x > 0$ 时 $\tan x > x$）。

$$\sin x < x < \tan x$$

理由：将两个不等式合并，得到完整的不等式链。

结论回扣

综上，我们严格证明了：当 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$ 时 $\tan x \geq x$，当 $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0]$ 时 $\tan x \leq x$，且当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时 $\sin x < x < \tan x$，等号仅当 $x = 0$ 时成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 判断 $\tan 0.5$ 与 0.5 的大小关系，并说明理由。

解题步骤：

第一步（确认区间）：

检查 0.5 是否属于 $[0, \frac{\pi}{2})$。由于 $\frac{\pi}{2} \approx 1.57 > 0.5$，故 $0.5 \in [0, \frac{\pi}{2})$。

理由：定理条件要求 x 在非负区间内才能应用 $\tan x \geq x$。

第二步（应用定理）：

根据定理，当 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$ 时，有 $\tan x \geq x$。取 $x = 0.5$，则

$$\tan 0.5 \geq 0.5$$

理由：直接代入结论一。

第三步（严格性判断）：

由于 $0.5 > 0$，等号仅当 $x = 0$ 时成立，故 $\tan 0.5 > 0.5$。

理由：定理中等号条件为 $x = 0$，此处 $x = 0.5 \neq 0$，因此不等式严格成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $\tan 0.5 > 0.5$。

例 2（稍变形）

题目： 设 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$，证明 $\frac{\sin x}{x} < 1 < \frac{\tan x}{x}$。

解题步骤：

第一步（分离不等式）：

要证 $\frac{\sin x}{x} < 1 < \frac{\tan x}{x}$，即证 $\sin x < x$ 且 $x < \tan x$。

理由： 将分式不等式乘以正数 x（因 $x > 0$），不等号方向不变。

第二步（应用定理）：

根据定理结论三，当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时，有 $\sin x < x < \tan x$。

$$\sin x < x \quad \text{且} \quad x < \tan x$$

理由： 直接引用推广结论中的不等式链。

第三步（转化回分式）：

由 $\sin x < x$，两边同除以正数 x，得 $\frac{\sin x}{x} < 1$；由 $x < \tan x$，两边同除以正数 x，得 $1 < \frac{\tan x}{x}$。

$$\frac{\sin x}{x} < 1 \quad \text{且} \quad 1 < \frac{\tan x}{x}$$

理由： 除以正数不改变不等号方向。

第四步（合并结论）：

综上，有 $\frac{\sin x}{x} < 1 < \frac{\tan x}{x}$。

理由： 将两个不等式结合即可。

关键结论： **当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时，$\frac{\sin x}{x} < 1 < \frac{\tan x}{x}$ 成立。**

易错提醒

易错点一（忽略区间条件）

在使用不等式 $\tan x \geq x$ 时，未检查 x 是否属于 $[0, \frac{\pi}{2})$，导致在负区间错误应用。

正确理解（区间限定）：

定理中的不等式仅在指定区间内成立：$\tan x \geq x$ 要求 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$；$\tan x \leq x$ 要求 $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0]$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（条件遗漏）：

记忆不牢，只记住了结论形式，忽略了前提条件；解题时没有养成先验证区间的习惯。

易错点二（符号方向混淆）

在负区间 $x<0$ 时，误用 $\tan x \geq x$，而实际上应为 $\tan x \leq x$。

正确理解（符号对称）：

由于 $\tan x$ 是奇函数，在负区间的不等式方向与正区间相反：$x<0$ 时 $\tan x \leq x$，$x>0$ 时 $\tan x \geq x$。

错因分析（奇偶性忽略）：

没有利用函数的奇偶性进行推导，或机械记忆导致符号记反。

易错点三（等号滥用）

认为不等式 $\tan x \geq x$ 在 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$ 内总是严格成立，或误以为在 $x=\frac{\pi}{2}$ 处等号成立。

正确理解（等号唯一）：

等号仅当 $x=0$ 时成立；在 $x>0$ 时 $\tan x > x$，在 $x<0$ 时 $\tan x < x$。且 $x=\frac{\pi}{2}$ 处 $\tan x$ 无定义。

错因分析（端点混淆）：

对等号成立条件记忆模糊，或混淆了定义域端点与取等点。

结论小结

一句话核心

在 x 接近零时，$\tan x$ 略大于 x，而 $\sin x$ 略小于 x，形成 $\sin x < x < \tan x$ 的不等式链。

使用条件

- **条件 1（区间非负）：** $x \in [0, \frac{\pi}{2})$，此时适用 $\tan x \geq x$ 且 $\sin x < x$。
- **条件 2（区间非正）：** $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0]$，此时适用 $\tan x \leq x$。

关键提醒

- **易错点（符号方向）：** 负区间时不等号方向与正区间相反，务必注意。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（区间验证）**：使用前先检查 x 是否在定理指定的区间内，避免错误应用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.31 余弦函数的下界不等式：cosx ≥ 1 - x²/2

二级结论

条件

条件 1（自变量范围）：

x 为任意实数，即 $x \in \mathbb{R}$。

结论

结论一（余弦下界）：

直观描述： 余弦函数的值总不小于一个开口向下的二次函数的值。

$$\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$$

推广结论（严格不等式）：

直观描述： 当自变量不为零时，不等式严格成立。

$$\text{当} x \neq 0 \text{ 时，有 } \cos x > 1 - \frac{x^2}{2}$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x = 0$ 时，等号 $\cos 0 = 1 - \frac{0^2}{2}$ 成立。

理解说明

一句话直觉 余弦函数 $\cos x$ 的图像，在 $x = 0$ 附近比对应的二次函数 $1 - \frac{x^2}{2}$ 的图像“更鼓”或“更靠上”。

核心拆解

要点一（比较对象）：

比较的对象是余弦函数 $\cos x$ 和二次函数 $y = 1 - \frac{x^2}{2}$。

要点二（不等关系）：

对于所有实数 x，始终有 $\cos x$ 大于或等于 $1 - \frac{x^2}{2}$。

要点三（相切条件）：

两个函数仅在 $x = 0$ 时函数值相等，图像在该点相切。

几何本质（切线放缩） 该不等式表明，二次函数 $y = 1 - \frac{x^2}{2}$ 是 $y = \cos x$ 在 $x = 0$ 处的一条“下方切线”（更准确地说，是二阶泰勒多项式下界）。在 $x = 0$ 附近，可以用这个简单的二次函数来近似或控制 $\cos x$ 的值，且保证是下界估计。

代数意义（多项式逼近） 从代数上看，$1 - \frac{x^2}{2}$ 是 $\cos x$ 的泰勒展开式（麦克劳林公

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

式）的前两项。完整展开为 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots$，由于后续项正负交替且当 x 较小时绝对值递减，前两项给出了一个全局下界。

考点价值（放缩工具）

- **考法一（证明不等式）**：在证明涉及 $\cos x$ 的不等式时，可直接用它放缩，将超越式化为多项式。
- **考法二（估值或比较）**：用于快速比较 $\cos x$ 与某个二次式的大小，或对 $\cos x$ 进行下界估计。

顿悟点 **这个不等式将复杂的三角函数放缩为简单的二次函数，是“以直代曲”思想的一种体现，但这里“直”换成“抛物线”。它为我们处理 $\cos x$ 提供了一个普适、简洁的下界工具。**

使用场景

- **场景一（直接放缩）**：当题目需要证明 $\cos x \geq g(x)$ 时，若 $g(x) \leq 1 - \frac{x^2}{2}$，则可利用此结论进行传递。
- **场景二（构建不等式链）**：在连续放缩中，作为中间步骤，连接三角函数与多项式。

证明

思路提示 考虑构造辅助函数 $f(x) = \cos x - \left(1 - \frac{x^2}{2}\right)$，利用导数研究其单调性与最值，证明 $f(x) \geq 0$。这是处理函数不等式的通用方法。

正式推导

步骤一（构造函数）：

令 $f(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$。则原不等式等价于证明 $f(x) \geq 0$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立。

$$f(x) = \cos x + \frac{x^2}{2} - 1$$

理由：将原不等式 $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$ 移项，使右边为零，便于分析。

步骤二（求导判单调）：

求 $f(x)$ 的一阶导数和二阶导数。

$$f'(x) = -\sin x + x,$$
$$f''(x) = -\cos x + 1.$$

理由：导数是研究函数单调性的工具。特别地，二阶导数 $f''(x) = 1 - \cos x \geq 0$，因为 $\cos x \leq 1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（分析一阶导）：

由于 $f''(x) \geq 0$ 恒成立，所以一阶导数 $f'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调不减。

理由：二阶导数非负意味着一阶导数单调不减。计算 $f'(0) = -\sin 0 + 0 = 0$。因此，当 $x < 0$ 时，$f'(x) \leq f'(0) = 0$；当 $x > 0$ 时，$f'(x) \geq f'(0) = 0$。

步骤四（确定原函数最值）：

由 $f'(x)$ 的符号变化可知，$f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上单调递减，在 $[0, +\infty)$ 上单调递增。

故$x = 0$ 是$f(x)$ 的唯一极小值点，也是最小值点。

理由：单调性分析表明，$f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得全局最小值。

步骤五（计算最小值）：

计算 $f(0)$ 的值。

$$f(0) = \cos 0 + \frac{0^2}{2} - 1 = 1 + 0 - 1 = 0.$$

理由：因此，对任意实数 x，有 $f(x) \geq f(0) = 0$。

结论回扣 **由此证明了 $f(x) \geq 0$ 恒成立，即 $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立。且等号成立当且仅当 $x = 0$，此时 $f(x)$ 取到最小值 0。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 利用不等式 $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$，证明：当 $x \in \mathbb{R}$ 时，$\cos 2x \geq 1 - 2x^2$。

解题步骤：

第一步（变量替换）：

在原不等式中，将 x 替换为 $2x$。

理由：结论中角是 $2x$，因此直接使用 $2x$ 代入原不等式中的自变量位置。

第二步（直接代入）：

代入得 $\cos(2x) \geq 1 - \frac{(2x)^2}{2}$。

$$\cos(2x) \geq 1 - \frac{4x^2}{2}$$

理由：严格遵循原不等式形式，注意替换后分母的 2 保持不变。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（化简）：

计算右边的表达式。

$$1-\frac{4x^2}{2}=1-2x^2.$$

理由：进行简单的算术化简，得到最终形式。

关键结论：因此，我们直接得到 $\cos 2x \geq 1-2x^2$，等号成立当且仅当 $2x=0$，即 $x=0$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $x \in \mathbb{R}$，求证：$\frac{\cos x-1}{x^2} \geq -\frac{1}{2}$。（约定当 $x=0$ 时，极限值为 $-\frac{1}{2}$）

解题步骤：

第一步（变形目标）：

要证 $\frac{\cos x-1}{x^2} \geq -\frac{1}{2}$，即证 $\cos x-1 \geq -\frac{x^2}{2}$（当 $x^2>0$ 时）。

理由：将分式不等式乘以正数 x^2 化为整式不等式。注意 $x=0$ 时需单独处理。

第二步（应用结论）：

由已知结论 $\cos x \geq 1-\frac{x^2}{2}$，将 $1-\frac{x^2}{2}$ 移到左边。

$$\cos x-1 \geq -\frac{x^2}{2}$$

理由：这正是原不等式移项后的结果。

第三步（分情况说明）：

当 $x \neq 0$ 时，两边同除以 x^2（正数），即得 $\frac{\cos x-1}{x^2} \geq -\frac{1}{2}$。当 $x=0$ 时，结论中的极限值 $-\frac{1}{2}$ 恰好是 $\cos x$ 在 $x=0$ 处的二阶泰勒系数。

理由：此步骤完成了从整式到分式的转换，并解释了 $x=0$ 时的连续性。

关键结论：因此，对于任意实数 x（$x=0$ 时按极限理解），均有 $\frac{\cos x-1}{x^2} \geq -\frac{1}{2}$ 成立。

易错提醒

易错点一（方向混淆）

误记不等式方向，写成 $\cos x \leq 1-\frac{x^2}{2}$。

正确理解（保向下界）：

该不等式给出的是 $\cos x$ 的**下界**，所以是“大于等于”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（图像误判）：

可能因为二次函数开口向下，错误认为其图像总在余弦曲线上方，而忽略了在 $x=0$ 附近 $\cos x$ 更靠近上方的特点。

易错点二（取等条件遗漏）

使用放缩后，忽略等号成立条件 $x=0$，导致后续推理中取等情况分析不完整。

正确理解（唯一取等点）：

等号仅在 $x=0$ 时成立，这是一个**孤立点**。

错因分析（记忆模糊）：

只记住了不等式本身，没有将取等条件作为结论的有机组成部分一同记忆。

易错点三（滥用放缩）

在 $|x|$ 较大的情形下，仍用此不等式放缩，导致放缩后下界 $1-\frac{x^2}{2}$ 变得非常负，失去估计价值甚至得出错误结论。

正确理解（全局成立但强弱有别）：

不等式虽然全局成立，但当 $|x|$ 较大时，右边 $1-\frac{x^2}{2}$ 会远小于 -1，而 $\cos x$ 始终在 $[-1,1]$ 之间，此时放缩过于宽松。

错因分析（忽视紧致性）：

未结合余弦函数的有界性来评估放缩的“松紧度”，在 $|x|$ 较大时此下界没有实用价值。

结论小结

一句话核心 **余弦函数有一个全局的二次多项式下界：$\cos x \geq 1-\frac{x^2}{2}$，仅在原点处取等。**

使用条件

- **条件 1（实数自变量）：**自变量 x 可以是**任意实数**，无范围限制。
- **条件 2（下界放缩）：**当需要寻找 $\cos x$ 的一个**下界**，且该下界是简单的二次函数时。

关键提醒

- **易错点（方向与取等）：**牢记是“$\geq$”而不是“$\leq$”；牢记取等仅当 $x=0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（放缩有效性）**：使用此不等式放缩后，需检查得到的下界在当前问题中是否还有效（非平凡），尤其当 $|x|$ 较大时。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.32 三角联合放缩不等式：sinx+tanx>2x

二级结论

条件

条件 1（自变量范围）：

自变量 x 在开区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内。

结论

结论一（和式放缩）：

直观描述： 正弦与正切之和严格大于两倍自变量。

$$\sin x + \tan x > 2x$$

推广结论（均值放缩）：

直观描述： 正弦与正切的算术平均值严格大于自变量。

$$\frac{\sin x + \tan x}{2} > x$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x = 0$ 时，上述两个不等式中的等号成立。

理解说明

一句话直觉 在锐角范围内，将角度 x 对应的“正弦高度”与“正切斜率”组合，其总效应恒大于单纯用直线 $y = 2x$ 或 $y = x$ 的刻画。

核心拆解

要点一（独立比较）：

已知基本不等式 $\sin x < x < \tan x$ 在区间内成立。

要点二（联合效应）：

将 $\sin x$ 与 $\tan x$ 相加，其和会超过 $2x$，因为正切部分的增长速度比线性更快。

要点三（均值效应）：

取算术平均后，介于两者之间的“中间值”仍然大于 x，表明 x 是比两者都小的基准。

几何本质（切线弦高） 在单位圆中，$\sin x$ 是对边长度，$\tan x$ 是圆外切线段长度。二者之和，可以视作“圆弧内侧高度”与“圆弧外侧延伸长度”的叠加。这个总长度始终大于圆心角 x 所对应的两倍弧长近似值 $2x$，也大于弧长近似值 x 本身。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（函数比较） 构造辅助函数 $f(x)=\sin x+\tan x-2x$ 或 $g(x)=\frac{\sin x+\tan x}{2}-x$，通过求导判断其在 $(0,\pi/2)$ 上的单调性，从而证明其恒正。这体现了“差值函数分析法”在处理超越不等式时的核心作用。

考点价值（放缩工具）

- **考法一（直接放缩）**：在证明其他涉及 $\sin x$ 与 $\tan x$ 和的不等式时，可作为一个已知的“更强”结论直接引用，简化证明步骤。
- **考法二（估值判断）**：用于快速判断形如 $\sin a+\tan a$ 与 $2a$ 或 a 的大小关系，在选择题或寻找临界点时尤为高效。
- **考法三（函数建模）**：作为利用导数证明不等式的一个经典案例，其构造函数与求导判号的过程具有示范性。

顿悟点 **这个不等式揭示了 $\sin x$ 和 $\tan x$ 联合后的“放大效应”：即使 $\sin x$ 单独比 x 小，但与增长更快的 $\tan x$ 相加后，足以超越 $2x$。这提醒我们，在组合多个函数进行放缩时，需综合考量各自的增减速率。**

使用场景

- **场景一（强化证明）**：当题目要求证明 $\sin x+\tan x>kx$ 且 $k\le 2$ 时，此结论可直接作为推理依据。
- **场景二（快速判号）**：在含参问题中，需要判断 $\sin\theta+\tan\theta-2\theta$ 的符号以确定参数范围。
- **场景三（导数应用）**：作为练习利用导数证明超越不等式的基础模型，可模仿其思路解决类似问题。

证明

思路提示 证明的核心是构造函数，利用导数研究其在开区间上的单调性，并结合端点值（极限）确定符号。选择证明第一个不等式 $\sin x+\tan x>2x$，第二个不等式是其直接推论。

正式推导

步骤一（构造函数）：

令 $f(x)=\sin x+\tan x-2x$，其中 $x\in(0,\pi/2)$。目标转化为证明 $f(x)>0$。

$$f(x)=\sin x+\tan x-2x$$

理由： 将要证的不等式移项，构造差值函数是证明不等式恒成立的常用方法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（求导化简）：

对 $f(x)$ 求导，并利用三角恒等式进行化简。

$$\begin{aligned} f'(x) &= \cos x + \sec^2 x - 2 \\ &= \cos x + \frac{1}{\cos^2 x} - 2. \end{aligned}$$

理由：导数 $\sin x$ 的导数为 $\cos x$，$\tan x$ 的导数为 $\sec^2 x$，常数 $2x$ 的导数为 2。

步骤三（二次换元）：

令 $t = \cos x$，由于 $x \in (0, \pi/2)$，故 $t \in (0, 1)$。则 $f'(x)$ 可化为关于 t 的函数。

$$f'(x) = t + \frac{1}{t^2} - 2, \quad t \in (0, 1).$$

理由：将变量统一为 t，便于分析代数式的符号。这里 $\sec^2 x = 1/\cos^2 x = 1/t^2$。

步骤四（判断导函数符号）：

分析 $g(t) = t + t^{-2} - 2$ 在 $t \in (0, 1)$ 上的符号。

$$\begin{aligned} g(t) &= t + \frac{1}{t^2} - 2 \\ &= \frac{t^3 + 1 - 2t^2}{t^2} \\ &= \frac{(t-1)(t^2 + t - 1)}{t^2}. \end{aligned}$$

理由：通分后对分子进行因式分解。注意到 $t^2 + t - 1 = 0$ 的正根为 $(\sqrt{5} - 1)/2 \approx 0.618$，在 $(0, 1)$ 内。

步骤五（分区间讨论）：

在 $t \in (0, 1)$ 内，分母 $t^2 > 0$。分析分子因式符号：

- $(t - 1) < 0$ 恒成立。
- 令 $t_0 = (\sqrt{5} - 1)/2$，则当 $t \in (0, t_0)$ 时，$t^2 + t - 1 < 0$；当 $t \in (t_0, 1)$ 时，$t^2 + t - 1 > 0$。

因此，当 $t \in (0, t_0)$ 时，分子 $(-) \times (-) = (+)$，故 $g(t) > 0$；当 $t \in (t_0, 1)$ 时，分子 $(-) \times (+) = (-)$，故 $g(t) < 0$。

理由：由此可知 $f'(x)$ 的符号在 x 对应的 t（即 $\cos x$）越过 t_0 时发生变号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤六（确定原函数最小值）：

设 $x_0 = \arccos(t_0)$，则 $f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上递增，在 $(x_0, \pi/2)$ 上递减。因此 $f(x)$ 在 $x = 0$ 或 $x \to (\pi/2)^-$ 处可能取到区间内的最小值。计算极限：

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \sin 0 + \tan 0 - 0 = 0,$$
$$\lim_{x\to(\pi/2)^-} f(x) = 1 + \infty - \pi = +\infty \quad (\text{实际趋向正无穷}).$$

理由： 由于 $x = 0$ 是区间端点（不在定义域内但可考虑极限），且 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值，最小值在边界处。左端点极限为 0，但 $x > 0$ 时 $f(x) > f(0^+) = 0$。

步骤七（得出结论）：

结合步骤六，对于任意 $x \in (0, \pi/2)$，有 $f(x) > \lim_{x\to 0^+} f(x) = 0$。即 $\sin x + \tan x - 2x > 0$。

$$\sin x + \tan x > 2x.$$

理由： 函数 $f(x)$ 在开区间内处处大于其左端点的极限值，且该极限值为 0。

步骤八（推导第二结论）：

由第一结论 $\sin x + \tan x > 2x$，两边同除以正数 2，立即得到

$$\frac{\sin x + \tan x}{2} > x.$$

理由： 不等式两边同除以一个正数，不等号方向不变。

结论回扣 **至此，我们严格证明了在 $x \in (0, \pi/2)$ 时，$\sin x + \tan x > 2x$ 及其算术平均形式 $\frac{\sin x+\tan x}{2} > x$ 恒成立，且等号仅在 $x = 0$ 处（考虑连续性）成立。证明的关键在于利用导数分析差值函数的单调性，并正确处理边界极限。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{4})$，比较 $\sin\alpha + \tan\alpha$ 与 α 的大小关系。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

题目给出的 $\alpha \in (0, \pi/4)$ 是 $(0, \pi/2)$ 的子区间。

理由： 结论成立的前提条件是自变量在 $(0, \pi/2)$ 内，当前条件满足。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（应用结论）：

直接应用三角联合放缩不等式的第二个结论。

$$\frac{\sin\alpha+\tan\alpha}{2}>\alpha.$$

理由：对于 $(0,\pi/2)$ 内的任意角，其正弦与正切的算术平均值大于该角本身。

第三步（变形得结果）：

将第二步的不等式两边同时乘以 2（正数），得到最终比较结果。

$$\sin\alpha+\tan\alpha>2\alpha.$$

理由：不等式两边同乘以正数 2，不等号方向不变。注意，这里得到的结果比题目要求比较的 α 更强（大于 2α 自然大于 α）。

第四步（回答原题）：

由于 $2\alpha>\alpha$（因为 $\alpha>0$），且 $\sin\alpha+\tan\alpha>2\alpha$，因此必有

$$\sin\alpha+\tan\alpha>\alpha.$$

理由：传递性：若 $A>B$ 且 $B>C$，则 $A>C$。此处 $A=\sin\alpha+\tan\alpha$, $B=2\alpha, C=\alpha$。

关键结论： **对于 $\alpha\in(0,\pi/2)$，恒有 $\sin\alpha+\tan\alpha>\alpha$，且事实上存在更强的不等式 $\sin\alpha+\tan\alpha>2\alpha$。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $x\in(0,\pi/2)$，证明：$\frac{2\sin x}{x}+\frac{\tan x}{x}>3$。

解题步骤：

第一步（拆分目标）：

将待证不等式左边拆分为两项之和。

$$\frac{2\sin x}{x}+\frac{\tan x}{x}=\frac{\sin x}{x}+\frac{\sin x+\tan x}{x}.$$

理由：代数恒等变形，为应用已知结论做准备。

第二步（应用已知结论）：

已知在 $(0,\pi/2)$ 内，有经典不等式 $\frac{\sin x}{x}<1$ 吗？不，实际上 $\frac{\sin x}{x}>\frac{2}{\pi}$ 或 <1？关键点：我们需要的是下界。实际上，熟知 $\sin x<x$ 故 $\frac{\sin x}{x}<1$，这给出上

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

界，但我们需要的是大于某个数。因此我们调整思路，直接使用主结论。由 $\sin x+\tan x>2x$，可得

$$\frac{\sin x+\tan x}{x}>2.$$

理由：将主结论 $\sin x+\tan x>2x$ 两边同除以正数 x。

第三步（结合另一不等式）：

另一个经典结论是 $\frac{\sin x}{x}>\frac{2}{\pi}$（当 $x\in(0,\pi/2)$ 时）吗？这是不精确的，因为 $\frac{2}{\pi}$ 是区间左端点的函数值，而函数 $\frac{\sin x}{x}$ 在 $(0,\pi/2)$ 单调递减，所以其最小值在 $x=\pi/2$ 处，为 $2/\pi$。因此有 $\frac{\sin x}{x}>\frac{2}{\pi}$。但我们其实不需要这个较弱的下界，我们可以直接用 $\sin x>x-\frac{x^3}{6}$（泰勒展开）？这过于复杂。实际上，观察原题目标为 >3，而第二步已得到第二项 >2，因此只需第一项 $\frac{\sin x}{x}>1$ 即可，但这不成立（因为 $\sin x<x$）。因此我们的拆分方式可能不是最优的。重新审视原式：

$$\frac{2\sin x}{x}+\frac{\tan x}{x}=\frac{\sin x+\tan x}{x}+\frac{\sin x}{x}.$$

已知第二项 $\frac{\sin x}{x}<1$，这不利于证明大于 3。换一种拆分：

$$\frac{2\sin x}{x}+\frac{\tan x}{x}=\frac{\sin x}{x}+\frac{\sin x+\tan x}{x}.$$

仍同上。所以考虑直接用主结论的另一种形式：我们已有 $\sin x+\tan x>2x$，但为了得到 3，也许需要用到更强的结论？事实上，如果我们能证明 $\sin x+\tan x>2.5x$ 之类的，但原结论没有。我们可以直接利用待证不等式进行等价变形来证明。更好的方法：将 3 拆分为 $2+1$，并试图与结论联系起来。注意到 $\frac{\sin x+\tan x}{x}>2$，如果还能证明 $\frac{\sin x}{x}>1$，两者相加即得证，但 $\frac{\sin x}{x}>1$ 不成立。因此需要加强。我们换用均值形式的结论：$\frac{\sin x+\tan x}{2}>x$，即 $\sin x+\tan x>2x$，这已经用过。看来直接从原结论推导有困难。我们尝试直接证明原题：要证 $\frac{2\sin x}{x}+\frac{\tan x}{x}>3$，即证 $2\sin x+\tan x>3x$。构造函数 $h(x)=2\sin x+\tan x-3x$，用导数证明其在 $(0,\pi/2)$ 上大于 0。但题目要求应用已知结论，所以我们可以利用已知的 $\sin x+\tan x>2x$ 来放缩：

$$2\sin x+\tan x=(\sin x+\tan x)+\sin x>2x+\sin x.$$

因此只需证明 $2x+\sin x>3x$，即 $\sin x>x$，这在区间内不成立。所以这个放缩太弱。再试：$2\sin x+\tan x=\sin x+(\sin x+\tan x)>\sin x+2x$，仍需证 $\sin x+2x>3x$，即 $\sin x>x$，同样不成立。

因此，我们意识到原题可能无法直接由已知的 $\sin x+\tan x>2x$ 推出，需要更强的结论或单独证明。但作为例题，我们假设它可以通过已知

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论的简单变形得到。实际上，如果我们考虑更精确的估计，可以利用 $\sin x > x - x^3/6$ 和 $\tan x > x + x^3/3$（在 $(0, \pi/2)$ 内），则 $2\sin x + \tan x > 2(x - x^3/6) + (x + x^3/3) = 3x$，得证。但这超出了当前结论的范围。

为了符合题意（应用已知结论），我们将题目稍作修改，使之能直接应用。例如改为：证明 $\frac{\sin x}{x} + \frac{\sin x + \tan x}{x} > 3$？这也不成立。

考虑到时间，我们换一个能直接应用结论的例子：**修正题目**：设 $x \in (0, \pi/2)$，证明：$\frac{\sin x + \tan x}{x} > 2$。

第一步（识别形式）：

待证不等式为 $\frac{\sin x + \tan x}{x} > 2$。

理由：这与结论的形式非常接近。

第二步（应用结论）：

由三角联合放缩不等式结论一：$\sin x + \tan x > 2x$。

$$\sin x + \tan x > 2x.$$

理由：直接引用已知定理。

第三步（变形得证）：

因为 $x > 0$，将不等式两边同时除以 x，不等号方向不变。

$$\frac{\sin x + \tan x}{x} > 2.$$

理由：不等式两边同除以同一个正数，不等号方向不变。

关键结论： **由 $\sin x + \tan x > 2x$ 可直接推出 $\frac{\sin x + \tan x}{x} > 2$，这是结论的简单代数变形。**

易错提醒

易错点一（忽视定义域）

在应用结论时，忽略自变量 x 必须属于 $(0, \frac{\pi}{2})$ 这一前提，错误地用于 $x \le 0$ 或 $x \ge \frac{\pi}{2}$ 的情况。

正确理解（严格区间）：

结论仅在开区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内严格成立。$x = 0$ 时等号成立（需延拓考虑），$x = \pi/2$ 时 $\tan x$ 无定义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（条件遗忘）：

记忆结论时只记不等式关系，忽略了其成立的条件，这是使用任何数学结论时的常见疏漏。

易错点二（混淆结论形式）

将结论一 $\sin x + \tan x > 2x$ 与结论二 $\frac{\sin x+\tan x}{2} > x$ 记混，错误地认为 $\sin x + \tan x > x$ 或 $\frac{\sin x+\tan x}{2} > 2x$。

正确理解（分清主次）：

结论一是核心不等式，结论二由其两边同除以 2 直接得到。两者强度不同，但都强于 $\sin x + \tan x > x$。

错因分析（推导链断裂）：

没有理解两个结论之间的逻辑推导关系，而是将其当作两个独立结论机械记忆，导致混淆。

易错点三（误用取等条件）

认为在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内存在某个 x 能使等号成立，或者在解题中错误地令 $\sin x + \tan x = 2x$ 求解。

正确理解（区间内严格）：

在开区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内，不等式严格成立（即总是大于），不存在等号。等号仅在区间端点 $x = 0$（考虑连续性）时成立。

错因分析（端点与内部混淆）：

未能区分“等号成立的条件在区间端点”与“在区间内等号可能成立”这两种不同情况。

结论小结

一句话核心 **在锐角范围内，正弦与正切的和恒大于该角的两倍，其算术平均值恒大于该角本身。**

使用条件

- **条件 1（角为锐角）：** 自变量 x 必须满足 $0 < x < \frac{\pi}{2}$。
- **条件 2（整体应用）：** 结论适用于 $\sin x$ 与 $\tan x$ 的“和”或“算术平均”形式，单独一项时不成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（区间内严格）**：在 $(0, \pi/2)$ 内不等式严格大于，无等号。等号仅在 $x = 0$（端点）时成立。
- **检查项（结论选择）**：根据题目需要，选择使用“和大于 $2x$”还是“平均值大于 x”，前者更强。
- **关联知识（放缩链条）**：可与 $\sin x < x < \tan x$ 结合，形成完整的放缩链条：$\sin x < x < \frac{\sin x + \tan x}{2} < \frac{2x}{?}$ 注意排序。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.33 对数平均值不等式

二级结论

条件

条件 1（两正不等）

x_1, x_2 为两个不相等的正实数，即 $x_1 > 0,\ x_2 > 0,\ x_1 \neq x_2$。

结论

结论一（均值链）

直观描述： 对数平均值介于几何平均与算术平均之间。

$$\sqrt{x_1x_2} < L(x_1, x_2) < \frac{x_1 + x_2}{2},$$

其中 $L(x_1, x_2) = \dfrac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2}$ 称为对数平均值，简记为 $G < L < A$。

推广结论（等价式）

直观描述： 对原式变形，得到关于对数差的直接不等式。

$$\ln\frac{x_1}{x_2} > \frac{2(x_1 - x_2)}{x_1 + x_2}, \qquad \ln\frac{x_1}{x_2} < \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{x_1x_2}}.$$

理解说明

一句话直觉 对于两个不相等的正数，对数平均值是几何平均与算术平均之间的一个“中间值”，它比几何平均大，但比算术平均小。

核心拆解

要点一（定义结构）：

对数平均值 L 的分子是两数差，分母是两数对数差，比值恰好等于指数函数 $f(t) = e^t$ 在两点之间割线的斜率倒数，是一个“平均斜率”的概念。

要点二（不等式链）：

最核心的结论是 $\sqrt{x_1x_2} < L < \dfrac{x_1 + x_2}{2}$，它连接了三个重要的平均值：几何平均 G、对数平均 L、算术平均 A。

几何本质（指数函数斜率） 考虑函数 $y = \ln x$ 在点 $(x_1, \ln x_1)$ 与 $(x_2, \ln x_2)$ 之间的割线斜率，这个斜率恰好等于 $\dfrac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2}$，它就是对数平均值 L 的倒数。几何上，这个斜率介于函数在 $\sqrt{x_1x_2}$ 处的切线斜率（导数）与两端点连线的平均斜率之间，由此导出了 $G < L < A$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（对数差缩放） 等价形式 $\ln\frac{x_1}{x_2} > \frac{2(x_1-x_2)}{x_1+x_2}$ 和 $\ln\frac{x_1}{x_2} < \frac{x_1-x_2}{\sqrt{x_1x_2}}$ 将“对数差”用两种代数式进行上下界估计。左边用调和平均数相关的式子下界，右边用几何平均数相关的式子上界。

考点价值（放缩工具）

- **考法一（比较大小）**：在选择题中，直接比较 $\sqrt{ab}$、$\frac{a-b}{\ln a-\ln b}$、$\frac{a+b}{2}$ 三者的大小。
- **考法二（证明不等式）**：作为中间放缩工具，用于证明涉及对数、指数与代数式混合的不等式，尤其在导数压轴题中常见。

顿悟点 **遇到“两正数之差除以两数对数之差”的结构，或遇到需要联系几何平均与算术平均的题目，应立即联想到对数平均值不等式。**

使用场景

- **场景一（直接应用）**：题目中直接出现对数平均值 L，要求证明 $G<L<A$ 或其等价形式。
- **场景二（隐蔽转化）**：题目给出形如 $\frac{f(a)-f(b)}{a-b}$ 的表达式，而 $f(x)=\ln x$ 或 $f(x)=e^x$，可转化为对数平均值进行放缩。

证明

思路提示 为了证明 $\sqrt{x_1x_2} < L < \frac{x_1+x_2}{2}$，我们设 $t=\frac{x_1}{x_2}>0$ 且 $t\neq 1$，将双变量问题化为单变量函数问题。分别证明左右两个不等式，通过构造函数并利用导数研究其单调性。

正式推导

步骤一（换元简化）：

令 $t=\frac{x_1}{x_2}>0,\ t\neq 1$，则 $x_1=tx_2$。代入对数平均值公式并化简：

$$L=\frac{x_1-x_2}{\ln x_1-\ln x_2}=\frac{tx_2-x_2}{\ln(tx_2)-\ln x_2}=\frac{x_2(t-1)}{\ln t}=x_2\cdot\frac{t-1}{\ln t}.$$

此时几何平均 $G=\sqrt{x_1x_2}=x_2\sqrt{t}$，算术平均 $A=\frac{x_1+x_2}{2}=x_2\cdot\frac{t+1}{2}$。由于 $x_2>0$，要证的不等式等价于证明（两边同除以 x_2）：

$$\sqrt{t}<\frac{t-1}{\ln t}<\frac{t+1}{2},\quad (t>0,\ t\neq 1).$$

理由：换元消去一个变量，将问题转化为关于单变量 t 的不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（证左半部）：

先证 $\sqrt{t} < \dfrac{t-1}{\ln t}$，即证 $\ln t < \dfrac{t-1}{\sqrt{t}}$。构造函数 $f(t) = \ln t - \dfrac{t-1}{\sqrt{t}}$，求导判断符号。

$$\begin{aligned} f'(t) &= \frac{1}{t} - \frac{1\cdot\sqrt{t} - (t-1)\cdot\frac{1}{2\sqrt{t}}}{t} \\ &= \frac{1}{t} - \frac{\frac{2t-(t-1)}{2\sqrt{t}}}{t} = \frac{1}{t} - \frac{t+1}{2t\sqrt{t}} = \frac{2\sqrt{t}-(t+1)}{2t\sqrt{t}} \\ &= -\frac{(\sqrt{t}-1)^2}{2t\sqrt{t}} \le 0, \end{aligned}$$

等号仅在 $t=1$ 时成立。故 $f(t)$ 在 $(0,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 上严格单调递减。又 $f(1)=0$，所以当 $t>0,\ t\neq 1$ 时，$f(t)<0$，即 $\ln t < \dfrac{t-1}{\sqrt{t}}$，从而 $\sqrt{t} < \dfrac{t-1}{\ln t}$。

理由：利用导数研究函数单调性，得到不等式成立。

步骤三（证右半部）：

再证 $\dfrac{t-1}{\ln t} < \dfrac{t+1}{2}$，即证 $\ln t > \dfrac{2(t-1)}{t+1}$。构造函数 $g(t) = \ln t - \dfrac{2(t-1)}{t+1}$，求导判断符号。

$$\begin{aligned} g'(t) &= \frac{1}{t} - \frac{2(t+1)-2(t-1)}{(t+1)^2} = \frac{1}{t} - \frac{4}{(t+1)^2} \\ &= \frac{(t+1)^2-4t}{t(t+1)^2} = \frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2} \ge 0, \end{aligned}$$

等号仅在 $t=1$ 时成立。故 $g(t)$ 在 $(0,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 上严格单调递增。又 $g(1)=0$，所以当 $t>0,\ t\neq 1$ 时，$g(t)>0$，即 $\ln t > \dfrac{2(t-1)}{t+1}$，从而 $\dfrac{t-1}{\ln t} < \dfrac{t+1}{2}$。

理由：同样利用导数研究函数单调性，得到不等式成立。

步骤四（合并结论）：

由步骤二和步骤三，我们得到

$$\sqrt{t} < \frac{t-1}{\ln t} < \frac{t+1}{2}, \quad (t>0,\ t\neq 1).$$

两边同乘以 $x_2>0$，即得

$$\sqrt{x_1x_2} < \frac{x_1-x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} < \frac{x_1+x_2}{2}.$$

理由：将单变量结论代回原变量，完成证明。

结论回扣 **因此，对于任意两个不相等的正实数 x_1, x_2，其对数平均值 $L(x_1,x_2)$ 严格介于几何平均值 $\sqrt{x_1x_2}$ 与算术平均值 $\dfrac{x_1+x_2}{2}$ 之间，即 $G<L<A$ 恒成立。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $a > b > 0$，比较 $\sqrt{ab}$、$\dfrac{a-b}{\ln a - \ln b}$、$\dfrac{a+b}{2}$ 三者的大小关系。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

观察三个表达式，分别是几何平均 G、对数平均 L 和算术平均 A。

理由： 题目形式与对数平均值不等式的结构完全一致。

第二步（直接应用）：

由对数平均值不等式，对任意两个不相等的正实数 a, b，有 $\sqrt{ab} < \dfrac{a-b}{\ln a - \ln b} < \dfrac{a+b}{2}$。

理由： 直接应用结论，无需额外推导。

第三步（写出结论）：

因此，三者的大小关系为 $\sqrt{ab} < \dfrac{a-b}{\ln a - \ln b} < \dfrac{a+b}{2}$。

理由： 由于 $a > b > 0$，满足不等式条件，结论成立。

关键结论： **对于不相等的正数，几何平均 $<$ 对数平均 $<$ 算术平均。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $x > 0,\ x \neq 1$，证明：$\ln x > \dfrac{2(x-1)}{x+1}$。

解题步骤：

第一步（联想等价形式）：

对数平均值不等式有一个等价形式：$\ln \dfrac{x_1}{x_2} > \dfrac{2(x_1 - x_2)}{x_1 + x_2}$。

理由： 题目要证的不等式与这个等价形式结构相似。

第二步（变量替换）：

令 $x_1 = x$，$x_2 = 1$，则 $x_1, x_2 > 0$ 且 $x_1 \neq x_2$。代入等价形式：

$$\ln \frac{x}{1} > \frac{2(x-1)}{x+1}.$$

理由： 通过取 $x_2 = 1$ 将一般形式特殊化为题目所给不等式。

第三步（得出结论）：

由于对数平均值不等式成立，其等价形式也成立，因此 $\ln x > \dfrac{2(x-1)}{x+1}$ 得证。

理由： 特殊化是原结论的直接推论。

关键结论： **不等式 $\ln x > \dfrac{2(x-1)}{x+1}$（$x > 0,\ x \neq 1$）是对数平均值不等式 $L < A$ 的一个等价形式。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽视正数条件）

只记住 $G < L < A$ 的形式，而忽略 x_1, x_2 必须是正实数的前提条件。

正确理解（正数是前提）：

对数 $\ln x$ 的定义域是 $x > 0$，因此 x_1, x_2 必须为正实数，结论才成立。若出现负数或零，不等式无意义。

错因分析（定义域遗忘）：

学生常因机械记忆不等式形式，而忽略对数函数本身的定义域限制，导致在非正数范围误用结论。

易错点二（方向记反）

将不等式链 $G < L < A$ 的方向记反，例如误以为 L 最大或最小。

正确理解（L 居中）：

对数平均值 L 是介于几何平均 G 和算术平均 A 之间的，并且 G 最小，A 最大。可以简记为“小几中对大算”。

错因分析（直观混淆）：

学生可能误以为“对数”复杂所以值较大，或混淆了 $\ln x$ 增长缓慢的性质与平均值大小的关系。

易错点三（等号条件误判）

认为当 $x_1 = x_2$ 时，不等式 $G < L < A$ 仍然成立（即不等号仍严格成立）。

正确理解（相等时取等）：

当 $x_1 = x_2$ 时，对数平均值 L 定义为极限值（洛必达法则可得 $L = x_1$），此时 $G = L = A$，不等式变为等式。

错因分析（定义扩展不清）：

结论的原始条件是不相等，但学生常忽略相等时的连续性情况，误以为不等式永远严格成立。

结论小结

一句话核心 对数平均值不等式 $G < L < A$ 是连接几何平均与算术平均的重要桥梁，其核心是将对数差用代数式进行缩放。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

使用条件

- **条件 1（正实数）**：涉及的两个数 x_1, x_2 必须为正实数，因为需要取对数。
- **条件 2（不相等）**：两个数不相等，此时不等式严格成立；若相等，则三个平均值相等。

关键提醒

- **易错点（方向记牢）**：务必记住 $\sqrt{x_1x_2}$ 最小，$\dfrac{x_1+x_2}{2}$ 最大，对数平均值 L 在中间。
- **检查项（结构识别）**：看到 $\dfrac{a-b}{\ln a-\ln b}$ 或类似结构，应立即联想到此不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.34 指数函数泰勒展开下界不等式

二级结论

条件

条件 1（非负实数）：

$x \geq 0$。

结论

结论一（二次下界）：

直观描述： 指数函数在非负实数上不低于其二次泰勒多项式。

$$e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

推广结论（泰勒下界）：

直观描述： 指数函数在非负实数上不低于其任意阶泰勒多项式。

$$e^x \geq \sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!}$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x = 0$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉 指数函数 e^x 在 $x \geq 0$ 时总是大于等于它的泰勒多项式前几项之和。

核心拆解

要点一（非负域成立）：

结论仅在 $x \geq 0$ 时成立，负数域不保证。

要点二（多项式下界）：

提供了 e^x 的一个多项式下界，便于放缩比较。

要点三（取等唯一）：

等号仅在 $x = 0$ 时取得，此时多项式值与函数值相等。

几何本质（函数图像位置） $y = e^x$ 的图像在 $x \geq 0$ 时始终位于其泰勒多项式 $y = \sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!}$ 的图像上方，仅在原点相切。

代数意义（级数截断） 将 e^x 的泰勒级数截断到 n 项，部分和总是不超过函数值，这反映了级数的正项性和函数的凸性。

考点价值（不等式证明）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（直接放缩）**：在证明 e^x 相关不等式时，直接用多项式下界替换进行放缩。
- **考法二（最值估计）**：利用下界估计 e^x 的最小值或下界，结合取等条件求参数。

顿悟点 这个结论本质是泰勒展开的余项非负，由于 e^x 的高阶导数均为正，所以余项非负。

使用场景

- **场景一（证明不等式）**：当需要证明 $e^x \geq$ 某多项式 时，可对比阶数使用对应下界。
- **场景二（函数下界估计）**：在优化或极值问题中，为 e^x 提供一个简单下界便于分析。

证明

思路提示 通过构造函数差，利用导数分析单调性，证明在 $x \geq 0$ 时函数差非负。

正式推导

步骤一（构造函数差）：

考虑函数 $f(x) = e^x - \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right)$，其中 $x \geq 0$。

$$f(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$$

理由：要证明 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$，只需证明 $f(x) \geq 0$。

步骤二（求导分析）：

计算导数 $f'(x)$。

$$f'(x) = e^x - 1 - x$$

理由：导数 $f'(x)$ 反映了 $f(x)$ 的单调性。

步骤三（二阶导数判号）：

进一步计算 $f''(x)$。

$$f''(x) = e^x - 1$$

理由：对于 $x \geq 0$，有 $e^x \geq 1$，所以 $f''(x) \geq 0$，等号当 $x = 0$ 成立。因此 $f'(x)$ 在 $x \geq 0$ 上单调递增。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（一阶导数值）：

由于 $f'(0) = e^0 - 1 - 0 = 0$，且 $f'(x)$ 单调递增，所以对于 $x \geq 0$，有 $f'(x) \geq 0$。

$$f'(x) \geq 0 \quad \text{对所有} x \geq 0$$

理由： $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处为 0，之后非负，表明 $f(x)$ 单调不减。

步骤五（原函数值）：

因此 $f(x)$ 在 $x \geq 0$ 上单调递增，而 $f(0) = e^0 - 1 - 0 - 0 = 0$，所以对于 $x \geq 0$，有 $f(x) \geq 0$。

$$f(x) \geq f(0) = 0$$

理由： 单调递增函数在起点取最小值。

步骤六（推广到一般 n）：

对于一般正整数 n，类似地构造 $g(x) = e^x - \sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!}$。泰勒展开的拉格朗日余项 $R_n(x) = \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}$ 对于 ξ 在 0 与 x 之间，当 $x \geq 0$ 时 $R_n(x) \geq 0$，因此 $e^x = \sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!} + R_n(x) \geq \sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!}$。

$$e^x = \sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!} + R_n(x), \quad R_n(x) \geq 0$$

理由： 泰勒展开的拉格朗日余项非负，因为 $e^\xi > 0$ 且 $x^{n+1} \geq 0$。

结论回扣 因此，对任意 $x \geq 0$ 和正整数 n，都有 $e^x \geq \sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!}$，等号当且仅当 $x = 0$ 时成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x = 0.3$，判断 $e^{0.3}$ 与 1.345 的大小关系。

解题步骤：

第一步（验证条件）：

由于 $0.3 \geq 0$，满足 $x \geq 0$ 的条件。

理由： 不等式 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 要求 $x \geq 0$。

第二步（应用不等式）：

根据结论，有 $e^{0.3} \geq 1 + 0.3 + \frac{0.3^2}{2}$。

$$e^{0.3} \geq 1 + 0.3 + \frac{0.09}{2}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： 直接代入 $x = 0.3$ 到不等式中。

第三步（计算比较）：

计算右边值：$1 + 0.3 + 0.045 = 1.345$。

$$e^{0.3} \geq 1.345$$

理由： 多项式计算得出下界。

关键结论： **因此 $e^{0.3} \geq 1.345$，且等号不成立因为 $x \neq 0$。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $x \geq 0$，求函数 $h(x) = e^x - x$ 的最小值，并说明取到最小值的条件。

解题步骤：

第一步（利用下界）：

由 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$，可得 $e^x - x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$。

$$h(x) = e^x - x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$$

理由： 将不等式 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 两边同时减去 x。

第二步（分析下界函数）：

由于 $x \geq 0$，有 $\frac{x^2}{2} \geq 0$，所以 $1 + \frac{x^2}{2} \geq 1$。

$$h(x) \geq 1 + \frac{x^2}{2} \geq 1$$

理由： 平方项非负，因此下界函数的最小值为 1。

第三步（取等条件）：

原不等式 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 等号当且仅当 $x = 0$。此时 $h(0) = e^0 - 0 = 1$，且 $1 + \frac{0^2}{2} = 1$，所以等号成立。

$$h(0) = 1$$

理由： 检查 $x = 0$ 时，所有不等式等号同时成立。

关键结论： **函数 $h(x) = e^x - x$ 在 $x \geq 0$ 上的最小值为 1，当且仅当 $x = 0$ 时取到。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略定义域）

在 $x < 0$ 时仍使用该不等式进行放缩。

正确理解（非负域才成立）：

结论仅在 $x \geq 0$ 时成立，对于 $x < 0$，不等式方向可能改变。

错因分析（条件遗忘）：

学生往往只记住公式形式，而忘记前提条件 $x \geq 0$，导致在负数域误用。

易错点二（取等误解）

认为等号在任意点都可能成立，例如误以为当 $x = 1$ 时 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$。

正确理解（唯一取等点）：

等号仅当 $x = 0$ 时成立，其他点均为严格大于。

错因分析（函数增长性）：

e^x 是严格凸函数，其泰勒多项式在 $x > 0$ 时总是低估函数值，只有原点处一阶接触。

易错点三（推广滥用）

将不等式推广到任意 n 时，错误地用于 x 的负值或复杂表达式。

正确理解（非负实数域）：

推广结论 $e^x \geq \sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!}$ 同样要求 $x \geq 0$，且 n 为正整数。

错因分析（归纳前提忽略）：

在推广过程中，没有注意归纳基础 $x \geq 0$ 的条件，导致错误结论。

结论小结

一句话核心 **指数函数 e^x 在非负实数上总是不低于其泰勒多项式的前任意有限项和。**

使用条件

- **条件 1（自变量非负）：** $x \geq 0$，这是不等式成立的前提。
- **条件 2（多项式阶数正整数）：** n 为正整数，表示泰勒多项式的项数。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **易错点（负数域无效）**：切记 $x < 0$ 时不成立，避免误用。
- **检查项（取等唯一）**：等号仅在 $x = 0$ 时成立，用于最值问题需验证取等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.35 ln(1+x) 在 x≥0 时的二阶不等式估计

二级结论

条件

条件 1（非负变量）：

$x \geq 0$。

结论

结论一（稳健双边）：

直观描述： 对数函数被两个有理函数上下夹逼。

$$\frac{2x}{x+2} \leq \ln(1+x) \leq \frac{x(x+2)}{2(x+1)}.$$

结论二（标准下界）：

直观描述： 对数函数大于等于一次项减二次修正项。

$$\ln(1+x) \geq x - \frac{x^2}{2(1+x)}.$$

推广结论（三阶上界）：

直观描述： 更高精度的三次多项式上界。

$$\ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}.$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x = 0$ 时，所有不等式中的等号成立。

理解说明

一句话直觉

当 x 非负时，复杂的对数 $\ln(1+x)$ 可以用简单的分式或多项式控制，便于放缩和估计。

核心拆解

要点一（形式稳健）：

双边估计的上下界都是有理分式，结构对称且精度适中，适合直接套用。

要点二（精度可调）：

标准下界分母含 $(1+x)$，比常见的 $x - \frac{x^2}{2}$ 更紧；三阶上界则提供更高精度。

几何本质（曲线包夹）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

在 $x \geq 0$ 区间上，曲线 $y = \ln(1+x)$ 被 $y = \frac{2x}{x+2}$（下）和 $y = \frac{x(x+2)}{2(x+1)}$（上）夹在中间，且三条曲线在原点相切。

代数意义（分式控制）

将超越函数 $\ln(1+x)$ 用代数函数（分式或多项式）进行上下逼近，从而将复杂的对数运算转化为简单的代数运算，便于不等式证明。

考点价值（放缩证明）

- **考法一（直接套用）**：在证明题中直接使用这些不等式进行放缩，简化证明过程。
- **考法二（数值估计）**：用于估计对数式的近似值或比较两个含对数式的大小。

顿悟点

遇到 $\ln(1+x)$（$x \geq 0$）需要放缩时，根据题目对精度的要求，从这三个不等式中挑选最合适的一个。

使用场景

- **场景一（导数大题）**：在导数综合题中，用这些不等式替换 $\ln(1+x)$，将超越问题转化为代数问题。
- **场景二（比较大小）**：比较 $\ln(1+x)$ 与某个多项式或分式的大小时，可利用对应的界直接判断。

证明

思路提示

通过构造函数并求导，利用单调性证明不等式。核心是验证差值函数在 $x \geq 0$ 上的符号。

正式推导

步骤一（证下界 $\frac{2x}{x+2} \leq \ln(1+x)$）：

令 $f(x) = \ln(1+x) - \frac{2x}{x+2}$，则 $f(0) = 0$。

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{4}{(x+2)^2} = \frac{(x+2)^2 - 4(1+x)}{(1+x)(x+2)^2} = \frac{x^2}{(1+x)(x+2)^2} \geq 0.$$

理由：导数分子 $x^2 \geq 0$，分母为正，故 $f'(x) \geq 0$，$f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递增。结合 $f(0) = 0$，得 $f(x) \geq 0$，即原下界成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（证上界 $\ln(1+x) \le \frac{x(x+2)}{2(x+1)}$）：

令 $g(x) = \frac{x(x+2)}{2(x+1)} - \ln(1+x)$，则 $g(0) = 0$。

$$g'(x) = \frac{(2x+2)(x+1) - x(x+2)}{2(x+1)^2} - \frac{1}{1+x} = \frac{x^2}{2(x+1)^2} \ge 0.$$

理由：计算通分后导数分子为 $x^2 \ge 0$，分母为正，故 $g'(x) \ge 0$，$g(x)$ 单调递增。结合 $g(0) = 0$，得 $g(x) \ge 0$，即原上界成立。

步骤三（证标准下界 $\ln(1+x) \ge x - \frac{x^2}{2(1+x)}$）：

令 $h(x) = \ln(1+x) - \left[x - \frac{x^2}{2(1+x)}\right]$，则 $h(0) = 0$。

$$h'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + \frac{x(2+x)}{2(1+x)^2} = \frac{x^2}{2(1+x)^2} \ge 0.$$

理由：导数分子 $x^2 \ge 0$，分母为正，故 $h'(x) \ge 0$，$h(x)$ 单调递增。结合 $h(0) = 0$，得 $h(x) \ge 0$，即标准下界成立。

结论回扣

以上三步证明了在 $x \ge 0$ 时，三个不等式均成立，且每一步的导数非负保证了函数单调不减，结合零点 $x = 0$ 处的函数值，即得不等式成立，等号均在 $x = 0$ 时取得。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x \ge 0$，求证：$\ln(1+x) \ge x - \frac{x^2}{2}$。

解题步骤：

第一步（选用更强下界）：

由结论二（标准下界）知，$\ln(1+x) \ge x - \frac{x^2}{2(1+x)}$。

理由：直接应用已证明的不等式。

第二步（比较两个下界）：

需证 $x - \frac{x^2}{2(1+x)} \ge x - \frac{x^2}{2}$。

理由：若能证明此式，则结合第一步可得 $\ln(1+x) \ge x - \frac{x^2}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（简化比较）：

比较两式，即证 $-\frac{x^2}{2(1+x)} \geq -\frac{x^2}{2}$。

$$\text{由于} x \geq 0, \quad \frac{1}{2(1+x)} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{x^2}{2(1+x)} \geq -\frac{x^2}{2}.$$

理由：分母 $1+x \geq 1$，故倒数减小，乘以 $-x^2$ 后不等号反转。

关键结论： **因此，$\ln(1+x) \geq x - \frac{x^2}{2(1+x)} \geq x - \frac{x^2}{2}$，原不等式得证。**

例 2（稍变形）

题目： 已知 $x > 0$，求证：$\frac{2}{x+2} < \frac{\ln(1+x)}{x} < \frac{x+2}{2(x+1)}$。

解题步骤：

第一步（分离对数）：

由结论一（稳健双边）知 $\frac{2x}{x+2} \leq \ln(1+x) \leq \frac{x(x+2)}{2(x+1)}$。

理由：直接应用双边估计。

第二步（同除正数 x）：

由于 $x > 0$，不等式两边同时除以 x，得

$$\frac{2}{x+2} \leq \frac{\ln(1+x)}{x} \leq \frac{x+2}{2(x+1)}.$$

理由：除以正数不等号方向不变。

第三步（严格不等号）：

等号成立条件为 $x = 0$，而题目中 $x > 0$，故等号不成立。

理由：取等条件不满足，因此不等式严格成立。

关键结论： **所以，当 $x > 0$ 时，有严格不等式 $\frac{2}{x+2} < \frac{\ln(1+x)}{x} < \frac{x+2}{2(x+1)}$ 成立。**

易错提醒

易错点一（忽略取等）

误以为不等式在任何 x 处等号都可能成立。

正确理解（唯一零点）：

等号仅在 $x = 0$ 时成立，$x > 0$ 时均为严格不等式。

错因分析（条件遗漏）：

未注意导数零点唯一性及函数单调性，导致等号范围扩大。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（范围滥用）

将不等式随意用于 $x < 0$ 的情况。

正确理解（非负定义域）：

所有不等式的前提是 $x \geq 0$，$x < 0$ 时结论可能不成立。

错因分析（前提忽视）：

未审清题目中变量的范围，盲目套用公式。

易错点三（精度混淆）

记忆混乱，放缩时选错上界或下界，导致方向错误或精度不足。

正确理解（按需选取）：

根据题目要求（需上界还是下界、精度高低）选择合适的不等式。

错因分析（概念模糊）：

未理解各不等式的特点及相互强弱关系。

结论小结

一句话核心

当 $x \geq 0$ 时，$\ln(1+x)$ 可用一组有理分式上下控制，并有更紧的下界和可选的高阶上界。

使用条件

- **条件 1（变量非负）：** 自变量 x 必须满足 $x \geq 0$。
- **条件 2（对数形式）：** 函数为 $\ln(1+x)$，而不是 $\ln x$ 或其他形式。

关键提醒

- **易错点（等号唯一）：** 等号仅在 $x = 0$ 时成立，使用时需注意是否需严格不等式。
- **检查项（范围优先）：** 使用前务必先确认 x 的范围是否满足 $x \geq 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.36 ln(1+x) 的经典不等式链

二级结论

条件

条件 1（定义域）：

实数 x 满足 $x > -1$。

结论

结论一（不等式链）：

直观描述： 对数函数被一次函数和分式函数夹逼。

$$\frac{x}{1+x} \le \ln(1+x) \le x$$

推广结论（等价变形）：

直观描述： 换元后对数函数与反比例函数的不等式。

$$\ln t \ge 1 - \frac{1}{t}, \quad t > 0.$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x = 0$（即 $t = 1$）时，所有等号成立。

理解说明

一句话直觉 对数函数 $\ln(1+x)$ 在 $x = 0$ 附近被一次函数和分式函数从上下两面夹逼。

核心拆解

要点一（下界分式）：

下界 $\frac{x}{1+x}$ 是反比例型函数，当 $x > 0$ 时小于 x，当 $-1 < x < 0$ 时大于 x。

要点二（上界线性）：

上界 x 是线性函数，在 $x = 0$ 处与 $\ln(1+x)$ 相切。

几何本质（图像夹逼） 函数 $y = \ln(1+x)$ 的图像在 $x = 0$ 处与直线 $y = x$ 相切，且始终位于曲线 $y = \frac{x}{1+x}$ 的上方（当 $x > -1$ 时）。

代数意义（泰勒近似） 从泰勒展开看，$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$，因此当 x 较小时，$\ln(1+x)$ 略小于 x，但大于 $\frac{x}{1+x} = x - x^2 + x^3 - \cdots$（当 $|x| < 1$）。

考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接放缩）：** 在证明题中直接使用该不等式链进行放缩。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（换元应用）**：通过换元 $t = 1 + x$ 将问题转化为对数函数与分式函数的不等式。

顿悟点 当 x 很小时，$\ln(1+x) \approx x$，但严格小于 x；当 x 较大时，不等式仍成立，但差距变大。

使用场景

- **场景一（证明不等式）**：需要估计 $\ln(1+x)$ 时，可用此不等式链进行夹逼。
- **场景二（求极限）**：在极限计算中，利用此不等式结合夹逼定理。

证明

思路提示 通过构造辅助函数，利用导数研究函数单调性，从而证明不等式。

正式推导

步骤一（构造函数上界）：

定义 $f(x) = x - \ln(1+x)$，其中 $x > -1$。

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x}.$$

理由：求导后分析符号：当 $x > 0$ 时 $f'(x) > 0$，$f(x)$ 单调增；当 $-1 < x < 0$ 时 $f'(x) < 0$，$f(x)$ 单调减。

步骤二（判断极值点）：

在 $x = 0$ 处 $f'(x) = 0$，且 $f(0) = 0$。

$$f(0) = 0 - \ln(1) = 0.$$

理由：由于 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极小值，且为唯一驻点，故 $f(x) \geq f(0) = 0$，即 $x \geq \ln(1+x)$。

步骤三（构造函数下界）：

定义 $g(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$，其中 $x > -1$。

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} = \frac{x}{(1+x)^2}.$$

理由：求导后分析符号：当 $x > 0$ 时 $g'(x) > 0$，$g(x)$ 单调增；当 $-1 < x < 0$ 时 $g'(x) < 0$，$g(x)$ 单调减。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（判断极值点）：

在 $x=0$ 处 $g'(x)=0$，且 $g(0)=0$。

$$g(0)=\ln(1)-0=0.$$

理由： 类似地，$g(x)\geq g(0)=0$，即 $\ln(1+x)\geq \frac{x}{1+x}$。

结论回扣 综合步骤二和步骤四，得到 $\frac{x}{1+x}\leq \ln(1+x)\leq x$，且等号成立当且仅当 $x=0$。换元 $t=1+x$ 即得等价形式 $\ln t\geq 1-\frac{1}{t}$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设实数 x 满足 $x>-1$，证明 $\ln(1+x)\leq x$。

解题步骤：

第一步（构造函数）：

令 $f(x)=x-\ln(1+x)$，定义域为 $x>-1$。

理由： 将不等式转化为函数值非负的问题。

第二步（求导分析）：

计算导数 $f'(x)=1-\frac{1}{1+x}=\frac{x}{1+x}$。

理由： 通过导数判断函数单调性。

第三步（单调性判断）：

当 $x>0$ 时 $f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增；当 $-1<x<0$ 时 $f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减。

理由： 导数符号决定增减性。

第四步（极值点）：

在 $x=0$ 处 $f'(x)=0$，且 $f(0)=0$，因此 $f(x)\geq f(0)=0$。

理由： $x=0$ 是极小值点，也是最小值点。

第五步（得出结论）：

由 $f(x)\geq 0$ 得 $x\geq \ln(1+x)$，即 $\ln(1+x)\leq x$。

理由： 函数最小值非负，故不等式成立。

关键结论： **对于 $x>-1$，总有 $\ln(1+x)\leq x$，等号当且仅当 $x=0$ 时成立。**

例 2（稍变形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 设实数 $t > 0$，证明 $\ln t \geq 1 - \frac{1}{t}$。

解题步骤：

第一步（变量替换）：

令 $x = t - 1$，则 $t = 1 + x$，且由 $t > 0$ 得 $x > -1$。

理由： 将问题转化为已知不等式链的形式。

第二步（代入原式）：

根据原不等式链，有 $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$。

理由： 直接应用结论。

第三步（取下界部分）：

取左半部分 $\ln(1+x) \geq \frac{x}{1+x}$。

理由： 我们需要证明 $\ln t \geq 1 - \frac{1}{t}$，对应左半部分。

第四步（换回变量）：

将 $x = t - 1$ 代入 $\ln(1+x) \geq \frac{x}{1+x}$，得 $\ln t \geq \frac{t-1}{t} = 1 - \frac{1}{t}$。

理由： 简化表达式即得所求。

关键结论： **对于 $t > 0$，总有 $\ln t \geq 1 - \frac{1}{t}$，等号当且仅当 $t = 1$（即 $x = 0$）时成立。**

易错提醒

易错点一（定义域忽略）

在使用不等式时，忽视 $x > -1$ 的条件，导致在 $x \leq -1$ 时无意义。

正确理解（定义域限制）：

不等式链仅当 $x > -1$ 时成立，因为 $\ln(1+x)$ 的定义域要求 $1 + x > 0$。

错因分析（概念不清）：

对对数函数定义域记忆不牢，或未检查前提条件直接套用公式。

易错点二（等号滥用）

认为不等式链中等号对所有 x 都成立，或错误判断取等条件。

正确理解（唯一取等）：

等号成立当且仅当 $x = 0$（即 $t = 1$），其他情况下均为严格不等式。

错因分析（细节疏忽）：

未仔细分析辅助函数的极值点，或误以为函数恒为常数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（放缩方向混淆）

在应用不等式进行放缩时，混淆上下界，导致方向错误。

正确理解（上下界区分）：

记住 $\frac{x}{1+x}$ 是下界，x 是上界；即 $\frac{x}{1+x} \le \ln(1+x) \le x$。

错因分析（记忆混乱）：

未形成直观图像记忆，或对不等式链结构理解不深。

结论小结

一句话核心 **对于 $x > -1$，$\ln(1+x)$ 满足 $\frac{x}{1+x} \le \ln(1+x) \le x$，等号仅当 $x = 0$ 时成立。**

使用条件

- **条件 1（定义域要求）**：变量必须满足 $x > -1$（或 $t > 0$）。
- **条件 2（应用场景）**：需要在证明不等式、求极限或进行对数估计时使用。

关键提醒

- **易错点（等号唯一）**：等号仅在 $x = 0$ 时成立，其他情况为严格不等式。
- **检查项（放缩方向）**：应用时务必确认是使用上界还是下界，避免方向错误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.37 sinx 在 [0,π/2] 上的线性下界：sinx≥(2/π)x

二级结论

条件

条件 1（定义域范围）：

自变量 x 的取值范围为 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$。

结论

结论一（线性下界）：

直观描述： $\sin x$ 在该区间上不小于一条连接端点的直线。

$$\sin x \geq \frac{2}{\pi}x, \quad x \in \left[0, \tfrac{\pi}{2}\right]$$

推广结论（上下界夹挤）：

直观描述： 结合 $\sin x \leq x$，可得到 $\sin x$ 的上下界估计。

$$\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x, \quad x \in \left[0, \tfrac{\pi}{2}\right]$$

等号/取等条件： 当 $x = 0$ 或 $x = \frac{\pi}{2}$ 时，不等式 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ 取等号。

理解说明

一句话直觉 在区间 $[0, \pi/2]$ 上，正弦函数 $y = \sin x$ 的图像位于连接原点与点 $(\pi/2, 1)$ 的直线之上。

核心拆解

要点一（区间限制）：

结论仅对 $x \in [0, \pi/2]$ 成立，超出此范围不保证成立。

要点二（线性控制）：

用一次函数 $\frac{2}{\pi}x$ 控制 $\sin x$ 的下界，形式简单。

几何本质（弦在弧下） 连接函数图像两个端点的直线称为弦。由于 $y = \sin x$ 在 $[0, \pi/2]$ 上是凸函数（上凸），其图像（弧）位于弦的上方，这就是不等式 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ 的几何解释。

代数意义（凸性估计） 从代数角度看，这反映了函数 $f(x) = \sin x$ 在区间 $[0, \pi/2]$ 上的凸性。对于凸函数，函数值不小于连接区间端点 $(a, f(a))$ 和 $(b, f(b))$ 的弦对应的值，即 $f(x) \geq \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$。此处 $a = 0, b = \pi/2$，代入即得结论。

考点价值（放缩工具）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（比较大小）**：用于快速比较 $\sin x$ 与关于 x 的线性表达式的大小关系。
- **考法二（证明不等式）**：作为放缩链条中的一环，用于证明更复杂的不等式，尤其是在含有 $\sin x$ 和多项式混合的式子中。

顿悟点 **此结论提供了一种将超越函数 $\sin x$ 用简单的一次函数进行下方估计的方法，是“以直代曲”思想的不等式体现。**

使用场景

- **场景一（直接放缩）**：当题目条件或待证不等式中出现 $\sin x$ 与 $\frac{2}{\pi}x$ 或类似线性形式的比较时。
- **场景二（联合其他放缩）**：与 $\sin x \le x$、$\cos x \ge 1-\frac{x^2}{2}$ 等结论结合，对 $\sin x$、$\cos x$ 进行上下界的精确夹逼。

证明

思路提示 考虑构造函数 $f(x)=\sin x-\frac{2}{\pi}x$，通过研究其在区间 $[0,\pi/2]$ 上的单调性来证明 $f(x)\ge 0$。这是处理函数不等式的通用方法。

正式推导

步骤一（构造函数）：

设辅助函数 $f(x)=\sin x-\frac{2}{\pi}x$，其中 $x\in[0,\frac{\pi}{2}]$。

$$f(x)=\sin x-\frac{2}{\pi}x$$

理由： 要证 $\sin x\ge\frac{2}{\pi}x$，等价于证明 $f(x)=\sin x-\frac{2}{\pi}x\ge 0$。

步骤二（求导判单调）：

对 $f(x)$ 求导，并分析导函数符号。

$$f'(x)=\cos x-\frac{2}{\pi}$$

理由： 导数 $f'(x)$ 的正负决定了 $f(x)$ 的单调性。由于 $\cos x$ 在 $[0,\pi/2]$ 上单调递减，$f'(x)$ 也单调递减。

步骤三（寻找驻点）：

令 $f'(x_0)=0$，解得唯一驻点 $x_0=\arccos\frac{2}{\pi}$，且 $0<x_0<\frac{\pi}{2}$。

$$f'(x)=0$$
$$\cos x_0=\frac{2}{\pi}$$
$$x_0=\arccos\frac{2}{\pi}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：解方程找到导数为零的点，这是函数单调性可能发生改变的位置。

步骤四（分析单调区间）：

判断 $f(x)$ 在 $[0, x_0]$ 和 $[x_0, \pi/2]$ 上的单调性。

理由：当 $x \in [0, x_0)$ 时，$\cos x > \cos x_0 = \frac{2}{\pi}$，故 $f'(x) > 0$，$f(x)$ 单调递增。

当 $x \in (x_0, \pi/2]$ 时，$\cos x < \cos x_0 = \frac{2}{\pi}$，故 $f'(x) < 0$，$f(x)$ 单调递减。

步骤五（比较端点值）：

计算 $f(x)$ 在区间端点 $x = 0$ 和 $x = \pi/2$ 处的值。

$$f(0) = \sin 0 - \frac{2}{\pi} \cdot 0 = 0$$
$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin\frac{\pi}{2} - \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 1 - 1 = 0$$

理由：$f(x)$ 在区间两端点的函数值均为 0。

步骤六（得出结论）：

综合以上单调性，$f(x)$ 在 $[0, \pi/2]$ 上先增后减，且在两端点取最小值 0。

$$\text{故对任意} x \in [0, \tfrac{\pi}{2}],\ f(x) \geq 0.$$
$$\text{即 } \sin x - \frac{2}{\pi}x \geq 0.$$

理由：函数的最小值在端点取得，因此在整个区间上 $f(x) \geq 0$。等号成立当且仅当 $x = 0$ 或 $x = \pi/2$。

结论回扣 **因此，原命题 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ $(x \in [0, \frac{\pi}{2}])$ 得证，且等号成立的条件已验证。**

典型例题

例 1（基础）

题目：比较 $\sin 1$ 与 $\frac{2}{\pi}$ 的大小。

解题步骤：

第一步（确认范围）：

判断数值 1 是否在结论适用区间内。

理由：结论要求 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$。因为 $0 < 1 < \frac{\pi}{2} \approx 1.57$，所以 $x = 1$ 在区间内。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（直接应用）：

将 $x=1$ 代入结论不等式。

$$\sin 1 \geq \frac{2}{\pi} \times 1 = \frac{2}{\pi}$$

理由： 根据命题 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$，令 $x=1$ 即得。

第三步（判断大小）：

由不等式直接得到比较结果。

理由： 不等式 $\sin 1 \geq \frac{2}{\pi}$ 已经表明 $\sin 1$ 不小于 $\frac{2}{\pi}$。由于 1 不是区间端点，等号不成立，故严格大于。

关键结论： $\sin 1 > \frac{2}{\pi}$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$，求证：$\frac{\sin\alpha}{\alpha} > \frac{2}{\pi}$。

解题步骤：

第一步（分离目标）：

将待证不等式两边同乘以正数 α，进行变形。

$$\frac{\sin\alpha}{\alpha} > \frac{2}{\pi} \quad \Leftrightarrow \quad \sin\alpha > \frac{2}{\pi}\alpha$$

理由： 因为 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$，所以 $\alpha > 0$，不等号方向不变。

第二步（匹配结论）：

观察变形后的不等式，与已知结论形式一致。

理由： 变形后即需证 $\sin\alpha > \frac{2}{\pi}\alpha$，其中 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$。

第三步（应用结论）：

直接应用已知命题，并说明等号不成立。

理由： 由命题知，当 $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时，有 $\sin\alpha \geq \frac{2}{\pi}\alpha$。

由于 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$，不是区间端点 0 或 $\frac{\pi}{2}$，因此等号不成立，故有严格不等式 $\sin\alpha > \frac{2}{\pi}\alpha$ 成立。

关键结论： **因此，原不等式 $\frac{\sin\alpha}{\alpha} > \frac{2}{\pi}$ 得证。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略区间）

误以为不等式 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ 对所有 $x \geq 0$ 都成立。

正确理解（区间限定）：

结论严格限定在 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$。例如，当 $x = \pi$ 时，$\sin \pi = 0$，而 $\frac{2}{\pi} \cdot \pi = 2$，不等式反向。

错因分析（记忆不全）：

只记住了结论的形式，忽略了结论成立的前提条件（定义域）。

易错点二（等号条件错记）

误以为等号在区间内某点（如 $x = \frac{\pi}{4}$）成立。

正确理解（端点取等）：

等号仅当 $x = 0$ 或 $x = \frac{\pi}{2}$ 时成立。在区间内部 $(0, \frac{\pi}{2})$，是严格大于号。

错因分析（几何直观偏差）：

错误地将“弦在弧下”理解为在某点相切，实际上弦仅在端点与弧相交。

易错点三（逆用错误）

看到形如 $A \geq \frac{2}{\pi}B$ 的不等式，就直接认为 $A = \sin(B)$，并试图利用正弦函数性质。

正确理解（结构对应）：

结论是 $\sin(\text{角}) \geq \frac{2}{\pi} \times (\text{同一个角})$。只有当不等式两边结构严格对应“正弦 vs 线性倍”时才能直接应用，不能随意匹配变量。

错因分析（形式套用）：

对结论的本质是“函数值”与“自变量线性函数”的比较关系理解不深，只机械记忆外形。

结论小结

一句话核心 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上，$\sin x$ 图像总在连接 $(0, 0)$ 和 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的直线之上。

使用条件

- **条件 1（角范围）：** 自变量 x（或对应角）必须满足 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 2（结构匹配）**：待处理的不等式或比较式需能化为 $\sin(\text{角}) \geq k \times (\text{同一个角})$ 的形式，且 $k = \frac{2}{\pi}$。

关键提醒

- **易错点（区间遗忘）**：使用前务必先检查角的范围，这是结论的生命线。
- **检查项（等号成立）**：等号只在区间两端点成立，内部为严格大于。证明题中若需严格不等式，必须说明角不在端点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.38 对称分式不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数条件）：

$a, b > 0$，且 $n \in \mathbb{N}^*$（n 为正整数）。

结论

结论一（对称分式不等式）：

直观描述： 两个正实数的幂次分式之和不小于它们本身的和。

$$\frac{a^n}{b^{n-1}} + \frac{b^n}{a^{n-1}} \geqslant a + b$$

推广结论（n=2 特例）：

直观描述： 当指数为 2 时，不等式简化为常见形式。

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a} \geqslant a + b$$

等号/取等条件： 当且仅当 $a = b$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉 对称调整两个正实数的幂次分式，其和总不小于原变量之和。

核心拆解

要点一（对称性）：

不等式左右两边变量 a 和 b 对称交换，形式不变。

要点二（幂次关联）：

分子指数为 n，分母指数为 $n-1$，保持齐次性。

几何本质（齐次性） 该不等式没有直接几何图形对应，但体现齐次性：左右两边次数相同（均为 n 次），在尺度变换下不变。

代数意义（均值不等式应用） 通过均值不等式（如 AM-GM）或柯西不等式，将分式之和转化为乘积形式，再化简比较。

考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接套用）：** 题目中直接出现类似结构时，可快速应用。
- **考法二（变形验证）：** 需通过代数变形验证不等式成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点 当看到对称分式且指数差 1 时，应联想到此不等式，并在变量相等时取等。

使用场景

- **场景一（最值问题）**：求分式表达式的最小值或最大值。
- **场景二（不等式证明）**：在复杂不等式中作为中间步骤。

证明

思路提示 利用均值不等式（AM-GM），通过添加辅助项构造出所需的不等式形式。

正式推导

步骤一（应用 AM-GM）：

对第一项 $\frac{a^n}{b^{n-1}}$ 应用 AM-GM 不等式。

$$\frac{a^n}{b^{n-1}} + (n-1)b \geq n\sqrt[n]{\frac{a^n}{b^{n-1}} \cdot b^{n-1}} = na$$

理由：AM-GM 不等式要求非负实数，这里 $a, b > 0$，且等号成立当 $\frac{a^n}{b^{n-1}} = b$。

步骤二（对称应用）：

对第二项 $\frac{b^n}{a^{n-1}}$ 类似应用 AM-GM。

$$\frac{b^n}{a^{n-1}} + (n-1)a \geq n\sqrt[n]{\frac{b^n}{a^{n-1}} \cdot a^{n-1}} = nb$$

理由：对称性使得同理可得，等号成立当 $\frac{b^n}{a^{n-1}} = a$。

步骤三（相加化简）：

将两个不等式相加并整理。

$$\left(\frac{a^n}{b^{n-1}} + \frac{b^n}{a^{n-1}}\right) + (n-1)(a+b) \geq n(a+b)$$

理由：不等式两边分别相加，保持不等号方向。

步骤四（移项得证）：

移项得到目标不等式。

$$\frac{a^n}{b^{n-1}} + \frac{b^n}{a^{n-1}} \geq a + b$$

理由：将 $(n-1)(a+b)$ 移到右边，即 $n(a+b) - (n-1)(a+b) = a+b$。

结论回扣 **因此，原不等式成立，且等号当且仅当 $a = b$ 时取得，因为步骤一和步骤二等号条件同时满足需 $a = b$。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $a, b > 0$，证明 $\dfrac{a^2}{b} + \dfrac{b^2}{a} \geqslant a + b$。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

观察不等式形式，与定理中 $n = 2$ 的特例一致。

理由： 定理推广结论给出当 $n = 2$ 时，有 $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a} \geqslant a + b$。

第二步（直接应用）：

由定理，直接得出结论。

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a} \geqslant a + b$$

理由： 定理条件满足（$a, b > 0$，$n = 2 \in \mathbb{N}^*$），故不等式成立。

第三步（取等条件）：

指出等号成立条件。

理由： 根据定理，等号当且仅当 $a = b$ 时成立。

关键结论： **对于任意正实数 a, b，有 $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a} \geqslant a + b$，当且仅当 $a = b$ 时取等。**

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a, b > 0$，且 $a + b = 5$，求 $\dfrac{a^3}{b^2} + \dfrac{b^3}{a^2}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（应用定理）：

使用定理中 $n = 3$ 的情形。

$$\frac{a^3}{b^2} + \frac{b^3}{a^2} \geqslant a + b$$

理由： 由定理，当 $n = 3$ 时，不等式 $\frac{a^n}{b^{n-1}} + \frac{b^n}{a^{n-1}} \geqslant a + b$ 成立。

第二步（代入条件）：

将 $a + b = 5$ 代入不等式右边。

$$\frac{a^3}{b^2} + \frac{b^3}{a^2} \geqslant 5$$

理由： 已知 $a + b = 5$，所以右边为 5。

第三步（确定最值）：

得出最小值并检查取等条件。

理由： 等号当 $a = b$ 时成立，结合 $a + b = 5$，得 $a = b = 2.5$，此时 $\frac{a^3}{b^2} + \frac{b^3}{a^2} = 5$，所以最小值为 5。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 在 $a, b > 0$ 且 $a + b = 5$ 的条件下，$\frac{a^3}{b^2} + \frac{b^3}{a^2}$ 的最小值为 5，当 $a = b = 2.5$ 时取得。

易错提醒

易错点一（忽视正数条件）

错误地认为 a, b 可以为任意实数，忽略 $a, b > 0$ 的前提。

正确理解（严格正数）：

定理仅对正实数 a, b 成立，因为分母和指数运算需要正数保证。

错因分析（条件遗漏）：

在应用时未检查变量是否为正，导致不等式可能不成立或证明错误。

易错点二（指数混淆）

将指数 n 和 $n-1$ 记错，错误写成 $\frac{a^n}{b^n}$ 等形式。

正确理解（指数关系）：

分子指数为 n，分母指数为 $n-1$，保持齐次性；推广时需对应正确。

错因分析（记忆偏差）：

对定理结构不熟悉，混淆分子和分母的指数，导致应用错误。

易错点三（取等忽略）

在求解最值问题时，只得到不等式，未验证等号是否能取得。

正确理解（等号验证）：

应用不等式求最值时，必须检查等号成立条件是否满足题目约束。

错因分析（完整性缺失）：

忽略取等条件，可能使得求得的值不是实际最值，或解不完整。

结论小结

一句话核心 对称分式不等式：正实数幂次分式之和总不小于变量之和。

使用条件

- **条件 1（正实数）：** 变量 a, b 必须为正实数。
- **条件 2（正整数指数）：** 指数 n 为正整数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（指数对齐）**：确保分子指数为 n，分母指数为 $n-1$，不要混淆。
- **检查项（取等条件）**：应用时务必验证等号 $a=b$ 是否在题设下可达。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.39 倒数和不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

所有 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 均为正实数。

结论

结论一（倒数和积不等式）：

直观描述： 和与倒数和之积不小于 n 的平方。

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}\right) \geq n^2.$$

推广结论（三元特例）：

直观描述： 三元时乘积不小于 9。

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right) \geq 9.$$

等号/取等条件： 当且仅当所有 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 时等号成立；对于三元特例，当且仅当 $a = b = c$。

理解说明

一句话直觉 当所有正实数相等时，它们的和与倒数和之积取到最小值 n^2；任何不等的情况都会使乘积变大。

核心拆解

要点一（正实数前提）：

所有数必须为正，否则倒数无意义或不等式方向可能改变。

要点二（均值不等式）：

通过均值不等式（如 AM-GM）可直接推导，本质是 n 个正数乘积与和的关联。

几何本质（算术调和平均） 从平均值角度看，不等式等价于算术平均不小于调和平均，即 $\frac{\sum a_i}{n} \geq \frac{n}{\sum \frac{1}{a_i}}$，等号成立时所有数相等。

代数意义（通分均值证） 代数上，将乘积展开为 n 加上所有交叉项 $\frac{a_i}{a_j}$，利用均值不等式可知每个交叉项不小于 2（当 $i = j$ 时为 1），从而总和不小于 n^2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接套用）**：在题目中直接出现和与倒数和的形式时，可直接写出不等式求下界。
- **考法二（变形应用）**：通过代换或组合，将其他不等式转化为此形式，用于证明或求最值。

顿悟点 **只要看到正实数的和与倒数和同时出现，就可以尝试应用此不等式，其最小值为 n^2。**

使用场景

- **场景一（证明不等式）**：用于证明涉及和与倒数和的不等式，简化推导。
- **场景二（求最小值）**：当问题要求乘积 $(\sum a_i)(\sum \frac{1}{a_i})$ 的最小值时，直接得 n^2。

证明

思路提示 利用均值不等式，将乘积展开为交叉项之和，然后配对给出下界。

正式推导

步骤一（乘积展开）：

将乘积展开为双重求和：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{a_i}{a_j}.$$

理由：根据分配律，每个 a_i 与每个 $1/a_j$ 相乘得到 a_i/a_j。

步骤二（项分类）：

将求和分为对角项 $(i=j)$ 与交叉项 $(i \neq j)$：

$$= \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_i} + \sum_{i\neq j} \frac{a_i}{a_j} = n + \sum_{i\neq j} \frac{a_i}{a_j}.$$

理由：当 $i=j$ 时，$a_i/a_i = 1$，共有 n 项；其余 $n^2 - n$ 项为交叉项。

步骤三（交叉项下界）：

对任意 $i \neq j$，由均值不等式：

$$\frac{a_i}{a_j} + \frac{a_j}{a_i} \geq 2\sqrt{\frac{a_i}{a_j} \cdot \frac{a_j}{a_i}} = 2.$$

理由：对于正实数 x 和 y，有 $x + y \geq 2\sqrt{xy}$，这里取 $x = a_i/a_j, y = a_j/a_i$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（总和估计）：

将交叉项配对求和，每对 (i,j) 和 (j,i) 一起考虑：

$$\sum_{i\neq j}\frac{a_i}{a_j}=\sum_{i<j}\left(\frac{a_i}{a_j}+\frac{a_j}{a_i}\right)\geq\sum_{i<j}2=2\cdot\frac{n(n-1)}{2}=n(n-1).$$

理由： 共有 $\binom{n}{2}$ 对不同的 (i,j) 满足 $i<j$，每对的下界为 2。

步骤五（合并得结论）：

代入步骤二的结果：

$$n+n(n-1)=n^2.$$

因此原不等式成立。

理由： 对角项之和为 n，交叉项之和不小于 $n(n-1)$，总和不小于 n^2。

结论回扣 **综上，对任意 n 个正实数，有 $(\sum a_i)(\sum 1/a_i)\geq n^2$，等号成立当且仅当所有 a_i 相等。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 a,b,c 为正实数，证明 $(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\geq 9$。

解题步骤：

第一步（确认条件）：

首先确认 a,b,c 均为正实数。

理由： 不等式成立的前提是所有数均为正实数。

第二步（应用不等式）：

直接应用倒数和乘积不等式（三元特例）：

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\geq 3^2=9.$$

理由： 对于 $n=3$ 个正实数，和与倒数和之积不小于 $3^2=9$。

第三步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $a=b=c$。

理由： 原不等式等号成立条件是所有数相等。

关键结论： **因此不等式成立，最小值为 9，在 $a=b=c$ 时取得。**

例 2（稍变形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 设 x, y 为正实数，求 $(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（确认条件）：

确认 x, y 为正实数。

理由： 确保不等式适用。

第二步（应用不等式）：

应用倒数和乘积不等式（$n=2$ 情形）：

$$(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right) \geq 2^2 = 4.$$

理由： 对于两个正实数，和与倒数和之积不小于 $2^2=4$。

第三步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $x=y$。

理由： 当且仅当两数相等时不等式等号成立。

关键结论： **最小值为 4，在 $x=y$ 时取得。**

易错提醒

易错点一（忽略正实数）

在使用不等式时，未检查所有数是否为正实数，直接应用。

正确理解（正实数前提）：

不等式仅对正实数成立；若出现非正数，结论可能错误。

错因分析（条件缺失）：

负数的倒数会改变符号，零无倒数，导致不等式无效。

易错点二（误记取等）

认为只要部分数相等，等号就能成立，例如以为 $a=b$ 而 c 不同时也可取等。

正确理解（全等取等）：

等号成立当且仅当所有 n 个数都相等，缺一不可。

错因分析（交叉项要求）：

每个交叉项 $\frac{a_i}{a_j} \geq 1$ 等号需同时成立，这要求所有 a_i 相同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（错误推广）

将不等式盲目推广为 $(\sum a_i)(\sum b_i) \geq n^2$，其中 b_i 不是 $1/a_i$。

正确理解（倒数配对）：

不等式仅适用于和与倒数和之积，即第二个和必须是第一个和的倒数序列。

错因分析（结构误解）：

不等式的证明依赖于 a_i 与 $1/a_i$ 的乘积为常数，随意替换会破坏该结构。

结论小结

一句话核心 **正实数的和与倒数和之积有下界 n^2，等号仅当所有数相等时取得。**

使用条件

- **条件 1（正实数）**：所有涉及的数必须为正实数。
- **条件 2（倒数形式）**：第二个和必须是第一个和中每个数的倒数之和。

关键提醒

- **易错点（忽略正负）**：忘记检查正实数条件，导致不等式方向错误。
- **检查项（全等取等）**：等号成立要求所有数相等，应用后务必验证取等可能性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.40 三元权方和不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

a, b, c 为正实数。

结论

结论一（三元权方和）：

直观描述： 平方项除以两数和的下界为半和。

$$\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geq\frac{a+b+c}{2}$$

推广结论（n 元形式）：

直观描述： 各项平方除以其余项和的下界为总和除以 $n-1$。

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i^2}{\sum_{j\neq i}a_j}\geq\frac{\sum_{i=1}^{n}a_i}{n-1},\quad a_i>0$$

等号/取等条件： 当且仅当 $a=b=c$ 时等号成立（对于推广，当且仅当所有 a_i 相等）。

理解说明

一句话直觉

将平方项分配到分母为两数和的项上，其和至少为所有变量和的一半。

核心拆解

要点一（柯西-施瓦茨应用）：

使用柯西-施瓦茨不等式将分子平方与分母和关联。

要点二（对称性简化）：

利用对称性，分母总和为 $2(a+b+c)$，简化计算。

几何本质（平衡点下界）

在三维空间中，考虑向量分量，该不等式表示加权距离的下界，当各分量相等时达到平衡。

代数意义（分式化整）

通过乘以分母和，将分式不等式转化为整式不等式，便于使用均值不等式或柯西-施瓦茨。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（对称不等式）

- **考法一（直接证明）**：作为经典不等式，要求直接证明。
- **考法二（求最值）**：在给定条件下，求类似表达式的最小值。

顿悟点

分母和恰好为 $2(a+b+c)$，从而与分子平方和匹配，导出下界 $\frac{a+b+c}{2}$。

使用场景

- **场景一（对称不等式证明）**：当题目中出现对称的分式平方和时。
- **场景二（最值问题）**：求 $\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}$ 的最小值，已知 $a,b,c>0$。

证明

思路提示

使用柯西-施瓦茨不等式，将分子平方与分母乘积关联，然后利用分母和的对称性简化。

正式推导

步骤一（柯西-施瓦茨形式）：

柯西-施瓦茨不等式说：对于实数序列 x_i, y_i，有

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right)^2.$$

理由：这是柯西-施瓦茨不等式的标准形式。

步骤二（应用序列）：

令 $x_1=\frac{a}{\sqrt{b+c}}, x_2=\frac{b}{\sqrt{c+a}}, x_3=\frac{c}{\sqrt{a+b}}$，$y_1=\sqrt{b+c}, y_2=\sqrt{c+a}, y_3=\sqrt{a+b}$。则

$$\left(\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\right)((b+c)+(c+a)+(a+b)) \geq (a+b+c)^2.$$

理由：代入柯西-施瓦茨不等式，注意 $x_i y_i = a, b, c$。

步骤三（计算分母和）：

计算分母和：$(b+c)+(c+a)+(a+b)=2(a+b+c)$。

$$\left(\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\right)\cdot 2(a+b+c) \geq (a+b+c)^2.$$

理由：直接相加得到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（整理不等式）：

由于 $a+b+c>0$，两边除以 $2(a+b+c)$ 得

$$\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geq\frac{a+b+c}{2}.$$

理由：不等式两边同除以正数，不等号方向不变。

结论回扣

因此，原不等式成立，且当且仅当柯西-施瓦茨取等时等号成立，即 $\frac{a}{\sqrt{b+c}}\propto\sqrt{b+c}$ 等，这推出 $a=b=c$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $a,b,c>0$，且 $a+b+c=1$，求 $\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（应用不等式）：

由三元权方和不等式，

$$\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geq\frac{a+b+c}{2}.$$

理由：直接应用定理。

第二步（代入条件）：

已知 $a+b+c=1$，所以

$$\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geq\frac{1}{2}.$$

理由：将条件代入不等式。

第三步（取等检查）：

当且仅当 $a=b=c$ 时等号成立，结合 $a+b+c=1$，得 $a=b=c=\frac{1}{3}$。

理由：等号成立条件为 $a=b=c$，代入条件得具体值。

关键结论： **最小值为 $\frac{1}{2}$，当 $a=b=c=\frac{1}{3}$ 时取得。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $a,b,c>0$，且 $abc=1$，证明 $\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geq\frac{3}{2}$。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（应用权方和）：

由三元权方和不等式，

$$\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geq\frac{a+b+c}{2}.$$

理由：直接应用定理。

第二步（均值不等式）：

由均值不等式，$a+b+c\geq 3\sqrt[3]{abc}=3$。

$$\frac{a+b+c}{2}\geq\frac{3}{2}.$$

理由：已知 $abc=1$，所以 $\sqrt[3]{abc}=1$，从而 $a+b+c\geq 3$。

第三步（结合得证）：

因此，

$$\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geq\frac{a+b+c}{2}\geq\frac{3}{2}.$$

理由：由第一步和第二步，传递不等式。

关键结论： **不等式成立，当且仅当 $a=b=c=1$ 时等号成立。**

易错提醒

易错点一（忽略正实条件）

误以为 a,b,c 可为任意实数。

正确理解（正实数必要）：

a,b,c 必须为正实数，否则分母可能为零或负，不等式不成立。

错因分析（条件缺失）：

未注意不等式前提条件，导致错误应用。

易错点二（取等误解）

认为只要部分变量相等即可取等。

正确理解（全等取等）：

等号成立当且仅当 $a=b=c$，所有变量必须相等。

错因分析（对称性误解）：

由于不等式对称，误以为对称条件下任意相等即可，但推导要求严格比例。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（分母不匹配）

在类似表达式中直接套用，忽略分母形式。

正确理解（形式匹配）：

只有分母为 $b+c, c+a, a+b$ 时才能直接应用此结论。

错因分析（机械套用）：

未理解不等式结构，盲目应用导致错误。

结论小结

一句话核心

对于正实数 a, b, c，平方项除以两数和的和小下界为半和。

使用条件

- **条件 1（正实数）：** $a, b, c > 0$。
- **条件 2（分母形式）：** 分母必须为 $b+c, c+a, a+b$ 的形式。

关键提醒

- **易错点（取等条件）：** 等号成立当且仅当 $a=b=c$。
- **检查项（分母匹配）：** 应用前检查分母是否匹配定理要求。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.41 循环分式不等式

二级结论

条件

条件 1（变量正实）：

变量 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 均为正实数，并约定 $a_{n+1} = a_1$。

结论

结论一（循环和不等式）：

直观描述： 循环分式和不小于变量个数。

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}} \geq n.$$

推广结论（三元特例）：

直观描述： 三变量循环和至少为 3。

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq 3.$$

等号/取等条件： 当且仅当所有变量相等，即 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$。三元特例等号成立当且仅当 $a = b = c$。

理解说明

一句话直觉 一个“分数”形式的循环求和，其最小值恰好等于循环的“圈数”，本质是均值不等式在对称循环结构中的体现。

核心拆解

要点一（结构循环）：

下标构成闭环（$a_{n+1} = a_1$），每个分式是“前一项除以后一项”。

要点二（目标定值）：

不等式右端是常数 n，即循环的项数，与变量具体大小无关。

几何本质（轮换对称） 所有变量地位平等，表达式在变量的轮换置换下保持不变（$a_1 \to a_2, a_2 \to a_3, \ldots, a_n \to a_1$）。这种高度对称性导致最小值在完全对称（所有变量相等）时取得。

代数意义（均值放缩） 利用算术-几何平均不等式（AM-GM）对 n 个分式的乘积

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

进行放缩：

$$\frac{a_1}{a_2}\cdot\frac{a_2}{a_3}\cdots\frac{a_n}{a_1}=1\le\left(\frac{\frac{a_1}{a_2}+\frac{a_2}{a_3}+\cdots+\frac{a_n}{a_1}}{n}\right)^n.$$

开 n 次方后即得结论。

考点价值（不等式工具）

- **考法一（直接应用）**：题目条件或待证式恰好是循环分式和，直接套用结论。
- **考法二（变形构造）**：将非齐次式或复杂分式通过配凑、代换转化为循环分式和结构。

顿悟点 **观察式子中所有分子和分母**：若将所有分式相乘，分子分母会完全约去，结果为 1。这个“乘积为 1”的特性是连接均值不等式的关键桥梁。

使用场景

- **场景一（证明最值）**：证明形如“$\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}\ge 3$”的循环分式最小值问题。
- **场景二（简化复杂式）**：在复杂的多元不等式证明中，识别出局部循环结构并应用此结论进行放缩。

证明

思路提示 利用算术-几何平均不等式（AM-GM），对 n 个正数 $\frac{a_1}{a_2},\frac{a_2}{a_3},\ldots,\frac{a_n}{a_1}$ 直接应用。因为它们的乘积为 1，由均值不等式可得它们的和至少为 n。

正式推导

步骤一（构造序列）：

记 $b_i=\frac{a_i}{a_{i+1}}$，其中 $i=1,2,\ldots,n$，且 $a_{n+1}=a_1$。则 $b_1,b_2,\ldots,b_n$ 均为正实数。

$$b_i>0\quad(i=1,\ldots,n).$$

理由：由条件 $a_i>0$ 可知分式值 $b_i>0$。

步骤二（计算乘积）：

计算这 n 个数的乘积。

$$\begin{aligned}b_1b_2\cdots b_n&=\left(\frac{a_1}{a_2}\right)\cdot\left(\frac{a_2}{a_3}\right)\cdots\left(\frac{a_n}{a_1}\right)\\&=\frac{a_1a_2\cdots a_n}{a_2a_3\cdots a_na_1}\\&=1.\end{aligned}$$

理由：分子分母中的 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 各出现一次，全部约去。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（应用均值）：

对 $b_1, b_2, \ldots, b_n$ 应用算术-几何平均不等式（AM-GM）。

$$\frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}{n} \geq \sqrt[n]{b_1 b_2 \cdots b_n}.$$

理由： AM-GM 不等式要求所有数为正实数，此处满足。

步骤四（代入化简）：

将乘积 $b_1 b_2 \cdots b_n = 1$ 代入右边，并两边乘以 n。

$$\frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}{n} \geq \sqrt[n]{1} = 1,$$
$$\therefore \quad b_1 + b_2 + \cdots + b_n \geq n.$$

理由： 1 的 n 次方根仍为 1，不等式方向不变。

步骤五（还原变量）：

将 b_i 代回原分式形式。

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}} = b_1 + b_2 + \cdots + b_n \geq n.$$

理由： 这是 b_i 的定义。

步骤六（分析取等）：

在 AM-GM 不等式中，等号成立当且仅当 $b_1 = b_2 = \cdots = b_n$。

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{a_2}{a_3} = \cdots = \frac{a_n}{a_1}.$$

理由： 均值不等式取等条件要求所有数相等。由这些等式可递推得 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$。反之，若所有 a_i 相等，显然等号成立。

结论回扣 因此，对于任意 n 个正实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，在约定 $a_{n+1} = a_1$ 下，必有 $\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}} \geq n$，且等号当且仅当所有变量相等时成立。特例 $n = 3$ 即得 $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq 3$，等号当且仅当 $a = b = c$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x, y, z > 0$，求证：$\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \geq 3$。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（识别结构）：

观察待证式，它是三个正数 x, y, z 的循环分式和，恰好对应定理中 $n = 3$ 的情形。

理由： 分式依次为 $\frac{x}{y}, \frac{y}{z}, \frac{z}{x}$，下标构成循环 $x \to y \to z \to x$。

第二步（直接应用）：

根据循环分式不等式（三元特例），立即有

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \geq 3.$$

理由： 定理结论的直接代入。

第三步（说明取等）：

等号成立的条件是 $x = y = z$。

理由： 定理指出，等号当且仅当三个变量相等。

关键结论： **对于任意正实数 x, y, z，恒有 $\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \geq 3$，等号成立当且仅当 $x = y = z$。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $a, b, c > 0$，求证：$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$。（提示：先利用不等式 $\frac{a}{b+c} \geq \frac{2a}{a+b+c}$）

解题步骤：

第一步（初步放缩）：

对每一项应用给定提示的不等式。

$$\frac{a}{b+c} \geq \frac{2a}{a+b+c},$$
$$\frac{b}{c+a} \geq \frac{2b}{a+b+c},$$
$$\frac{c}{a+b} \geq \frac{2c}{a+b+c}.$$

理由： 因为 $a + b + c > a$，所以 $\frac{a}{b+c} \geq \frac{a}{a+b+c}$ 不充分，提示给出了更强的系数 2，可由 $\frac{a}{b+c} = \frac{a}{b+c}$ 和 $\frac{2a}{a+b+c}$ 通分比较得到。

第二步（求和得新式）：

将三个不等式相加。

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{2a+2b+2c}{a+b+c} = 2.$$

理由： 同分母 $a + b + c$，分子相加为 $2(a + b + c)$。

但此结果 ≥ 2 比目标 $\geq 3/2$ 更强，说明提示放缩过强。实际上，经典证法（Nesbitt 不等式）需另寻他路。我们换一种与循环分式相关的思路。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（对称化处理）：

考虑对称化：令 $S=a+b+c$，则 $b+c=S-a$。原式可写为

$$\frac{a}{S-a}+\frac{b}{S-b}+\frac{c}{S-c}.$$

理由：统一分母为 S 减去分子，形式更对称。

第四步（构造循环和）：

尝试证明 $\frac{a}{S-a}+\frac{b}{S-b}+\frac{c}{S-c}\geq\frac{3}{2}$。

利用换元：设 $x=S-a, y=S-b, z=S-c$，则 $x,y,z>0$ 且 $x+y+z=2S$。

理由： $a=S-x$，代入原式变为 $\frac{S-x}{x}+\frac{S-y}{y}+\frac{S-z}{z}=\left(\frac{S}{x}+\frac{S}{y}+\frac{S}{z}\right)-3$。

第五步（应用循环不等式）：

注意到 $\frac{S}{x}=\frac{y+z}{x}$（因为 $S=x+y+z$），原不等式等价于

$$\frac{y+z}{x}+\frac{z+x}{y}+\frac{x+y}{z}\geq 6.$$

理由：将 $\frac{S}{x}+\frac{S}{y}+\frac{S}{z}\geq\frac{9}{2}$ 转化为上述形式。而

$$\frac{y+z}{x}+\frac{z+x}{y}+\frac{x+y}{z}=\left(\frac{y}{x}+\frac{z}{x}\right)+\left(\frac{z}{y}+\frac{x}{y}\right)+\left(\frac{x}{z}+\frac{y}{z}\right),$$

重组得

$$\left(\frac{y}{x}+\frac{x}{y}\right)+\left(\frac{z}{y}+\frac{y}{z}\right)+\left(\frac{x}{z}+\frac{z}{x}\right)\geq 2+2+2=6.$$

理由：每一对括号内均可用基本不等式 $\frac{u}{v}+\frac{v}{u}\geq 2$（$u,v>0$）得到最小值 2。这正是循环分式不等式在 $n=2$ 时的特例。

关键结论： **通过拆项和基本不等式，最终证得 $\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\geq\frac{3}{2}$，且等号当 $a=b=c$ 时成立。本题展示了如何将非标准循环式拆解为多个循环分式结构。**

易错提醒

易错点一（忽略正数条件）

未验证变量为正实数就直接套用结论。

正确理解（前提必验）：

定理成立的前提是 $a_1,a_2,\ldots,a_n>0$。若变量可为负或零，结论不成立。

错因分析（条件缺失）：

均值不等式（AM-GM）仅适用于正实数，忽略前提会导致错误结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（循环结构误判）

将非循环的分式和误判为循环结构。例如，$\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{d}$（$d$ 与 a 无关）不是循环和。

正确理解（下标闭环）：

必须满足 $a_{n+1}=a_1$，即最后一个分式的分母是第一个分式的分子。

错因分析（定义混淆）：

混淆了“轮换对称”与“循环和”的定义，后者要求严格的闭环。

易错点三（取等条件漏解）

仅写出部分取等条件，例如在 $n=3$ 时只写出 $a=b$，未写出 $b=c$。

正确理解（全部相等）：

等号成立的充要条件是所有变量相等，即 $a_1=a_2=\cdots=a_n$。

错因分析（条件递推不全）：

由 $\frac{a_1}{a_2}=\frac{a_2}{a_3}=\cdots=\frac{a_n}{a_1}$ 应递推出全部相等，不能只推出相邻相等。

结论小结

一句话核心 **正实数循环分式之和，最小值等于循环的项数，当且仅当所有数相等时取到最小值。**

使用条件

- **条件 1（变量全正）：**所有涉及的变量必须是正实数。
- **条件 2（结构循环）：**分式序列必须构成闭环，即最后一个分式的分母等于第一个分式的分子。

关键提醒

- **易错点（前提验证）：**使用前务必检查变量正负与结构循环性，两者缺一不可。
- **检查项（取等条件）：**最小值取到时，所有变量一定相等，这是等号成立的唯一情况。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.42 三元循环平方分式不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

变量 x, y, z 都是正实数。

结论

结论一（三元循环不等式）：

直观描述： 分式的平方和大于等于变量直接和。

$$\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x} \geq x+y+z.$$

推广结论（加权推广形式）：

直观描述： 每个分式项乘以正权重的推广。

$$\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x} \geq \frac{(x+y+z)^2}{x+y+z}=x+y+z.$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x=y=z$ 时，不等式取等号。

理解说明

一句话直觉 把每个变量的平方“分摊”给下一个变量作分母，这样的循环分式之和，不会小于变量自身之和。它描述了一种“循环放大”效应，但总和仍有下限。

核心拆解

要点一（结构对称）：

不等式左边三个分式呈 $x \to y \to z \to x$ 的循环对称结构。

要点二（分式降幂）：

左边每一项是二次除以一次，整体是齐一次式，右边也是齐一次式。

几何本质（旋转放缩） 可以将 $\frac{x^2}{y}$ 视为以 x 和 $\frac{x}{y}$ 为两边的矩形面积的一种度量。不等式表明，经过循环“旋转”和“伸缩”后的面积之和，总不小于原始边长之和。当三个变量相等时，这种“旋转伸缩”效应消失，达到平衡。

代数意义（柯西变形） 从代数角度看，该不等式是柯西-施瓦茨不等式一个精妙的变形。通过将 $x+y+z$ 拆分为 $\sqrt{x}\sqrt{\frac{x}{y}}\cdot\sqrt{y}+\ldots$ 等形式，并应用 $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$，可自然导出结论。它揭示了平方和与交叉项和之间的深层关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（综合应用）

- **考法一（直接证明求最值）**：作为已知结论直接用于证明其他不等式或求多元表达式的最小值。
- **考法二（变形识别应用）**：题目可能将 $\frac{x^2}{y}$ 变形为 $\frac{x^3}{xy}$ 等形式，需要逆向识别出本结构方可应用。

顿悟点 **关键在于发现 $\frac{x^2}{y}+y\geq 2x$，并对三个这样的不等式进行循环求和。**这是将非对称分式化为对称整体最常用的技巧。

使用场景

- **场景一（循环分式求和）**：当遇到 $\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}$ 这类循环分式求和求最小值时，优先考虑此结论。
- **场景二（条件最值证明）**：在已知 $x,y,z>0$ 且满足某条件（如 $xyz=1$）时，证明包含此类循环分式的不等式。

证明

思路提示 利用基本不等式 $a^2+b^2\geq 2ab$，对左边的每一项进行“配凑”，使之与右边的 x,y,z 产生联系。具体来说，为 $\frac{x^2}{y}$ 配上一个 y，就能运用均值不等式。

正式推导

步骤一（单项配凑）：

对第一个分式应用二元均值不等式。

$$\frac{x^2}{y}+y\geq 2\sqrt{\frac{x^2}{y}\cdot y}=2x.$$

理由：这里 $a=\frac{x}{\sqrt{y}}, b=\sqrt{y}$，满足 $a^2+b^2\geq 2ab$。此步将分式与一个变量配对。

步骤二（循环类推）：

同理，写出另外两个循环配对的不等式。

$$\frac{y^2}{z}+z\geq 2y,$$
$$\frac{z^2}{x}+x\geq 2z.$$

理由：完全仿照步骤一，只是将变量按 $x\to y\to z\to x$ 的顺序轮换。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（叠加求和）：

将上面得到的三式左边与右边分别相加。

$$\left(\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x}\right)+(y+z+x)\geq 2x+2y+2z.$$

理由：不等式两边分别相加，不等号方向不变。

步骤四（移项化简）：

将不等式右边的 $2(x+y+z)$ 拆开，并将一部分移到左边。

$$\left(\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x}\right)+(x+y+z)\geq 2(x+y+z)$$
$$\Rightarrow \quad \frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x}\geq (x+y+z).$$

理由：从叠加后的不等式两边同时减去 $(x+y+z)$，即得所要证明的结论。

结论回扣 **以上每一步均可逆，且均值不等式取等条件为 $\frac{x^2}{y}=y,\frac{y^2}{z}=z,\frac{z^2}{x}=x$，即 $x^2=y^2,y^2=z^2,z^2=x^2$。结合 $x,y,z>0$，推出当且仅当 $x=y=z$ 时原不等式取等号。**证明完毕。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $a,b,c>0$，证明：$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\geq a+b+c$。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

观察题目结构与已知结论完全一致。

理由：将 (x,y,z) 对应为 (a,b,c)，即为结论的直接形式。

第二步（应用结论）：

直接写出已知的不等式结论。

$$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\geq a+b+c.$$

理由：根据“三元循环平方分式不等式”，该式恒成立。

第三步（说明取等）：

指出等号成立的条件。

理由：当且仅当 $a=b=c$ 时，上述不等式取等号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 对于任意正实数 a, b, c，不等式 $\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a} \geq a+b+c$ 成立，等号在 $a=b=c$ 时取得。

例 2（稍变形）

题目： 设 $x, y, z>0$，且 $xyz=1$。求 $\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（应用主结论）：

直接应用已知不等式得到一个下界。

$$\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x} \geq x+y+z.$$

理由： 题目条件 $x, y, z>0$ 满足不等式应用前提。

第二步（利用条件放缩）：

在 $xyz=1$ 的条件下，对 $x+y+z$ 进一步使用均值不等式。

$$x+y+z \geq 3\sqrt[3]{xyz}=3.$$

理由： 三个正数的算术平均数不小于几何平均数，且 $xyz=1$。

第三步（得到最小值）：

结合前两步，得出原式的最小值。

$$\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x} \geq x+y+z \geq 3.$$

理由： 不等式具有传递性。因此原式的最小值不小于 3。

第四步（验证可达到）：

检查等号能否同时成立。

理由： 第一个不等式取等需 $x=y=z$，第二个不等式取等也需 $x=y=z$。结合 $xyz=1$，得 $x=y=z=1$。此时原式值为 3。故最小值为 3。

关键结论： 在 $x, y, z>0$ 且 $xyz=1$ 的条件下，$\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x}$ 的最小值为 3，当 $x=y=z=1$ 时取得。

易错提醒

易错点一（忽略正实数条件）

错误地认为 x, y, z 可以是任意实数或零。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（严格正性）：

结论成立的前提是 $x, y, z > 0$。若变量为负或为零，则均值不等式步骤可能失效或分母无意义。

错因分析（条件遗忘）：

忽视不等式成立的基本前提，将特殊结论盲目推广到一般情况。

易错点二（取等条件误用）

在复杂问题中，认为只要 $x = y = z$ 就一定能使所有相关不等式同时取等。

正确理解（链条检验）：

当结论是通过多个不等式链推导得到时，必须验证每个不等式的取等条件能否同时满足。

错因分析（逻辑混淆）：

混淆了单个不等式取等与整个不等式链取等的逻辑关系。

易错点三（形式误用）

看到形如 $\frac{a^2}{b}$ 的项就套用结论，未注意是否是 $a \to b \to c \to a$ 的循环结构。

正确理解（结构对称）：

结论要求分子是变量的平方，分母是下一个变量，且三个项循环对称。对于 $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a} + \frac{c^2}{d}$ 等不对称结构不适用。

错因分析（模式错配）：

机械记忆结论形式，缺乏对变量间循环对称关系的识别能力。

结论小结

一句话核心 **正实数循环平方分式之和，不小于变量本身之和。**这是连接分式结构与一次和的重要桥梁。

使用条件

- **条件 1（变量正性）：**所有涉及的变量必须是正实数 (> 0)。
- **条件 2（循环对称）：**表达式必须是 $\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + \frac{z^2}{x}$ 或其轮换对称形式。

关键提醒

- **易错点（取等验证）：**牢记取等条件是 $x = y = z$。在复杂推导中，需验证该条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

能否使链条中每个不等式同时取等。

- **检查项（结构匹配）**：应用前务必检查分式项是否构成严格的 $a \to b \to c \to a$ 循环，避免形式类似的错误套用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料