

JACガイドブック 第1冊（体調レイヤー） pre-完成版

Web版ガイドを、現場で読み進めやすい章構成に再編集した版

発行: Next Being Lab

形式: 試作レイアウト

目次

1. この冊子の使い方
2. 章一覧
3. 第01章 会議疲れを減らす会議設計
4. 第02章 体調の波を前提にした業務配分
5. 第03章 通院と勤務を両立する時間設計
6. 第04章 音・光・温度ストレスを下げる職場調整
7. 第05章 通勤消耗を減らす働き方設計
8. 第06章 配慮に必要な情報だけ共有する
9. 第07章 復職初期を守る段階復帰
10. 第08章 睡眠・服薬リズムを守るシフト設計
11. 第09章 配慮を続ける相談運用の定着
12. 巻末メモ（編集チェック用）

- 生成日時: 2026-02-18T21:55:08.572Z
- 対象: 体調レイヤー9フレーム（第01章～第09章）
- 位置づけ: 公開前の確認版（本文は読みやすさ優先、根拠IDは章末に保持）

この冊子の使い方

1. まず、自分の課題に近い章を1章だけ選ぶ。
2. 「最初の7日アクション」だけ先に実行する。
3. 4週間運用して、章内の観測指標で再評価する。
4. 境界が曖昧なときは「この章を選ぶ目安」を優先して章を切り替える。


章一覧

1. 第01章 会議疲れを減らす会議設計
 2. 第02章 体調の波を前提にした業務配分
 3. 第03章 通院と勤務を両立する時間設計
 4. 第04章 音・光・温度ストレスを下げる職場調整
 5. 第05章 通勤消耗を減らす働き方設計
 6. 第06章 配慮に必要な情報だけ共有する
 7. 第07章 復職初期を守る段階復帰
 8. 第08章 睡眠・服薬リズムを守るシフト設計
 9. 第09章 配慮を続ける相談運用の定着
-

第01章 会議疲れを減らす会議設計

元フレーム名: 会議同時処理負荷が主因: 理解遅延が午後疲労へ連鎖する

第01章 会議疲れを減らす会議設計



book1 pre-final illustration (replaceable)

第01章イラスト

- フレームID: `p-meeting-overload`
- 推奨モード: `conditional_only`

この章が扱う課題

長時間会議・即時応答・資料の同時読解が重なると、理解遅延と疲労蓄積が同時に起きやすい。

因果の見取り図

- 起点: 会議同時処理負荷が主因
- 連鎖: 理解遅延が午後疲労へ連鎖する

この章を選ぶ目安（他章との境界）

選ぶ目安: 主困りごとが会議中の同時処理（聞く・読む・即答）なら本カード。会議外の割込み切替が中心なら「タスク切替過多が主因」カード、聞こえ/見えのアクセス不足が中心なら各アクセスカードを優先。

最初の7日アクション

1. 会議を30分単位に分割し、論点を1テーマずつ固定する
2. 事前資料を前日配布し、当日は意思決定項目だけに集中する
3. 同期会議の一部を非同期コメントに置き換える
4. 会議後15分の回復バッファを勤務設計に組み込む

1か月の定着運用

パッケージ1: 会議再設計パッケージ

- 狙い: 同時処理負荷を減らし、会議中の理解精度を上げる。
- 実装項目:
 - 会議を「共有」「判断」「調整」に分離して別枠化
 - 事前資料は24時間前配布し、当日は決定論点のみ扱う
 - 会議後15分の回復バッファを標準運用にする
- 運用ルール:
 - 4週間の試行期間を設定し、毎週運用レビューを実施する
 - 司会者が議題逸脱を止める責任を持つ
- 観測指標:
 - 会議後の再説明依頼件数
 - 会議後30分の疲労自己評価
 - 会議内意思決定率
- 見直し条件: 2週間連続で疲労自己評価が悪化した場合、会議数と密度を再設計する。

パッケージ2: 同期→非同期シフトパッケージ

- 狙い: 即時応答ストレスを下げつつ、合意速度を維持する。
- 実装項目:
 - 情報共有は非同期スレッドへ移行し、会議は意思決定のみ
 - 返信SLA（例: 4営業時間以内）を合意する
 - 非同期議論のテンプレート（論点/懸念/提案）を固定化する
- 運用ルール:
 - レスポンス遅延を個人責任化しない
 - 会議と非同期の役割境界を明文化する
- 観測指標:

- ・ 非同期スレッド完結率
- ・ 会議時間総量
- ・ 締切遅延件数
- ・ 見直し条件: 締切遅延が増えた場合、非同期対象タスクを再分類する。

実装前チェック

- ・ 職務上、会議参加が必須である
- ・ 会議目的（共有/意思決定/調整）が区別されている
- ・ 上長・司会者が進行設計を変更できる

つまづきやすいポイント

- ・ 会議時間だけ短縮して論点密度を下げないと、効果が出にくい
- ・ 非同期化しても返信SLAを決めないと逆に負荷が増える

相談時に追加確認すること

- ・ 理解遅延は「どの会議」で最も起きやすいか？
- ・ 会議後に落ちる業務（文章作成/判断/対人調整）は何か？
- ・ 短縮と非同期化のどちらが現場文化に適合するか？
- ・ person: 本人の強み・疲労サイン・回復条件は何か。
- ・ job: 必須業務と代替可能業務の境界はどこか。
- ・ environment: どの環境要因がトリガーか。
- ・ support: 誰が調整責任を持つか。外部連携は必要か。
- ・ time: 週内・月内で悪化/回復のパターンはあるか。
- ・ institution: 法域・制度・就業規則の制約は何か。
- ・ evidence: 改善判定をどの指標で行うか。

関連章

- ・ タスク切替過多が主因: 認知負荷が急上昇する（`p-developmental-switch-load`）
- ・ 記憶・遂行機能負荷が主因: 業務が分断され手戻りが増える（`p-higher-brain-memory-support`）
- ・ 対人即時応答負荷が主因: 接客場面でミスと疲労が増える（`p-customer-facing-load`）

根拠トレース（監修用）


- ・ GLM: GLM-S3-002, GLM-S1-001

- claim IDs: 9a810f34c89b02b2, 627977e3fd538fe0
 - source regions: JP, US, UK
-

第02章 体調の波を前提にした業務配分

元フレーム名: 体調変動が主因: 日ごとの業務達成度が安定しない

第02章 体調の波を前提にした業務配分



book1 pre-final illustration (replaceable)

第02章イラスト

- フレームID: `p-fatigue-pacing`
- 推奨モード: `conditional_only`

この章が扱う課題

症状の波・疲労・回復遅延がある場合、同じ業務量でも日ごとの達成度が大きく変動しやすい。

因果の見取り図

- 起点: 体調変動が主因
- 連鎖: 日ごとの業務達成度が安定しない

この章を選ぶ目安（他章との境界）

選ぶ目安: 日ごとの体調波で同一業務量を維持しにくいなら本カード。通院日の当て込み不足は「通院日程の衝突が主因」、治療後の回復時間不足は「回復時間不足が主因」、勤務時刻制度の不整合は「勤務時刻の不整合が主因」を優先。

最初の7日アクション

1. 業務量を週単位で平準化し、ピーク日を作らない
2. 90分ごとの短休憩を標準運用にする
3. 重要タスクを体調の安定時間帯へ再配置する
4. 週次レビューで負荷の上げ下げを事前合意する

1か月の定着運用

パッケージ1: ペーシング運用パッケージ

- 狙い: 体調波がある前提で、負荷を可変制御する。
- 実装項目:
 - 業務を高負荷/中負荷/低負荷で分類して日次配分する
 - 90分ごとに強制マイクロ休憩を入れる
 - 安定時間帯に重要判断タスクを配置する
- 運用ルール:
 - 週次で業務密度を再調整する
 - 自己申告を評価不利益に結びつけない
- 観測指標:
 - 週次完了率
 - 疲労ピーク頻度
 - 体調要因による遅延件数
- 見直し条件: 完了率低下が2週続いたら、目標設定を再調整する。

パッケージ2: 負荷バッファ設計パッケージ

- 狙い: 症状悪化日の影響を翌日以降に連鎖させない。
- 実装項目:
 - 予備日を週1回設ける
 - 納期を中間締切付きの二段階にする
 - 代替担当ルールを明文化する
- 運用ルール:
 - 繁忙期は前倒し着手を標準化する
 - 調整履歴を記録し翌月設計に反映する
- 観測指標:

- ・ 中間締切遵守率
- ・ 突発残業時間
- ・ 代替発動件数
- ・ 見直し条件: 突発残業が増加した場合は中間締切の設計を見直す。

実装前チェック

- ・ 日内/週内で体調波の傾向が把握できる
- ・ 業務の優先順位づけが可能
- ・ レビューで調整する運用責任者がいる

つまずきやすいポイント

- ・ 根性論でカバーすると再発・離脱リスクが上がる
- ・ 本人の自己申告チャンネルがないと調整が後手になる

相談時に追加確認すること

- ・ 体調が崩れる直前の業務パターンは何か？
- ・ 休憩で回復するのか、タスク変更が必要なのか？
- ・ 調整後に改善を測るKPIは何か？
- ・ person: 本人の強み・疲労サイン・回復条件は何か。
- ・ job: 必須業務と代替可能業務の境界はどこか。
- ・ environment: どの環境要因がトリガーか。
- ・ support: 誰が調整責任を持つか。外部連携は必要か。
- ・ time: 週内・月内で悪化/回復のパターンはあるか。
- ・ institution: 法域・制度・就業規則の制約は何か。
- ・ evidence: 改善判定をどの指標で行うか。

関連章

- ・ 勤務時刻の不整合が主因: 生活・服薬リズムが崩れる（`p-shift-rhythm-guard`）
- ・ 通勤負荷が主因: 始業前消耗で日中稼働が崩れる（`p-commute-hybrid`）
- ・ タスク切替過多が主因: 認知負荷が急上昇する（`p-developmental-switch-load`）

根拠トレース（監修用）


- ・ GLM: GLM-S3-001, GLM-S2-001

- claim IDs: d2033f3551357dd0, 55b623ad4146f8b9
 - source regions: US, JP, NBL-local
-

第03章 通院と勤務を両立する時間設計

元フレーム名: 通院日程の衝突が主因: 通院・治療と勤務スケジュールが噛み合わない

第03章 通院と勤務を両立する時間設計



book1 pre-final illustration (replaceable)

第03章イラスト

- フレームID: `p-medical-schedule`
- 推奨モード: `questions_first`

この章が扱う課題

主課題が「通院日・受診時刻の調整不足」にある場合のカード。受診予定と業務ピークが重なると、欠勤不安・有給消費不安・心理的負荷が重なり、就業継続の見通しが下がりやすい。

因果の見取り図

- 起点: 通院日程の衝突が主因
- 連鎖: 通院・治療と勤務スケジュールが噛み合わない

この章を選ぶ目安（他章との境界）

選ぶ目安: 課題の中心が日程衝突（いつ通院するか）なら本カード。定期治療でも、主課題が通院時刻・勤務調整ならこちらを優先。治療後の長い回復時間や体力低下が主因なら「回復時間不足が主因」カードを優先。

最初の7日アクション

1. 通院日を固定し、前後で業務負荷を調整する
2. 始業/終業時刻の可変枠を設定する
3. 引き継ぎテンプレートを作り、突発時の業務穴を最小化する
4. 治療ピーク期だけ短期運用ルールを別立てにする

1か月の定着運用

パッケージ1: 治療ウィンドウ確保パッケージ

- 狙い: 治療継続と業務継続を両立する時間枠を作る。
- 実装項目:
 - 通院日を先に固定し、納期計画を逆算する
 - 始業/終業の可変枠を定義する
 - 通院当日・翌日の負荷上限を明文化する
- 運用ルール:
 - 適用対象の法域と雇用区分を必ず確認する
 - 運用開始前に本人同意範囲を確認する
- 観測指標:
 - 通院実施率
 - 治療関連欠勤率
 - 納期遅延率
- 見直し条件: 通院実施率が下がった場合、業務配分と時間枠を優先的に再設計する。

パッケージ2: 欠勤影響最小化パッケージ

- 狙い: 急な不調時でも業務穴を最小化する。
- 実装項目:
 - 引き継ぎテンプレートを1ページ化する
 - 代替担当を事前合意する
 - 未完了タスクの優先順位ルールを設定する
- 運用ルール:
 - 代替担当への負担偏りを週次で点検する

- 引き継ぎ記録は更新責任者を固定する
- 観測指標:
- 代替起動から再開までの時間
- 引き継ぎ漏れ件数
- 周囲負担自己評価
- 見直し条件: 引き継ぎ漏れが月2件を超えたらテンプレート項目を見直す。

実装前チェック

- 通院予定と業務ピークの重なりが見える化されている
- 代替担当・先送り基準が運用で合意されている

つまづきやすいポイント

- 制度だけ作って案件優先ルールを変えないと、現場で形骸化する
- 本人の開示範囲が未整理のまま運用すると対人摩擦が増える

相談時に追加確認すること

- 適用法域（JP/US/EUなど）と雇用区分は何か？
- 通院直後に難しくなる具体タスクは何か？
- 既に試した配慮で効いたもの/逆効果だったものは何か？
- person: 本人の強み・疲労サイン・回復条件は何か。
- job: 必須業務と代替可能業務の境界はどこか。
- environment: どの環境要因がトリガーか。
- support: 誰が調整責任を持つか。外部連携は必要か。
- time: 週内・月内で悪化/回復のパターンはあるか。
- institution: 法域・制度・就業規則の制約は何か。
- evidence: 改善判定をどの指標で行うか。

関連章

- 通勤負荷が主因: 始業前消耗で日中稼働が崩れる（`p-commute-hybrid`）
- 回復時間不足が主因: 定期治療の回復リズムと業務密度が衝突する（`p-internal-treatment-compatibility`）
- 勤務時刻の不整合が主因: 生活・服薬リズムが崩れる（`p-shift-rhythm-guard`）


根拠トレース（監修用）

- GLM: GLM-S4-001, GLM-S1-003
 - claim IDs: 5991a785430975cb, 86f336fb9e05cec8
 - source regions: JP, NBL-local
-

第04章 音・光・温度ストレスを下げる職場調整

元フレーム名: 環境刺激が主因: 音・光・温度で症状が悪化する

第04章 音・光・温度ストレスを下げる職場調整



book1 pre-final illustration (replaceable)

第04章イラスト

- フレームID: p-environment-sensory
- 推奨モード: conditional_only

この章が扱う課題

感覚刺激が強い環境では、集中低下と疲労増幅が重なり、業務継続性が下がることもある。

因果の見取り図

- 起点: 環境刺激が主因
- 連鎖: 音・光・温度で症状が悪化する

この章を選ぶ目安（他章との境界）

選ぶ目安: 音・光・温度など刺激そのものが主トリガーなら本カード。資料や画面の見え方が主因なら「視覚アクセス障壁が主因」、音声情報の欠落が主因なら「音声アクセス障壁が主因」を優先。

最初の7日アクション

1. 静音席・照明調整・通知制御をセットで導入する
2. 作業ゾーン（集中/連絡）を分離する
3. 在宅/出社の使い分け基準を業務ごとに定義する
4. 環境調整の効果を2週間単位で測定する

1か月の定着運用

パッケージ1: 感覚刺激制御パッケージ

- 狙い: 音・光・通知刺激を下げ、集中維持を改善する。
- 実装項目:
 - 静音席/遮光/通知制御を同時導入する
 - 必要に応じて耳栓・ノイズキャンセル機器を許容する
 - 会議室・執務席で刺激量基準を設定する
- 運用ルール:
 - 単一施策で終わらず、複合導入を前提とする
 - 周囲に運用意図を説明し誤解を防ぐ
- 観測指標:
 - 集中中断回数
 - 刺激要因による離席回数
 - 終業時疲労スコア
- 見直し条件: 刺激要因離席が減らない場合、席配置とタスク設計を同時に見直す。

パッケージ2: 作業ゾーニングパッケージ

- 狙い: 環境とタスクのミスマッチを減らす。
- 実装項目:
 - 集中ゾーンと連絡ゾーンを分ける
 - 在宅/出社の使い分け基準を業務単位で定義する
 - 高集中時間帯に割込連絡を制限する
- 運用ルール:
 - チーム全体でゾーニングルールを共有する
 - 例外処理手順を先に決める
- 観測指標:

- 高集中タスクの完了時間
- 割込件数
- 業務再開までの平均時間
- 見直し条件: 割込件数が増える場合は例外運用の範囲を再設定する。

実装前チェック

- 刺激要因（音/光/温度）の特定ができています
- 座席・設備・勤務形態の調整権限がある

つまずきやすいポイント

- 単一施策（例: イヤホンのみ）では十分な改善にならないことがある
- 周囲説明なしの個別運用は運用摩擦につながる

相談時に追加確認すること

- どの刺激がどの時間帯に影響するか？
- 環境変更後に改善を測る指標は何か？
- 在宅化と現場要件の境界線はどこか？
- person: 本人の強み・疲労サイン・回復条件は何か。
- job: 必須業務と代替可能業務の境界はどこか。
- environment: どの環境要因がトリガーか。
- support: 誰が調整責任を持つか。外部連携は必要か。
- time: 週内・月内で悪化/回復のパターンはあるか。
- institution: 法域・制度・就業規則の制約は何か。
- evidence: 改善判定をどの指標で行うか。

関連章

- タスク切替過多が主因: 認知負荷が急上昇する（`p-developmental-switch-load`）
- 悪化前対応の欠如が主因: 精神・心理面の症状の波に先手を打てない（`p-mental-fluctuation-plan`）
- 安全クリティカル要件が主因: 危険のある事態への対処で事故リスクが上がる（`p-safety-critical-operations`）

根拠トレース（監修用）


- GLM: GLM-S3-003, GLM-S4-002
- claim IDs: 030f6c25bee7e726, 8a704d1bd91c999b

- source regions: US, EU, AU
-

第05章 通勤消耗を減らす働き方設計

元フレーム名: 通勤負荷が主因: 始業前消耗で日中稼働が崩れる

第05章 通勤消耗を減らす働き方設計



book1 pre-final illustration (replaceable)

第05章イラスト

- フレームID: `p-commute-hybrid`
- 推奨モード: `conditional_only`

この章が扱う課題

混雑・移動時間・気温差が大きいと、業務開始前にエネルギーを消耗し、日中の集中維持が難しくなる。

因果の見取り図

- 起点: 通勤負荷が主因
- 連鎖: 始業前消耗で日中稼働が崩れる

この章を選ぶ目安（他章との境界）

選ぶ目安: 混雑・移動時間・気温差など通勤そのものが主因なら本カード。職場内の段差や動線負荷が主因なら「動線・移動負荷が主因」を優先。

最初の7日アクション

1. 時差出勤と在宅勤務をタスク単位で使い分ける
2. 出社は高協働タスク、在宅日は高集中タスクに再編する
3. 遠距離移動・連続出張の回避ルールを明文化する
4. 通勤負荷が高い日の代替KPI（成果基準）を定義する

1か月の定着運用

パッケージ1: 通勤負荷分散ハイブリッドパッケージ

- 狙い: 移動負荷を抑えつつ成果を維持する。
- 実装項目:
 - 時差出勤と在宅勤務をタスク別に割り当てる
 - 出社は協働タスク、在宅日は集中タスクへ再編する
 - 移動が重い日は業務開始前の高負荷作業を避ける
- 運用ルール:
 - ハイブリッド対象業務を四半期ごとに棚卸しする
 - 評価は拘束時間より成果基準を優先する
- 観測指標:
 - 通勤後1時間の生産性指標
 - 移動要因の欠勤率
 - タスク完了率
- 見直し条件: 通勤後パフォーマンス低下が続く場合、勤務開始時刻を再設計する。

パッケージ2: 移動制約ガードレールパッケージ

- 狙い: 連続移動による症状悪化を予防する。
- 実装項目:
 - 遠距離出張の除外基準を定義する
 - 連続移動日の翌日は回復重視タスクにする
 - 代替参加（オンライン参加）ルールを明文化する
- 運用ルール:
 - 例外承認フローを短くし、無理な出張を防ぐ
 - 業務都合のみで除外基準を崩さない
- 観測指標:

- ・ 連続移動後の体調悪化報告件数
- ・ 出張代替実施率
- ・ 翌日欠勤率
- ・ 見直し条件: 悪化報告が続く場合は移動上限と参加方式を再定義する。

実装前チェック

- ・ 業務を出社必須/非必須に分解できる
- ・ 成果評価を時間拘束中心から調整できる

つまづきやすいポイント

- ・ 在宅化だけで業務設計を変えないと、生産性が不安定になる
- ・ 同僚負担の再設計がないと長期運用しにくい

相談時に追加確認すること

- ・ 通勤で最も消耗する要因（距離/混雑/乗換/気温）は何か？
- ・ 出社必須タスクは本当に必須か？
- ・ 在宅時の成果確認基準は合意されているか？
- ・ person: 本人の強み・疲労サイン・回復条件は何か。
- ・ job: 必須業務と代替可能業務の境界はどこか。
- ・ environment: どの環境要因がトリガーか。
- ・ support: 誰が調整責任を持つか。外部連携は必要か。
- ・ time: 週内・月内で悪化/回復のパターンはあるか。
- ・ institution: 法域・制度・就業規則の制約は何か。
- ・ evidence: 改善判定をどの指標で行うか。

関連章

- ・ 勤務時刻の不整合が主因: 生活・服薬リズムが崩れる（`p-shift-rhythm-guard`）
- ・ 体調変動が主因: 日ごとの業務達成度が安定しない（`p-fatigue-pacing`）
- ・ 通院日程の衝突が主因: 通院・治療と勤務スケジュールが噛み合わない（`p-medical-schedule`）

根拠トレース（監修用）


- ・ GLM: GLM-S1-001, GLM-S3-001
- ・ claim IDs: dafcf53e7fe87f2c, d9d2a5f228f59eef

- source regions: JP, NBL-local, US
-

第06章 配慮に必要な情報だけ共有する

元フレーム名: 情報開示の設計不足が主因: 配慮実装とプライバシーが両立しにくい

第06章 配慮に必要な情報だけ共有する



book1 pre-final illustration (replaceable)

第06章イラスト

- フレームID: `p-disclosure-boundary`
- 推奨モード: `questions_first`

この章が扱う課題

必要配慮の実装には情報共有が必要だが、開示過多はプライバシー侵害リスクを高める。

因果の見取り図

- 起点: 情報開示の設計不足が主因
- 連鎖: 配慮実装とプライバシーが両立しにくい

この章を選ぶ目安（他章との境界）

選ぶ目安: 課題が「誰に何をどこまで共有するか」の設計なら本カード。面接での伝え方が主課題なら「面接時自己説明不足が主因」、相談運用の定着が主課題なら「相談運用の欠如が主因」を優先。

最初の7日アクション

1. 「共有する情報」と「共有しない情報」を二層で定義する
2. 職務遂行に必要な配慮情報だけをチーム共有する
3. 個人情報は管理責任者ルートで限定管理する
4. 定期面談で開示範囲を見直す

1か月の定着運用

パッケージ1: 開示レイヤー設計パッケージ

- 狙い: 配慮実装に必要な情報だけを適切に共有する。
- 実装項目:
 - 共有情報を「業務必要」「本人限定」「管理者限定」に分ける
 - チーム共有は配慮実施に必要な事実のみとする
 - 同意取得と更新タイミングを明示する
- 運用ルール:
 - 共有範囲の変更は本人同意を必須にする
 - 目的外利用を禁止し記録を残す
- 観測指標:
 - 配慮実装までのリードタイム
 - 情報共有トラブル件数
 - 本人納得度
- 見直し条件: トラブル発生時は共有範囲とアクセス権限を即時見直す。

パッケージ2: 面談・見直しループパッケージ

- 狙い: 開示と配慮のバランスを継続的に調整する。
- 実装項目:
 - 月次面談で開示範囲と配慮効果を評価する
 - 配慮情報の更新履歴を管理責任者が保持する
 - 異動・業務変更時は再評価を必須化する
- 運用ルール:
 - 面談未実施を放置しない
 - 担当者依存を避けて複線管理する
- 観測指標:

- ・ 面談実施率
- ・ 配慮更新反映率
- ・ 再発トラブル率
- ・ 見直し条件: 組織変更や担当変更が起きた時点で再設計する。

実装前チェック

- ・ 情報共有ポリシーと責任者が定義されている
- ・ 現場が目的限定の情報共有ルールを運用できる

つまずきやすいポイント

- ・ 開示を本人任せにしすぎると配慮が実装されない
- ・ 逆に過剰開示すると信頼損失と二次被害が起きる

相談時に追加確認すること

- ・ 配慮実装に必須な情報は何で、不要な情報は何か？
- ・ どの役割まで共有する必要があるか？
- ・ 本人同意と見直しタイミングをどう設計するか？
- ・ person: 本人の強み・疲労サイン・回復条件は何か。
- ・ job: 必須業務と代替可能業務の境界はどこか。
- ・ environment: どの環境要因がトリガーか。
- ・ support: 誰が調整責任を持つか。外部連携は必要か。
- ・ time: 週内・月内で悪化/回復のパターンはあるか。
- ・ institution: 法域・制度・就業規則の制約は何か。
- ・ evidence: 改善判定をどの指標で行うか。

関連章

- ・ 悪化前対応の欠如が主因: 精神・心理面の症状の波に先手を打てない（[p-mental-fluctuation-plan](#)）
- ・ 記憶・遂行機能負荷が主因: 業務が分断され手戻りが増える（[p-higher-brain-memory-support](#)）
- ・ 指示の曖昧さが主因: 作業再現性が下がる（[p-intellectual-task-clarity](#)）

根拠トレース（監修用）


- ・ GLM: GLM-S4-001, GLM-S2-001
- ・ claim IDs: 39c93a1d04fe9955, d2f92a0d8af18ab3

- source regions: JP, UK, CA
-

第07章 復職初期を守る段階復帰

元フレーム名: 復職初期の負荷復帰が主因: 早戻しで再不調が起きやすい

第07章 復職初期を守る段階復帰



book1 pre-final illustration (replaceable)

第07章イラスト

- ・ フレームID: p-return-to-work-ramp
- ・ 推奨モード: questions_first

この章が扱う課題

復職初期は「できる業務」と「継続できる業務」が一致しないことが多く、段階設計がないと再不調が起きやすい。

因果の見取り図

- ・ 起点: 復職初期の負荷復帰が主因
- ・ 連鎖: 早戻しで再不調が起きやすい

この章を選ぶ目安（他章との境界）

選ぶ目安: 休職・病休からの復職初期に負荷段階設計がないことが主因なら本カード。通常運用時の悪化予防手順不足が主因なら「悪化前対応の欠如が主因」を優先。

最初の7日アクション

1. 復職初月は段階負荷（例: 60%→80%→100%）で設定する
2. 体調・勤務・業務進捗を同じシートで見える化する
3. 復職面談を週次で実施し、配慮を微調整する
4. 支援機関・産業保健との連携窓口を固定する

1か月の定着運用

パッケージ1: 段階復職ランブパッケージ

- ・ 狙い: 復職初期の再不調リスクを下げ、定着確率を上げる。
- ・ 実装項目:
 - ・ 週単位で業務負荷上限を設定する
 - ・ 復職後4週間は週次面談を固定する
 - ・ 症状悪化時の即時調整ルールを明示する
- ・ 運用ルール:
 - ・ 短期の生産性低下を許容し長期安定を優先する
 - ・ 面談結果を業務計画に反映する責任者を定める
- ・ 観測指標:
 - ・ 復職後8週間の継続率
 - ・ 再不調による離脱件数
 - ・ 計画負荷遵守率
- ・ 見直し条件: 欠勤・早退が増加した場合、負荷段階を一段戻して再設計する。

パッケージ2: 支援連携ブリッジパッケージ

- ・ 狙い: 職場外支援と職場運用を接続し、情報断絶を防ぐ。
- ・ 実装項目:
 - ・ 支援機関/産業保健/現場責任者の連絡窓口を一本化する
 - ・ 共有情報を目的限定で定義する
 - ・ 月次で連携評価会を実施する
- ・ 運用ルール:
 - ・ 本人同意範囲を超える共有をしない
 - ・ 共有は配慮実装に必要な最小限に留める
- ・ 観測指標:

- ・ 連携会実施率
- ・ 情報連携遅延件数
- ・ 配慮反映までの日数
- ・ 見直し条件: 連携遅延が続く場合は窓口設計を再編する。

実装前チェック

- ・ 復職計画の合意がある
- ・ 調整責任者と面談スケジュールが確定している

つまずきやすいポイント

- ・ 本人の一時的回復を恒常能力と誤認すると再不調につながる
- ・ 面談だけで業務計画を変えないと実質改善しない

相談時に追加確認すること

- ・ 復職初期に崩れやすいタスクは何か？
- ・ 負荷を戻す判断基準はどの指標か？
- ・ 連携先（支援機関/産業保健）の役割分担は明確か？
- ・ person: 本人の強み・疲労サイン・回復条件は何か。
- ・ job: 必須業務と代替可能業務の境界はどこか。
- ・ environment: どの環境要因がトリガーか。
- ・ support: 誰が調整責任を持つか。外部連携は必要か。
- ・ time: 週内・月内で悪化/回復のパターンはあるか。
- ・ institution: 法域・制度・就業規則の制約は何か。
- ・ evidence: 改善判定をどの指標で行うか。

関連章

- ・ 回復時間不足が主因: 定期治療の回復リズムと業務密度が衝突する（`p-internal-treatment-compatibility`）
- ・ 勤務時刻の不整合が主因: 生活・服薬リズムが崩れる（`p-shift-rhythm-guard`）
- ・ 相談運用の欠如が主因: 配慮が単発で定着しない（`p-manager-checkin`）

根拠トレース（監修用）


- ・ GLM: GLM-S2-001, GLM-S4-001
- ・ claim IDs: 1bc1228c08504dbb, 3dfea629344d20c3

- source regions: JP, NBL-local
-

第08章 睡眠・服薬リズムを守るシフト設計

元フレーム名: 勤務時刻の不整合が主因: 生活・服薬リズムが崩れる

第08章 睡眠・服薬リズムを守るシフト設計



book1 pre-final illustration (replaceable)

第08章イラスト

- フレームID: `p-shift-rhythm-guard`
- 推奨モード: `conditional_only`

この章が扱う課題

早出/遅出/夜勤や連続残業があると、睡眠・服薬・通院リズムが崩れやすく、症状悪化を引き起こしやすい。

因果の見取り図

- 起点: 勤務時刻の不整合が主因
- 連鎖: 生活・服薬リズムが崩れる

この章を選ぶ目安（他章との境界）

選ぶ目安: 早出/遅出/夜勤/連勤など勤務時刻そのものが悪化要因なら本カード。通院日の当て込み不足が主因なら「通院日程の衝突が主因」を優先。

最初の7日アクション

1. 固定シフト優先と残業上限の設定
2. 夜勤・連続勤務の除外条件を明文化
3. セルフチェック（睡眠/体調）を日次で記録
4. 体調指標に応じて勤務時間を段階調整

1か月の定着運用

パッケージ1: 生活リズム保護パッケージ

- 狙い: 勤務設計で症状悪化トリガーを減らす。
- 実装項目:
 - 固定シフトを基本とし、急な時刻変更を抑える
 - 残業・夜勤の上限ルールを設定する
 - 睡眠・体調のセルフチェックを運用する
- 運用ルール:
 - シフト変更時は本人確認を必須化する
 - 業務都合による例外を乱用しない
- 観測指標:
 - 睡眠不足日数
 - 体調悪化報告件数
 - シフト逸脱件数
- 見直し条件: 体調悪化報告が増えた週はシフト設計を即時見直す。

パッケージ2: 勤務形態フォールバックパッケージ

- 狙い: 悪化兆候が出た時に勤務を安全側へ切り替える。
- 実装項目:
 - 悪化サイン時の短時間勤務ルールを事前定義する
 - 業務引き継ぎ先を先に決める
 - 回復後の復帰ステップを明文化する
- 運用ルール:
 - 本人申告の遅れを責めない
 - フォールバック適用記録を残す
- 観測指標:

- フォールバック起動時間
- 復帰までの日数
- 再悪化率
- 見直し条件: 再悪化が続く場合は基本勤務設計を再定義する。

実装前チェック

- シフト編成権限がある
- 体調記録の運用が受け入れられている

つまずきやすいポイント

- 例外運用の常態化でルールが形骸化する
- データ記録だけで勤務を調整しないと効果が出ない

相談時に追加確認すること

- どの勤務帯で悪化しやすいか？
- 夜勤・残業の代替手段はあるか？
- 悪化兆候の閾値をどう定義するか？
- person: 本人の強み・疲労サイン・回復条件は何か。
- job: 必須業務と代替可能業務の境界はどこか。
- environment: どの環境要因がトリガーか。
- support: 誰が調整責任を持つか。外部連携は必要か。
- time: 週内・月内で悪化/回復のパターンはあるか。
- institution: 法域・制度・就業規則の制約は何か。
- evidence: 改善判定をどの指標で行うか。

関連章

- 回復時間不足が主因: 定期治療の回復リズムと業務密度が衝突する（`p-internal-treatment-compatibility`）
- 体調変動が主因: 日ごとの業務達成度が安定しない（`p-fatigue-pacing`）
- 通勤負荷が主因: 始業前消耗で日中稼働が崩れる（`p-commute-hybrid`）

根拠トレース（監修用）


- GLM: GLM-S3-001, GLM-S1-003
- claim IDs: 344f20a67c246bb1, 9823aa9bed509b53

- source regions: JP
-

第09章 配慮を続ける相談運用の定着

元フレーム名: 相談運用の欠如が主因: 配慮が単発で定着しない

第09章 配慮を続ける相談運用の定着



book1 pre-final illustration (replaceable)

第09章イラスト

- フレームID: `p-manager-checkin`
- 推奨モード: `conditional_only`

この章が扱う課題

相談窓口が曖昧だと、困りごとが蓄積してから顕在化し、調整が後手になりやすい。

因果の見取り図

- 起点: 相談運用の欠如が主因
- 連鎖: 配慮が単発で定着しない

この章を選ぶ目安（他章との境界）

選ぶ目安: 定期面談・エスカレーション・更新責任がなく配慮運用が続かないなら本カード。開示範囲の判断が主課題なら「情報開示の設計不足が主因」を優先。

最初の7日アクション

1. 相談窓口を固定し、週次チェックインを定例化する
2. 本人申告が苦手でも拾える声かけ運用を設計する
3. 現場→人事→支援機関のエスカレーション経路を明文化する
4. 相談内容を業務設計変更に反映する運用責任者を置く

1か月の定着運用

パッケージ1: チェックイン定着パッケージ

- 狙い: 問題を早期検知し、配慮の微調整を継続する。
- 実装項目:
 - 週次15分チェックインを固定化する
 - 相談項目テンプレート（体調/業務/環境）を使う
 - 未対応項目に期限と責任者を設定する
- 運用ルール:
 - 単なる傾聴で終わらず、次アクションを必ず決める
 - 申告しづらい人向けに代替入力手段を用意する
- 観測指標:
 - 相談実施率
 - 未対応項目滞留日数
 - 配慮更新件数
- 見直し条件: 未対応滞留が増えた場合は会議体と責任分担を再設計する。

パッケージ2: 支援連携エスカレーションパッケージ

- 狙い: 現場だけで抱え込まない運用を作る。
- 実装項目:
 - エスカレーション条件を明文化する
 - 人事・産業保健・支援機関の接続点を定義する
- 連携結果を現場運用へ戻す
- 運用ルール:
 - 目的外共有をしない
- 連携結果を現場で実装したか確認する
- 観測指標:

- ・ エスカレーション適時率
- ・ 連携後の再発率
- ・ 現場納得度
- ・ 見直し条件: 再発率が下がらない場合は連携プロトコルを改定する。

実装前チェック

- ・ 相談窓口の担当が明確
- ・ 業務変更権限を持つ管理者が関与できる

つまずきやすいポイント

- ・ 相談だけ増えて実装が伴わない
- ・ 担当者依存で運用継続性が落ちる

相談時に追加確認すること

- ・ 現在の相談導線は誰が担っているか？
- ・ 相談内容が業務変更へ反映されるまでの遅延は何日か？
- ・ 連携先へのエスカレーション条件は明確か？
- ・ person: 本人の強み・疲労サイン・回復条件は何か。
- ・ job: 必須業務と代替可能業務の境界はどこか。
- ・ environment: どの環境要因がトリガーか。
- ・ support: 誰が調整責任を持つか。外部連携は必要か。
- ・ time: 週内・月内で悪化/回復のパターンはあるか。
- ・ institution: 法域・制度・就業規則の制約は何か。
- ・ evidence: 改善判定をどの指標で行うか。

関連章

- ・ 悪化前対応の欠如が主因: 精神・心理面の症状の波に先手を打てない（[p-mental-fluctuation-plan](#)）
- ・ 情報開示の設計不足が主因: 配慮実装とプライバシーが両立しにくい（[p-disclosure-boundary](#)）
- ・ 復職初期の負荷復帰が主因: 早戻して再不調が起きやすい（[p-return-to-work-ramp](#)）

根拠トレース（監修用）

- ・ GLM: GLM-S4-001, GLM-S2-002
- ・ claim IDs: c496569b9ed0b484, bc5b77049ad3cbbd

- source regions: JP, NBL-local
-

巻末メモ（編集チェック用）

- 章タイトルが相談者に一読で伝わるか。
- 章ごとの境界がMECEに近づいているか。
- 各章の7日アクションが実行単位になっているか。
- 指標が現場運用で記録可能か。