



北京航空航天大学  
BEIHANG UNIVERSITY

# 矩阵理论

---

刘克新

自动化科学与电气工程学院

答疑邮箱: [skxliu@163.com](mailto:skxliu@163.com)

# 第一章 线性空间引论

---

- 线性空间
- 线性子空间
- 基与坐标
- 内积空间
- 直和与投影
- 应用：多项式插值

# 第一章 线性空间引论

---

## 1.5 直和与投影



# 第一章 线性空间引论——直和与投影

**定义1.5.1（直和与正交直和）** 设 $W_1$ 与 $W_2$ 是线性空间 $V$ 的子空间, 若和空间 $W_1 + W_2$ 中任意向量均唯一地表示成 $W_1$ 中的一个向量和 $W_2$ 中的一个向量之和, 则称 $W_1 + W_2$ 是 $W_1$ 与 $W_2$ 的**直和**, 记为 $W_1 \dot{+} W_2$ . 进一步, 若 $W_1 \perp W_2$ , 则称直和 $W_1 \dot{+} W_2$ 是 $W_1$ 与 $W_2$ 的**正交直和**, 记为 $W_1 \oplus W_2$ .



## 第一章 线性空间引论——直和与投影

**例1.5.1** 在直角坐标系 $O - xyz$ 中, 若 $W_1 = xoy$ 平面,  $W_2 = yoz$ 平面, 试判断 $W_1 + W_2$ 是否为直和.

$$\begin{pmatrix} x, y, 0 \\ 0, y, z \end{pmatrix}$$

若 $W_1 = x$ 轴,  $W_2 = yoz$ 平面, 试判断 $W_1 + W_2$ 是否为直和.

$$\begin{pmatrix} x, 0, 0 \\ 0, y, z \end{pmatrix}$$

若 $W_1$ 为过原点且不在 $yoz$ 平面的一条直线,  $W_2 = yoz$ 平面, 试判断 $W_1 + W_2$ 是否为直和.



# 第一章 线性空间引论——直和与投影

---

**定理1.5.1（直和判定定理）** 设 $W_1$ 与 $W_2$ 是线性空间 $V$ 的两个子空间, 则以下命题等价:

- (1)  $W_1 + W_2$ 是直和;
- (2)  $W_1 + W_2$ 中零元素表法唯一;
- (3)  $W_1 \cap W_2 = \{\boldsymbol{\theta}\}$ ;
- (4)  $\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2$ .



# 第一章 线性空间引论——直和与投影

---

**定理1.5.1（直和判定定理）** 设 $W_1$ 与 $W_2$ 是线性空间 $V$ 的两个子空间, 则以下命题等价:

(1)  $W_1 + W_2$ 是直和;

(4)  $\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2$ .  
 $\dim(W_1 \cap W_2) = 0$

## 第一章 线性空间引论——直和与投影

---

**例1.5.1** 在直角坐标系 $O - xyz$ 中, 若 $W_1 = xoy$ 平面,  $W_2 = yoz$ 平面, 试判断 $W_1 + W_2$ 是否为直和.

$$W_1 \cap W_2$$

若 $W_1 = x$ 轴,  $W_2 = yoz$ 平面, 试判断 $W_1 + W_2$ 是否为直和.

若 $W_1$ 为过原点且不在 $yoz$ 平面的一条直线,  $W_2 = yoz$ 平面, 试判断 $W_1 + W_2$ 是否为直和.





# 第一章 线性空间引论——直和与投影

---

**例1.5.2** 取  $V = \mathbb{R}^{n \times n}$ ,  $W_1 = \{A \in V | A^T = A\}$ ,  $W_2 = \{A \in V | A^T = -A\}$ , 则  $V = W_1 \dot{+} W_2$ .

$W_1, W_2$  的维数分别是多少?



# 第一章 线性空间引论——直和与投影

**例1.5.3** 定义 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的两个线性子空间分别为

$$W_1 = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid \begin{array}{l} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \end{array} \right\}$$

$$W_2 = \text{span} \left( \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ a+2 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & a+8 \end{bmatrix} \right)$$

(1) 求 $W_1$ 的一组基;

(2) 当 $a$ 取何值时,  $W_1 + W_2$ 是直和.

# 第一章 线性空间引论——直和与投影

**例1.5.4** 设  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  且满足  $A^2 = A$ , 试证明

$$\mathbb{C}^n = R(A) \dot{+} R(I - A)$$

证明: (1)  $R(A) + R(I - A) = R(A) \dot{+} R(I - A)$

$$(2) \mathbb{C}^n = R(A) + R(I - A)$$

$$(a) \dim(\mathbb{C}^n) = \dim(R(A) + R(I - A))$$

$$\text{或 } (b) \mathbb{C}^n \subset R(A) + R(I - A)$$

# 第一章 线性空间引论——直和与投影

---

**例1.5.4** 设  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  且满足  $A^2 = A$ , 试证明

$$\mathbb{C}^n = R(A) \dot{+} R(I - A)$$

证明: (1)  $R(A) + R(I - A) = R(A) \dot{+} R(I - A)$

$$R(A) \cap R(I - A) = \{0\}$$

## 第一章 线性空间引论——直和与投影

---

**例1.5.4** 设  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  且满足  $A^2 = A$ , 试证明

$$\mathbb{C}^n = R(A) \dot{+} R(I - A)$$

证明: (2)  $\mathbb{C}^n = R(A) + R(I - A)$

$$(a) \dim(\mathbb{C}^n) = \dim(R(A) + R(I - A))$$

$$\dim(R(I - A)) = n - \text{rank}(A)$$

或 (b)  $\mathbb{C}^n \subset R(A) + R(I - A)$



## 第一章 线性空间引论——直和与投影

---

**例1.5.4** 设  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  且满足  $A^2 = A$ , 试证明

$$\mathbb{C}^n = R(A) \dot{+} R(I - A)$$

证明: (2)  $\mathbb{C}^n = R(A) + R(I - A)$

$$(a) \dim(\mathbb{C}^n) = \dim(R(A) + R(I - A))$$

$$\dim(R(I - A)) = n - \text{rank}(A)$$



# 第一章 线性空间引论——直和与投影

**例1.5.4** 设  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  且满足  $A^2 = A$ , 试证明

$$\mathbb{C}^n = R(A) \dot{+} N(A),$$

逆命题是否成立呢?

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \mathbb{C}^n = R(A) \dot{+} N(A).$$

补充: 设  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ , 则  $r(A^2) = r(A)$  **当且仅当**  $\mathbb{C}^n = R(A) \dot{+} N(A)$

# 第一章 线性空间引论——直和与投影

**例1.5.4** 设  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  且满足  $A^2 = A$ , 试证明

$$\mathbb{C}^n = R(A) \dot{+} N(A), \quad R(I - A) = N(A)$$

$$\mathbb{C}^n = R(A) \dot{+} R(I - A)$$

$$\mathbb{C}^n = R(A) \dot{+} N(A),$$

“消元”，直接推出  $R(I - A) = N(A)$ ? 可以吗





# 第一章 线性空间引论——直和与投影

---

## 定理1.5.2

若子空间  $W_1 \perp W_2$ , 则  $W_1 + W_2 = W_1 \oplus W_2$ .

注1: 对于子空间  $W$ ,  $V = W \oplus W^\perp$ .

注2: 正交直和分解中, 若  $V = W_1 \oplus W_2$ ,  $W_1$  给定, 则  $W_2$  唯一确定, 且  $W_2 = W_1^\perp$  (正交补空间的唯一性). 普通的直和分解不具备这样的性质.

## 第一章 线性空间引论——直和与投影

---

**例1.5.5** 在直角坐标系 $O - xyz$ 中, 假设 $W_1$ 是位于 $ox$ 轴上所有向量的集合,  $W_2$ 是过坐标原点且不包括 $ox$ 轴的任一平面, 则 $\mathbb{R}^3 = W_1 + W_2$  (直和分解不唯一). 假若定义 $W_1^\perp = yoz$ 平面. 此时,  $V = W_1 \oplus W_1^\perp$  (正交直和分解).



# 第一章 线性空间引论——直和与投影

---

**定理1.5.3** 设  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ , 则

$$N(A) \oplus R(A^H) = \mathbb{C}^n \text{ 且 } R(A^H) = (N(A))^\perp$$

$$N(A) \oplus R(A^H) = \mathbb{C}^n$$

当且仅当

$$R(A^H) \perp N(A) \text{ 且 } R(A^H) + N(A) = \mathbb{C}^n$$

当且仅当

$$R(A^H) = (N(A))^\perp.$$

# 第一章 线性空间引论——直和与投影

---

证明  $V = W_1 \oplus W_2$ , 先证明  $W_1 \perp W_2$ , 然后证明

(1)  $V = W_1 + W_2$

或者

(2)  $\dim(V) = \dim W_1 + \dim W_2$ , 从而  
 $W_2 = W_1^\perp$



# 第一章 线性空间引论——直和与投影

---

证明  $V = W_1 \oplus W_2$ , 先证明  $W_1 \perp W_2$ , 然后证明

(1)  $V = W_1 + W_2$

$$\mathbb{C}^n = N(A) + R(A^H)$$

$$\dim(N(A)) = r(A), \dim(R(A^H)) = n - r(A)$$

# 第一章 线性空间引论——直和与投影

---

证明  $V = W_1 \oplus W_2$ , 先证明  $W_1 \perp W_2$ , 然后证明

$$(1) V = W_1 + W_2$$

$$\mathbb{C}^n = N(A) + R(A^H)$$

证明  $x \in \mathbb{C}^n, x = y + z, y \in N(A), z \in R(A^H)$

假设  $z = A^H \xi$ , 证明  $y = x - z = x - A^H \xi \in N(A)$ , 即

$$Ay = A(x - A^H \xi) = 0,$$

$$AA^H \xi = Ax$$

$$\text{rank}(AA^H) = \text{rank}(AA^H : A)$$

该方程一定有解

# 第一章 线性空间引论——直和与投影

**定义1.5.3（投影与正交投影）** 设 $W_1$ 与 $W_2$ 是线性空间 $V$ 的两个子空间且 $V = W_1 + W_2$ , 对任意向量 $x \in V$ 均可唯一地分解成 $x = y + z$ , 其中 $y \in W_1$ ,  $z \in W_2$ , 此时称向量 $y$ 为向量 $x$ 在 $W_1$ 上的**投影**. 特别地, 若 $V = W_1 \oplus W_2$ , 则称向量 $y$ 为向量 $x$ 在 $W_1$ 上的**正交投影**.



# 第一章 线性空间引论——直和与投影

---

**例1.5.6** 定义 $\mathbb{R}^3$ 的线性子空间 $W = \text{span}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$ , 其中,  $\mathbf{x}_1 = [2, 5, -1]^T$ ,  $\mathbf{x}_2 = [-2, 1, 1]^T$ . 求向量 $\mathbf{y} = [1, 2, 3]^T$ 在 $W$ 和 $W^\perp$ 的正交投影.





# 第一章 线性空间引论——直和与投影

**例1.5.6** 定义 $\mathbb{R}^3$ 的线性子空间 $W = \text{span}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$ , 其中,  $\mathbf{x}_1 = [2, 5, -1]^T$ ,  $\mathbf{x}_2 = [-2, 1, 1]^T$ . 求向量 $\mathbf{y} = [1, 2, 3]^T$ 在 $W$ 和 $W^\perp$ 的正交投影.

解: 方法1. 先求 $W^\perp = \text{span}\{\mathbf{x}_3\}$ ,  $\mathbf{x}_3 = (1, 0, 2)^T$ .

再求 $\mathbf{y} = (1, 2, 3)^T$ 在空间 $W^\perp$ 上的投影:

$$\text{Proj}_{W^\perp} \mathbf{y} = \frac{(\mathbf{y}, \mathbf{x}_3)}{\|\mathbf{x}_3\|} \frac{\mathbf{x}_3}{\|\mathbf{x}_3\|} = \left(\frac{7}{5}, 0, \frac{14}{5}\right)^T.$$

尽管我们利用的欧式空间中夹角的概念求解投影, 这里数域并不局限于实数域



## 第一章 线性空间引论——直和与投影

**例1.5.6** 定义 $\mathbb{R}^3$ 的线性子空间 $W = \text{span}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$ , 其中,  $\mathbf{x}_1 = [2, 5, -1]^T$ ,  $\mathbf{x}_2 = [-2, 1, 1]^T$ . 求向量 $\mathbf{y} = [1, 2, 3]^T$ 在 $W$ 和 $W^\perp$ 的正交投影.

解: 方法1. 先求 $W^\perp = \text{span}\{\mathbf{x}_3\}$ ,  $\mathbf{x}_3 = (1, 0, 2)^T$ .

再求 $\mathbf{y} = (1, 2, 3)^T$ 在空间 $W^\perp$ 上的投影:

$$\text{Proj}_{W^\perp} \mathbf{y} = \frac{(\mathbf{y}, \mathbf{x}_3)}{\|\mathbf{x}_3\|} \frac{\mathbf{x}_3}{\|\mathbf{x}_3\|} = \left(\frac{7}{5}, 0, \frac{14}{5}\right)^T.$$

再由分解的唯一性知,

$$\text{Proj}_W \mathbf{y} = \mathbf{y} - \text{Proj}_{W^\perp} \mathbf{y} = \left(-\frac{2}{5}, 2, \frac{1}{5}\right)^T.$$

## 第一章 线性空间引论——直和与投影

**例1.5.6** 定义 $\mathbb{R}^3$ 的线性子空间 $W = \text{span}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$ , 其中,  $\mathbf{x}_1 = [2, 5, -1]^T$ ,  $\mathbf{x}_2 = [-2, 1, 1]^T$ . 求向量 $\mathbf{y} = [1, 2, 3]^T$ 在 $W$ 和 $W^\perp$ 的正交投影.

**解: 方法2.** 先求 $\mathbf{y} = (1, 2, 3)^T$ 在空间 $W$ 上的投影

$$\text{Proj}_W \mathbf{y} = \frac{(\mathbf{y}, \mathbf{x}_1)}{\|\mathbf{x}_1\|^2} \mathbf{x}_1 + \frac{(\mathbf{y}, \mathbf{x}_2)}{\|\mathbf{x}_2\|^2} \mathbf{x}_2 = \left(-\frac{2}{5}, 2, \frac{1}{5}\right)^T.$$

余下略.

# 第一章 线性空间引论——直和与投影

**命题1.5.1** 若 $W$ 是 $V$ 的子空间, $x_1, \dots, x_n$ 是 $W$ 的一组正交基. 对于 $V$ 中任一向量 $y$ 均可唯一地表示为

$$y = \text{Proj}_W y + \text{Proj}_{W^\perp} y$$

其中 $\text{Proj}_W y$ 和 $\text{Proj}_{W^\perp} y$ 分别为向量 $y$ 在空间 $W$ 和补空间 $W^\perp$ 上的正交投影, 且


$$\text{Proj}_W y = \frac{(y, x_1)}{(x_1, x_1)} x_1 + \dots + \frac{(y, x_n)}{(x_n, x_n)} x_n$$

特别地, 若 $x_1, \dots, x_n$ 是 $W$ 的一组标准正交基, 则

$$\text{Proj}_W y = (y, x_1) x_1 + \dots + (y, x_n) x_n$$


# 第一章 线性空间引论——直和与投影

**定理1.5.4** 内积空间必存在标准正交基.




# 第一章 线性空间引论——直和与投影

## 定理1.5.4 内积空间必存在标准正交基.



# 第一章 线性空间引论——直和与投影

## 定理1.5.4 内积空间必存在标准正交基.



# 第一章 线性空间引论——直和与投影

**定理1.5.4** 内积空间必存在标准正交基.

证明方法是构造性的, 称为Gram-Schmidt正交化方法.

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_k &= \mathbf{x}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(\mathbf{x}_k, \mathbf{y}_i)}{(\mathbf{y}_i, \mathbf{y}_i)} \mathbf{y}_i \\ &= \mathbf{x}_k - \sum_{i=1}^{k-1} (\mathbf{x}_k, \mathbf{z}_i) \mathbf{z}_i \\ \mathbf{z}_k &= \frac{\mathbf{y}_k}{\|\mathbf{y}_k\|} \end{aligned}$$





# 第一章 线性空间引论——直和与投影

**定理1.5.4** 内积空间必存在标准正交基.

构造性证明方法, 称为Gram-Schmidt正交化方法.

$(x_1, \dots, x_n) = (z_1, \dots, z_n)A$ , 其中, 过渡矩阵 $A$ 为**正线上三角矩阵**, 定义为

$$A = \begin{bmatrix} \|y_1\| & (x_2, z_1) & \cdots & (x_n, z_1) \\ & \|y_2\| & \cdots & (x_n, z_2) \\ & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & \|y_n\| \end{bmatrix}.$$



# 第一章 线性空间引论——直和与投影

---

**例1.5.7** 已知 $\mathbb{R}^4$ 中的一组基 $\boldsymbol{x}_1 = [1, 1, 0, 0]^T$ ,  $\boldsymbol{x}_2 = [1, 0, 1, 0]^T$ ,  $\boldsymbol{x}_3 = [-1, 0, 0, 1]^T$ ,  $\boldsymbol{x}_4 = [1, -1, -1, 1]^T$ , 求 $\mathbb{R}^4$ 的一组标准正交基.



# 第一章 线性空间引论——直和与投影

**定义1.5.3（最佳逼近）** 设 $W$ 是线性空间 $V$ 的非空子集,  $\alpha \in V$ 为给定向量, 若存在 $x \in W$ 满足如下不等式

$$\|\alpha - x\| \leq \|\alpha - y\|, \forall y \in W$$

则称 $x$ 是 $\alpha$ 在 $W$ 的**最佳逼近（最佳近似）向量**.

**定理1.5.5（最佳逼近定理）** 设 $W$ 是线性空间 $V$ 的线性子空间, 则 $V$ 中任一向量 $x$ 在 $W$ 上都有唯一的最佳逼近, 且 $x$ 在 $W$ 上的最佳逼近是 $x$ 在 $W$ 上的正交投影.

# 第一章 线性空间引论——直和与投影

**例1.5.8（最小二乘问题）** 在许多实际观测数据的处理中, 若已知量 $y$ 与量 $x_1, \dots, x_n$ 间呈线性关系:

$$y = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n$$

但不知道系数 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ . 为确定这些系数, 通常做 $m \geq n$ 次试验, 得到 $m$ 组观测数据

$$\left( x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}, y^{(k)} \right), k = 1, \dots, m$$

通常按如下意义确定系数: 求 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 使得

$$\min_{c_k \in F} \sum_{k=1}^m \left| y^{(k)} - \sum_{i=1}^n c_i x_i^{(k)} \right|^2$$

# 第一章 线性空间引论——应用：多项式插值

---

设函数  $y = f(x)$  定义在区间  $[a, b]$  上,  $x_0, x_1, \dots, x_n$  是  $[a, b]$  上取定的  $(n + 1)$  个互异点, 且仅在这些点处的函数值  $y_i = f(x_i)$  已知, 要构造函数  $g(x)$  使得

$$g(x_i) = y_i, i = 0, 1, \dots,$$

且要求误差  $r(x) = f(x) - g(x)$  的绝对值在区间  $[a, b]$  上比较小. 点  $x_0, x_1, \dots, x_n$  称为**插值基点**, 由插值基点确定的区间为端点的区间) 称为**插值区间**,  $f(x)$  称为**求插函数**,  $g(x)$  称为**插值函数**,  $r(x)$  称为**插值余项**.



# 第一章 线性空间引论——应用：多项式插值

---

若选定 $P_n(x)$ 中的一组基为 $1, x, x^2, \dots, x^n$ , 则

$$g(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

得如下方程组

$$D^T \mathbf{a} = \mathbf{y}$$

式中,  $\mathbf{a} = [a_0, a_1, \dots, a_n]^T$  为待定向量,  $\mathbf{y} = [y_0, y_1, \dots, y_n]^T$  为给定向量, 系数矩阵 $D$ 定义为

$$D = \begin{bmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{bmatrix}$$

# 第一章 线性空间引论——应用：多项式插值

形如 $D$ 的矩阵称为**Vandermonde矩阵**

$$|D^T| = |D| = \prod_{0 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

则 $D$ 可逆, 方程有唯一解 $\mathbf{a} = (D^T)^{-1}\mathbf{y}$ , 可唯一确定 $g(x)$ . 为避开矩阵求逆, 重新选取 $P_n(x)$ 的一组基:

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=0, \\ j \neq i}}^n \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}, i = 1, \dots, n$$

称为**Lagrange基本多项式**.

# 第一章 线性空间引论——应用：多项式插值

---

因此,我们将

$$p_n(x) = g(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i)l_i(x)$$

称为**Lagrange插值多项式**.

