DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS


TEPHINET
Training Programs in Epidemiology and Public Health Interventions Network

SALA SITUACIONAL

LEISHMANIASIS

Yhojar A. Pisfil-Farroñay, MD
FETP Intermedio – Cohorte 2026






Entre 2015 y 2025 se observa persistencia de casos de leishmaniasis en Amazonas, con variación interanual y un máximo de 397 casos en 2018. Durante 2019–2025, los registros anuales fluctuaron entre 219 y 298 casos. El valor de 2026 corresponde a un periodo parcial, por lo que no se puede asumir como una reducción anual consolidada.

Canal endémico de leishmaniasis, Amazonas, 2026*


Casos semanales 2026 y comportamiento histórico 2015-2025




*Información 2026 hasta la SE 35; última SE con casos registrados: SE 33.
Canal construido mediante cuartiles semanales del periodo histórico 2015-2025.
Fuente: Base de vigilancia epidemiológica de leishmaniasis.

Los casos se concentraron principalmente en las primeras semanas de 2026, con un máximo de 12 casos en la SE1. Posteriormente, se observa una disminución y presentación esporádica, predominantemente dentro de los límites esperados del canal endémico, sin evidencia de incremento epidémico sostenido.


Características de los casos de leishmaniasis, según sexo y curso de vida, Amazonas 2026*





Los casos se presentaron en todos los cursos de vida, con predominio en adultos de 30–59 años (38,0 %), seguidos de adultos mayores (21,1 %). Se observó ligero predominio del sexo masculino (54,9 %).

Distribución espacial, magnitud y persistencia de la leishmaniasis en Amazonas, 2015-26*




Persistencia de casos, según localidad
- 1 año
- 2 - 3 años
- 4 - 6 años
- 7 - 9 años
- 10 - 12 años

Magnitud acumulada de casos
- 187 casos
- 100 casos
- 25 casos
- 1 caso

Entre 2015–2026 se observa una amplia distribución territorial de casos de leishmaniasis, con localidades que presentan recurrencia durante varios años. La mayor magnitud y persistencia se concentra principalmente en localidades de Bongará, Luya y Chachapoyas.


Fuente: Base de vigilancia epidemiológica de leishmaniasis, Amazonas 2015-26, SE 35*. Cartografía de centros poblados y límites político-administrativos.
Elaboración: Yhojar A. Pisfil-Farroñay, FETP Intermedio, Cohorte 2026.

Incidencia acumulada de leishmaniasis por distrito, Amazonas 2026*.




La incidencia acumulada presentó marcada heterogeneidad territorial, con los valores más elevados en La Jalca (541,4), Totora (354,6), Churuja (349,7) y Valera (303,5 casos por 100 000 habitantes). La Jalca concentró además el mayor número de casos del departamento (17 casos).


Nota: Infomación hasta la SE 35*
Fuente: base de vigilancia epidemiológica + población proyectada 2026 + cartografía político-administrativa.
Elaboración: Yhojar A. Pisfil-Farroñay, FETP Intermedio, Cohorte 2026.




La Jalca destaca como principal territorio prioritario al concentrar 17 casos, la mayor incidencia distrital (541,4 por 100 000 habitantes) y registros durante los 12 años evaluados. Otros distritos combinan menor magnitud actual con elevada incidencia o persistencia histórica, por lo que la priorización no debe basarse únicamente en el número de casos.



Entre las SE1–35 de 2026, la precipitación acumulada fue de 1 279 mm, casi el doble de la referencia climática del mismo periodo (660 mm). Las mayores diferencias se observaron principalmente durante las primeras semanas del año.




La notificación se distribuyó entre 36 establecimientos, con mayor aporte de Yerbabuena, Galilea y Pedro Ruiz Gallo. El tiempo mediano entre inicio de síntomas y notificación fue de 36 días, evidenciando una demora importante en la captación o notificación de los casos.



La intervención comprendió 18 localidades del ámbito de la Red de Salud Chachapoyas, alcanzando una cobertura operativa reportada de 89,1 %. La cobertura fue heterogénea entre localidades, con valores entre 66,7 % y 100 %.

Resultado operativo del rociado residual intradomiciliario para control de Lutzomyia sp., junio 2026

18 localidades intervenidas - Red de Salud Chachapoyas



Total: 1 905 viviendas programadas. Rociado total: 1 402; parcial: 295; cerradas: 177; deshabitadas: 13; renuentes: 20.
Fuente: Informe de Control Vectorial Integrado para Lutzomyia sp., Red de Salud Chachapoyas, junio 2026.

En 18 localidades de la Red de Salud Chachapoyas se programaron 1 905 viviendas para intervención, alcanzándose 1 402 con rociado total y 295 con rociado parcial. La cobertura de intervención fue heterogénea entre localidades, evidenciándose además viviendas cerradas, deshabitadas y renuentes que limitaron el alcance operativo.