

# NOMBRES COMPLEXES & FONCTIONS USUELLES

www.eleves.ens.fr/home/yhuang

29 Septembre, 2011

## 1 Somme de cos

Calculer  $\sum_{k=0}^n \cos(k\theta)$ , où  $\theta \in \mathbb{R}$ .

Indication: Utiliser la technique de l'angle moitié.

## 2 Demi-plan complexe

On définit  $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0\}$  le demi-plan du plan complexe.

Montrer que  $z \in \mathbb{H}$  ssi  $-\frac{1}{z} \in \mathbb{H}$ .

On se donne  $z, a$  deux nombres complexes.

Montrer que  $|1 - z\bar{a}|^2 - |z - a|^2 = (1 - |z|^2)(1 - |a|^2)$ .

En déduire que si  $|a| < 1$ , alors  $|z| = 1$  ssi  $f(a, z) = \left| \frac{z-a}{\bar{a}z-1} \right| = 1$ .

Que se passe-t-il si  $|z| < 1$ ?

## 3 Formule de De Moivre

Montrer qu'on a l'identité suivante:

$(\cos \phi + i \sin \phi)^n = \cos n\phi + i \sin n\phi$  avec  $\phi \in \mathbb{R}$ .

Solution: On remarque que  $(e^{i\phi})^n = e^{in\phi}$ , puis on identifie les parties réelles et imaginaires.

## 4 Théorème de Napoléon

## 5 Triangle équilatéral

Montrer qu'il n'existe pas de triangle équilatéral à coordonnées entières (non réduit à un point) dans  $\mathbb{R}^2$ .

(Indication:  $a^2 + b^2 + c^2 - (ab + bc + ca) = 0$ )

Solution: Cette indication n'est pas bonne. C'est plutôt une étape dans la démonstration de cette indication qu'il faudrait utiliser.

En effet, quitte à réorienter, on peut supposer que  $\frac{a-c}{b-c} = j$  où  $j$  est une racine 3-ième primitive de l'unité. On vérifie que  $j = \frac{-1-\sqrt{3}}{2}$  ou  $j = \frac{-1+\sqrt{3}}{2}$ . Alors en identifiant les parties réelles et les parties imaginaires et en utilisant l'irrationalité de  $\sqrt{3}$ , on obtient le résultat.

## 6 Polynôme et racines $n$ -ièmes de l'unité

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Soit  $p$  un entier.

1) Calculer  $\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega^p$ .

2) Soit  $P$  un polynôme de degré inférieur ou égal à  $n - 1$ . Montrer que  $a_k = \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \frac{P(\omega)}{n\omega^k}$ .

Solution: C'est un cas explicite de l'interpolation de Lagrange...

Il s'agit dans la question 1) d'une somme géométrique.

Dans 2), il s'agit d'une somme double: on fait un Fubini, et on voit que tous les termes, à part celui de  $x^k$ , sont annulés par symétrie. Finalement on retrouve la valeur de  $a_k$ .

## 7 Arithmétique?

Montrer que si  $a, b$  peuvent s'écrire comme la somme de deux carrés dans  $\mathbb{N}$ , alors leur produit  $ab$  l'est aussi.

Soient  $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$  tels que  $(a + bi)(c + di) = 1$ . Exhiber tous les cas possibles.

## 8 Noyau du Féjer

On introduit le noyau de Dirichlet d'ordre  $n$  la fonction sur  $\mathbb{R}$  défini par:  $D_n(x) = \sum_{k=-n}^n e^{ikx}$ .

1) Montrer que  $D_n(x) \in \mathbb{R}$ .

2) Montrer que  $D_n(x) = 1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos(kx)$ .

3) Montrer que  $D_n$  est  $2\pi$ -périodique, i.e.  $D_n(x) = D_n(x + 2\pi)$ .

4) Simplifier cette somme. (En discutant selon la divisibilité de  $x$  par  $2\pi$ .)

On introduit le noyau de Féjer d'ordre  $n$  la fonction sur  $\mathbb{R}$  défini par:  $F(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} D_k(x)$ .

5) Montrer que  $F(x) = \frac{1}{2n\pi} \left( \frac{\sin nx/2}{\sin x/2} \right)^2$ .

On donne ensuite sans démonstration quelques propriétés sympas de ce noyau, en particulier c'est une approximation de Dirac sur  $[-\pi, \pi]$ .

## 9 Extrait de “Un lemme de confinement” (X-ENS)

Soient  $\epsilon_i \in \{-1, 1\}$  et  $a_i$  des nombres complexes de module 1.

Montrer:

1) On peut choisir  $\epsilon_1$  et  $\epsilon_2$  de sorte que  $|\epsilon_1 a_1 + \epsilon_2 a_2| \leq \sqrt{3}$ . Exhiber un cas où l'égalité est atteinte.

2) Montrer la même assertion pour trois nombres.

## 10 Arctan

Résoudre l'équation:  $\arctan 2x + \arctan 3x = \frac{\pi}{4}$  d'inconnue  $x \in \mathbb{R}$ .

(Réponse:  $x = \frac{1}{6}$ . Penser à bien préciser l'injectivité de arctan sur un intervalle approprié.)

## 11 Ruse de substitution

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$ . Il existe alors  $u, v \in \mathbb{R}$  tels que pour tout  $\theta \in \mathbb{R}$ ,  
 $a \cos \theta + b \sin \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(\theta + u) = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + v)$ .

## 12 Approximation de $\frac{\pi}{4}$

Montrer que  $4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} = \frac{\pi}{4}$ .

## 13 Une somme télescopique déguisée

Soit  $x \in \mathbb{R}^*$ .

Montrer que  $\tanh x = 2 \coth x - \coth x$ . Conjecturer la somme de la série de terme  $\frac{1}{2^n} \tanh \frac{x}{2^n}$ .

Calculer la somme de  $\frac{1}{\sinh(2^n x)}$ .

(Ind:  $\frac{1}{\sinh x} = \coth \frac{x}{2} - \coth x$ .)

## 14 Somme de arctan

Montrer que  $\arctan \frac{1}{3} + \arctan \frac{1}{2} + \arctan 1 = \frac{\pi}{2}$ .

## 15 La fonction sin n'est pas rationnelle (X-ENS)

Montrer que la fonction sin n'est pas rationnelle sur aucun intervalle réel  $[a, b]$ .

On admettra le résultat suivant: une fonction rationnelle n'a qu'un nombre fini de zéro sur un intervalle non vide  $]a, b[$ .

On rappelle que le degré d'une fonction rationnelle  $\frac{P}{Q}$  est défini par  $\deg(P) - \deg(Q)$  si  $P \neq 0$  et  $-\infty$  sinon. Cette définition ne dépend pas de la représentation choisie.