

Midterm II Solution

Yidong Zhou

5/21/2021

Q1

```
plastic <- read.table("http://users.stat.ufl.edu/~rrandles/sta4210/Rclassnotes/data/textdatasets/Kutner1")
colnames(plastic) <- c('Y', 'X')
str(plastic)

## 'data.frame': 16 obs. of 2 variables:
## $ Y: num 199 205 196 200 218 220 215 223 237 234 ...
## $ X: num 16 16 16 16 24 24 24 24 32 32 ...

n <- nrow(plastic)
p <- 2
```

(a) 15 points

- $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$

Here we have only one predictor. The design matrix \mathbf{X} should be n by 2, where n is the number of observations ($n = 16$ in this case).

```
X <- cbind(rep(1, n), plastic$X) # n by 2
Y <- plastic$Y # n by 1
solve(t(X)%*%X)
```

```
##           [,1]      [,2]
## [1,]  0.675000 -0.02187500
## [2,] -0.021875  0.00078125
```

- \mathbf{b}

To make sure that \mathbf{b} is a vector, you can either use `as.vector()` or `as.numeric()`. See `class(solve(t(X)%*%X)%*%t(X)%*%Y)`.

```
b <- as.vector(solve(t(X)%*%X)%*%t(X)%*%Y)
b
```

```
## [1] 168.600000  2.034375
```

- SSE

The same for SSE, `as.vector()` or `as.numeric()` can be used.

```
H <- X%*%solve(t(X)%*%X)%*%t(X) # n by n
I <- diag(n)
SSE <- as.vector(t(Y)%*%(I-H)%*%Y)
MSE <- SSE/(n-p)
SSE
```

```
## [1] 146.425
```

(b) 10 points

$s\{b_i\}$ is the square root of $s^2\{b_i\}$, i.e., the square root of the (i, i) entry of the variance covariance matrix of \mathbf{b} . $s\{b_i, b_j\}$ is the (i, j) entry of the variance covariance matrix of \mathbf{b} .

```
s2b <- MSE*solve(t(X)%*%X)
sqrt(diag(s2b)[1])
```

```
## [1] 2.657024
```

```
sqrt(diag(s2b)[2])
```

```
## [1] 0.09039379
```

```
s2b[1, 2] # or s2b[2, 1]
```

```
## [1] -0.2287891
```

(c) 5 points

Note that $\frac{1}{n}\mathbf{J}$ is equal to $\mathbf{1}(\mathbf{1}'\mathbf{1})^{-1}\mathbf{1}'$, where $\mathbf{1}$ is the n -vector of ones.

```
J <- rep(1, n)%*%t(rep(1, n))
H-J/n
```

```
##           [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]      [,6]      [,7]      [,8]      [,9]
## [1,]  0.1125  0.1125  0.1125  0.1125  0.0375  0.0375  0.0375  0.0375 -0.0375
## [2,]  0.1125  0.1125  0.1125  0.1125  0.0375  0.0375  0.0375  0.0375 -0.0375
## [3,]  0.1125  0.1125  0.1125  0.1125  0.0375  0.0375  0.0375  0.0375 -0.0375
## [4,]  0.1125  0.1125  0.1125  0.1125  0.0375  0.0375  0.0375  0.0375 -0.0375
## [5,]  0.0375  0.0375  0.0375  0.0375  0.0125  0.0125  0.0125  0.0125 -0.0125
## [6,]  0.0375  0.0375  0.0375  0.0375  0.0125  0.0125  0.0125  0.0125 -0.0125
## [7,]  0.0375  0.0375  0.0375  0.0375  0.0125  0.0125  0.0125  0.0125 -0.0125
## [8,]  0.0375  0.0375  0.0375  0.0375  0.0125  0.0125  0.0125  0.0125 -0.0125
## [9,] -0.0375 -0.0375 -0.0375 -0.0375 -0.0125 -0.0125 -0.0125 -0.0125  0.0125
## [10,] -0.0375 -0.0375 -0.0375 -0.0375 -0.0125 -0.0125 -0.0125 -0.0125  0.0125
## [11,] -0.0375 -0.0375 -0.0375 -0.0375 -0.0125 -0.0125 -0.0125 -0.0125  0.0125
## [12,] -0.0375 -0.0375 -0.0375 -0.0375 -0.0125 -0.0125 -0.0125 -0.0125  0.0125
## [13,] -0.1125 -0.1125 -0.1125 -0.1125 -0.0375 -0.0375 -0.0375 -0.0375  0.0375
## [14,] -0.1125 -0.1125 -0.1125 -0.1125 -0.0375 -0.0375 -0.0375 -0.0375  0.0375
## [15,] -0.1125 -0.1125 -0.1125 -0.1125 -0.0375 -0.0375 -0.0375 -0.0375  0.0375
## [16,] -0.1125 -0.1125 -0.1125 -0.1125 -0.0375 -0.0375 -0.0375 -0.0375  0.0375
##           [,10]      [,11]      [,12]      [,13]      [,14]      [,15]      [,16]
## [1,] -0.0375 -0.0375 -0.0375 -0.1125 -0.1125 -0.1125 -0.1125
## [2,] -0.0375 -0.0375 -0.0375 -0.1125 -0.1125 -0.1125 -0.1125
## [3,] -0.0375 -0.0375 -0.0375 -0.1125 -0.1125 -0.1125 -0.1125
## [4,] -0.0375 -0.0375 -0.0375 -0.1125 -0.1125 -0.1125 -0.1125
## [5,] -0.0125 -0.0125 -0.0125 -0.0375 -0.0375 -0.0375 -0.0375
## [6,] -0.0125 -0.0125 -0.0125 -0.0375 -0.0375 -0.0375 -0.0375
## [7,] -0.0125 -0.0125 -0.0125 -0.0375 -0.0375 -0.0375 -0.0375
## [8,] -0.0125 -0.0125 -0.0125 -0.0375 -0.0375 -0.0375 -0.0375
## [9,]  0.0125  0.0125  0.0125  0.0375  0.0375  0.0375  0.0375
## [10,]  0.0125  0.0125  0.0125  0.0375  0.0375  0.0375  0.0375
## [11,]  0.0125  0.0125  0.0125  0.0375  0.0375  0.0375  0.0375
## [12,]  0.0125  0.0125  0.0125  0.0375  0.0375  0.0375  0.0375
## [13,]  0.0375  0.0375  0.0375  0.1125  0.1125  0.1125  0.1125
## [14,]  0.0375  0.0375  0.0375  0.1125  0.1125  0.1125  0.1125
## [15,]  0.0375  0.0375  0.0375  0.1125  0.1125  0.1125  0.1125
```

```
## [16,] 0.0375 0.0375 0.0375 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125
```

(d) 10 points

See (6.50) in the textbook.

```
alpha <- 1-0.95
c(L = b[2] - qt(1-alpha/2, n-p)*sqrt(diag(s2b)[2]),
  U = b[2] + qt(1-alpha/2, n-p)*sqrt(diag(s2b)[2]))
```

```
##          L          U
## 1.84050 2.22825
```

Q2

Code Appendix

```
plastic <- read.table("http://users.stat.ufl.edu/~rrandles/sta4210/Rclassnotes/data/textdatasets/Kutner")
colnames(plastic) <- c('Y', 'X')
str(plastic)
n <- nrow(plastic)
p <- 2
X <- cbind(rep(1, n), plastic$X) # n by 2
Y <- plastic$Y # n by 1
solve(t(X)%*%X)
b <- as.vector(solve(t(X)%*%X)%*%t(X)%*%Y)
b
H <- X%*%solve(t(X)%*%X)%*%t(X) # n by n
I <- diag(n)
SSE <- as.vector(t(Y)%*%(I-H)%*%Y)
MSE <- SSE/(n-p)
SSE
s2b <- MSE*solve(t(X)%*%X)
sqrt(diag(s2b)[1])
sqrt(diag(s2b)[2])
s2b[1, 2] # or s2b[2, 1]
J <- rep(1, n)%*%t(rep(1, n))
H-J/n
alpha <- 1-0.95
c(L = b[2] - qt(1-alpha/2, n-p)*sqrt(diag(s2b)[2]),
  U = b[2] + qt(1-alpha/2, n-p)*sqrt(diag(s2b)[2]))
```