

3

总12期

2020

全国地表水水质

月报

NATIONAL
SURFACE WATER
QUALITY REPORT



中国环境监测总站

2020年4月

目 录

一、概况	1
1 主要江河	2
2 重要湖库	3
二、主要江河	6
1 长江流域	6
2 黄河流域	8
3 珠江流域	10
4 松花江流域	13
5 淮河流域	16
6 海河流域	18
7 辽河流域	21
8 浙闽片河流	24
9 西北诸河	26
10 西南诸河	26
11 南水北调调水干线	27
12 入海河流	27
三、湖泊和水库	30
1 太湖	30
2 滇池	30
3 巢湖	31
4 重要湖泊	32
5 重要水库	33
附录	35

一、概况

“十三五”国家地表水环境质量监测网共设置1940个地表水国控评价、考核、排名断面（点位）（以下简称“国考断面”），包括：长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河和辽河七大流域，浙闽片河流、西北诸河和西南诸河，太湖、滇池和巢湖环湖河流等共978条河流的1698个断面；以及太湖、滇池、巢湖等112个（座）重点湖库的242个点位（60个湖泊173个点位，52座水库69个点位）。“十三五”国家在190条入海河流共设置195个监测断面（其中85个断面包含在国考断面中）。

本月全国共监测1934个地表水国考断面（点位），其中河流断面1693个，湖库点位241个；未监测的国考断面（点位）共有6个。共监测191个入海河流断面，未监测的入海河流断面4个（其中无断面包含在国考断面中）。未监测原因主要由于季节性断流、冰封期、交通阻断等。

本月全国地表水总体水质良好。监测的1934个国考断面（点位）中：I类水质断面占9.0%，II类占42.7%，III类占28.2%，IV类占13.4%，V类占4.7%，劣V类占2.1%。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降2.8个百分点，II类上升0.5个百分点，III类上升2.3个百分点，IV类下降0.3个百分点，V类上升0.5个百分点，劣V类下降0.1个百分点。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降0.4个百分点，II类上升4.8个百分点，III类上升1.2个百分点，IV类下降1.1个百分点，V类下降1.1个百分点，劣V类下降3.4个百分点。




图1-1 2020年3月全国地表水水质类别比例




图 1-2 2020 年 3 月全国地表水污染指标统计

1 主要江河

本月全国主要江河总体水质良好。监测的 971 条主要河流的 1693 个断面中：I 类水质断面占 9.0%，II 类占 46.2%，III 类占 27.0%，IV 类占 11.7%，V 类占 4.2%，劣 V 类占 1.9%。与上月相比，水质无明显变化，其中：I 类水质断面比例下降 3.2 个百分点，II 类上升 1.1 个百分点，III 类上升 1.6 个百分点，IV 类上升 0.1 个百分点，V 类上升 0.4 个百分点，劣 V 类持平。与去年同期相比，水质有所好转，I 类水质断面比例下降 0.8 个百分点，II 类上升 6.3 个百分点，III 类上升 1.3 个百分点，IV 类下降 1.7 个百分点，V 类下降 1.2 个百分点，劣 V 类下降 3.9 个百分点。




图 1-3 2020 年 3 月全国主要江河水系水质类别比例




图 1-4 2020 年 3 月全国主要江河水系污染指标统计

长江流域、浙闽片河流、西北诸河和西南诸河主要江河水质为优；黄河流域和珠江流域主要江河水质良好；松花江流域、淮河流域、海河流域和辽河流域主要江河为轻度污染。




图 1-5 2020 年 3 月十大流域水质类别比例

2 重要湖库

本月监测的 111 个重要湖泊和水库中：艾比湖、呼伦湖（达赉湖）、程海、乌伦古湖

和纳木错等5个湖泊为重度污染；杞麓湖、洪湖、仙女湖、兴凯湖和玉滩水库等5个湖库为中度污染；滇池、异龙湖、洪泽湖、太湖、星云湖、阳澄湖、鄱阳湖、瓦埠湖、黄大湖、洞庭湖、武昌湖、大通湖、沙湖、小兴凯湖、博斯腾湖和莲花水库等16个湖库为轻度污染；主要污染指标为总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数、氟化物和五日生化需氧量。其余湖库水质优良。

本月石门水库由于大坝施工未实施监测。




图 1-6 2020 年 3 月全国重点湖库污染指标统计

总氮单独评价时：艾比湖、杞麓湖、淀山湖、太湖、斧头湖、白洋淀、西湖、万峰湖、赛里木湖、三门峡水库、莲花水库、于桥水库、松花湖、富水水库、小浪底水库、云蒙湖、大伙房水库、鸭子荡水库、红崖山水库和隔河岩水库等20个湖库为劣V类水质；洪湖、滇池、洪泽湖、巢湖、仙女湖、阳澄湖、升金湖、骆马湖、洞庭湖、玉滩水库、磨盘山水库、龙岩滩水库、解放村水库、山美水库和密云水库等15个湖库为V类水质；呼伦湖（达赉湖）、异龙湖、鄱阳湖、瓦埠湖、南漪湖、东平湖、衡水湖、百花湖、南四湖、红枫湖、高唐湖、察尔森水库、峡山水库、崂山水库、董铺水库、瀛湖、丹江口水库、党河水库、水丰湖、黄龙滩水库和怀柔水库等21个湖库为IV类水质；其余湖库水质均满足III类水质标准。

监测营养状态指标的108个湖库中：艾比湖、杞麓湖、洪湖和呼伦湖（达赉湖）等4个湖泊为中度富营养状态；滇池、异龙湖、洪泽湖、巢湖、淀山湖、太湖、星云湖、仙女

湖、斧头湖、阳澄湖、升金湖、高邮湖、玉滩水库、鹤地水库和三门峡水库等15个湖库为轻度富营养状态。

二、主要江河

1 长江流域

长江流域主要江河总体水质为优，监测的510个断面中：I类水质断面占7.8%，II类占62.5%，III类占22.7%，IV类占5.3%，V类占0.6%，劣V类占1.0%。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降8.9个百分点，II类上升4.1个百分点，III类上升3.9个百分点，IV类上升0.2个百分点，V类下降0.4个百分点，劣V类上升1.0个百分点。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降2.1个百分点，II类上升10.6个百分点，III类下降2.2个百分点，IV类下降2.9个百分点，V类下降3.2个百分点，劣V类下降0.4个百分点。




图 2-1 长江流域水体污染指标统计

1.1 长江流域

1.1.1 干流

长江干流水质为优，监测的59个断面中：I类水质断面占10.2%，II类占78.0%，III类占11.9%，无IV类、V类和劣V类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降3.4个百分点，II类下降1.7个百分点，III类上升5.1个百分点。

与去年同期相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降1.7个百分点，II类下降3.4个百分点，III类上升6.8个百分点，IV类下降1.7个百分点。




图2-2 长江干流高锰酸盐指数、氨氮沿程变化

1.1.2 支流

长江水系主要支流总体水质为优，监测的256条支流的451个断面中：I类水质断面占7.5%，II类占60.5%，III类占24.2%，IV类占6.0%，V类占0.7%，劣V类占1.1%。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降9.6个百分点，II类上升4.8个百分点，III类上升3.8个百分点，IV类上升0.2个百分点，V类下降0.4个百分点，劣V类上升1.1个百分点。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降2.2个百分点，II类上升12.5个百分点，III类下降3.3个百分点，IV类下降3.0个百分点，V类下降3.6个百分点，劣V类下降0.5个百分点。

其中八大支流水质状况为：湘江、雅砻江、岷江、汉江、沅江、赣江、嘉陵江和乌江水质均为优。

1.2 三峡库区

三峡库区水质为优，监测的10个断面中：II类水质断面占90.0%，III类占10.0%，无I类、IV类、V类和劣V类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：II类水质断面比例下降10.0个百分点，III类上升10.0个百分点。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：II类水质断面比例下降10.0个百分点，III类上升10.0个百分点。

1.3 省界断面

长江流域省界断面水质为优，监测的60个断面中：I类水质断面占16.7%，II类占63.3%，III类占16.7%，IV类占3.3%，无V类和劣V类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降16.6个百分点，II类上升13.3个百分点，III类上升3.4个百分点，IV类上升1.6个百分点，V类下降1.7个百分点。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降6.6个百分点，II类上升6.6个百分点，III类和IV类持平。

2 黄河流域

黄河流域主要江河总体水质良好，监测的137个断面中：I类水质断面占12.4%，II类占41.6%，III类占24.1%，IV类占12.4%，V类占5.1%，劣V类占4.4%。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降0.7个百分点，II类下降2.9个百分点，III类上升2.2个百分点，IV类下降1.5个百分点，V类上升1.5个百分点，劣V类上升1.5个百分点。与去年同期相比，水质明显好转，其中：I类水质断面比例上升4.1个百分点，II类上升13.8个百分点，III类上升2.3个百分点，IV类下降4.9个百分点，V类下降6.9个百分点，劣V类下降8.4个百分点。




图2-3 黄河流域水体污染指标统计

2.1 黄河水系

2.1.1 干流

黄河干流水质为优，监测的31个断面中：I类水质断面占22.6%，II类占64.5%，III类占9.7%，IV类占3.2%，无V类和劣V类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降3.2个百分点，II类上升3.2个百分点，III类和IV类持平。与去年同期相比，水质有所好转，其中：I类水质断面比例上升5.4个百分点，II类上升9.3个百分点，III类下降4.1个百分点，IV类下降0.2个百分点，V类下降10.3个百分点。




图2-4 黄河干流高锰酸盐指数、氨氮沿程变化

2.1.2 支流

黄河水系主要支流总体为轻度污染，主要污染指标为化学需氧量、氨氮和五日生化需氧量。监测的63条支流的106个断面中：I类水质断面占9.4%，II类占34.9%，III类占28.3%，IV类占15.1%，V类占6.6%，劣V类占5.7%。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例持平，II类下降4.7个百分点，III类上升2.8个百分点，IV类下降1.9个百分点，V类上升1.9个百分点，劣V类上升1.9个百分点。与去年同期相比，水质明显好转，其中：I类水质断面比例上升3.6个百分点，II类上升14.7个百分点，III类上升4.3个百分点，IV类下降6.1个百分点，V类下降5.9个百分点，劣V类下降10.6个百分点。

其中：石川河、清涧河、浑河和三川河为重度污染；浍河和磁窑河为中度污染；汾河、瀛汶河、金堤河、渭河、涑水河、湫水河、蔚汾河、都斯兔河、屈产河、马莲

河、文峪河、窟野河、延河、清水河和总排干为轻度污染；其余河流水质优良。

渭河为轻度污染，监测的10个断面中：Ⅱ类水质断面占30.0%，Ⅲ类占40.0%，Ⅳ类占20.0%，Ⅴ类占10.0%，无Ⅰ类和劣Ⅴ类水质断面。与上月相比，水质明显下降，其中：Ⅱ类水质断面比例下降10.0个百分点，Ⅲ类下降20.0个百分点，Ⅳ类上升20.0个百分点，Ⅴ类上升10个百分点。与去年同期相比，水质明显好转，其中：Ⅱ类水质断面比例上升30.0个百分点，Ⅲ类上升30.0个百分点，Ⅳ类下降60.0个百分点，Ⅴ类持平。

2.2 省界断面

黄河流域省界断面为轻度污染，监测的39个断面中：Ⅰ类水质断面占15.4%，Ⅱ类占41.0%，Ⅲ类占12.8%，Ⅳ类占23.1%，Ⅴ类占2.6%，劣Ⅴ类占5.1%。与上月相比，水质有所下降，其中：Ⅰ类水质断面比例上升7.7个百分点，Ⅱ类下降7.7个百分点，Ⅲ类下降7.7个百分点，Ⅳ类上升5.2个百分点，Ⅴ类持平，劣Ⅴ类上升2.5个百分点。与去年同期相比，水质有所好转，其中：Ⅰ类水质断面比例上升10.1个百分点，Ⅱ类上升9.4个百分点，Ⅲ类下降8.3个百分点，Ⅳ类上升7.3个百分点，Ⅴ类下降10.6个百分点，劣Ⅴ类下降8.1个百分点。

污染较重的省界断面是：晋-晋、陕三川河两河口桥、汾河庙前村断面。

3 珠江流域

珠江流域主要江河总体水质良好。监测的165个断面中：Ⅰ类水质断面占13.3%，Ⅱ类占60.6%，Ⅲ类占13.3%，Ⅳ类占8.5%，Ⅴ类占4.2%，无劣Ⅴ类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：Ⅰ类水质断面比例持平，Ⅱ类上升1.2个百分点，Ⅲ类下降3.1个百分点，Ⅳ类上升0.6个百分点，Ⅴ类上升1.8个百分点，劣Ⅴ类下降0.6个百分点。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：Ⅰ类水质断面比例上升4.2个百分点，Ⅱ类上升10.3个百分点，Ⅲ类下降10.9个百分点，Ⅳ类上升0.6个百分点，Ⅴ类上升1.2个百分点，劣Ⅴ类下降5.5个百分点。




图 2-5 珠江流域主要江河水体污染指标统计

3.1 珠江水系

3.1.1 干流

珠江干流水质为优。监测的50个断面中：I类水质断面占10.0%，II类占70.0%，III类占12.0%，IV类占4.0%，V类占4.0%，无劣V类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例上升6.0个百分点，II类下降10.0个百分点，III类上升4.0个百分点，IV类持平，V类上升2.0个百分点，劣V类下降2.0个百分点。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例上升6.0个百分点，II类上升14.0个百分点，III类下降16.0个百分点，IV类下降8.0个百分点，V类上升4.0个百分点。




图 2-6 珠江干流高锰酸盐指数、氨氮沿程变化

3.1.2 支流

珠江水系主要支流水质良好。监测的69条支流的101个断面中：I类水质断面占15.8%，II类占52.5%，III类占15.8%，IV类占10.9%，V类占5.0%，无劣V类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降4.0个百分点，II类上升7.9个百分点，III类下降6.0个百分点，IV类持平，V类上升2.0个百分点。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例上升2.9个百分点，II类上升7.9个百分点，III类下降7.0个百分点，IV类上升4.0个百分点，V类上升1.0个百分点，劣V类下降8.9个百分点。

其中：钦江、练江、榕江北河和黄江河为中度污染；东莞运河、梅江、榕江南河、小东江、淡水河、茅洲河、深圳河、武利江、梅溪河、曲江、石马河和九洲江为轻度污染；其余河流水质优良。

3.2 海南岛内河流

海南岛内的8条河流中：三亚河为轻度污染；文昌河、昌化江、南渡江、万泉河、石碌河、陵水河和大边河水质为优。

3.3 省界断面

珠江流域省界断面总体水质为优。监测的17个断面中：I类水质断面占23.5%，II类占58.8%，III类占17.6%，无IV类、V类和劣V类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降11.8个百分点，II类上升11.7个百分点，III类持平。与

去年同期相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例上升11.7个百分点，II类下降17.7个百分点，III类上升5.8个百分点。

4 松花江流域

松花江流域主要江河总体为轻度污染，主要污染指标为化学需氧量、氨氮、高锰酸盐指数、总磷和五日生化需氧量。监测的107个断面中：I类水质断面占3.7%，II类占20.6%，III类占43.0%，IV类占24.3%，V类占7.5%，劣V类占0.9%。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例上升2.8个百分点，II类上升1.9个百分点，III类下降7.5个百分点，IV类上升4.7个百分点，V类下降0.9个百分点，劣V类下降1.0个百分点。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降7.6个百分点，II类下降2.0个百分点，III类上升12.8个百分点，IV类上升5.4个百分点，V类下降3.8个百分点，劣V类下降4.8个百分点。




图2-7 松花江流域水体污染指标

4.1 松花江水系

4.1.1 干流

松花江干流水质为优。监测的17个断面中：II类水质断面占35.3%，III类占58.8%，IV类占5.9%，无I类、V类和劣V类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：

II类水质断面比例上升5.9个百分点，III类下降11.8个百分点，IV类上升5.9个百分点。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：II类水质断面比例上升21.0个百分点，III类下降12.6个百分点，IV类下降8.4个百分点。




图2-8 松花江干流高锰酸盐指数、氨氮沿程变化

4.1.2 支流

松花江水系主要支流总体为轻度污染，主要污染指标为氨氮、化学需氧量和高锰酸盐指数。监测的55个断面中：I类水质断面占5.5%，II类占20.0%，III类占34.5%，IV类占27.3%，V类占10.9%，劣V类占1.8%。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例上升3.7个百分点，II类持平，III类下降9.1个百分点，IV类上升9.1个百分点，V类下降1.8个百分点，劣V类下降1.8个百分点。与去年同期相比，水质有所好转，其中：I类水质断面比例下降14.5个百分点，II类上升4.0个百分点，III类上升10.5个百分点，IV类上升15.3个百分点，V类下降5.1个百分点，劣V类下降10.2个百分点。

其中：细鳞河和梧桐河为中度污染；双阳河、拉林河、蛟河、安邦河、乌裕尔河、倭肯河、洮儿河、饮马河、辉发河和阿什河为轻度污染；其余河流水质优良。

4.2 其它水系

4.2.1 黑龙江

黑龙江水系总体为轻度污染，主要污染指标为高锰酸盐指数、化学需氧量和总磷。监测的18个断面中：I类水质断面占5.6%，II类占22.2%，III类占33.3%，IV类占33.3%，V类占5.6%，无劣V类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类

水质断面比例上升5.6个百分点，II类上升5.5个百分点，III类下降16.7个百分点，IV类上升5.5个百分点，V类持平。与去年同期相比，水质明显下降，其中：I类水质断面比例下降2.1个百分点，II类下降16.3个百分点，III类上升2.5个百分点，IV类上升10.2个百分点，V类上升5.6个百分点。

其中：海拉尔河、黑龙江和额尔古纳河为轻度污染；其余河流水质优良。

4.2.2 乌苏里江

乌苏里江水系总体良好。监测的9个断面中：II类水质断面占11.1%，III类占66.7%，IV类占11.1%，V类占11.1%，无I类和劣V类水质断面。与上月相比，水质有所好转，其中：II类水质断面比例持平，III类上升11.1个百分点，IV类下降11.1个百分点，V类持平。与去年同期相比，水质明显好转，其中：II类水质断面比例上升11.1个百分点，III类上升66.7个百分点，IV类上升11.1个百分点，V类下降88.9个百分点。

其中：穆棱河和挠力河水质良好；松阿察河和乌苏里江水质为优。

4.2.3 图们江

图们江为轻度污染，主要污染指标为氨氮、高锰酸盐指数和化学需氧量。监测的7个断面中：III类水质断面占57.1%，IV类占42.9%，无I类、II类、V类和劣V类水质断面。与上月相比，水质有所好转，其中：III类水质断面比例上升14.2个百分点，IV类下降14.2个百分点。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：II类水质断面比例下降33.3个百分点，III类上升40.4个百分点，IV类上升9.6个百分点，V类下降16.7个百分点。

4.2.4 绥芬河

绥芬河水质良好。三岔口断面为III类水质，与上月相比，水质无明显变化。与去年同期相比，水质有所好转。

4.3 省界断面

松花江流域省界断面水质良好。监测的23个断面中：I类水质断面占13.0%，II类占26.1%，III类占43.5%，IV类占4.3%，V类占13.0%，无劣V类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例上升8.7个百分点，II类下降8.7个百分点，III类上升4.4个百分点，IV类下降8.7个百分点，V类上升4.3个百分点。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降22.7个百分点，II类上升4.7个百分点，III类上升14.9个百分点，IV类下降2.8个百分点，V类上升5.9个百分点。

5 淮河流域

淮河流域主要江河总体为轻度污染，主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氟化物和氨氮。监测的180个断面中：I类水质断面占2.2%，II类占15.6%，III类占55.0%，IV类占22.8%，V类占3.3%，劣V类占1.1%。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降0.6个百分点，II类下降6.1个百分点，III类上升5.0个百分点，IV类上升3.9个百分点，V类下降0.6个百分点，劣V类下降1.7个百分点。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降0.1个百分点，II类下降1.4个百分点，III类上升8.4个百分点，IV类下降1.6个百分点，V类下降4.7个百分点，劣V类下降0.6个百分点。




图 2-9 淮河流域水体污染指标统计

5.1 淮河水系

5.1.1 干流

淮河干流水质良好。监测的10个断面均为III类水质。与上月相比，水质无明显变化，其中：II类水质断面比例下降50.0个百分点，III类上升50.0个百分点。与去年同期相比，水质有所好转，其中：II类水质断面比例下降10.0个百分点，III类上升30.0个百分点，IV类下降20.0个百分点。




图 2-10 淮河干流高锰酸盐指数、氨氮沿程变化

5.1.2 支流

淮河水系主要支流总体为轻度污染，主要污染指标为氟化物、化学需氧量和高锰酸盐指数。监测的66条支流的101个断面中：I类水质断面占4.0%，II类占15.8%，III类占51.5%，IV类占26.7%，V类占1.0%，劣V类占1.0%。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降1.0个百分点，II类下降8.0个百分点，III类上升5.0个百分点，IV类上升5.9个百分点，V类持平，劣V类下降2.0个百分点。与去年同期相比，水质有所好转，其中：I类水质断面比例上升1.0个百分点，II类下降2.2个百分点，III类上升12.5个百分点，IV类下降4.3个百分点，V类下降7.0个百分点，劣V类持平。

其中：澥河为重度污染；涡河、黑茨河、如泰运河、大沙河、白塔河、浔河、沱河、运料河、怀洪新河、浉河、包河、浍河、淠河和竹竿河为轻度污染；其余河流水质优良。

5.2 沂沭泗水系

沂沭泗水系总体水质良好。监测的38条支流的48个断面中：II类水质断面占18.8%，III类占70.8%，IV类占8.3%，V类占2.1%，无I类和劣V类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：II类水质断面比例上升6.3个百分点，III类下降2.1个百分点，IV类下降6.3个百分点，V类上升2.1个百分点。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：II类水质断面比例下降0.3个百分点，III类上升0.6个百分点，IV类下降2.3个百分点，V类上升2.1个百分点。

5.3 山东半岛独流入海

山东半岛独流入海河流总体为轻度污染，主要污染指标为高锰酸盐指数、化学需氧量和五日生化需氧量。监测的21个断面中：Ⅱ类水质断面占14.3%，Ⅲ类占14.3%，Ⅳ类占47.6%，Ⅴ类占19.0%，劣Ⅴ类占4.8%，无Ⅰ类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：Ⅱ类水质断面比例下降4.7个百分点，Ⅲ类持平，Ⅳ类上升19.0个百分点，Ⅴ类下降9.6个百分点，劣Ⅴ类下降4.7个百分点。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：Ⅰ类水质断面比例下降5.3个百分点，Ⅱ类上升3.8个百分点，Ⅲ类下降1.5个百分点，Ⅳ类上升21.3个百分点，Ⅴ类下降12.6个百分点，劣Ⅴ类下降5.7个百分点。

5.4 省界断面

淮河流域省界断面总体为轻度污染，主要污染指标为化学需氧量、氟化物和高锰酸盐指数。监测的30个断面中：Ⅰ类水质断面占3.3%，Ⅱ类占6.7%，Ⅲ类占60.0%，Ⅳ类占30.0%，无Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：Ⅰ类水质断面比例持平，Ⅱ类下降3.3个百分点，Ⅲ类持平，Ⅳ类上升3.3个百分点。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：Ⅰ类水质断面比例上升3.3个百分点，Ⅱ类下降7.6个百分点，Ⅲ类上升13.6个百分点，Ⅳ类下降2.1个百分点，Ⅴ类下降7.1个百分点。

6 海河流域

海河流域主要江河总体为轻度污染，主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮和氟化物。监测的160个断面中：Ⅰ类水质断面占13.8%，Ⅱ类占30.0%，Ⅲ类占17.5%，Ⅳ类占20.6%，Ⅴ类占11.9%，劣Ⅴ类占6.2%。与上月相比，水质无明显变化，其中：Ⅰ类水质断面比例上升1.9个百分点，Ⅱ类上升1.2个百分点，Ⅲ类下降1.3个百分点，Ⅳ类下降2.5个百分点，Ⅴ类上升1.9个百分点，劣Ⅴ类下降1.3个百分点。与去年同期相比，水质明显好转，其中：Ⅰ类水质断面比例上升6.1个百分点，Ⅱ类上升10.8个百分点，Ⅲ类下降4.9个百分点，Ⅳ类下降2.5个百分点，Ⅴ类上升4.2个百分点，劣Ⅴ类下降13.7个百分点。




图 2-11 海河流域水体污染指标统计

6.1 海河水系

6.1.1 干流

海河干流为轻度污染，主要污染指标为高锰酸盐指数和化学需氧量。监测的2个断面中，三岔口断面为Ⅱ类水质，海河大闸断面为Ⅳ类。与上月相比，海河大闸断面水质有所好转，三岔口断面水质无明显变化；与去年同期相比，三岔口和海河大闸断面水质均有所好转。

6.1.2 支流

海河水系主要支流总体为轻度污染，主要污染指标为化学需氧量、五日生化需氧量和高锰酸盐指数。监测的82条支流的124个断面中：Ⅰ类水质断面占16.9%，Ⅱ类占23.4%，Ⅲ类占16.9%，Ⅳ类占23.4%，Ⅴ类占13.7%，劣Ⅴ类占5.6%。与上月相比，水质无明显变化，其中：Ⅰ类水质断面比例上升3.2个百分点，Ⅱ类下降2.4个百分点，Ⅲ类上升1.6个百分点，Ⅳ类下降3.2个百分点，Ⅴ类上升4.0个百分点，劣Ⅴ类下降3.3个百分点。与去年同期相比，水质明显好转，其中：Ⅰ类水质断面比例上升8.7个百分点，Ⅱ类上升9.5个百分点，Ⅲ类下降5.2个百分点，Ⅳ类上升0.4个百分点，Ⅴ类上升5.5个百分点，劣Ⅴ类下降19.0个百分点。

其中：大清河为重度污染；独流减河、蓟运河、潮白河、漳卫新河和子牙新河为中度污染；洪泥河、潮白新河、卫运河、桑干河、北运河和永定新河为轻度污染；其余主

要河流水质优良。

6.2 其它水系

6.2.1 漠河水系

漠河水系总体水质为优，监测的7条河流17个断面中：I类水质断面占5.9%，II类占64.7%，III类占23.5%，劣V类占5.9%，无IV类和V类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：II类水质断面比例上升11.8个百分点，III类下降5.9个百分点，V类下降5.9个百分点，I类和劣V类持平。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降6.6个百分点，II类上升14.7个百分点，III类下降1.5个百分点，IV类下降6.2个百分点，V类下降6.2个百分点，劣V类上升5.9个百分点。

6.2.2 徒骇马颊河水系

徒骇马颊河水系总体为轻度污染，主要污染指标为化学需氧量、氟化物和高锰酸盐指数。监测的5条河流11个断面中：II类水质断面占27.3%，III类占27.3%，IV类占18.2%，V类占18.2%，劣V类占9.1%，无I类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降9.1个百分点，II类上升18.2个百分点，III类下降9.1个百分点，IV类下降9.1个百分点，V类持平，劣V类上升9.1个百分点。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例持平，II类上升7.3个百分点，III类下降2.7个百分点，IV类下降31.8个百分点，V类上升18.2个百分点，劣V类上升9.1个百分点。

6.2.3 冀东诸河水系

冀东诸河水系总体为轻度污染，主要污染指标为氟化物、高锰酸盐指数和化学需氧量。监测的6条河流6个断面中：II类水质断面占66.7%，IV类占16.7%，劣V类占16.7%，无I类、III类和V类水质断面。与上月相比，水质明显下降，其中：II类水质断面比例上升16.7个百分点，III类下降33.3个百分点，劣V类上升16.7个百分点，I类、IV类和V类持平。与去年同期相比，水质有所好转，其中：II类水质断面比例上升16.7个百分点，IV类下降16.6个百分点，I类、III类、V类和劣V类均持平。

6.3 省界断面

海河流域省界断面为轻度污染，主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和五日生化需氧量。监测的47个断面中：I类水质断面占17.0%，II类占17.0%，III类占12.8%，IV类占29.8%，V类占14.9%，劣V类占8.5%。与上月相比，水质无明显变化，

其中：I类水质断面比例上升2.1个百分点，II类下降4.3个百分点，III类和IV类持平，V类上升6.4个百分点，劣V类下降4.3个百分点。与去年同期相比，水质明显好转，其中：I类水质断面比例上升4.0个百分点，II类上升8.3个百分点，III类下降4.6个百分点，IV类上升1.5个百分点，V类上升8.4个百分点，劣V类下降17.6个百分点。

污染较重的省界断面是：蒙-冀滦河大河口断面；京、冀潮白河吴村断面；京-冀龙凤减河老夏安公路断面；冀-津大清河台头断面。

7 辽河流域

辽河流域主要江河总体为轻度污染，主要污染指标为化学需氧量、氨氮、高锰酸盐指数、五日生化需氧量和总磷。监测的103个断面中：I类水质断面占7.8%，II类占32.0%，III类占17.5%，IV类占21.4%，V类占17.5%，劣V类占3.9%。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降1.9个百分点，II类上升0.9个百分点，III类上升2.0个百分点，IV类下降2.9个百分点，V类上升4.9个百分点，劣V类下降2.9个百分点。与去年同期相比，水质有所好转，其中：I类水质断面比例下降0.2个百分点，II类下降1.3个百分点，III类上升6.8个百分点，IV类上升1.4个百分点，V类上升4.2个百分点，劣V类下降10.8个百分点。




图2-12 辽河流域水体污染指标统计

7.1 辽河水系

7.1.1 干流

辽河干流为轻度污染，主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和氨氮。监测的14个断面中：II类水质断面占7.1%，III类占28.6%，IV类占42.9%，V类占21.4%，无I类和劣V类水质断面。与上月相比，水质明显好转，其中：II类水质断面比例持平，III类上升28.6个百分点，IV类下降14.2个百分点，V类下降7.2个百分点，劣V类下降7.1个百分点。与去年同期相比，水质明显好转，其中：II类水质断面比例下降21.5个百分点，III类上升28.6个百分点，IV类上升14.3个百分点，V类下降7.2个百分点，劣V类下降14.3个百分点。




图2-13 辽河干流高锰酸盐指数、氨氮沿程变化

7.1.2 支流

辽河水系主要支流总体为轻度污染，主要污染指标为化学需氧量、氨氮和高锰酸盐指数。监测的14条河流的19个断面中：II类水质断面占5.3%，III类占26.3%，IV类占42.1%，V类占26.3%，无I类和劣V类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：II类水质断面比例下降21.0个百分点，III类上升21.0个百分点，IV类下降10.5个百分点，V类上升15.8个百分点，劣V类下降5.3个百分点。与去年同期相比，水质明显好转，其中：II类水质断面比例上升5.3个百分点，III类上升6.3个百分点，IV

类上升2.1个百分点，V类上升6.3个百分点，劣V类下降20.0个百分点。

其中：柴河、拉马河、条子河、亮子河和寇河为中度污染；庞家河、招苏台河、绕阳河、柳河和乌尔吉沐沦河为轻度污染；其余河流水质优良。

7.2 其它水系

7.2.1 大辽河

大辽河水系总体为轻度污染，主要污染指标为氨氮、化学需氧量和五日生化需氧量。监测的15条河流的28个断面中：I类水质断面占7.1%，II类占28.6%，III类占10.7%，IV类占14.3%，V类占28.6%，劣V类占10.7%。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例上升3.5个百分点，II类持平，III类下降3.6个百分点，IV类持平，V类上升7.2个百分点，劣V类下降7.2个百分点。与去年同期相比，水质明显好转，其中：I类水质断面比例下降2.9个百分点，II类上升3.6个百分点，III类上升5.7个百分点，IV类上升4.3个百分点，V类上升13.6个百分点，劣V类下降24.3个百分点。

其中：细河和北沙河为重度污染；大辽河为中度污染；太子河、浑河和蒲河为轻度污染；其余河流水质优良。

7.2.2 大凌河

大凌河水系总体为轻度污染，主要污染指标为总磷、高锰酸盐指数和氨氮。监测的5条河流的11个断面中：II类水质断面占54.5%，III类占18.2%，IV类占9.1%，V类占18.2%，无I类和劣V类水质断面。与上月相比，水质明显好转，其中：II类水质断面比例上升27.2个百分点，III类下降36.3个百分点，IV类持平，V类上升9.1个百分点。与去年同期相比，水质明显好转，其中：II类水质断面比例上升34.5个百分点，III类下降11.8个百分点，IV类下降30.9个百分点，V类上升8.2个百分点。

其中：大凌河西支为轻度污染；西细河为轻度污染；其余河流水质优良。

7.2.3 鸭绿江

鸭绿江水系总体水质为优，监测的4条河流的13个断面中：I类水质断面占15.4%，II类占76.9%，III类占7.7%，无IV类、V类和劣V类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降23.1个百分点，II类上升15.4个百分点，III类上升7.7个百分点。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例上升5.4个百分点，II类下降13.1个百分点，III类上升7.7个百分点。

其中：所有河流水质均为优。

7.3 省界断面

辽河流域省界断面为轻度污染，主要污染指标为化学需氧量、氟化物和高锰酸盐指数。监测的10个断面中：I类水质断面占10.0%，II类占30.0%，IV类占40.0%，V类占20.0%，无III类和劣V类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，I类水质断面比例下降10.0个百分点，II类上升10.0个百分点，IV类和V类持平。与去年同期相比，水质有所下降，其中：I类水质断面比例上升10.0个百分点，II类下降10.0个百分点，III类下降20.0个百分点，IV类上升20.0个百分点，V类持平。

8 漳闽片河流

浙闽片主要江河总体水质为优，监测的87条支流的125个断面中：I类水质断面占3.2%，II类占57.6%，III类占31.2%，IV类占6.4%，V类占0.8%，劣V类占0.8%。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降4.8个百分点，II类上升2.4个百分点，III类上升4.8个百分点，IV类下降3.2个百分点，V类持平，劣V类上升0.8个百分点。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降4.0个百分点，II类上升2.4个百分点，III类上升7.2个百分点，IV类下降4.0个百分点，V类持平，劣V类下降1.6个百分点。




图 2-14 浙闽片河流污染指标统计

8.1 安徽省境内河流

安徽省境内河流水质总体为优，监测的5条支流的5个断面中：Ⅱ类水质断面占80.0%，Ⅲ类占20.0%，无Ⅰ类、Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：Ⅰ类水质断面比例下降20.0个百分点，Ⅱ类上升20.0个百分点，Ⅲ类持平。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：Ⅰ类水质断面比例下降20.0个百分点，Ⅱ类持平，Ⅲ类上升20.0个百分点。

其中：练江水质良好；新安江、横江、率水和扬之河水质为优。

8.2 浙江省境内河流

浙江省境内河流水质总体为优，监测的49条支流的68个断面中：Ⅰ类水质断面占4.4%，Ⅱ类64.7%，Ⅲ类占25.0%，Ⅳ类占4.4%，劣Ⅴ类占1.5%，无Ⅴ类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：Ⅰ类水质断面比例下降8.8个百分点，Ⅱ类上升5.9个百分点，Ⅲ类上升2.9个百分点，Ⅳ类下降1.5个百分点，劣Ⅴ类上升1.5个百分点。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：Ⅰ类水质断面比例下降7.4个百分点，Ⅱ类上升10.3个百分点，Ⅲ类上升1.5个百分点，Ⅳ类下降3.0个百分点，劣Ⅴ类下降1.4个百分点。

其中：虹桥塘河为重度污染；椒江、永康江和江厦大港为轻度污染；其余河流水质优良。

8.3 福建省境内河流

福建省境内河流总体水质良好，监测的34条支流的52个断面中：Ⅰ类水质断面占1.9%，Ⅱ类占46.2%，Ⅲ类占40.4%，Ⅳ类占9.6%，Ⅴ类占1.9%，无劣Ⅴ类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：Ⅰ类水质断面比例上升1.9个百分点，Ⅱ类下降3.8个百分点，Ⅲ类上升7.7个百分点，Ⅳ类下降5.8个百分点，Ⅴ类持平。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：Ⅰ类水质断面比例上升1.9个百分点，Ⅱ类下降7.6个百分点，Ⅲ类上升13.5个百分点，Ⅳ类下降5.8个百分点，Ⅴ类持平，劣Ⅴ类下降1.9个百分点。

其中：龙江为中度污染；晋江、花山溪、南溪和雁石溪为轻度污染；其余河流水质优良。

8.4 省界断面

浙闽片省界断面水质为优，监测的2个断面中，街口和松溪岩下断面为Ⅱ类水质。

与上月和去年同期相比，街口和松溪岩下水质均无明显变化。

9 西北诸河

西北诸河主要江河总体水质为优，监测的41条支流的62个断面中：I类水质断面占40.3%，II类占51.6%，III类占6.5%，IV类占1.6%，无V类和劣V类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例上升1.6个百分点，II类下降1.6个百分点，III类和IV类持平。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降7.1个百分点，II类上升14.8个百分点，III类下降0.5个百分点，IV类下降0.2个百分点，V类下降3.5个百分点，劣V类下降3.5个百分点。

9.1 主要水系

锡林河为轻度污染，其余河流水质优良。

9.2 省界断面

西北诸河省界断面水质为优。与上月相比，王家庄断面水质有所好转，黄藏寺断面水质无明显变化；与去年同期相比，两个断面水质均无明显变化。

10 西南诸河

西南诸河域主要江河总体水质为优，监测的41条支流的63个断面中：I类水质断面占4.8%，II类占69.8%，III类占19.0%，IV类占1.6%，劣V类占4.8%，无V类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降12.7个百分点，II类上升7.9个百分点，III类上升3.1个百分点，IV类上升1.6个百分点，V类下降4.8个百分点，劣V类上升4.8个百分点。与去年同期同比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降17.8个百分点，II类上升8.5个百分点，III类上升9.3个百分点，IV类持平，V类下降1.6个百分点，劣V类上升1.6个百分点。

10.1 主要水系

思茅河、西洱河和芒市大河为重度污染；星宿江为轻度污染；其余河流水质为优良。

10.2 省界断面

西南诸河省界断面水质为优。与上月和去年同期相比，两个断面水质均无明显变化。

11 南水北调调水干线

11.1 南水北调东线调水干线

南水北调东线调水干线总体水质为优，监测的16个监测断面（点位）中，Ⅱ类水质断面占31.2%，Ⅲ类占68.8%，无Ⅰ类、Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与上月相比，水质有所好转，其中：Ⅱ类水质断面比例上升18.8个百分点，Ⅲ类下降6.3个百分点，Ⅳ类下降12.5个百分点。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：Ⅱ类水质断面比例上升25.0个百分点，Ⅲ类下降25.0个百分点。

11.2 南水北调中线调水干线

南水北调中线调水干线总体水质为优，监测的6个监测断面（点位）中均为Ⅱ类水质。与上月相比，水质无明显变化，其中：Ⅰ类水质断面比例下降16.7个百分点，Ⅱ类上升33.3个百分点，Ⅲ类下降16.7个百分点。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：Ⅰ类水质断面比例下降16.7个百分点，Ⅱ类上升16.7个百分点。

12 入海河流

入海河流总体为轻度污染，主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮和总磷。监测的186条支流的191个断面中：Ⅰ类水质断面比例占1.0%，Ⅱ类占25.7%，Ⅲ类占39.3%，Ⅳ类占19.4%，Ⅴ类占10.5%，劣Ⅴ类占4.2%。与上月相比，水质无明显变化，其中：Ⅰ类水质断面比例上升0.5个百分点，Ⅱ类下降2.0个百分点，Ⅲ类上升5.3个百分点，Ⅳ类下降2.1个百分点，Ⅴ类下降1.5个百分点，劣Ⅴ类持平。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：Ⅰ类水质断面比例上升1.0个百分点，Ⅱ类上升4.9个百分点，Ⅲ类上升9.5个百分点，Ⅳ类下降4.8个百分点，Ⅴ类下降0.7个百分点，劣Ⅴ类下降9.8个百分点。




图2-15 入海河流污染指标统计

12.1 渤海

渤海入海河流总体为轻度污染，主要污染指标为高锰酸盐指数、化学需氧量和五日生化需氧量。监测的46条支流的46个断面中：II类水质断面占23.9%，III类占17.4%，IV类占26.1%，V类占23.9%，劣V类占8.7%，无I类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例下降2.2个百分点，II类上升10.9个百分点，III类下降8.7个百分点，IV类上升6.5个百分点，V类下降4.4个百分点，劣V类下降2.2个百分点。与去年同期相比，水质有所好转，其中：II类水质断面比例上升11.1个百分点，III类下降0.5个百分点，IV类上升3.0个百分点，V类上升8.5个百分点，劣V类下降22.1个百分点。

12.2 黄海

黄海入海河流总体为轻度污染，主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和五日生化需氧量。监测的50条支流的50个断面中：I类水质断面占2.0%，II类占18.0%，III类占50.0%，IV类占18.0%，V类占8.0%，劣V类占4.0%。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例上升2.0个百分点，II类下降8.0个百分点，III类上升8.0个百分点，IV类下降6.0个百分点，V类上升4.0个百分点，劣V类持平。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例上升2.0个百分点，II类上升8.9个百分点，III类上升11.4个百分点，IV类下降9.3个百分点，V类下降7.9个百分点，劣

V类下降5.1个百分点。

12.3 东海

东海入海河流总体水质良好。监测的25条支流的25个断面中：II类水质断面占28.0%，III类占60.0%，IV类占8.0%，V类占4.0%，无I类和劣V类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：II类水质断面比例下降4.0个百分点，III类上升16.0个百分点，IV类下降8.0个百分点，V类下降4.0个百分点。与去年同期相比，水质有所好转，其中：II类水质断面比例持平，III类上升28.0个百分点，IV类下降24.0个百分点，V类持平，劣V类下降4.0个百分点。

12.4 南海

南海入海河流总体为轻度污染，主要污染指标为氨氮、五日生化需氧量和高锰酸盐指数。监测的65条支流的70个断面中：I类水质断面占1.4%，II类占31.4%，III类占38.6%，IV类占20.0%，V类占5.7%，劣V类占2.9%。与上月相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例上升1.4个百分点，II类下降5.7个百分点，III类上升8.6个百分点，IV类下降2.9个百分点，V类下降2.9个百分点，劣V类上升1.5个百分点。与去年同期相比，水质无明显变化，其中：I类水质断面比例上升1.4个百分点，II类上升1.4个百分点，III类上升8.6个百分点，IV类持平，V类下降2.9个百分点，劣V类下降8.5个百分点。

三、湖泊和水库

1 太湖

1.1 湖体

太湖湖体共监测 17 个点位。全湖整体为轻度污染，主要污染指标为总磷。其中，西部沿岸区为中度污染，湖心区为轻度污染，北部沿岸区和东部沿岸区水质良好。与上月相比，西部沿岸区水质有所下降，北部沿岸区和东部沿岸区水质有所好转，湖心区和全湖整体无明显变化；与去年同期相比，东部沿岸区水质有所好转，北部沿岸区、西部沿岸区、湖心区和全湖整体水质无明显变化。

总氮单独评价时：全湖整体为劣 V 类水质。其中，东部沿岸区为 IV 类水质，北部沿岸区为 V 类水质，西部沿岸区和湖心区为劣 V 类水质。

营养状态评价表明：全湖整体为轻度富营养状态。其中，西部沿岸区、湖心区、北部沿岸区和东部沿岸区为轻度富营养。

1.2 环湖河流

主要环湖河流总体水质为优。监测的 39 条河流的 55 个断面中：I 类水质断面占 5.5%，II 类占 32.7%，III 类占 52.7%，IV 类占 7.3%，V 类占 1.8%，无劣 V 类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：I 类水质断面比例上升 3.7 个百分点，II 类下降 1.8 个百分点，IV 类下降 1.8 个百分点，III 类、V 类和劣 V 类持平。与去年同期相比，水质有所好转，其中：I 类水质断面比例上升 3.7 个百分点，II 类上升 1.8 个百分点，III 类上升 5.4 个百分点，IV 类下降 10.9 个百分点，V 类上升 1.8 个百分点，劣 V 类下降 1.8 个百分点。

主要入湖河流：所有入湖河流水质优良。

主要出湖河流：胥江和苏东河水水质为优。

主要环湖河流：梅溧河为中度污染；京杭运河和朱库港为轻度污染；其余河流水质优良。

2 滇池

2.1 湖体

滇池湖体共监测 10 个点位。全湖整体为轻度污染，主要污染指标为总磷和化学需

氧量。其中，滇池外海和滇池草海为轻度污染。与上月相比，滇池草海水质有所下降，滇池外海和全湖整体水质无明显变化；与去年同期相比，滇池外海水质有所好转，滇池草海和全湖整体水质无明显变化。

总氮单独评价时：全湖整体为V类水质。其中，滇池外海为V类水质，滇池草海为劣V类水质。

营养状态评价表明：全湖整体为轻度富营养状态。其中，滇池外海和滇池草海为轻度富营养。

2.2 环湖河流

主要环湖河流总体水质良好。监测的12条河流的12个断面中：II类水质断面占50.0%，III类占25.0%，IV类占25.0%，无I类、V类和劣V类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：IV类水质断面比例上升8.3个百分点，劣V类下降8.3个百分点。与去年同期相比，水质明显好转，其中：III类水质断面比例上升8.3个百分点，IV类上升8.3个百分点，劣V类下降16.7个百分点。

主要入湖河流：宝象河、捞渔河和东大河为轻度污染；其余河流水质优良。

主要环湖河流：金汁河水质良好。

3 巢湖

3.1 湖体

巢湖湖体共监测8个点位。全湖整体水质良好，其中，西半湖为轻度污染，东半湖水质良好。与上月相比，东半湖、西半湖和全湖整体水质无明显变化；与去年同期相比，西半湖水质有所下降，东半湖和全湖整体水质无明显变化。

总氮单独评价时：全湖整体为V类水质，其中，东半湖为IV类水质，西半湖为劣V类水质。

营养状态评价表明：全湖整体为轻度富营养状态。其中，西半湖和东半湖为轻度富营养。

3.2 环湖河流

主要环湖河流总体水质良好。监测的10条河流的14个断面中：II类水质断面占28.6%，III类占57.1%，IV类占7.1%，V类占7.1%，无I类和劣V类水质断面。与上月相比，水质无明显变化，其中：IV类水质断面比例下降7.2个百分点，V类上升7.1个

百分点。与去年同期相比，水质明显好转，其中：III类水质断面比例上升21.4个百分点，IV类下降21.5个百分点，V类上升7.1个百分点，劣V类下降7.1个百分点。

主要入湖河流：派河为中度污染；南淝河为轻度污染；其余河流水质优良。

主要出湖河流：裕溪河水质为优。

主要环湖河流：丰乐河水质良好。

4 重要湖泊

本月监测的57个重要湖泊中，艾比湖、呼伦湖和程海等5个湖泊为劣V类水质，杞麓湖、洪湖和仙女湖等4个湖泊为V类，异龙湖、洪泽湖和星云湖等13个湖泊为IV类，淀山湖、斧头湖和升金湖等22个湖泊为III类，白马湖、西湖和洱海等10个湖泊为II类，抚仙湖、泸沽湖和柘林湖共3个湖泊为I类。与上月相比，异龙湖和菜子湖水质明显好转，杞麓湖、星云湖、高邮湖、大通湖香山湖和红枫湖水质有所好转，洪湖、瓦埠湖、黄大湖、武昌湖、衡水湖、梁子湖、东钱湖、百花湖和赛里木湖水质有所下降，其余湖泊水质无明显变化。与去年同期相比，星云湖和黄大湖水质明显好转，淀山湖、龙感湖、南漪湖白洋淀和大通湖水质有所好转，洪湖、洪泽湖、仙女湖、阳澄湖、瓦埠湖、武昌湖、菜子湖、百花湖、兴凯湖、沙湖、小兴凯湖和万峰湖水质有所下降，其余湖泊水质无明显变化。

总氮单独评价时：艾比湖、杞麓湖和淀山湖等8个湖泊为劣V类，洪湖、洪泽湖和仙女湖等7个湖泊为V类，呼伦湖、异龙湖和鄱阳湖等11个湖泊为IV类，其余31个湖泊水质均满足III类水质标准。

监测营养状态的54个湖泊中，艾比湖、杞麓湖和洪湖等4个湖泊为中度富营养状态，异龙湖、洪泽湖和淀山湖等9个湖泊为轻度富营养状态，抚仙湖、泸沽湖和赛里木湖等5个湖泊为贫营养状态，其余36个湖泊为中营养状态。

注：呼伦湖、程海、纳木错、乌伦古湖受天然背景值影响。




图 3-1 2020 年 3 月重要湖泊营养状态指数比较

5 重要水库

本月监测的 51 个重要水库中，玉滩水库为 V 类水质，莲花水库为 IV 类，鹤地水库、三门峡水库和察尔森水库等 15 个水库为 III 类，董铺水库、瀛湖和云蒙湖等 19 个水库为 II 类，里石门水库、山美水库和长潭水库等 15 个水库为 I 类。与上月相比，王瑶水库水质明显好转，三门峡水库察尔森水库和高州水库水质有所好转，莲花水库、崂山水库、富水水库、鲁班水库、铜山源水库、尔王庄水库、白莲河水库和大隆水库水质有所下降，其余水库水质无明显变化。与去年同期相比，鲁班水库、王瑶水库、鲇鱼山水库、南湾水库松涛水库和双塔水库水质有所好转，玉滩水库、鹤地水库、于桥水库、崂山水库、尔王庄水库和大隆水库水质有所下降，其余水库水质无明显变化。

总氮单独评价时：三门峡水库、莲花水库和于桥水库等 11 个水库为劣 V 类，玉滩水库、磨盘山水库和龙岩滩水库等 6 个水库为 V 类，察尔森水库、峡山水库和崂山水库等 10 个水库为 IV 类，其余 24 个水库水质均满足 III 类水质标准。

监测营养状态的 51 个水库中，玉滩水库、鹤地水库和三门峡水库共 3 个水库为轻度富营养状态，党河水库、大隆水库和长潭水库等 17 个水库为贫营养状态，其余 31 个水库为中营养状态。

2020 全国地表水水质月报

National Surface Water Quality Report




图 3-2 2020 年 3 月重要水库营养状态指数比较

附录

1、概况说明

按照中华人民共和国环境保护部《关于印发<“十三五”国家地表水环境质量监测网设置方案>的通知》(环监测[2016]30号文件)中公布的1940个地表水国控评价、考核、排名断面(以下简称“国考断面”)和“十三五”国家入海河流设置的195个监测断面(其中85个断面包含在国考断面中),中国环境监测总站组织开展了全国地表水水质月监测工作,并根据监测结果编制全国地表水水质月报。

其中,地表水国考断面包括:长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河和辽河七大流域,浙闽片河流、西北诸河和西南诸河,太湖、滇池和巢湖环湖河流等共978条河流的1698个断面;以及太湖、滇池、巢湖等112个(座)重点湖库的242个点位(60个湖泊173个点位,52座水库69个点位)。

地表水水质评价执行《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办[2011]22号文件)。

2、地表水水质月报评价指标及标准

根据《关于印发<地表水环境质量评价办法(试行)>的通知》(环办[2011]22号文)的要求,地表水水质评价指标为《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。即:pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂和硫化物。总氮作为参考指标单独评价。水温仅作为参考指标。湖泊和水库营养状态评价指标为:叶绿素a(chla)、总磷(TP)、总氮(TN)、透明度(SD)和高锰酸盐指数(COD_{Mn})共5项。

水质评价标准执行《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》,按I类~劣V类六个类别进行评价。

湖泊和水库营养化评价方法执行中国环境监测总站总站生字[21]090号文,按贫营养~重度富营养五个级别进行评价。

3、河流水质评价方法

(1) 断面水质评价

河流断面水质类别评价采用单因子评价法,即根据评价时段内该断面参评的指标

表1 断面、河段水质定性评价

水质类别	水质状况	表征颜色	水质功能
I、II类水质	优	蓝色	饮用水源一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等
III类水质	良好	绿色	饮用水源二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区、游泳区
IV类水质	轻度污染	黄色	一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水
V类水质	中度污染	橙色	农业用水及一般景观用水
劣V类水质	重度污染	红色	除调节局部气候外,使用功能较差

中类别最高的一项来确定。描述断面的水质类别时, 使用“符合”或“劣于”等词语。断面水质类别与水质定性评价分级的对应关系见表1。

(2) 河流、流域(水系)水质评价

河流、流域(水系)水质评价: 当河流、流域(水系)的断面总数少于5个时, 计算河流、流域(水系)所有断面各评价指标浓度算术平均值, 然后按照“(1)断面水质评价”方法评价, 并按表1指出每个断面的水质类别和水质状况。

当河流、流域(水系)的断面总数在5个(含5个)以上时, 采用断面水质类别比例法, 即根据评价河流、流域(水系)中各水质类别的断面数占河流、流域(水系)所有评价断面总数的百分比来评价其水质状况。河流、流域(水系)的断面总数在5个(含5个)以上时不作平均水质类别的评价。如果所有断面水质均为III类, 整体水质为“良好”。

河流、流域(水系)水质类别比例与水质定性评价分级的对应关系见表2。

表2 河流、水系水质定性评价

水质类别比例	水质状况	表征颜色
I~III类水质比例≥90%	优	蓝色
75%≤I~III类水质比例<90%	良好	绿色
I~III类水质比例<75%,且劣V类比例<20%	轻度污染	黄色
I~III类水质比例<75%,且20%≤劣V类比例<40%	中度污染	橙色
I~III类水质比例<60%,且劣V类比例≥40%	重度污染	红色

(3) 地表水主要污染指标的确定方法

a、断面主要污染指标的确定方法

评价时段内, 断面水质为“优”或“良好”时, 不评价主要污染指标。

断面水质超过III类标准时，先按照不同指标对应水质类别的优劣，选择水质类别最差的前三项指标作为主要污染指标。当不同指标对应的水质类别相同时计算超标倍数，将超标指标按其超标倍数大小排列，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。当氰化物或汞、铅、六价铬等重金属超标时，也作为主要污染指标列出。

确定了主要污染指标的同时，应在指标后标注该指标浓度超过III类水质标准的倍数，即超标倍数，如高锰酸盐指数(1.2)。对于水温、pH值和溶解氧等项目不计算超标倍数。

$$\text{超标倍数} = \frac{\text{某指标的浓度值} - \text{该指标的III类水质标准}}{\text{该指标的III类水质标准}}$$

b、河流、流域（水系）主要污染指标的确定方法

将水质超过III类标准的指标按其断面超标率大小排列，整个流域取断面超标率最大的前五项为主要污染指标，河流水系取断面超标率最大的前三项为主要污染指标；对于断面数少于5个的河流、流域（水系），按“a、断面主要污染指标的确定方法”确定每个断面的主要污染指标。

$$\text{断面超标率} = \frac{\text{某评价指标超过III类标准的断面(点位)个数}}{\text{断面(点位)总数}} \times 100\%$$

4、湖泊水库评价方法

(1) 水质评价

- a、湖泊、水库单个点位的水质评价，按照“2 (1) 断面水质评价”方法进行。
- b、当一个湖泊、水库有多个监测点位时，计算湖泊、水库多个点位各评价指标浓度算术平均值，然后按照“2 (1) 断面水质评价”方法评价。
- c、湖泊、水库多次监测结果的水质评价，先按时间序列计算湖泊、水库各个点位各个评价指标浓度的算术平均值，再按空间序列计算湖泊、水库所有点位各个评价指标浓度的算术平均值，然后按照“2 (1) 断面水质评价”方法评价。
- d、对于大型湖泊、水库，亦可分不同的湖（库）区进行水质评价。
- e、河流型水库按照河流水质评价方法进行。

(2) 营养状态评价

a、评价方法

采用综合营养状态指数法（TLI（Σ））。

b、湖泊营养状态分级

采用0~100的一系列连续数字对湖泊（水库）营养状态进行分级：

TLI（Σ）<30	贫营养
30≤TLI（Σ）≤50	中营养
TLI（Σ）>50	富营养
50<TLI（Σ）≤60	轻度富营养
60<TLI（Σ）≤70	中度富营养
TLI（Σ）>70	重度富营养

c、综合营养状态指数计算

综合营养状态指数计算公式如下：

$$TLI(\Sigma) = \sum_{j=1}^m W_j \cdot TLI(j)$$

式中： $TLI(\Sigma)$ ——综合营养状态指数；

W_j ——第 j 种参数的营养状态指数的相关权重；

$TLI(j)$ ——代表第 j 种参数的营养状态指数。

以 chla 作为基准参数，则第 j 种参数的归一化的相关权重计算公式为：

$$W_j = \frac{r_{ij}^2}{\sum_{j=1}^m r_{ij}^2}$$

式中： r_{ij} ——第 j 种参数与基准参数 chla 的相关系数；

m——评价参数的个数。

中国湖泊（水库）的 chla 与其它参数之间的相关关系 r_{ij} 及 r_{ij}^2 见表 3。

表3 中国湖泊(水库)部分参数与chla的相关关系 r_{ij} 及 r_{ij}^2 值

参数	chla	TP	TN	SD	COD _{Mn}
r_{ij}	1	0.84	0.82	-0.83	0.83
r_{ij}^2	1	0.7056	0.6724	0.6889	0.6889

(4) 各项目营养状态指数计算

$$TLI \text{ (chl}a\text{)} = 10 (2.5 + 1.086 \ln chl a)$$

$$TLI \text{ (TP)} = 10 (9.436 + 1.624 \ln TP)$$

$$TLI \text{ (TN)} = 10 (5.453 + 1.694 \ln TN)$$

$$TLI \text{ (SD)} = 10 (5.118 - 1.94 \ln SD)$$

$$TLI \text{ (CODMn)} = 10 (0.109 + 2.661 \ln CODMn)$$

式中：chl a 单位为 mg/m³， SD 单位为 m；其它指标单位均为 mg/L。

5、不同时段水环境变化的判断

对断面（点位）、河流、流域（水系）、全国及行政区域内不同时段的水质变化趋势分析，以断面（点位）的水质类别或河流、流域（水系）、全国及行政区域内水质类别比例的变化为依据，对照表1或表2的规定，按下列方法评价。

按水质状况等级变化评价：

- ①当水质状况等级不变时，则评价为无明显变化；
- ②当水质状况等级发生一级变化时，则评价为有所变化（好转或变差、下降）；
- ③当水质状况等级发生两级以上（含两级）变化时，则评价为明显变化（好转或变差、下降、恶化）。

按组合类别比例法评价：

设 ΔG 为后时段与前时段 I ~ III 类水质百分点之差： $\Delta G = G_2 - G_1$ ， ΔD 为后时段与前时段劣 V 类水质百分点之差： $\Delta D = D_2 - D_1$ ；

- ①当 $\Delta G - \Delta D > 0$ 时，水质变好；当 $\Delta G - \Delta D < 0$ 时，水质变差；
- ②当 $| \Delta G - \Delta D | \leq 10$ 时，则评价为无明显变化；
- ③当 $10 < | \Delta G - \Delta D | \leq 20$ 时，则评价有所变化（好转或变差、下降）；
- ④当 $| \Delta G - \Delta D | > 20$ 时，则评价为明显变化（好转或变差、下降、恶化）。

按水质状况等级变化评价或按组合类别比例变化评价两种方法的评价结果一致，可采用任何一种方法进行评价；若评价结果不一致，以变化大的作为变化趋势评价的结果。