

2020 年全国军队文职专业类考试

《临床医学》模拟卷一

第一部分 基础知识

一、单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。共 20

题，每题 0.5 分，共 10 分。）

1. 排卵时可用下列哪个激素的高峰作为标志：
 - A. 卵泡刺激素
 - B. 催产素
 - C. 孕酮
 - D. 黄体生成素
2. 房室延搁的生理意义是：
 - A. 增强心肌收缩力
 - B. 使心房和心室不同时收缩
 - C. 使心室肌不会产生强直收缩
 - D. 使心室肌动作电位幅度增加
3. 肠结核溃疡的肉眼形态是：
 - A. 椭圆形，溃疡的长轴与肠的长轴平行
 - B. 口小底大烧瓶状
 - C. 不规则地图状
 - D. 呈带状，其长轴与肠长轴垂直
4. 细胞坏死镜下主要形态表现是：

10. 下斜肌收缩时瞳孔转向:
- A.上内 B.下内
- C.上外 D.下外
11. 下列哪种病变可使肝浊音界下移:
- A.肺不张 B.肺气肿
- C.大叶性肺炎 D.肝硬变
12. 潜伏性感染的临床特征不包括:
- A.并不是每种传染病中都存在 B.常见病原体有单纯疱疹病毒等
- C.其病原体易排出体 D.一般不引起显性感染
13. 下列哪项典型的体征可作为诊断急性心包炎的依据:
- A.呼吸困难 B.心包压塞
- C.心包摩擦音 D.心包积液
14. 女, 65 岁, 因慢性阻塞性肺疾病 (COPD)、慢性 II 型呼吸衰竭、呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒、心力衰竭入院, $\text{pH} < 7.15$, 以下针对该患者的治疗, 恰当的是:
- A.给予高流量氧疗
- B.积极补充 5%碳酸氢钠, 使 pH 值迅速升至正常
- C.积极给予强心药物治疗
- D.适当补充 5%碳酸氢钠, 使 pH 值升至 7.2 以上即可

15. 男, 45 岁。工地高空坠落受伤, 出现血压下降、腹胀、腹痛。查体骨盆挤压和分离试验阳性, 双下肢不等长, 会阴部见瘀斑。首先考虑的诊断是:
- A. 股骨颈骨折
B. 股骨干骨折
C. 髌关节脱位
D. 骨盆骨折
16. 药品监督管理部门对医疗机构使用药品的事项进行监督检查时, 必须出示:
- A. 检查人员身份证
B. 单位介绍信
C. 检查人员工作证
D. 证明文件
17. 发生医疗事故时病程记录应在什么情况下封存和启封:
- A. 有卫生行政部门有关人员在场
B. 有医患双方在场
C. 经请卫生行政部门批准后
D. 有医疗事故鉴定委员会专家在场
18. 医疗机构的下述行为中不属于违反条例的是:
- A. 未将《医疗机构执业许可证》收费标准等悬挂于明显处所
B. 工作人员上岗未按规定佩戴标牌
C. 擅自涂改执业许可证
D. 擅自增加医师人数
19. 对于一个具有一定医学背景知识的智力正常的成年患者, 理想的医患关系模式应是:
- A. 主动-被动型
B. 指导-合作型
C. 共同参与型
D. 解释-说明型

20. 关于医师的道德义务, 下列各项错误的是:

- A. 救治急重病人时, 要敢于承担风险
- B. 应强制病人进行必要的治疗
- C. 对病人进行医学科普知识教育和健康教育
- D. 尊重病人的宗教信仰

二、单项选择题 (请根据题目要求, 在四个选项中选出一个最恰当的答案。共 20

题, 每题 1 分, 共 20 分)

21. 小肠上皮、肾小管上皮对葡萄糖、氨基酸的吸收是通过:

- A. 继发性主动转运
- B. 易化扩散
- C. 吞噬
- D. 胞饮

22. 兴奋性突触后电位属于:

- A. 静息电位
- B. 阈电位
- C. 动作电位
- D. 去极化电位

23. 影响能量代谢的最主要因素是:

- A. 肌肉活动
- B. 精神活动
- C. 食物的特殊动力作用
- D. 环境温度

24. 不符合肺腺癌描述的是:

- A. 多为周围型
- B. 常有吸烟史

- A. 心肌的主要供血动脉
B. 前降支发自右窦
C. 后降支发自前窦
D. 收缩期供血为主
31. 诊断急性胰腺炎的酶学检查是：
A. AMS
B. ALT
C. AST
D. ALP
32. 男性，42岁，食欲不振，尿色深2周，来院就诊。查体：皮肤、巩膜均黄染。肝大，肋下2cm，轻度触痛，脾肋下未及；实验室检查：TB（总胆红素） $120\mu\text{mol/L}$ ，CB（结合胆红素） $60\mu\text{mol/L}$ ，ALT200U，ALP100U，GGT100U，尿胆红素及尿胆原均呈（+），彩超检查未见胆囊肿大，胆总管扩大。考虑其黄疸属于：
A. 肝细胞性
B. 溶血性
C. 药物中毒性
D. 肝内梗阻性
33. 当传染病暴发、流行时，经省、自治区、直辖市政府决定，可以对其实行封锁的地区是：
A. 甲类传染病疫区
B. 乙类传染病疫区
C. 丙类传染病疫区
D. 甲、乙、丙三类传染病疫区
34. 正常菌群的免疫作用是指：
A. 作为抗原使宿主致病
B. 作为抗原刺激宿主产生免疫
C. 促进消化吸收
D. 构成生物屏障

35. 男, 15 岁, 因急性心肌炎, 快速性心律失常入院, 经心电图检查, 确定为室性心动过速, 分析其诊断的最主要依据是:
- A. 出现心室夺获及室性融合波 B. QRS 波群宽大畸形
- C. 心室律稍不规则 D. 心室率 160 次/分
36. 女性患者, 40 岁, 雨淋后出现发热、胸痛、咳铁锈色痰, 体温 39°C, 肺部 X 光片发现右肺中叶有大片密度增高阴影, 实验室痰培养为 G⁺双球菌, 菊糖发酵实验(+). 应诊断为:
- A. 继发性肺结核 B. 肺炭疽
- C. 大叶性肺炎 D. 原发性肺结核
37. 我国高血压病的死亡原因最常见的是:
- A. 心脏骤停 B. 心功能不全
- C. 心律失常 D. 脑血管意外
38. 患者, 女, 32 岁, 主诉右乳胀痛, 与月经周期有关, 检查乳房有多个结节状肿块, 边界不清, 可推动, 诊断首先考虑:
- A. 乳腺癌 B. 乳房纤维腺瘤
- C. 乳房囊性增生病 D. 乳管内乳头状瘤
39. 抢救开放性气胸患者呼吸困难最为关键的是:
- A. 迅速封闭胸部伤口 B. 气管插管
- C. 吸氧 D. 立即剖胸探查

40. 二级突发公共卫生事件是用_____进行预警。

A.蓝色

B.黄色

C.橙色

D.红色

第二部分 专业知识

一、单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。共 20

题，每题 1 分，共 20 分。）

41. 急性肺水肿典型 X 线表现是：

A.肺门舞蹈征

B.两肺纹理增粗

C.肺门蝴蝶形阴影

D.肺透亮度增加

42. 胃镜下慢性萎缩性胃炎的表现是：

A.黏膜充血、水肿及糜烂

B.黏膜呈颗粒状渗出

C.黏液分泌增加

D.黏膜下血管透见

43. 下列哪种肝硬化引起肝性脑病最为多见：

A.酒精性肝硬化

B.原发性胆汁性肝硬化

C.淤血性肝硬化

D.肝炎后性肝硬化

44. 泌尿系统感染最常见的传播途径是：

A.上行感染

B.血行感染

C.淋巴感染

D.直接蔓延

45. 应用胰岛素治疗糖尿病最常出现的不良反应是：
- A.过敏反应 B.胰岛素抗药性
- C.出血 D.低血糖反应
46. 亚急性感染性心内膜炎引起栓塞临床最常见的是：
- A.冠状动脉栓塞 B.脑栓塞
- C.肾栓塞 D.肺栓塞
47. 下列哪项易导致压力负荷过重引起心衰：
- A.房间隔缺损 B.心肌梗死
- C.高血压 D.动脉导管未闭
48. 重度支气管哮喘的抢救措施中，一般不采用的一项是：
- A.静脉滴注氨茶碱 B.静脉滴注糖皮质激素
- C.氧气吸入 D.注射强心剂
49. 急性白血病最常见的死因是：
- A.贫血 B.感染
- C.出血 D.全身衰竭
50. 男性，46岁，饮酒后出现发热，体温 39.3℃，伴咳嗽。咳少量黄痰，自服“头孢菌素”3天无效，1天前咳出大量脓痰，自觉有臭味，体温降至 37.5℃，最可能诊断是：
- A.支气管扩张 B.金葡菌肺炎

- C.吸入性肺炎
D.肺脓肿
51. 下列哪项不是腹腔镜胆囊切除术的手术适应证:
- A.有症状的胆囊结石
B.伴有糖尿病的无症状的胆囊结石
C.有临床症状的慢性胆囊炎
D.高度怀疑的胆囊癌
52. 关节脱位的特有体征是:
- A.肿胀
B.疼痛和压痛
C.功能障碍
D.畸形
53. 急性血源性骨髓炎好发于:
- A.婴幼儿
B.青壮年
C.儿童
D.老年
54. 骨肉瘤的好发年龄是:
- A.15 岁以下
B.15 ~ 25 岁
C.婴幼儿
D.25 ~ 40 岁
55. 纠正呼吸性碱中毒主要是:
- A.输 2%氯化铵溶液
B.输 0.1mol/L 盐液
C.输平衡盐溶液
D.积极处理原发病
56. 关于孕激素的生理作用, 以下哪项正确:
- A.使宫颈黏液稀薄透亮, 利于精子通过
B.能抑制子宫肌层的收缩, 可用于保胎

材料一：病人男性，58 岁。突然头痛呕吐，伴意识丧失 30 分钟。查体：神志清楚，颈部抵抗，克氏征阳性。右侧上睑下垂，右侧瞳孔 4mm，对光反射消失。

61. 最可能的诊断是：

- A.脑梗死
- B.蛛网膜下腔出血
- C.高血压脑出血
- D.脑动静脉畸形出血

62. 最好的诊断措施是：

- A.腰椎穿刺
- B.脑电图
- C.视力检查
- D.头颅 CT

63. 引起病人右侧上睑下垂、右侧瞳孔散大的最可能原因是：

- A.面神经麻痹
- B.动眼神经麻痹
- C.小脑幕切迹疝
- D.糖尿病眼底病

材料二：男性，42 岁，高血压病史，长期服用硝苯地平，最近出现烧心、反流、胸痛，食用高脂肪、巧克力等症状明显加重。

64. 该患者最可能的诊断是：

- A.胃溃疡
- B.十二指肠溃疡
- C.胃食管反流病
- D.冠心病

65. 该患者首选的检查是：

- A.胃镜
- B.肠镜
- C.食管 X 线
- D.心电图

材料三：男，5岁，于夏季突然出现高热，2h后抽搐，面色灰暗，四肢凉，血压下降，心肺未见异常。脑膜刺激征阴性。

66. 最可能的诊断为：

- | | |
|--------|------------|
| A.颅内出血 | B.结核性脑膜炎 |
| C.颅内肿瘤 | D.中毒型细菌性痢疾 |

67. 为确诊，应进一步检查：

- | | |
|-------|-------|
| A.血常规 | B.便常规 |
| C.脑脊液 | D.脑电图 |

材料四：患者，女，28岁。3个月来乏力，1周来发热伴皮肤紫癜和口腔颊黏膜血疱，浅表淋巴结及肝脾均不大，胸骨无压痛。化验：Hb65g/L，RBC $2.2 \times 10^{12}/L$ ，Ret0.2%，WBC $2.4 \times 10^9/L$ ，分类：N24%，L70%，M6%，Plt $10 \times 10^9/L$ ，胸部X线片检查示右下肺炎症。

68. 对该患者最可能的血液病学诊断是：

- | | |
|-------------|-----------|
| A.骨髓增生异常综合征 | B.再生障碍性贫血 |
| C.急性淋巴细胞白血病 | D.巨幼细胞贫血 |

69. 为确定诊断，首选的检查是：

- | | |
|-----------|---------------------------|
| A.血清铁和铁蛋白 | B.血清叶酸和维生素B ₁₂ |
| C.骨髓穿刺 | D.骨髓活检 |

70. 根据病史，该患者最急需的治疗是：

A. 抗生素治疗

B. 补充叶酸和维生素 B₁₂

C. 雄激素治疗

D. 血小板成分输注

三、多项选择题（请根据题目要求，在五个选项中选出两个或两个以上恰当的答案，错选或者多选均不得分，少选且选择正确的每个选项得 0.3 分。共 10 题，每题 1.5 分，共 15 分。）

71. 肾病综合征在儿童肾脏疾病中发病率仅次于急性肾炎，它的临床特点有：

A. 高蛋白血症

B. 高脂血症

C. 明显水肿

D. 大量蛋白尿

E. 低白蛋白血症

72. 巨幼细胞贫血的发病原因主要是_____的缺乏。

A. 锌元素

B. 维生素 C

C. 叶酸

D. 维生素 B₁₂

E. 铁元素

73. 能引起心绞痛的疾病有：

A. 主动脉瓣狭窄

B. 主动脉瓣关闭不全

C. 冠心病

D. 肥厚型心肌病

E. 冠脉粥样硬化

74. 糖尿病的急性并发症有：

- A.神经病变
- B.糖尿病酮症酸中毒
- C.心血管疾病
- D.肾脏疾病
- E.高渗性昏迷

75. 复苏时可以气管内给药的药物是：

- A.肾上腺素
- B.利多卡因
- C.碳酸氢钠
- D.阿托品
- E.氯化钙

76. 低血钾症时，会出现的症状有：

- A.肌肉软弱乏力，腱反射减弱或消失
- B.腹胀、恶心、呕吐
- C.神智淡漠或嗜睡
- D.心动过缓
- E.室颤

77. 下列哪些符合外科感染的特点：

- A.常为单一细菌感染
- B.多为混合感染
- C.局部症状明显
- D.受累组织愈合后形成瘢痕
- E.必须手术才能进行治疗

78. 胎盘剥离的征象包括：

- A.宫体变硬呈球形
- B.阴道口外露的一段脐带自行延长
- C.阴道少量流血

D.在产妇耻骨联合上方轻压子宫下段时，子宫上升而外露脐带不再回缩

E.剥离的胎盘降至子宫下段,子宫体被推向上,宫底升高达脐上

79. 造成子宫收缩乏力的因素有:

A.膀胱充盈

B.胎位异常

C.临产后体内前列腺素分泌过多

D.临产后使用大剂量镇静剂

E.精神因素

80. 法洛四联症患儿“蹲踞症”的产生机制是:

A.体循环阻力增加

B.右向左分流增加

C.下肢动脉压增加

D.回心血量减少

E.以上均正确

四、系列多项选择题（请根据题目要求，在五个选项中选出两个或两个以上恰当的答案，错选或者多选均不得分，少选且选择正确的每个选项得 0.4 分。共 10 题，每题 2 分，共 20 分。）

材料一：患儿，男 15 个月，因腹泻、呕吐伴发热 3 天入院，3 天前出现腹泻，大便 10 余次/日，黄色水样便，量多，未见粘液脓血便，呕吐胃内容物 4~5 次/日，伴发热，体温 38~39℃。来院前 6 小时未解尿。查体：T38.5℃，P150 次/分，R40 次/分，BP50/30mmHg，体重 9kg，精神萎靡，面色青灰，反应差，哭声微弱，肢端湿冷，可见花纹，前凶眼窝明显凹陷，口唇黏膜干燥，两肺呼吸音清，心律齐，无杂音，腹平软，

肝肋下 2cm，皮肤弹性差，神经系统阴性。血常规：Hb130g/L，WBC $8.0 \times 10^9/L$ ，N30%，L70%，大便常规：黄糊状，WBC0 ~ 1/HP，血气分析：pH7.20，BE-12mmol/L， Na^+ 128mmol/L、 K^+ 2.9mmol/L

81. 请说出患儿的诊断：

- A.急性重症肠炎
- B.重度低渗性脱水
- C.代谢性酸中毒
- D.低钾血症
- E.中度等渗性脱水

82. 第一个 24 小时的补液包括哪些：

- A.生理需要量
- B.累积损失量
- C.继续损失量
- D.估计损失量
- E.以上都是

83. 如需补钾下列正确的是：

- A.口服补钾安全
- B.可以静脉推注
- C.可以静脉点滴
- D.补钾浓度小于 0.3%
- E.严重缺钾时直接静脉推注 10%氯化钾

材料二：患者女性，45 岁。持续中上腹痛 3h，伴恶心、呕吐入院。体查：腹软，上腹部轻度压痛，无反跳痛，Murphy 征（-）。

84. 应首先检查哪些项目：

- A.腹部 X 线透视
- B.腹部 B 超

C.血常规

D.血、尿淀粉酶

E.腹腔穿刺检查

85. 应考虑哪些疾病：提示：查血淀粉酶 300U/dl (Somogyi 法)，WBC $14 \times 10^9/L$ ，心

电图未见异常：

A.急性胃炎

B.急性胆囊炎

C.急性阑尾炎

D.急性胰腺炎

E.急性心肌梗塞

86. 为明确诊断，应采取下列哪些辅助检查：

A.血常规

B.腹部 B 超

C.血清淀粉酶

D.正铁血红蛋白

E.X 线

87. 此时应优先采取哪些检查：提示：患者出现腹痛加剧，腹痛波及全腹，体检：全腹

压痛及反跳痛：

A.腹部 CT

B.腹腔穿刺

C.血气分析

D.肝肾功能

E.胃镜

材料三：男婴，6 个月。烦躁，多汗、夜惊 2 个月。

患儿 2 个月前无明显诱因逐渐出现烦躁，入睡后汗多，易被轻微响动惊醒，醒后啼哭持续数小时。无发热、咳嗽，呕吐、腹泻，未给予治疗。发病以来进食正常，大小便

正常。足月顺产，出生体重 3.2kg，否认出生窒息史。生后母乳喂养，未添加辅食及鱼肝油。生长发育基本同正常儿。按时预防接种，否认药物过敏史，否认遗传病家族史。

查体：T36.7°C，P119 次/分，R32 次/分，体重 7kg。皮肤未见出血点和皮疹，浅表淋巴结未触及肿大。头形正常，可见枕秃，前卤 2.5cm，平软，按压项骨有乒乓球感，尚未出牙。胸廓对称，可见肋缘外翻。双肺未闻及干湿性啰音。心界不大，心率 119 次/分，律齐，心音有力，各瓣膜听诊区未闻及杂音，腹软，肝脾不大。双下肢无水肿。颈无抵抗，病理征阴性。

实验室检查：血常规：Hb110g/L，RBC $3.9 \times 10^{12}/L$ ，WBC $8.1 \times 10^9/L$ ，PLT $285 \times 10^9/L$ 。血清钙 1.52mmol/L，血清磷 0.9mmol/L（正常值 1.45 ~ 2.1mmol/L），血清碱性磷酸酶 355U/L（正常值 125 ~ 250U/L）。便常规（-）。尿常规（-）。

88. 说出鉴别诊断：

- A.软骨营养不良
- B.脑积水
- C.低血磷性抗维生素 D 佝偻病
- D.维生素 D 依赖性佝偻病
- E.呆小病

89. 需要进一步检查有哪些：

- A.骨骼 X 线片检查
- B.血清 25- (OH) D₃ 测定

C.肝功能检查

D.肾功能检查

E.尿常规

90. 治疗原则:

A.及时添加辅食, 尤甚含维生素 D 较多的食物

B.口服或肌注维生素 D 调剂

C.补充钙剂

D.加强户外活动

E.无需特殊治疗