

军队文职人员统一招聘《医基+护理学》

全真模拟卷四

第一部分 基础综合

一、单选题（20 题，每题 0.5 分，共 10 分）

1. 房室结位于：
A.下腔静脉口的后方
B.冠状窦口的前上方
C.卵圆窝的后方
D.室间隔膜部
2. 肺循环途径中，血液无需流经：
A.主动脉
B.肺动脉
C.肺泡毛细血管
D.右心室
3. 心肌正常起搏点是：
A.窦房结
B.房室结
C.房室束
D.房室交点
4. 与低常期相对应的动作电位时相是：
A.峰电位升支
B.峰电位降支
C.正后电位
D.负后电位
5. 下列关于电压门控钠离子通道与钾离子通道共同点的叙述，错误的是：
A.都有开放状态
B.都有关闭状态
C.都有激活状态
D.都有失活状态
6. 骨骼肌兴奋-收缩耦联的耦联因子是：
A. Na^+
B. K^+
C. Cl^-
D. Ca^{2+}

7. 肉芽组织内发挥抗感染作用的主要成分是:
 - A.毛细血管内皮细胞
 - B.肌纤维母细胞
 - C.炎症细胞
 - D.成纤维细胞
8. 患者,20岁,骨折愈合良好,5年后骨折处骨组织病变变化表现为:
 - A.大量成纤维细胞
 - B.大量新生毛细血管
 - C.正常骨组织
 - D.大量多核巨细胞
9. 下列哪项条件易产生二期愈合:
 - A.组织缺损大、创缘整齐、创面对合紧密
 - B.组织缺损少、创缘整齐、创面对合紧密
 - C.组织缺损大、无感染、创缘整齐
 - D.创缘不整齐、创面对合不紧密、有感染
10. 下列哪项可出现呼气性呼吸困难:
 - A.支气管哮喘
 - B.气胸
 - C.白喉
 - D.重症肺炎
11. 下列哪项是错误的:
 - A.发绀见于缺氧,缺氧一定有发绀
 - B.发绀是皮肤、黏膜呈青紫色
 - C.发绀常见的部位为唇、舌、颊部、甲床
 - D.血液中存在异常血红蛋白也可出现发绀
12. 呕吐伴眩晕、眼球震颤可见于:
 - A.脑震荡
 - B.脑溢血
 - C.脑梗塞
 - D.前庭器官疾病
13. 下列哪项结构与维持细菌固有形态有关:
 - A.细胞壁
 - B.细胞膜
 - C.细胞壁和细胞膜
 - D.荚膜

14. 某护士在给一位乙型肝炎病毒携带者注射时,不慎被患者用过的针头刺伤手指。为预防乙型肝炎病毒感染,应首先采取的措施是:
- A.注射抗生素
B.注射丙种球蛋白
C.注射乙型肝炎疫苗
D.注射 HBIg
15. 当妊娠危及胎儿母亲的生命时,可允许行人工流产或引产,这符合:
- A.行善原则
B.不伤害原则
C.公正原则
D.尊重原则
16. 以下哪一点是属于最优化原则的内容:
- A.时间最早
B.痛苦最少
C.没有副作用
D.知情同意
17. 治疗需要获得病人的知情同意,其实质体现的是:
- A.尊重病人的自主性
B.维护良好的医患关系
C.不伤害病人的基本原则
D.有利于病人的基本原则
18. 护士发现医师医嘱可能存在错误,但仍然执行错误医嘱,对病人造成严重后果,该后果的法律责任承担着是:
- A.开写医嘱的医师
B.执行医嘱的护士
C.医师和护士共同承担
D.医师和护士无需承担责任
19. 某乡卫生院医生甲在实行阑尾炎手术时,误将结肠切断,因条件差,即将患者送往县医院,因延误了时机,县医院乙在助手配合下,也没有处理好,最终造成永久造瘘,该结果是:
- A.医生甲的医疗差错
B.医生甲的医疗事故
C.医生乙的医疗差错
D.医生乙的医疗事故

20. 《中华人民共和国传染病防治法》规定管理的传染病可分为：

- A.甲类、乙类
- B.甲类、乙类、丙类
- C.A类、B类
- D.A类、B类、C类

二、单选题（20题，每题1分，共20分）

21. 关于膝关节半月板的描述正确的是：

- A.半月板外缘较薄、内缘厚
- B.内侧半月板呈“O”形
- C.外侧半月板较小
- D.半月板周围附着于胫骨上

22. 属于臂后群肌的是：

- A.三角肌
- B.肱三头肌
- C.肱二头肌
- D.喙肱肌

23. 关于咽，下列正确的是：

- A.口咽是消化道和呼吸道的共同通道
- B.上端附着颅底，下通食管和气管
- C.鼻咽后壁有咽鼓管咽口
- D.口咽侧壁有咽隐窝

24. 患者，男，80岁，高血压病史30年，查体：BP180/50mmHg，HR70次/分。该患者脉压异常的最可能原因是：

- A.心率加快
- B.循环血量降低
- C.心脏每搏输出量增加
- D.大动脉管壁硬化

25. 某人由平卧位突然站立，静脉回心血量减少，每搏输出量、动脉血压降低，该人搏出量减少是由于下列哪项所致：

- A.心室后负荷增大
- B.心迷走神经兴奋
- C.心交感神经兴奋
- D.异长调节

26. 患者，女，50岁，COPD（慢性阻塞性肺病）10年，近1个月来出现双下肢水肿。
查体：颈静脉怒张，第二心音亢进，剑突下可闻及3/6级收缩期杂音，肝肋下3cm，
压痛（+），血白蛋白40g/L，尿蛋白（-），患者水肿最主要的原因是：
- A.淋巴回流受阻
B.组织液胶体渗透压减低
C.中心静脉压降低
D.毛细血管内静水压升高
27. 区别良性肿瘤与恶性肿瘤的主要组织学依据是：
- A.结构紊乱
B.细胞形态不一
C.间质内炎细胞浸润
D.细胞核多形性
28. 含有三个胚层组织成分的肿瘤称为：
- A.间叶瘤
B.混合瘤
C.畸胎瘤
D.错构瘤
29. 肿瘤血道播散最常见的部位是：
- A.肺、胸膜、脑
B.肺、肾、胃、脾
C.肝、腹膜、骨、肾
D.肝、肺
30. 患者，女性，心脏听诊A₂减弱，同时S₂反常分裂，该患者的心脏疾病是：
- A.二尖瓣关闭不全
B.主动脉瓣关闭不全
C.二尖瓣狭窄
D.主动脉瓣狭窄
31. 患者，女性，34岁，突发右胸痛，呼吸困难，查体：语音震颤减弱，气管向左侧
移位，叩诊右侧为鼓音，该患者查体还可见：
- A.肝浊音界上移
B.肝浊音界消失
C.肝浊音界下移
D.肝浊音界扩大
32. 急性阑尾炎患者出现腹膜炎，可能的体征不包括：
- A.腹壁肌紧张
B.腹式呼吸消失
C.腹部压痛
D.移动性浊音阳性

33. 下列哪种不是细菌的基本形态：
- A.球形 B.杆形
- C.梨形 D.螺形
34. 甲型流感病毒最容易发生变异的成分是：
- A.包膜脂类 B.神经氨酸酶和血凝素
- C.衣壳蛋白 D.基质蛋白
35. “医乃仁术”是指：
- A.道德是医学的本质特征
- B.道德是医学活动中的一般现象
- C.道德是医学的非本质要求
- D.道德是个别医务人员的追求
36. 反映医疗卫生工作根本任务及职业道德特点的是：
- A.实行社会主义的人道主义
- B.救死扶伤，防病治病
- C.全心全意为人民的健康服务
- D.担负医德责任
37. 病人下列义务中应该经其知情同意后才能合理履行的是：
- A.如实提供病情信息
- B.尊重医务人员的劳动
- C.避免将疾病传播给他人
- D.支持医学生实习和发展医学
38. 接受婚前医学检查的人员对检查结果持有异议的，可以申请：
- A.行政复议 B.仲裁
- C.医学鉴定 D.行政诉讼
39. 《中华人民共和国传染病防治法》中的“医源性感染”的含义是指：
- A.感染病原体无临床症状能排出病原体

- B.在从事医学服务中，因病原体传播引起的感染
 - C.在从事实验室工作中，因接触病原体所指的感染
 - D.在住院期间发生的感染和在医院内获得出院后发生的感染
40. 根据对患者人身伤害造成的损害程度，医疗事故分为四级，其中四级医疗事故是指：
- A.造成患者中度残疾，器官组织损伤导致严重功能障碍的
 - B.造成患者轻度残疾，器官组织损伤导致一般功能障碍的
 - C.造成患者人身损害的其他后果
 - D.造成患者明显人身损害的其他后果

第二部分 专业知识

一、单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案，共 20 题，每题 1 分，共 20 分。）

1. 患者，女，54 岁，因慢性胆囊炎急性发作住院治疗两周后，病人自感身体恢复缓慢，害怕出院，时刻希望医护人员给予更多的关注，该现象属于：
- A.角色行为冲突
 - B.角色行为缺如
 - C.角色行为消退
 - D.角色行为强化
 - E.角色行为异常
2. 伤寒病人不宜进食哪种食物：
- A.菜汤
 - B.米汤
 - C.芹菜
 - D.蒸鸡蛋
 - E.新鲜果汁
3. 静脉注射过程中，注射部位，皮肤肿胀，有痛感，抽有回血，可能的原因是：
- A.静脉痉挛
 - B.针头刺入皮下
 - C.针头斜面一半在血管外
 - D.针头斜面紧贴血管壁
 - E.针头堵塞

4. 适用热疗治疗法治疗的患者是：
 - A.脏器出血
 - B.面部危险三角区感染
 - C.恶性肿瘤
 - D.末梢循环不良
 - E.软组织损伤早期
5. 实施人工呼吸前首要的护理措施是：
 - A.将病人安置在空气新鲜的地方
 - B.密切观察病人胸部的起伏状况
 - C.清除口鼻内的分泌物呕吐物
 - D.取下活动假牙，用开口器打开口腔
 - E.胸外按压
6. 以下哪项不需空腹抽血：
 - A.血三脂
 - B.血糖
 - C.肝功能
 - D.做交叉配血试验
 - E.转铁蛋白
7. 临床常用化学消毒法描述正确的是：
 - A.环氧乙烷可用于食物的消毒
 - B.过氧乙酸可用于金属类器械消毒
 - C.碘伏稀释后不稳定宜现用现配
 - D.苯扎溴铵对肥皂有促进作用
 - E.氯己定可杀灭所有细菌的繁殖体和亲脂病毒
8. 临床护理中，护士处理及执行医嘱的行为，不正确的是：
 - A.患者对医嘱有疑议，护士应再次核实医嘱
 - B.患者病情变化时，可先暂停医嘱，并通知医生核对
 - C.紧急情况，医生的口头医嘱，护士需复述无误后执行
 - D.对于不清楚，不完整的医嘱，护士有权不予执行
 - E.护士发现医嘱有误时，应立即通知医生，核对无误后再执行

9. 按照隔离技术要求口罩使用不正确的是:
- A.戴口罩时应遮盖口鼻
 - B.口罩使用后及时取下并将污染面折叠放入污物袋
 - C.口罩使用后可以挂在胸前
 - D.手不可接触口罩的污染面
 - E.医用外科口罩只能一次性使用
10. 有效预防氧疗过程中肺不张发生的措施是:
- A.病人卧床休息, 尽量减少活动
 - B.保证 $FiO_2 > 60\%$
 - C.维持 $PaO_2 > 100\text{mmHg}$
 - D.经常变换体位, 多咳嗽
 - E.鼓励病人做深呼吸
11. 患者男, 46岁, 患重型再障, 护士巡视中发现患者头痛、呕吐、烦躁不安等症状, 下列措施不正确的是:
- A.患者平卧位, 头偏一侧
 - B.迅速通知医生
 - C.输浓缩红细胞
 - D.观察患者意识和瞳孔
12. 男性, 70岁。主动脉-冠状动脉旁路移植手术后第二天, ICU 监护, EKG 示波出现心室颤动, 血压下降, 应该立即采取的措施是:
- A.静推肾上腺素
 - B.同步电复律
 - C.非同步电复律
 - D.静推心三联
13. 女, 71岁, 因慢性阻塞性肺疾病急性加重行气管切开, 进行有创性机械通气, 以下选项中_____不是其常用的通气模式:
- A.持续强制通气
 - B.间歇强制通气
 - C.压力支持通气
 - D.持续气道负压

C.前尿道损伤

D.后尿道损伤

二、系列单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案，共10题，每题1.5分，共15分。）

（1~2题共用题干）

患者，男，35岁。近年来，患者主要从事蔬菜种植，曾出现手指、脚趾间奇痒，起红色丘疹，此后出现上腹部不适。以面色苍白，疲乏无力6个月入院。检查：RBC $2.0 \times 10^{12}/L$ ，Hb50.9/L，WBC $7.6 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.5，淋巴细胞0.26，嗜酸性粒细胞0.14，拟诊断为缺铁性贫血。

1. 患者可能的病因是：

A.营养不良

B.农药中毒

C.消化性溃疡

D.肠道钩虫病

2. 给患者硫酸亚铁每次0.3g，每天3次，口服，治疗一个月效果不佳，其原因是：

A.诊断不正确

B.病因未去除

C.铁剂剂量不够

D.未合并应用维生素C

（3~4题共用题干）

患者，男，25岁。足底刺伤后发生破伤风。入院时患者频繁抽搐。

3. 在安排病床时应注意：

A.便于家属探视，交谈

B.避免声、光刺激

C.靠近监护室

D.保持病室清洁

4. 足底伤口换下的敷料的处理是：

A.用过氧乙酸浸泡

B.放入含有75%乙醇的容器内熏蒸

C.用甲醛熏蒸

D.放到指定地点彻底焚烧

（5~6题共用题干）

患者，女，30岁。发热、腹部不适、疲乏、恶心、食欲不振、尿色变黄6天。体检发现巩膜中度黄染，肝肋下2cm可扪及，质软，无明显触痛。外周血红细胞 $4.0 \times 10^{12}/L$ ，

白细胞 $6.3 \times 10^9/L$ ，血红蛋白 $138g/L$ ，ALT2300U/L，总胆红素 $84 \mu mol/L$ 。

5. 应首先考虑该患者为：

- | | |
|-------|---------|
| A.败血症 | B.钩体病 |
| C.恙虫病 | D.病毒性肝炎 |

6. 对明确诊断最有意义的检查项目是：

- | | |
|----------|-------------|
| A.血培养 | B.外斐反应 |
| C.钩体凝溶试验 | D.肝炎病毒标志物检测 |

(7~8 题共用题干)

患者，女，46岁。行阑尾切除术后，给予青霉素治疗，护士未做青霉素过敏试验，给患者输入青霉素后致过敏性休克死亡。

7. 该事件属于：

- | | |
|---------|----------|
| A.医疗事故 | B.护理质量缺陷 |
| C.责任心不强 | D.护理差错 |
| E.医疗纠纷 | |

8. 下列不属于医疗事故预防措施的是：

- | | |
|-----------------|---------------|
| A.设立医疗质量监控部门或人员 | B.加强风险管理 |
| C.严格控制探视 | D.提高护理人员的技术水平 |
| E.持续质量改进 | |

(9~10 题共用题干)

患者，男，30岁。因车祸致脾破裂急诊入院，病人面色苍白，四肢厥冷，测得血压 70/40mmHg，脉细弱，护士按医嘱给病人紧急输血，在输血即将结束时，病人出现呼吸困难，皮肤发痒，眼睑水肿。

9. 该患者出现的反应是：

- | | |
|--------|--------|
| A.肺水肿 | B.发热反应 |
| C.过敏反应 | D.溶血反应 |
| E.出血倾向 | |

10. 为该患者采取的护理措施不妥的是：

- A.立即停止输血
- B.氧气吸入
- C.密切观察病情
- D.让病人进低盐饮食
- E.按医嘱皮下注射 0.1%盐酸肾上腺素 0.5~1ml

三、多项选择题（请根据题目要求，在五个选项中选出两个或两个以上恰当的答案，多选和未选均不得分。共 10 题，每题 1.5 分，共 15 分。）

1. 引起医院感染的高危因素包括：

- A.抗生素滥用
- B.侵入性诊疗机会增加
- C.个人抵抗力下降
- D.医院管理机制不完善
- E.严格消毒灭菌

2. 护士对便秘患者进行预防便秘知识教育的内容是：

- A.定时排便
- B.适当下床活动
- C.多食蔬菜水果
- D.摄取适量油脂食物
- E.定时使用开塞露

3. 临床中，由于输血引起血管内容血反应的原因是：

- A.输入变质血液
- B.输入异型血
- C.无菌操作不严格
- D.多次输血体内产生过敏性抗体
- E.输血过多、速度过快

4. 口腔护理，膀胱冲洗，清洗压疮面均可采用：

- A.力帆诺溶液
- B.生理盐水
- C.0.02%呋喃西林
- D.1%~3%碳酸氢钠

- E.0.1%醋酸溶液
5. 端坐位适用于以下哪几种疾病:
- A.心力衰竭
B.心包积液
C.支气管哮喘发作时的病人
D.脑供血不足病人
E.腹部手术后恢复期病人
6. 肺源性呼吸困难的临床表现:
- A.呼吸急促
B.喘息
C.呼吸费力
D.心动过速
E.吸气相延长
7. 以下哪些为目前常用降压药物种类:
- A.利尿剂
B. β 受体兴奋剂
C. α 受体阻滞剂
D.血管紧张素转换酶抑制剂
E.钙通道阻滞剂
8. 隐性感染的特点为:
- A.无明显临床症状
B.无传染性
C.产生面临感染
D.感染率较低
E.只能通过免疫学检查才能发现
9. 全髋关节置换术后护理措施正确的是:
- A.术侧肢体一般取外展中立位
B.适用足底静脉泵,促进下肢血液循环
C.患者取物时可转向手术侧
D.术后早期进行患肢肌肉的等长收缩练习
E.肢体下垫软枕防止下肢外旋
10. 急性坏死性胰腺炎的并发症有:
- A.休克
B.化脓性感染
C.胰腺假性囊肿
D.慢性胰腺炎

E.慢性胆囊炎

四、系列多项选择题（请根据题目要求，在五个选项中选出两个或两个以上恰当的答案，多选和未选均不得分。共 10 题，每题 2 分，共 20 分。）

（1~2 题共用题干）

患者，男性，45 岁。肛门局部瘙痒 4 余年，昨日突发便后肛门剧烈疼痛，咳嗽及排便时加剧。体检见肛门口一暗紫色红色肿物，直径约 2cm，有触痛。

1. 若该患者行手术治疗，术后护理应注意：

- A.术后当天即应尽早下床活动
- B.术后 24 小时内，每 4~6 小时嘱患者排尿 1 次
- C.术后 1~2 天以无渣流食、半流食为主，
- D.术后 3 尽量避免解大便
- E.术后 24 小时予扩肛治疗，防止肛门狭窄

2. 患者术后可出现的并发症有：

- A.尿潴留
- B.切口出血
- C.切口感染
- D.肠粘连
- E.肛门狭窄

（3~5 题共用题干）

患者，女性，因尿毒症现拟行肾移植术。

3. 肾移植术后可发生排斥反应的供者有：

- A.父母子女
- B.异卵孪生
- C.同卵孪生
- D.同胞兄弟姐妹
- E.有血缘关系的亲属

4. 术后预防吻合口破裂的措施有：

- A.遵医嘱预防性使用抗菌药物
- B.保持大便通畅

- C.术后平卧 24 小时，移植肾侧下肢髋膝关节水平屈曲 $15^{\circ} \sim 25^{\circ}$
- D.禁忌突然改变体位
- E.术后第 2 日指导下床活动
5. 术后常用免疫抑制剂有：
- A.皮质类固醇激素
- B.硫唑嘌呤
- C.阿司匹林
- D.他克莫司
- E.利巴韦林

(6~7 题共用题干)

患者，男，45 岁。肝硬化出现肝昏迷先兆。

6. 肝硬化患者易发生肝性脑病的诱因有：
- A.快速大量放腹水
- B.高蛋白饮食
- C.便秘
- D.发生低血糖
- E.上消化道大出血
7. 经查明原因，该患者因饮食原因出现便秘 3 天，可以采用下列哪些治疗：
- A.弱酸性液体灌肠
- B.口服新霉素
- C.中止蛋白质饮食
- D.0.1%肥皂液灌肠
- E.输入复方氨基酸溶液

(8~9 题共用题干)

患者男，62 岁，因心力衰竭卧床 3 周，主诉骶尾部疼痛，护士仔细观察后确认为压疮的炎性浸润期。

8. 患者会出现的表现是：
- A.皮肤因水肿而变薄，常有水疱形成，且极易破溃
- B.患者主诉骶尾部发红、疼痛、麻木感
- C.伤口周围有坏死组织
- D.骶尾部皮肤呈紫色、有皮下硬结，并出现水疱
- E.创面湿润，有脓液流出

