

# 军队文职人员统一招聘《医基+护理学》

## 全真模拟卷五-答案及解析

### 第一部分 基础综合

#### 一、单选题（20 题，每题 0.5 分，共 10 分）

1.【答案】D。解析：在视神经盘的颞侧稍下方约 0.35cm 处有一黄色小区，称黄斑。黄斑中央有一凹陷称中央凹，是感光最敏锐的部位。

2.【答案】A。解析：泪器包括泪腺和泪管组成。其中泪管包括：泪点、泪小管、泪囊和鼻泪管四部分。泪小管起自泪点，先与睑缘成垂直方向走行向上、下，继而转行向内，上、下泪小管汇合开口于泪囊，故非直线走行。泪腺是由细管状腺和导管组成，它就是分泌泪液的器官。泪腺位于眼眶外上方泪腺窝里，泪腺排泄导管约 10~20 根，开口于外上穹窿部结膜处。泪囊是位于眼眶内侧壁前下方泪囊窝内的一个膜性囊。鼻泪管为泪囊下端的膜性管道，上段大部分包埋于骨性鼻泪管中，与骨膜紧密相贴；下段位于鼻腔外侧壁黏膜的深面，向下开口于下鼻道外侧壁的前份。

3.【答案】A。解析：白质：主要由上、下行的纤维束组成，行于脑干前部。

4.【答案】C。解析：渗透压的高低取决于溶液中溶质颗粒数目的多少，而与溶质的种类和颗粒的大小无关。血浆渗透压由晶体渗透压和胶体渗透压两部分组成。晶体渗透压是总渗透压的最为主要的组成部分，而其 80% 来自钠离子和氯离子。

5.【答案】B。解析：选项中所列的几种缓冲对在血浆中都存在，但是其中  $\text{NaHCO}_3/\text{H}_2\text{CO}_3$  的量最大，在维持 pH 值恒定过程中也最为重要。

6.【答案】D。解析：血液由血浆和悬浮其中的血细胞组成。

7.【答案】A。解析：肺泡腔中有较多漏出的水肿液，少量红细胞和气泡，随着病变的进展，可有一些巨噬细胞浸润并吞噬红细胞，将其分解，胞浆内形成棕黄色的含铁黄素，此时称为“心力衰竭细胞”。

8.【答案】B。解析：考查淤血的概念，淤血：细血管和小静脉内血含量增加。

9.【答案】A。解析：延续性血栓的头体尾分别为白色血栓，混合血栓，红色血栓。

10.【答案】C。解析：便血伴发热常见于传染性疾病，如败血症、流行性出血热、钩端螺旋体病或部分恶性肿瘤，如肠道淋巴瘤、白血病等。

11.【答案】A。解析：一般腹泻伴重度脱水见于分泌性腹泻，如霍乱、细菌性食物中毒或尿毒症。

12.【答案】C。解析：患者患有狼疮性疾病（其中抗体直接与组织细胞抗原作用，引起细胞破坏如红细胞、淋巴细胞及血小板壁的特异性抗原与相应的自身抗体结合，分别引起溶血性贫血、淋巴细胞减少症和血小板减少症）。

溶血性黄疸。主要是红细胞本身的内在缺陷或红细胞受外源性因素损伤，使红细胞遭到大量破坏，释放出大量的血红蛋白，致使血浆中非结合型胆红素含量增多，超过肝细胞的处理能力则出现黄疸。

13.【答案】D。

14.【答案】B。解析：注射破伤风抗毒素（TAT）的目的是对可疑或确诊的破伤风患者进行紧急预防或治疗。

15.【答案】B。解析：尊重患者及家属的知情同意权。

16.【答案】C。解析：对于癌症患者应该确诊后告知，以便其配合治疗。

17.【答案】D。解析：评价医德行为的善恶的根本标准是有利于病人、有利于医学发展、有利于生存环境的改善。

18.【答案】B。解析：《传染病防治法》第十五条规定国家实行有计划的预防接种制度。国务院卫生行政部门和省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门，根据传染病预防、控制的需，制定传染病预防接种规划并组织实施。用于预防接种的疫苗必须符合国家标准。

19.【答案】C。解析：《艾滋病防治条例》第三十九条规定未经本人或者其监护人同意，任何单位或者个人不得公开艾滋病病毒感染者、艾滋病病人及其家属的姓名、住址、工作单位、肖像、病史资料以及其他可能推断出其具体身份的信息。

20.【答案】A。解析：医疗机构的免除赔偿责任事由：（1）患者或者其近亲属不配合医疗机构进行符合诊疗规范的诊疗，如果医疗机构及其医务人员也有过错的，医疗机构应当承担相应的赔偿责任；（2）医务人员在抢救生命垂危的患者等紧急情况下已经尽到合理诊疗义务；（3）限于当时的医疗水平难以诊疗。

## 二、单选题（20 题，每题 1 分，共 20 分）

21.【答案】D。解析：第一狭窄位于咽与食管交接处，距中切牙 15cm；第二狭窄位于气管杈水平，左主支气管跨越其前方，相当于胸骨角或第 4 与第 5 胸椎间盘水平，距中切牙 25cm；第三狭窄为食管通过膈食管裂孔处，相当于第 10 胸椎水平，距中切牙约 40cm。

22.【答案】C。解析：上消化道由口腔、咽、食管、胃、十二指肠组成。下消化道由空肠、回肠和大肠组成。

23.【答案】A。解析：脑室中的脉络丛是脑脊液产生的部位。

24.【答案】C。解析：影响动脉血压的因素有：①搏出量：主要影响收缩压。②外周阻力：主要影响舒张压，是影响舒张压最主要的因素；③心率：主要影响舒张压；④大动脉管壁的弹性：缓冲动脉血压变化；⑤循环血量与血管容量之间的比例。老年人的主动脉和大动脉弹性降低，缓冲作用弱，脉压增大。

25.【答案】A。解析：回心血量增多，前负荷增大，但保证心脏射血的物质基础增加，会使搏出量增加。心率过快时，心室充盈不充分，会使搏出量减少。

26.【答案】C。解析：肺活量测定方法简单，重复性好，可反映一次通气的最大能力，是肺功能测定的常用指标。

27.【答案】D。解析：绒毛状腺瘤改变又称乳头状腺瘤、绒毛息肉、绒毛乳头腺瘤、柱状或黏液腺瘤，因其恶性变率可达 30%，又称恶性腺瘤。

28.【答案】D。解析：与 HTLV 感染关系密切的肿瘤是 T 细胞白血病。

29.【答案】D。解析：原发性心肌病是心脏的原发病，与动脉粥样硬化无关。

30.【答案】A。解析：典型急性细菌性痢疾起病急，有发热、腹痛、腹泻、黏液血便和里急后重等症状；粪便检查：为脓血黏液便，镜检有大量脓细胞、红细胞及巨噬细胞，对诊断有意义。急性胃肠炎症状没有这么严重。

31.【答案】D。解析：鉴别良恶性胃溃疡的重要方法是病理学检查。

32.【答案】B。解析：主动脉关闭不全时，收缩压正常或稍高，舒张压明显降低，脉压差明显增大。可出现周围血管体征：水冲脉，毛细血管搏动征，股动脉枪击音，股动脉收缩期和舒张期双重杂音，以及头部随心搏频率的上下摆动。

33.【答案】B。

34.【答案】A。解析：疾病前期为双峰热。

35.【答案】D。解析：医学发展早期医患关系的特征包括：平等性、直接性、主动性、稳定性。

36.【答案】D。

37.【答案】A。解析：医患关系是以社会主义法制为保障建立起来的信托关系。社会主义法制的根本职能是保护人民群众的合法权益，患者就医和医者行医同样受到法律保护。社会主义法制保护了医生为患者提供医疗卫生保健和康复的特殊职权，使之可以获得患者身体、心理、隐私等信息；患者为了诊治疾病的需要而信任医生，将必要的信息告诉医生，并委托医生为其解除疾苦。因此，两者是建立在信赖基础上的特殊人际关系。

38.【答案】C。解析：限制一切活动不妥。

39.【答案】D。解析：任何单位和个人发现传染病病人或者疑似传染病病人时，应当及时向附近的疾病预防控制机构或者医疗机构报告。

40.【答案】C。解析：鼠疫、霍乱属于甲类传染病，丝虫病属于丙类传染病。

## 第二部分 专业知识

**一、单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案，共 20 题，每题 1 分，共 20 分。）**

1.【答案】D。解析：微波和高压蒸汽消毒会损坏随身听，日光暴晒消毒不彻底，环氧乙烷熏蒸消毒最彻底。

2.【答案】B。解析：临床死亡期即为脑死亡：无感受性和反应性，对刺激完全无反应，即使剧痛刺激也不能引出反应；无运动、无呼吸，观察 1 小时后，撤去人工呼吸机 3 分钟，仍无自主呼吸；无反射，瞳孔散大、固定，对光反射消失；无吞咽反射；无角膜反射；无咽反射和跟腱反射；脑电波平坦。以上四项为脑死亡判断标准。

3.【答案】C。解析：有机磷农药中毒时，会出现瞳孔缩小，甚至针尖样瞳孔。

4.【答案】D。解析：无痛注射技术，注射时做到“二快一慢”；注射刺激性强的药物，针头宜细长，且进针要深；先注射无刺激性或刺激性弱的药物，再注射刺激性强的药物，且推药速度宜更慢，以减轻疼痛。

5.【答案】B。解析：大便潜血实验前三天应禁食易造成假阳性含铁丰富的食物，比如动物血以及动物肝脏等。

6.【答案】B。解析：需要时（限用 1 次，12 小时有效）是指临时备用医嘱，其外文缩写是 sos。

7.【答案】C。解析：米泔水样便多见于霍乱。

8.【答案】C。解析：输血发生溶血反应导致急性肾功能衰竭，是因为大量红细胞从血浆进入肾小管，遇酸性物质后形成结晶，阻塞肾小管。表现为少尿或无尿，管型尿和蛋白尿，高钾血症，酸中毒等。

9.【答案】C。

10.【答案】B。解析：机体为避免长时间用热对组织的损伤而引起的防御反应，因为持续用热 30~45 分钟后则血管收缩。

11.【答案】B。解析：血清钠 130mmol/L 为轻度缺钠，而低渗性缺水根据缺钠程度可分为轻度缺钠、中度缺钠、重度缺钠；故此题选 B。

12.【答案】C。解析：由于患者大量出血，并且处于休克状态，所以在患者到达之前，当班护士应立即建立静脉通路，方便后期对患者进行抢救或纠正患者的休克状态。

13.【答案】C。解析：该患者血压测不到，无尿，出现了明显的休克，那么目前最紧急恰当的措施就是给予补液，纠正休克。同时遵医嘱给予其他抢救措施。

14.【答案】C。解析：轻度烧伤：II 度烧伤总面积在 9% 以下；中度烧伤：II 度烧伤面积在 10%~20% 内，或 III 度烧伤面积不足 10%；重度烧伤：烧伤面积 30%~49%，或 III 度烧伤面积 10%~19%；特重烧伤：烧伤总面积在 50% 以上。

15.【答案】D。解析：清创缝合术后出现伤口处肿胀、发红，说明伤口缝合处有炎性液体，应及早拆除缝线进行引流。

16.【答案】D。解析：频发室性早搏是指一分钟内有六次以上的室性早搏，多在器质性心脏病基础上出现，最常见的心脏疾病是高血压、冠心病、心肌病、风湿性心脏病与二尖瓣脱垂病人。

17.【答案】C。解析：内囊是高血压脑出血最常见的出血部位，其最典型的表现“三偏征”，即偏瘫、偏身感觉障碍、偏盲。

18.【答案】D。解析：基础代谢率%=(脉率+脉压)-111。

19.【答案】C。解析：慢性肾衰竭最早出现的表现是消化系统的表现，主要是食欲减退、腹部不适等。

20.【答案】A。解析：慢性呼衰的诊断，除根据原发疾病症状、体征以及缺 O<sub>2</sub> 及 CO<sub>2</sub> 潴留的表现外，动脉血气分析是确诊呼吸衰竭的重要依据。慢性呼衰典型的动脉血气改变是 PaO<sub>2</sub><60mmHg，伴或不伴 PaCO<sub>2</sub>>50mmHg，临床上以伴有 PaCO<sub>2</sub>>50mmHg (II 型呼衰) 常见。

**二、系列单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案，共 10 题，每题 1.5 分，共 15 分。）**

1.【答案】D。解析：腹部 X 线检查出现胀气肠袢及数个气液平面为肠梗阻的典型征象。

2.【答案】A。解析：肠粘连是术后常见并发症。该患者半年前曾作阑尾炎切除术，且发病前有暴饮暴食，呕吐宿食，体征表现为机械性肠梗阻，未见血运障碍及肠动力消失，故优先考虑粘连性肠梗阻。

3.【答案】C。解析：由于患者腹部尚软，轻度压痛，肠鸣音亢进，未见出血征象，故可排除绞窄性肠梗阻。

4.【答案】E。解析：急腹症时慎用吗啡类药物止痛，以免掩盖病情。

5.【答案】A。解析：室间隔缺损体征：心尖搏动增强并向左下移位，心界向左下扩大，典型体征为胸骨左缘第 3~4 肋间有 4~5 级粗糙收缩期杂音，向心前区传导，伴收缩期细震颤。若分流量大时，心尖部可有功能性舒张期杂音，肺动脉瓣第二心音亢进及分裂。严重时，肺动脉瓣区有相对肺动脉瓣关闭不全的舒张期杂音，原间隔缺损的收缩期杂音可减弱或消失。

6.【答案】E。解析：最常见的并发症为肺部感染。

7.【答案】A。解析：强心苷应在服药前测脉搏，一般脉率不得低于 80 次/分。

8.【答案】B。解析：该患者为弛张热，特点为平均体温为 39℃ 以上，但波动幅度大，24h 体温差在 1℃ 以上，最低体温仍高于正常水平。

9.【答案】E。解析：患者表现为退热期循环衰竭的症状。

10.【答案】A。解析：患者发热多日，退热后应注意补充营养和水分，鼓励患者多喝水，给予患者高热量、高蛋白、高维生素、易消化的流质或半流质饮食，不适宜给予高脂饮食。

**三、多项选择题（请根据题目要求，在五个选项中选出两个或两个以上恰当的答案，多选和未选均不得分。共 10 题，每题 1.5 分，共 15 分。）**

1.【答案】ABC。解析：胸外心脏按压的频率为 100~120 次/分；因患者已经出现心跳呼吸停止，护士应立即告知医生，并协助抢救。

2.【答案】AC。解析：打气不可过猛过高，充气至肱动脉搏动音消失再升高 20~30mmHg。需密切观察血压时，应做到四定，即定时间、定部位、定体位、定血压计。



袖带平整地缠绕于上臂中部，袖带下缘距肘窝 2~3cm，松紧以能放入 1 指为宜。听诊器胸件置于肱动脉搏动最明显处。偏瘫患者测血压时应选择健侧。

3.【答案】ABC。

4.【答案】CD。解析：凡危重、抢救、大手术后、特殊治疗或需严密观察病情者，须做好特别护理观察记录，以便及时了解和全面掌握患者情况，观察治疗或抢救后的效果。

5.【答案】ABCD。解析：冷疗的作用：（1）控制炎症扩散：适用于炎症早期的病人；（2）减轻疼痛：常用于牙痛、烫伤等病人；（3）减轻局部充血或出血：用于扁桃体摘除术后、鼻出血、局部软组织损伤早期；（4）降低体温：用于高热、中暑、脑外伤患者。

6.【答案】ABC。解析：人工排痰要求叩击者手指指腹并拢，用手腕的力量，从肺底自下而上，由外向内叩击。

7.【答案】ABC。解析：室性期前收缩：

（1）QRS 波群提前出现，形态宽大畸形，QRS 时限>12s；

（2）与前一个 p 波无相关；

（3）T 波常与 QRS 波群的主波方向相反；

（4）期前收缩后有完全代偿间歇。

8.【答案】ABCDE。解析：重症肝炎临床表现：极度虚弱，食欲极度减退，上腹部不适，黄疸迅速加剧，并且患者还会出现精神、神经症状等等。

9.【答案】ABDE。解析：C 项应为少渣食物，避免进食过多粗纤维食物。

10.【答案】ABE。解析：小脑的主要功能为维持姿势平衡、调节肌紧张、协调随意运动。小脑损伤时可出现眼球震颤、共济失调和意向性震颤。小脑损伤时随意运动为丧失，而表现为患者随意运动的力量、方向、速度均不能很好的控制，表现为四肢乏力、行走摇晃不稳等。

**四、系列多项选择题（请根据题目要求，在五个选项中选出两个或两个以上恰当的答案，多选和未选均不得分。共 10 题，每题 2 分，共 20 分。）**

1.【答案】ACE。解析：极期时，患者出现的高热、惊厥、呼吸衰竭极为凶险，三者互为因果，相互影响。

2. 【答案】ABCD。解析：惊厥发作时切勿用力牵拉或按压患者肢体，以防引起骨折。
3. 【答案】ABCE。解析：惊厥不是护理诊断。
4. 【答案】ACE。解析：流行性乙型脑炎是由乙型脑炎病毒引起，蚊虫为主要的传播媒介，对流行性乙型脑炎的预防主要采取两方面的措施，即防蚊灭蚊和预防接种乙脑疫苗。
5. 【答案】BDE。解析：该患者应禁食，在瘘管形成、病情好转后再进行封闭瘘口。
6. 【答案】ACDE。解析：由于患者已出现吻合瘘及腹腔感染症状，故在腹膜炎未控制前不能给予肠内营养，应禁食、胃肠减压，保持腹腔引流管通畅；取半坐卧位。
7. 【答案】ABE。解析：当患者出现术后排尿困难时，可能是由于麻醉反应所致，可先采取物理方法去诱导患者进行排尿；若仍然无法排尿，可告知医生，采取相应措施。
8. 【答案】ABCD。解析：阑尾术后患者采取半坐卧位可松弛腹肌，减轻腹部切口缝合处的张力，缓解疼痛，促进舒适，有利于伤口愈合。。
9. 【答案】ABD。解析：对于采集血清标本，采集后应取下针头，将血液沿管壁缓慢注入干燥试管内，避免震荡防止红细胞破裂溶血。
10. 【答案】ABCE。解析：试管外签应注明科室、姓名、床号、送检目的；特殊标本还应注明采集时间。