

2020 年全国军队文职人员招聘考试市场模拟卷

《医基 + 护理》参考答案及解析

第一部分 基础综合

一、单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。共 20 题，每题 0.5 分，共 10 分。）

1.【答案】D。解析：黄体生成素又称促黄体素，该激素含量升高达到高峰是机体排卵的标志。

2.【答案】B。解析：房室延搁的生理意义是使心房和心室不同时收缩，进而使血液能顺序流动。

3.【答案】D。解析：肠结核病溃疡型，肠壁淋巴管环肠管走行，病变沿淋巴管扩散，因此典型的肠结核溃疡多呈环形，其长轴与肠腔长轴垂直。溃疡边缘参差不齐，一般较浅，底部有干酪样坏死物，其下为结核性肉芽组织。

4.【答案】D。解析：细胞坏死镜下主要形态表现是核浓缩、核碎裂、核溶解。

5.【答案】D。解析：胸锁乳突肌收缩使头向同侧倾斜，脸转向对侧。

6.【答案】B。解析：胆囊为贮存和浓缩胆汁的器官。胆囊管和肝总管合成胆总管，囊底是胆囊突向前下方的盲端，常在肝前缘的胆囊切迹处露出。当胆汁充满时，胆囊底可贴近腹前壁。胆囊底的体表投影位于右腹直肌外缘或右锁骨中线与右肋弓交点附近。

7.【答案】A。解析：自前向后分为肺静脉、肺动脉、主支气管。自上而下，左肺根内部结构的排列为左肺动脉、左主支气管和左肺静脉，右肺根为右肺上叶支气管、右肺动脉、右肺中下叶支气管和右肺静脉。

8.【答案】C。解析：膀胱直肠陷凹属于男性所有。

9.【答案】D。解析：淋巴管壁平滑肌的收缩活动和淋巴管中的瓣膜共同构成“淋巴管泵”，能推进淋巴液流动。淋巴管周围组织对淋巴管的压迫也能推动淋巴液的流动。在部分淋巴管中，淋巴的流动是单向的，最终流入静脉角。

10.【答案】C。解析：下斜肌收缩时瞳孔转向上外，上斜肌收缩时瞳孔转向下外。

11.【答案】B。解析：肺气肿的基本病理：慢性炎症改变导致远端细支气管及肺泡管等肺支架结构破坏，从而导致气流受限。机理：吸气时胸廓扩张，胸腔负压增高，肺

被动扩张，气体进入肺泡；当呼气时胸廓及肺脏弹性回缩，胸腔内压增高导致远端已被炎症破坏的细支气管及肺泡管塌陷，而肺泡内气体排出障碍，肺泡内压增高；长期发展导致肺泡扩大，肺容积扩大，即肺气肿；肺泡破裂、融合则形成肺大疱，肺脏容积的扩大导致肺下界下移，膈肌下移，相对肝浊音界及肝浊音界均相应下移。

12.【答案】C。解析：潜伏性感染是指病原体寄生在机体中某些部位机体免疫功能足以将病原体局限化不引起显性感染，病原体长期潜伏下来，待机体免疫功能下降时，才引起显性感染。潜伏性感染期间，病原体一般不排出体外，因而不具有传染源作用。这是与病原携带状态不同之处。

13.【答案】C。解析：心包摩擦音是急性心包炎典型的体征，呈抓刮样粗糙音，多位于心前区，以胸骨左缘第3~4肋间最为明显，坐位时身体前倾，深吸气或将听诊器加压更易听到。

14.【答案】D。解析：II型呼吸衰竭不能用高流量吸氧，以防呼吸抑制。患者呼吸合并代酸，pH值<7.15需要补碱治疗，边治疗边观察。逐步纠正酸中毒是治疗的基本原则，不能迅速将pH值迅速升至正常，过快的纠正会出现低钙低钾及红细胞氧合功能降低。

15.【答案】D。解析：骨盆骨折多有强大暴力外伤史，主要是车祸、高空坠落和工业意外。多存在严重的多发伤，休克常见。骨盆骨折可发现下列体征：①骨盆分离试验与挤压试验阳性；②肢体长度不对称；③会阴部瘀斑是耻骨和坐骨骨折的特有体征。

16.【答案】D。解析：药品监督管理部门进行监督检查时，必须出示证明文件，对监督检查中知悉的被检查人的技术秘密和业务秘密应当保密。

17.【答案】B。解析：《医疗事故处理条例》第16条规定：发生医疗事故争议时，死亡病例讨论记录、疑难病例讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录应当在医患双方在场的情况下封存和启封。封存的病历资料可以是复印件，由医疗机构保管。

18.【答案】D。

19.【答案】C。解析：共同参与型：医生和病人有近似相等的权利和地位。病人的地位进入伙伴关系，适用于成年人之间。

20.【答案】B。解析：不可强制病人进行必要的治疗，不符合医师的道德义务。

二、单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。共20

题，每题1分，共20分）

21.【答案】A。解析：小肠上皮、肾小管上皮通过继发性主动转运吸收葡萄糖、氨基酸。

22.【答案】D。解析：兴奋性突触后电位是一种局部性的去极化电位。

23.【答案】A。解析：肌肉活动对能量代谢的影响最为显著，主要以增加肌肉耗氧量而做外功，使能量代谢率升高。

24.【答案】B。解析：肺腺癌多为周围型，与吸烟关系不密切。腺癌可分为高、中、低分化，细支气管肺泡细胞癌也是肺腺癌的一个亚型。癌组织可形成腺腔乳头，可伴有黏液分泌。常有肺门淋巴结转移。

25.【答案】D。解析：根据水肿波及的范围分为全身性水肿和局部性水肿。

26.【答案】D。解析：脊柱由24块椎骨、1块骶骨、1块尾骨构成，颈曲、腰曲凸向前，胸曲、骶曲凸向后，后纵韧带位于椎管内椎体的后面，而非脊柱后方。腰大肌能使髋关节前屈和旋外，腰方肌能使脊柱侧屈。

27.【答案】A。解析：肩关节活动度大，是最常发生习惯性脱位的关节。

28.【答案】D。解析：胸膜腔、腹膜腔、心包腔均为男性、女性共有的浆膜腔。

29.【答案】A。解析：肺循环过程为右心室→肺动脉→肺泡毛细血管网→氧合→肺静脉→左心房。其中无主动脉。

30.【答案】A。解析：冠状动脉是心脏的主要供血动脉。前降支为左冠状动脉主干的延续，后降支又称后室间支，为右冠状动脉行走至后十字交叉处分出的一较大分支。由于冠状动脉在心肌内行走，显然会受制于心肌收缩挤压的影响，因此，心脏收缩时，血液不易通过，只有当其舒张时，心脏方能得到足够的血流。

31.【答案】A。解析：血清淀粉酶（AMS）高于500IU/L有诊断意义，达到350IU/L应怀疑此病。

32.【答案】A。解析：肝细胞性黄疸血清总胆红素升高，其中以结合胆红素升高为主。尿中胆红素阳性，尿胆原常增加，根据题干可考虑为肝细胞性黄疸。

33.【答案】A。解析：省、自治区、直辖市人民政府可以决定对本行政区域内的甲类传染病疫区实施封锁；但是，封锁大、中城市的疫区或者封锁跨省、自治区、直辖市的疫区，以及封锁疫区导致中断干线交通或者封锁国境的，由国务院决定。疫区封锁的解除，由原决定机关决定并宣布。

34.【答案】B。解析：正常菌群作为抗原可促进宿主器官的发育，刺激免疫系统的成熟与免疫应答。产生的免疫物质对具有交叉抗原组分的致病菌有一定程度的抑制或杀灭作用。

35.【答案】A。解析：出现心室夺获及室性融合波是室性心动过速的特征性表现。

36.【答案】C。解析：患者胸痛、咳铁锈色痰，X片显示右肺中叶大片密度增高阴影，痰培养G⁺双球菌，菊糖发酵试验可分离出肺炎链球菌，故可判断为大叶性肺炎。肺结核患者多为低热。

37.【答案】D。解析：脑血管意外是我国高血压病的最见死亡原因。

38.【答案】C。解析：乳房囊性增生疼痛与月经周期有关，在月经前后出现胀痛。

39.【答案】A。解析：开放性气胸患者的抢救措施最重要的是变开放为闭合，所以要迅速封闭胸部伤口。

40.【答案】C。解析：根据突发卫生事件性质、危害程度、涉及范围，《国家突发公共卫生事件应急预案》将突发公共卫生事件划分为特别重大（Ⅰ）、重大（Ⅱ）、较大（Ⅲ）和一般（Ⅳ）四级，依次用红色、橙色、黄色、蓝色进行预警。

第二部分 专业知识

一、单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案，共 20

题，每题 1 分，共 20 分。）

1.【答案】B。解析：胆囊造影检查前一日晚餐进无脂肪、低蛋白、高糖类饮食，晚餐后服造影剂，禁食、水、烟至次日上午。检查当日早晨禁食，第一次拍 X 片后，胆囊显影良好，可进高脂肪餐。

2.【答案】B。解析：青霉素过敏性休克时采取的关键措施是皮下注射 0.1%盐酸肾上腺素 1ml，故此题的选项为 B。

3.【答案】D。解析：对易发生坠床、撞伤、抓伤、自伤、伤人等意外事件的患者，如小儿、躁动不安、意识不清者，应用保护具以限制其身体或肢体活动，确保患者的安全，保证治疗、护理顺利进行。

4.【答案】A。解析：敌百虫遇碱性药物进而分解出毒性更强的敌敌畏，其分解过程虽碱性的增强和温度的升高而加速。

5.【答案】A。解析：代谢性酸中毒病人呼吸表现为深长而规则的呼吸。

6.【答案】D。解析：盐酸氨溴索（沐舒坦）可促进呼吸道内黏稠分泌物的排出及减少黏液的滞留，可显著促进排痰。

7.【答案】B。解析：慢性支气管炎的患者在冬季可适当外出活动，适应寒冷环境，增强耐力，提高体质。

8.【答案】C。解析：Ⅱ型呼吸衰病人因缺氧和二氧化碳潴留会出现嗜睡现象。

9.【答案】D。解析：患者全身明显水肿，尿蛋白（+），血肌酐正常，故饮食应低盐以避免加重水钠潴留、正常量优质蛋白为主。

10.【答案】A。解析：高血压是公认的脑血管病最重要的独立危险因素。血压越高，脑卒中风险就越大。

11.【答案】B。解析：心源性呼吸困难常表现为：（1）劳力性呼吸困难，在体力活动时发生或加重，休息后缓解或消失，常为左心衰竭最早出现的症状；（2）夜间阵发性呼吸困难，病人在夜间已入睡后因突发胸闷、气急而憋醒，被迫坐起，呼吸深快。轻者数分钟至数十分钟后症状逐渐缓解，重者可伴有咳嗽、咳白色泡沫痰、气喘、发绀、肺部哮鸣音，称为“心源性哮喘”；（3）端坐呼吸，严重肺淤血的表现，即静息状态下病人仍觉呼吸困难，不能平卧。

12.【答案】A。

13.【答案】C。解析：使用过程中需要严密监测血压的是硝普钠，硝普钠是血管扩张剂缓慢静脉滴入，可扩张小静脉和小动脉，应严密监测血压。

14.【答案】A。解析：全身麻醉简称全麻，指麻醉药经呼吸道吸入或静脉注射、肌肉注射，产生中枢神经系统抑制，使病人意识消失而周身不感到疼痛。它包括吸入麻醉和静脉麻醉。

15.【答案】A。解析：混合痔由内痔通过静脉丛和相应部位外痔静脉丛互相吻合并扩张而成。位于齿状线上、下，表面被直肠黏膜和肛管皮肤覆盖，对疼痛不敏感。内痔表面覆盖直肠黏膜，多位于直肠下端、直肠上动脉分支处，即截石位3、7、11点，基底较宽。Ⅱ期内痔和Ⅲ期内痔主要的区别是痔脱出后能否自行回纳。

16.【答案】B。解析：直肠指检是肛肠科必用的一种检查手段。若指检后发现指套表面带有黏液、脓液或血液，怀疑直肠肛门里有炎症或伴肿瘤组织破溃；直肠癌及直肠息肉，可通过该检查而早期被发现；痔疮、肛瘘、肛门及直肠周围脓肿、肛乳头肥大、肛乳头瘤等疾病，也可以通过直肠指检而被发现。肛裂是齿状线以下肛管皮肤层裂伤后形成的小溃疡，其方向与肛管纵轴平行，常引起剧痛，愈合困难，故不宜采取直肠指检进行检查。

17.【答案】A。解析：肛裂切除术后的患者，切口出血多发生于术后1~7日，常见原因多为术后便秘、猛烈咳嗽、用力排便等。

18.【答案】D。解析：甲状腺危象是甲亢术后严重并发症之一，表现为术后12到36小时内出现高热39℃，脉快、虚弱大汗、烦躁不安，甚至昏迷、呕吐、腹泻。

19.【答案】B。解析：甲状腺功能亢进患者术前通过药物降低基础代谢率是甲亢病人手术准备的重要环节，可选用药物有：（1）单用碘剂，当病人情绪稳定，睡眠好转，体重增加，脉率稳定在每分钟90次以下，脉压恢复正常，基础代谢率+20%以下，便可

进行手术；（2）硫脲类药物加用碘剂；（3）碘剂加用硫脲类药物后再单用碘剂；（4）普萘洛尔单用或合用碘剂，并给予高热量、高蛋白质和富含纤维素的食物。

20.【答案】B。解析：根据题意，该患者的昏迷中有一中间清醒期，这是急性硬膜外血肿的典型症状。

二、系列单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案，共

10 题，每题 1.5 分，共 15 分。）

1.【答案】D。解析：地高辛属于洋地黄类药物，应严格按时按医嘱给药，口服地高辛期间若病人脉搏低于 60 次/分或节律不规则应暂停给药，报告医生。

2.【答案】D。解析：根据患者的临床表现恶心、呕吐、视物模糊，判断患者出现洋地黄中毒，此时应立即停用洋地黄并报告医生。

3.【答案】D。解析：“三查七对”主要是针对病人服药，注射，输液的查对制度，减少操作差错。一注意：注意观察用药后的反应。

4.【答案】D。解析：（1）易挥发、潮解、风化的药物须装瓶、盖紧，如乙醇、过氧乙酸、酵母片等；（2）易氧化和遇光变质的药物，装在有色密盖瓶中放阴凉处，如维生素、氨茶碱等；（3）易燃烧的药物，应远离明火，如乙醚、乙醇等；（4）易被热破坏的药物，须放 2~10℃的冰箱内保存，如疫苗、抗毒血清、白蛋白、青霉素皮试液。

5.【答案】D。解析：助消化及对胃黏膜有刺激的药物应在饭后服用。

6.【答案】D。解析：茶碱类药物具有舒张支气管平滑肌的作用。

7.【答案】C。解析：吸气和呼气时间比为 1:2 或 1:3。

8.【答案】D。解析：戒烟是预防 COPD 的重要措施。

9.【答案】B。解析：急性胰腺炎病人常因疼痛而被迫采用弯腰屈膝侧卧位，以缓解疼痛。

10.【答案】A。解析：禁食、胃肠减压目的在于减少胃酸分泌，进而减少胰液分泌，已减轻腹痛和腹胀。

三、多项选择题（请根据题目要求，在五个选项中选出两个或两个以上恰当的答案。

共 10 题，每题 1.5 分，共 15 分。）

1. 【答案】ABC。解析：为了不被其传染，医务人员可以佩戴防护眼镜、手套，防渗透性口罩等。
2. 【答案】BC。解析：凡初次用药、停药3天后再用，以及在应用中更换青霉素批号时，均需按常规做过敏试验。
3. 【答案】ABCE。解析：能促进食欲的护理措施有：保证病室环境整洁、舒适；做好基础护理，使患者口腔清洁；保证患者食具清洁、食物温度适宜；减轻患者的不适，提升患者舒适感；使患者情绪稳定，精神愉快。
4. 【答案】BE。解析：去甲肾上腺素药液外漏会引起组织血管的强烈收缩，造成组织坏死。25%山梨醇溶液属于高渗溶液，外渗可致组织水肿、皮肤坏死。
5. 【答案】BCDE。解析：昏迷患者从臼齿放入开口器，禁忌漱口和棉球过湿，止血钳夹紧棉球每次1个，防止棉球滑落引起窒息。
6. 【答案】BCE。解析：鼓励SLE患者进食高蛋白、高糖和高维生素饮食，少食多餐，宜软食，忌食芹菜、无花果、蘑菇、烟熏食物及辛辣等刺激性食物，以免加重皮肤损害。
7. 【答案】BCD。解析：经过血液-体液传播：乙型病毒性肝炎、丙型病毒性肝炎、丁型病毒性肝炎；粪-口途径传播：甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎。
8. 【答案】ABCDE。解析：术后应用镇痛药物能够减轻患者术后的疼痛和应激反应，减少术后并发症，例如减少肺部并发症，能够改善病人的呼吸幅度保持肺泡膨胀，促使病人咳嗽排痰。同时也能减少心血管并发症，减轻焦虑，改善睡眠。
9. 【答案】BCD。解析：全麻苏醒期患者应取去枕平卧位，头偏向一侧，清醒前不能饮水，防止呛咳、误吸。
10. 【答案】ABCD。解析：长期卧床，甲亢患者尿钙增加，痛风病人，使用抗结核抗肿瘤药物者的尿中易形成尿酸结石和胱氨酸结晶；尿路感染时细菌、坏死组织等均可成为结石的核心。

四、系列多项选择题（请根据题目要求，在五个选项中选出两个或两个以上恰当的

答案。共10题，每题2分，共20分。）

1.【答案】AD。解析：压疮溃疡期的表现是创面感染，有脓性分泌物，重者还会有坏死组织。

2.【答案】ADE。解析：俯卧位：面颊、耳廓、肩部、女性乳房、男性生殖器、骶嵴、膝部及足尖处。

3.【答案】AD。解析：患者具有长期卧床的危险因素，局部受压过久；此外，患者近两月因食欲不佳、恶心等因素导致机体摄入能量、营养不足，也是导致压疮的另一主要因素。

4.【答案】ABCD。解析：预防压疮应至少每 2 小时翻身一次。

5.【答案】ABDE。解析：化学治疗的原则为：早期、联合、适量、规律和全程。

6.【答案】ABD。解析：链霉素主要不良反应为听力损伤、眩晕、肾损害。

7.【答案】ABCDE。

8.【答案】ABCDE。解析：白血病的病因迄今尚未明了，实验与临床资料表明，白血病的发病与下列因素有关：（1）生物因素：主要包括病毒感染及自身免疫功能；（2）化学因素：一些化学物质有致白血病的作用，如接触苯及其衍生物，还有某些抗肿瘤的细胞毒药物如氮芥、环磷酰胺、丙卡巴肼、依托泊苷等；（3）放射因素：X 射线、电离辐射等；（4）遗传因素等。

9.【答案】BCDE。解析：化疗时应注意：（1）合理使用静脉：首选中心静脉置管，如外周穿刺中心静脉导管、植入式静脉输液港。如果应用外周浅表静脉，尽量选择粗直的静脉。（2）静脉注射时先用生理盐水冲洗，确定注射针头在静脉内方可注入药物，推注速度要慢，边推边抽回血，确保药物在血管内，药物输注完毕再用生理盐水 10~20ml 冲洗后拔针，以减轻药物对局部血管的刺激。（3）联合化疗时，先输注对血管刺激性小的药物，再输注刺激性发疱性药物。

10.【答案】ABCD。解析：脑出血患者 24~48 小时内应暂禁食，发病第 2~3 天遵医嘱可给予鼻饲饮食。白血病患者如白细胞降至 $3.5 \times 10^9/L$ 以下时，应暂停放疗，预防感染，注意保暖，同时，做好口腔护理，预防口腔感染，给补血药物，增加营养。