

2020 年全国军队文职专业课考试

《临床医学》模拟卷一 答案及解析

第一部分 基础知识

一、单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。共 20

题，每题 0.5 分，共 10 分。）

1.【答案】D。解析：黄体生成素又称促黄体素，该激素含量升高达到高峰是机体排卵的标志。

2.【答案】B。解析：房室延搁的生理意义是使心房和心室不同时收缩，进而使血液能顺序流动。

3.【答案】D。解析：肠结核病溃疡型，肠壁淋巴管环肠管走行，病变沿淋巴管扩散，因此典型的肠结核溃疡多呈环形，其长轴与肠腔长轴垂直。溃疡边缘参差不齐，一般较浅，底部有干酪样坏死物，其下为结核性肉芽组织。

4.【答案】D。解析：细胞坏死镜下主要形态表现是核浓缩、核碎裂、核溶解。

5.【答案】D。解析：胸锁乳突肌收缩使头向同侧倾斜，脸转向对侧。

6.【答案】B。解析：胆囊为贮存和浓缩胆汁的器官。胆囊管和肝总管合成胆总管，囊底是胆囊突向前下方的盲端，常在肝前缘的胆囊切迹处露出。当胆汁充满时，胆囊底可贴近腹前壁。胆囊底的体表投影位于右腹直肌外缘或右锁骨中线与右肋弓交点附近。

7.【答案】A。解析：自前向后分为肺静脉、肺动脉、主支气管。自上而下，左肺根内部结构的排列为左肺动脉、左主支气管和左肺静脉，右肺根为右肺上叶支气管、右肺动脉、右肺中下叶支气管和右肺静脉。

8.【答案】C。解析：膀胱直肠陷凹属于男性所有。

9.【答案】D。解析：淋巴管壁平滑肌的收缩活动和淋巴管中的瓣膜共同构成“淋巴管泵”，能推进淋巴液流动。淋巴管周围组织对淋巴管的压迫也能推动淋巴液的流动。在部分淋巴管中，淋巴的流动是单向的，最终流入静脉角。

10.【答案】C。解析：下斜肌收缩时瞳孔转向上外，上斜肌收缩时瞳孔转向下外。

11.【答案】B。解析：肺气肿的基本病理：慢性炎症改变导致远端细支气管及肺泡管等肺支架结构破坏，从而导致气流受限。机理：吸气时胸廓扩张，胸腔负压增高，肺被动扩张，气体进入肺泡；当呼气时胸廓及肺脏弹性回缩，胸腔内压增高导致远端已被

炎症破坏的细支气管及肺泡管塌陷，而肺泡内气体排出障碍，肺泡内压增高；长期发展导致肺泡扩大，肺容积扩大，即肺气肿；肺泡破裂、融合则形成肺大疱，肺脏容积的扩大导致肺下界下移，膈肌下移，相对肝浊音界及肝浊音界均相应下移。

12.【答案】C。解析：潜伏性感染是指病原体寄生在机体中某些部位机体免疫功能足以将病原体局限化不引起显性感染，病原体长期潜伏下来，待机体免疫功能下降时，才引起显性感染。潜伏性感染期间，病原体一般不排出体外，因而不具有传染源作用。这是与病原携带状态不同之处。

13.【答案】C。解析：心包摩擦音是急性心包炎典型的体征，呈抓刮样粗糙音，多位于心前区，以胸骨左缘第3~4肋间最为明显，坐位时身体前倾，深吸气或将听诊器加压更易听到。

14.【答案】D。解析：II型呼吸衰竭不能用高流量吸氧，以防呼吸抑制。患者呼吸合并代酸，pH值<7.15需要补碱治疗，边治疗边观察。逐步纠正酸中毒是治疗的基本原则，不能迅速将pH值迅速升至正常，过快的纠正会出现低钙低钾及红细胞氧合功能降低。

15.【答案】D。解析：骨盆骨折多有强大暴力外伤史，主要是车祸、高空坠落和工业意外。多存在严重的多发伤，休克常见。骨盆骨折可发现下列体征：①骨盆分离试验与挤压试验阳性；②肢体长度不对称；③会阴部瘀斑是耻骨和坐骨骨折的特有体征。

16.【答案】D。解析：药品监督管理部门进行监督检查时，必须出示证明文件，对监督检查中知悉的被检查人的技术秘密和业务秘密应当保密。

17.【答案】B。解析：《医疗事故处理条例》第16条规定：发生医疗事故争议时，死亡病例讨论记录、疑难病例讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录应当在医患双方在场的情况下封存和启封。封存的病历资料可以是复印件，由医疗机构保管。

18.【答案】D。

19.【答案】C。解析：共同参与型：医生和病人有近似平等的权利和地位。病人的地位进入伙伴关系，适用于成年人之间。

20.【答案】B。解析：不可强制病人进行必要的治疗，不符合医师的道德义务。

二、单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。共20

题，每题1分，共20分）

21.【答案】A。解析：小肠上皮、肾小管上皮通过继发性主动转运吸收葡萄糖、氨基酸。

22.【答案】D。解析：兴奋性突触后电位是一种局部性的去极化电位。

23.【答案】A。解析：肌肉活动对能量代谢的影响最为显著，主要以增加肌肉耗氧量而做外功，使能量代谢率升高。

24.【答案】B。解析：肺腺癌多为周围型，与吸烟关系不密切。腺癌可分为高、中、低分化，细支气管肺泡细胞癌也是肺腺癌的一个亚型。癌组织可形成腺腔乳头，可伴有黏液分泌。常有肺门淋巴结转移。

25.【答案】D。解析：根据水肿波及的范围分为全身性水肿和局部性水肿。

26.【答案】D。解析：脊柱由24块椎骨、1块骶骨、1块尾骨构成，颈曲、腰曲凸向前，胸曲、骶曲凸向后，后纵韧带位于椎管内椎体的后面，而非脊柱后方。腰大肌能使髋关节前屈和旋外，腰方肌能使脊柱侧屈。

27.【答案】A。解析：肩关节活动度大，是最常发生习惯性脱位的关节。

28.【答案】D。解析：胸膜腔、腹膜腔、心包腔均为男性、女性共有的浆膜腔。

29.【答案】A。解析：肺循环过程为右心室→肺动脉→肺泡毛细血管网→氧合→肺静脉→左心房。其中无主动脉。

30.【答案】A。解析：冠状动脉是心脏的主要供血动脉。前降支为左冠状动脉主干的延续，后降支又称后室间支，为右冠状动脉行走至后十字交叉处分出的一较大分支。由于冠状动脉在心肌内行走，显然会受制于心肌收缩挤压的影响，因此，心脏收缩时，血液不易通过，只有当其舒张时，心脏方能得到足够的血流。

31.【答案】A。解析：血清淀粉酶（AMS）高于500IU/L有诊断意义，达到350IU/L应怀疑此病。

32.【答案】A。解析：肝细胞性黄疸血清总胆红素升高，其中以结合胆红素升高为主。尿中胆红素阳性，尿胆原常增加，根据题干可考虑为肝细胞性黄疸。

33.【答案】A。解析：省、自治区、直辖市人民政府可以决定对本行政区域内的甲类传染病疫区实施封锁；但是，封锁大、中城市的疫区或者封锁跨省、自治区、直辖市的疫区，以及封锁疫区导致中断干线交通或者封锁国境的，由国务院决定。疫区封锁的解除，由原决定机关决定并宣布。

34.【答案】B。解析：正常菌群作为抗原可促进宿主器官的发育，刺激免疫系统的成熟与免疫应答。产生的免疫物质对具有交叉抗原组分的致病菌有一定程度的抑制或杀灭作用。

35.【答案】A。解析：出现心室夺获及室性融合波是室性心动过速的特征性表现。

36.【答案】C。解析：患者胸痛、咳铁锈色痰，X片显示右肺中叶大片密度增高阴影，痰培养G⁺双球菌，菊糖发酵试验可分离出肺炎链球菌，故可判断为大叶性肺炎。肺结核患者多为低热。

37.【答案】D。解析：脑血管意外是我国高血压病的最见死亡原因。

38.【答案】C。解析：乳房囊性增生疼痛与月经周期有关，在月经前后出现胀痛。

39.【答案】A。解析：开放性气胸患者的抢救措施最重要的是变开放为闭合，所以要迅速封闭胸部伤口。

40.【答案】C。解析：根据突发卫生事件性质、危害程度、涉及范围，《国家突发公共卫生事件应急预案》将突发公共卫生事件划分为特别重大（Ⅰ）、重大（Ⅱ）、较大（Ⅲ）和一般（Ⅳ）四级，依次用红色、橙色、黄色、蓝色进行预警。

第二部分 专业知识

一、单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。共 20

题，每题 1 分，共 20 分。）

41.【答案】C。解析：肺泡水肿主要表现为腺泡状致密阴影，呈不规则相互融合的模糊阴影，弥漫分布或局限于一侧或一叶，或从肺门两侧向外扩展逐渐变淡成典型的蝴蝶状阴影。

42.【答案】D。解析：胃镜检查：①胃黏膜颜色变淡；②黏膜下血管透见；③黏膜皱襞细小甚至消失；④当萎缩性胃炎伴有腺体颈部过度增生或肠上皮化生时，黏膜表面粗糙不平，呈颗粒状或结节状，有时可见假息肉形成，而黏膜下血管显露的特征常被掩盖；⑤萎缩黏膜脆性增加，易出血，并可有糜烂灶；⑥萎缩性胃炎可同时伴有慢性浅表性胃炎的表现，如充血红斑、附着黏液以及反光增强等。

43.【答案】D。解析：我国最常见的肝硬化致病原因为肝炎病毒感染，其中乙型肝炎病毒感染最多见，所以其引起的肝性脑病也最多见。

44.【答案】A。

45.【答案】D。解析：胰岛素主要的不良反应是低血糖，与剂量过大和饮食失调有关。

46.【答案】B。解析：亚急性感染性心内膜炎引起栓塞临床最常见的是脑栓塞。

47.【答案】C。解析：心脏负荷过重为引起心衰的一个重要原因。心脏负荷包括前负荷（容量负荷）和后负荷（压力负荷）。压力负荷见于：高血压、主动脉瓣狭窄、肺动脉高压、肺动脉瓣狭窄等。

48.【答案】D。解析：重度支气管哮喘的抢救措施有：吸氧、改善通气、支气管解痉、控制感染、纠正水和电解质平衡失调、应用糖皮质激素。不采用注射强心剂的治疗方法。

49.【答案】C。解析：有资料显示 AL 死于出血者占 62.24%，其中 87%为颅内出血。

50.【答案】D。解析：肺脓肿起病急，且表现为咳大量脓痰，因其致病菌多为厌氧菌，所以头孢菌素无效。支气管扩张多慢性起病。细菌性肺炎常咳铁锈色痰而无大量黄脓痰，头孢菌素常对金葡菌肺炎有效。

51.【答案】B。解析：伴有糖尿病的无症状的胆囊结石不建议手术治疗，因手术的并发症较多。

52.【答案】D。解析：关节脱位特有体征包括：关节畸形、弹性固定、关节盂空虚。

53.【答案】C。解析：急性血源性骨髓炎多发生于儿童及青少年，起始于长骨的干骺端，成团的细菌在此处停滞繁殖。

54.【答案】B。解析：骨肉瘤可发生在任何年龄，但大多在10~25岁，男性较多。

55.【答案】D。解析：纠正呼吸性碱中毒主要是积极处理原发病。

56.【答案】B。解析：孕激素抑制子宫肌层收缩，降低妊娠子宫对催产素的敏感性，利于受精卵在宫腔内的生长发育；使增生期子宫内膜转化为分泌期内膜，利于受精卵着床；抑制输卵管节律性收缩的振幅，调节孕卵运行；使宫颈口闭合，抑制宫颈黏液分泌，使宫颈黏液减少、黏稠，拉丝度减少。镜下可见椭圆体状结晶，不利于精子穿透。使阴道上皮细胞脱落加快，角化细胞减少；在已有雌激素影响的基础上，促使乳腺腺泡发育，大量孕激素抑制乳汁分泌；孕激素通过中枢神经系统使体温升高。对下丘脑可产生负反馈作用等。

57.【答案】D。解析：停经35日时，宫腔内见到圆形或椭圆形的妊娠囊。

58.【答案】D。解析：患者心功能III级，不宜妊娠，应在妊娠12周前行治疗性人工流产，控制心衰后终止妊娠。

59.【答案】B。解析：房间隔缺损时，由于右心室增大，大量的血流通过正常的肺动脉瓣时（形成相对狭窄）在左第2肋间近胸骨旁可闻及2~3级喷射性收缩期杂音。

60.【答案】B。解析：惊厥持续5分钟以上则要进行药物止惊，可取地西泮0.3~0.5mg/kg缓慢静脉推注。

二、系列单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。共

10题，每题1.5分，共15分）

61.【答案】B。

62.【答案】D。

63.【答案】B。解析：突然头痛呕吐+脑膜刺激征阳性（颈项强直，克氏征阳性）蛛网膜下腔出血。蛛网膜下腔出血首选的检查是颅脑CT，可以发现颅内的脑池高密度影。控制瞳孔的括约肌受动眼神经的支配，故患者出现右侧瞳孔散大，说明动眼神经麻痹。

64.【答案】C。解析：患者有长期服用硝苯地平的病史，现出现烧心、反流、胸痛的等胃食管返流病的典型表现，食用高脂肪、巧克力等胃食管反流病加重，首先考虑胃食管反流病。

65.【答案】A。解析：内镜检查是诊断反流性食管炎最准确的方法，并能判断反流性食管炎的程度和有无并发症。

66.【答案】D。

67.【答案】B。解析：夏季+高热、抽搐+休克（四肢凉，血压下降）+脑膜刺激征阴性=中毒型细菌性痢疾（颅内出血——上运动神经元损伤；结核性脑膜炎、化脓性脑膜炎的诊断是依靠脑脊液检查）。为确诊，应进一步检查粪常规，黏液脓血便。

68.【答案】B。

69.【答案】C。

70.【答案】D。解析：皮肤紫癜、口腔黏膜血疱——出血；高热——感染；Hb65g/L——贫血，即三系细胞都减少的表现，三系细胞减少的疾病有再障和白血病。白血病的典型表现一胸骨压痛及肝脾肿大，和本例不符合，故本题的诊断是：再生障碍性贫血。再生障碍性贫血的确定性诊断是骨髓穿刺活检，可以发现骨髓增生低下。患者目前 $\text{Plt} 10 \times 10^9/\text{L}$ ，很容易发生出血，及严重的脑出血， Plt 小于 $20 \times 10^9/\text{L}$ 是输血的指征，故本题的正确答案是血小板成分输注。

三、多项选择题（请根据题目要求，在五个选项中选出两个或两个以上恰当的答案，

错选或者多选均不得分，少选且选择正确的每个选项得 0.3 分。共 10 题，每题 1.5 分，共 15 分。）

71.【答案】BCDE。解析：肾病综合征可出现的四大临床表现是大量蛋白尿、低蛋白血症、水肿和高脂血症。

72.【答案】CD。解析：机体缺乏维生素 B_{12} 和叶酸可导致病人出现巨幼细胞贫血。

73.【答案】ABCDE。

74.【答案】BE。解析：糖尿病的急性并发症主要是糖尿病酮症酸中毒（DKA）和高血糖高渗状态。

75.【答案】ABD。解析：复苏时可以气管内给药的药物是肾上腺素、利多卡因、阿托品。

76.【答案】ABCE。解析：低血钾时可出现头晕、躁动、昏迷，也可出现心律失常，如过早搏动、房性或室性心动过速以及心室扑动或颤动。

77.【答案】BCD。解析：外科感染是复杂细菌感染，局部症状明显，愈合留有瘢痕，必要时需要进行手术治疗。

78.【答案】ABCDE。解析：胎盘剥离征象，记忆题。

79.【答案】ABDE。解析：子宫收缩乏力多由几个因素综合引起，常见的原因如下：
（1）头盆不称或胎位异常：胎儿先露部下降受阻，不能紧贴子宫下段及宫颈。因而不能引起反射性子宫收缩，导致继发性子宫收缩乏力；（2）子宫因素：子宫发育不良、子宫畸形（如双角子宫等）、子宫壁过度膨胀（如双胎、巨大胎儿、羊水过多等）、经产妇子宫肌纤维变性或子宫肌瘤等，均能引起子宫收缩乏力；（3）精神因素：初产妇，尤其是35岁以上高龄初产妇，精神过度紧张使大脑皮层功能紊乱，睡眠少，临产后进食少以及过多的消耗体力、膀胱充盈，均可导致子宫收缩乏力；（4）内分泌失调：临产后，产妇体内雌激素、催产素、前列腺素、乙酰胆碱等分泌不足，孕激素下降缓慢，子宫对乙酰胆碱的敏感性降低等，均可影响子宫肌兴奋阈，致使子宫收缩乏力；（5）药物影响：临产后不当的使用大剂量镇静剂与镇痛剂，如吗啡、氯丙嗪、度冷丁、巴比妥等，可以使子宫收缩受到抑制。

80.【答案】ACD。解析：采纳蹲踞等体位，压住了部分（腿部）的静脉血管，使下肢低含氧的血液暂缓回流到心脏，减轻心脏负荷；因下肢的股动脉也被歪曲，流向下肢的动脉血阻力增高，使全身动脉压力增高，所以，含氧量低的右心室血液流向含氧量高的左心室削减（即分流削减，分流是因为距离残缺形成的），然后更多的右心室血就可经肺动脉到肺交换气体，获取氧气，使机体缺氧状况有所改进。

四、系列多项选择题（请根据题目要求，在五个选项中选出两个或两个以上恰当的

答案，错选或者多选均不得分，少选且选择正确的每个选项得0.4分。共10题，每题2分，共20分。）

81.【答案】ABCD。

82.【答案】ABC。

83.【答案】ACD。

84.【答案】ABCD。

85.【答案】BCD。

86.【答案】BC。

87.【答案】ABD。

88.【答案】ABCDE。

89.【答案】ABCD。

90.【答案】ABCD。