

# 2020 年全国军队文职人员招聘考试市场模拟卷

## 《医基 + 护理》

### 第一部分 基础综合

**一、单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。共 20 题，每题 0.5 分，共 10 分。）**

1. 排卵时可用下列哪个激素的高峰作为标志：
  - A. 卵泡刺激素
  - B. 催产素
  - C. 孕酮
  - D. 黄体生成素
2. 房室延搁的生理意义是：
  - A. 增强心肌收缩力
  - B. 使心房和心室不同时收缩
  - C. 使心室肌不会产生强直收缩
  - D. 使心室肌动作电位幅度增加
3. 肠结核溃疡的肉眼形态是：
  - A. 椭圆形，溃疡的长轴与肠的长轴平行
  - B. 口小底大烧瓶状
  - C. 不规则地图状
  - D. 呈带状，其长轴与肠长轴垂直
4. 细胞坏死镜下主要形态表现是：

- A.核浓缩、核膜破裂、胞浆浓缩
  - B.核溶解、胞浆浓缩、核膜破裂
  - C.核破裂、胞浆浓缩、胞核破裂
  - D.核浓缩、核碎裂、核溶解
5. 斜颈患者头偏向同侧，发生挛缩的可能是：
- A.肩胛提肌
  - B.斜方肌
  - C.前斜角肌
  - D.胸锁乳突肌
6. 下列关于胆囊的说法正确的是：
- A.分泌胆汁器官
  - B.位于肝下方的胆囊窝内
  - C.后端圆钝为胆囊底
  - D.胆囊管和肝左、右管合成胆总管
7. 肺根内各结构的排列自前向后是：
- A.肺静脉、肺动脉和主支气管
  - B.肺动脉、肺静脉和主支气管
  - C.肺动脉、主支气管和肺静脉
  - D.肺静脉、主支气管和肺动脉
8. 在女性盆腔内，腹膜形成结构不包括：
- A.膀胱子宫陷凹
  - B.子宫直肠陷凹
  - C.膀胱直肠陷凹
  - D.卵巢系膜
9. 淋巴的流动：
- A.取决于心率
  - B.依赖于重力
  - C.受淋巴结阻碍
  - D.在某特定淋巴管内是单向的

10. 下斜肌收缩时瞳孔转向:
- A.上内 B.下内
- C.上外 D.下外
11. 下列哪种病变可使肝浊音界下移:
- A.肺不张 B.肺气肿
- C.大叶性肺炎 D.肝硬变
12. 潜伏性感染的临床特征不包括:
- A.并不是每种传染病中都存在 B.常见病原体有单纯疱疹病毒等
- C.其病原体易排出体 D.一般不引起显性感染
13. 下列哪项典型的体征可作为诊断急性心包炎的依据:
- A.呼吸困难 B.心包压塞
- C.心包摩擦音 D.心包积液
14. 女, 65 岁, 因慢性阻塞性肺疾病 (COPD)、慢性 II 型呼吸衰竭、呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒、心力衰竭入院,  $\text{pH} < 7.15$ , 以下针对该患者的治疗, 恰当的是:
- A.给予高流量氧疗
- B.积极补充 5%碳酸氢钠, 使  $\text{pH}$  值迅速升至正常
- C.积极给予强心药物治疗
- D.适当补充 5%碳酸氢钠, 使  $\text{pH}$  值升至 7.2 以上即可

15. 男, 45 岁。工地高空坠落受伤, 出现血压下降、腹胀、腹痛。查体骨盆挤压和分离试验阳性, 双下肢不等长, 会阴部见瘀斑。首先考虑的诊断是:  
A. 股骨颈骨折  
B. 股骨干骨折  
C. 髌关节脱位  
D. 骨盆骨折
16. 药品监督管理部门对医疗机构使用药品的事项进行监督检查时, 必须出示:  
A. 检查人员身份证  
B. 单位介绍信  
C. 检查人员工作证  
D. 证明文件
17. 发生医疗事故时病程记录应在什么情况下封存和启封:  
A. 有卫生行政部门有关人员在场  
B. 有医患双方在场  
C. 经请卫生行政部门批准后  
D. 有医疗事故鉴定委员会专家在场
18. 医疗机构的下述行为中不属于违反条例的是:  
A. 未将《医疗机构执业许可证》收费标准等悬挂于明显处所  
B. 工作人员上岗未按规定佩戴标牌  
C. 擅自涂改执业许可证  
D. 擅自增加医师人数
19. 对于一个具有一定医学背景知识的智力正常的成年患者, 理想的医患关系模式应是:  
A. 主动-被动型  
B. 指导-合作型  
C. 共同参与型  
D. 解释-说明型
20. 关于医师的道德义务, 下列各项错误的是:

- A.救治急重病人时，要敢于承担风险
- B.应强制病人进行必要的治疗
- C.对病人进行医学科普知识教育和健康教育
- D.尊重病人的宗教信仰

**二、单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。共 20**

**题，每题 1 分，共 20 分）**

21. 小肠上皮、肾小管上皮对葡萄糖、氨基酸的吸收是通过：
- A.继发性主动转运
  - B.易化扩散
  - C.吞噬
  - D.胞饮
22. 兴奋性突触后电位属于：
- A.静息电位
  - B.阈电位
  - C.动作电位
  - D.去极化电位
23. 影响能量代谢的最主要因素是：
- A.肌肉活动
  - B.精神活动
  - C.食物的特殊动力作用
  - D.环境温度
24. 不符合肺腺癌描述的是：
- A.多为周围型
  - B.常有吸烟史
  - C.可伴有黏液分泌
  - D.常有肺门淋巴结转移

25. 水肿是指组织间隙内的体液增多，按水肿波及的范围可分为：
- A.肝性水肿和营养不良性水肿                      B.炎性水肿和淋巴性水肿
- C.心性水肿和炎性水肿                              D.全身性水肿和局部性水肿
26. 脊柱描述正确的是：
- A.由 24 块椎骨组成
- B.由 26 块椎骨组成
- C.颈曲、腰曲凸向后，胸曲、骶曲凸向前
- D.腰方肌可使脊柱腰部侧屈
27. 最常发生习惯性脱位的关节是：
- A.肩关节    B.肘关节
- C.腕关节    D.髋关节
28. 属于男性独有的浆膜腔：
- A.胸膜腔    B.腹膜腔
- C.心包腔    D.鞘膜腔
29. 肺循环途径中，血液无需流经：
- A.主动脉    B.肺动脉
- C.肺泡毛细血管                                      D.右心室
30. 关于冠状动脉，下列选项正确的是：
- A.心肌的主要供血动脉                              B.前降支发自右窦

- C.后降支发自前窦  
D.收缩期供血为主
31. 诊断急性胰腺炎的酶学检查是：  
A.AMS  
B.ALT  
C.AST  
D.ALP
32. 男性，42岁，食欲不振，尿色深2周，来院就诊。查体：皮肤、巩膜均黄染。肝大，肋下2cm，轻度触痛，脾肋下未及；实验室检查：TB（总胆红素） $120\mu\text{mol/L}$ ，CB（结合胆红素） $60\mu\text{mol/L}$ ，ALT 200U，ALP 100U，GGT 100U，尿胆红素及尿胆原均呈（+），彩超检查未见胆囊肿大，胆总管扩大。考虑其黄疸属于：  
A.肝细胞性  
B.溶血性  
C.药物中毒性  
D.肝内梗阻性
33. 当传染病暴发、流行时，经省、自治区、直辖市政府决定，可以对其实行封锁的地区是：  
A.甲类传染病疫区  
B.乙类传染病疫区  
C.丙类传染病疫区  
D.甲、乙、丙三类传染病疫区
34. 正常菌群的免疫作用是指：  
A.作为抗原使宿主致病  
B.作为抗原刺激宿主产生免疫  
C.促进消化吸收  
D.构成生物屏障

35. 男, 15 岁, 因急性心肌炎, 快速性心律失常入院, 经心电图检查, 确定为室性心动过速, 分析其诊断的最主要依据是:
- A. 出现心室夺获及室性融合波                      B. QRS 波群宽大畸形
- C. 心室律稍不规则                                      D. 心室率 160 次/分
36. 女性患者, 40 岁, 雨淋后出现发热、胸痛、咳铁锈色痰, 体温 39°C, 肺部 X 光片发现右肺中叶有大片密度增高阴影, 实验室痰培养为 G<sup>+</sup>双球菌, 菊糖发酵实验(+). 应诊断为:
- A. 继发性肺结核    B. 肺炭疽
- C. 大叶性肺炎    D. 原发性肺结核
37. 我国高血压病的死亡原因最常见的是:
- A. 心脏骤停    B. 心功能不全
- C. 心律失常    D. 脑血管意外
38. 患者, 女, 32 岁, 主诉右乳胀痛, 与月经周期有关, 检查乳房有多个结节状肿块, 边界不清, 可推动, 诊断首先考虑:
- A. 乳腺癌    B. 乳房纤维腺瘤
- C. 乳房囊性增生病                                      D. 乳管内乳头状瘤
39. 抢救开放性气胸患者呼吸困难最为关键的是:
- A. 迅速封闭胸部伤口                                    B. 气管插管
- C. 吸氧    D. 立即剖胸探查



40. 二级突发公共卫生事件是用\_\_\_\_\_进行预警。

A.蓝色

B.黄色

C.橙色

D.红色

## 第二部分 专业知识

**一、单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案，共 20 题，每题 1 分，共 20 分。）**

1. 胆囊造影检查在何时进食高脂肪餐：

A.检查当日晨

B.检查当日摄片显影良好后

C.检查前一日晚餐及当日摄片显影良好后晚餐

D.检查前一日早餐及当日摄片显影良好后晚餐

2. 青霉素过敏性休克抢救时，采取的关键措施是：

A.立即通知医生

B.皮下注射 0.1%盐酸肾上腺素 1ml

C.针刺人中，内关等穴位

D.立即停药，平卧

3. 保护具不适用于：

A.躁动不安者

B.高热意识不清者

C.谵妄者

D.昏迷者

4. 为敌百虫中毒患者洗胃时，应禁忌使用：



10. 脑血管病最重要的危险因素是:

A.高血压

B.高血脂

C.肥胖

D.高盐饮食

11. 心源性呼吸困难常表现为:

A.静息性呼吸困难

B.端坐呼吸

C.日间阵发性呼吸困难

D.咯血

12. 诊断心律失常最有效的方法是:

A.心电图

B.心向量图

C.超声心动图

D.X 线检查

13. 使用过程中需要严密监测血压的是:

A.普萘洛尔

B.维拉帕米

C.硝普钠

D.卡托普利

14. 麻醉的含义是通过药物或其他方法使病人整体或局部暂时失去感觉,以达到无痛的目的,为手术治疗或者其它医疗检查治疗提供条件。吸入麻醉和静脉麻醉属于临床麻醉中的:

A.全身麻醉

B.局部麻醉

C.椎管内麻醉

D.复合麻醉

15. 关于痔的描述正确的是:

A.混合痔分布在齿状线上下

- B.内痔好发于膝胸卧位 3、7 和 11 点处
- C.内痔表面覆盖黏膜，对疼痛比较敏感
- D.Ⅱ期内痔和Ⅲ期内痔主要的区别是出血量不同
16. 不宜做直肠指检的疾病：
- A.内痔  
B.肛裂  
C.肛痿  
D.肛周脓肿
17. 肛裂切除术后的患者，预防切口出血的措施，正确的有：
- A.多发生于术后 1~7 日  
B.勿进食高纤维饮食  
C.剧烈咳嗽时深呼吸  
D.排便时屏气用力
18. \_\_\_\_\_是甲亢术后严重并发症之一，表现为术后 12 到 36 小时内出现高热 39℃，脉快、虚弱大汗、烦躁不安，甚至昏迷、呕吐、腹泻。
- A.窒息  
B.手足抽搐  
C.喉返神经损伤  
D.甲状腺危象
19. 患者，女，32 岁，因甲亢拟行甲状腺大部切除术，下列关于术前准备的描述不正确的是：
- A.术前准备的目的是降低基础代谢率
- B.麻醉前给予阿托品和苯巴比妥钠
- C.基础代谢率 + 20%以下才可手术
- D.饮食应高热量、高维生素、少纤维素

20. 患者男, 27 岁。头部受伤后立即昏迷, 五分钟后清醒, 三小时后再度昏迷, X 线发现颅骨线状骨折, 且骨折线越过脑膜中动脉沟, 提示为:

- A. 脑震荡
- B. 急性硬膜外血肿
- C. 急性硬膜下血肿
- D. 脑挫伤

**二、系列单项选择题 (请根据题目要求, 在四个选项中选出一个最恰当的答案, 共**

**10 题, 每题 1.5 分, 共 15 分。)**

患者李阿姨, 63 岁, 因支气管扩张合并肺部感染、左心心力衰竭入院治疗, 入院时 T 39°C, 呼吸急促, 端坐呼吸。

请根据材料, 回答以下问题:

1. 李阿姨经过积极抗炎、利尿、强心治疗后, 体温降至正常范围, 能够平卧, 现改用  
地高辛口服。作为主管护士在给药时要特别注意:

- A. 应空腹服药
- B. 应饭后服药
- C. 应准时服药
- D. 用药前应测脉率 (心率) 和心脏节律

2. 李阿姨在服用地高辛几天后, 出现恶心、呕吐、视物模糊, 护士应立即:

- A. 报告护士长
- B. 给予止吐药
- C. 做心电图检查
- D. 停止服药并告知医生



8. 为防止病情进一步加重，最重要的措施是：

A.每日坚持用药

B.保持情绪稳定

C.坚持步行或慢跑等全身运动

D.戒烟

患者，男，30岁，因“暴饮暴食后出现上腹部疼痛，呈持续进行性加重，疼痛向背部、肋部放射并有恶心、呕吐、发热等症状”来就诊，经检查确诊为急性胰腺炎。

9. 为缓解疼痛，可指导该患者采取：

A.仰卧位

B.弯腰屈膝侧卧位

C.半坐卧位

D.仰卧屈膝位

10. 非手术治疗时，最重要的护理措施是：

A.禁食并给予胃肠减压

B.绝对卧床休息

C.给予流质饮食

D.应用抗生素

**三、多项选择题（请根据题目要求，在五个选项中选出两个或两个以上恰当的答案。**

**共10题，每题1.5分，共15分。）**

1. 在诊疗、护理操作过程中，有可能会发生艾滋病病人的血液、体液飞溅到医务人员的面部，为了不被传染，医务人员以下哪些做法是正确的：

A.戴手套

B.戴具有防渗透性能的口罩

C.戴防护眼镜

D.不用戴手套

E.不需防护

2. 应用青霉素过程中需要重做过敏试验的是：

- A.曾使用青霉素，但已停药 24 小时以上
- B.曾使用青霉素，但已停药 3 天
- C.使用过程中改用不同生产批号的制剂
- D.使用过程中出现皮肤瘙痒等症状
- E.曾使用青霉素，但已停药 12 小时以上

3. 能促进食欲的护理措施有：

- A.环境整洁、患者口腔清洁
- B.食具清洁、食物温度适宜
- C.减轻患者的不适
- D.尽量由护士喂食
- E.使患者情绪稳定，精神愉快

4. 输液时如药物溢出血管外，可以引起组织坏死的药物：

- A.能量合剂
- B.25%山梨醇溶液
- C.5%葡萄糖氯化钠注射液
- D.青霉素
- E.去甲肾上腺素

5. 为昏迷病人做口腔护理时应：

- A.擦拭口腔后要漱口
- B.使用开口器时应从臼齿放入
- C.擦洗口腔时血管钳夹紧棉球，一次只夹一个
- D.棉球不可过湿，以免溶液误吸入气道



- E.将义齿取下
6. 系统性红斑狼疮的病人应忌食：
- A.高蛋白 B.芹菜
- C.蘑菇 D.高维生素
- E.无花果
7. 下列哪些类型肝炎可以通过经血液-体液传播：
- A.甲型病毒性肝炎 B.乙型病毒性肝炎
- C.丙型病毒性肝炎 D.丁型病毒性肝炎
- E.戊型病毒性肝炎
8. 关于术后应用镇痛药物的目的有：
- A.保证患者睡眠休息 B.增加肺通气量
- C.促进患者深呼吸、咳嗽、咳痰 D.减轻伤口疼痛
- E.减少心血管并发症
9. 全麻苏醒期的护理措施包括：
- A.侧卧位 B.定时测量生命体征
- C.防止舌根后坠 D.保持体温
- E.清醒之前只能饮少量水
10. 与泌尿系结石形成有关的因素有：
- A.甲亢 B.痛风

C.尿路感染

D.长期卧床

E.吸烟

#### 四、系列多项选择题（请根据题目要求，在五个选项中选出两个或两个以上恰当的

答案。共 10 题，每题 2 分，共 20 分。）

患者，男性，65 岁，脑血栓致右侧肢体瘫痪卧床 2 年，近两个月来食欲不佳、常感恶心，体重下降增快。因骶尾部皮肤破损而入院。入院后检查：处于压疮溃疡期。

1. 支持判断的是：

A.破损处组织发黑，有臭味

B.皮肤上有大小水疱，水疱破溃湿润

C.主诉骶尾部疼痛，麻木感

D.创面湿润有脓性分泌物

E.骶尾部皮肤呈紫红色，皮下有硬结

2. 长时间俯卧位病人压疮的好发部位有：

A.髂前上棘

B.内、外踝

C.肩胛部

D.膝部

E.面颊

3. 患者发生压疮的主要原因有：

A.局部组织受压过久

B.病原菌侵入皮肤组织

C.皮肤受潮湿摩擦刺激

D.机体营养不良

E.皮肤破损

4. 下列对于压疮的预防措施正确的是:

- A.避免局部组织长期受压
- B.避免局部潮湿等不良刺激
- C.促进局部血液循环
- D.改善机体营养状况
- E.2~3 小时翻身一次

患者,女性,31岁,2个月来出现午后低热、盗汗、乏力、消瘦、食欲缺乏,近1周高热、咳嗽、咳痰,痰中带血。结核分枝杆菌阳性。

5. 患者现遵医嘱进行化学治疗,应遵循:

- A.联合
- B.全程
- C.足量
- D.规律
- E.早期

6. 使用链霉素时,主要不良反应有:

- A.听力损伤
- B.肾损害
- C.周围神经炎
- D.眩晕
- E.高尿酸血症

7. 患者出院时,健康宣教正确的有:

- A.接种卡介苗
- B.加强营养
- C.同桌共餐时使用公筷,以防传染
- D.避免情绪波动及呼吸道感染
- E.与肺结核病人密切接触的家属必要时可服用化学药物进行预防

郑某,男,52岁,以“皮肤乌青块伴头晕、乏力1个月,鼻出血5天”为主述,收

住入院，骨髓检查报告示急性早幼粒细胞白血病。住院期间予以维甲酸加三氧化二砷诱导分化治疗。第 10 天病人突然出现大量鼻出血，牙龈出血，随后诉头痛、喷射状呕吐、视物模糊，随即出现意识障碍。身体评估：体温 37.0℃，脉搏 92 次/分，呼吸 18 次/分，血压 155/85mmHg；全身皮肤见大片瘀斑，球结膜出血。血象：白细胞  $2.0 \times 10^9/L$ ，血红蛋白 56g/L，血小板  $11 \times 10^9/L$ 。

根据以上材料，回答下列问题：

8. 该病的发病因素包括：

- A.病毒感染
- B.苯及其衍生物
- C.X 射线
- D.遗传
- E.电离辐射

9. 下列有关化疗的注意事项正确的是：

- A.首选周围静脉
- B.输入刺激性药物前后，要用生理盐水冲管
- C.先使用刺激性小的药物，再输入发泡性药物
- D.输注化疗药物时，边推边抽回血
- E.如用外周浅表静脉，尽量选择粗直的静脉

10. 下列关于患者的护理措施正确的是：

- A.予以禁食
- B.暂停放疗
- C.注意保暖，避免受凉
- D.做好口腔护理

E.立即增加营养