

军队文职人员统一招聘《医基+护理学》

全真模拟卷一

第一部分 基础综合

- 一、单选题(20题, 每题0.5分, 共10分)
- 1. 将人体或器官分为左右两半的切面是:

A.冠状面

B.矢状面

C.水平面

D.额状面

- 2. 舌下神经核位于:
 - A.中脑

C.延髓

3.

B.脑桥

D.间脑

- 符号 6|代表的牙为:
- A.左侧上颔第一磨牙
- C.左侧上颔第一前磨牙

B.右侧上颔第一磨牙

D.右侧上颔第一前磨牙

- 4. 机体内环境的稳态是指:
 - A.红细胞外液的物理、化学因素保持着动态平衡
 - B.细胞内液理化性质保持不变
 - C.细胞外液理化性质保持不变
 - D.细胞外液的理化性质相对恒定
- 5. 通过自身调节方式维持相对稳定的是:

A.体温


B.血液 pH 值

C.肾血流量

D.激素水平

6. 当钠泵活动加强时,组织可出现的变化是:

第1页 共15页



A.细胞内低钾高钠

B.静息电位负值增加

C.动作电位频率增快

D.细胞体积增大

- 7. 下列错误的一项是:
 - A.移行上皮可出现鳞状上皮化生
 - B. 支气管黏膜上皮可出现鳞状上皮化生
 - C. 呼吸道黏膜上皮可出现小肠上皮化生
 - D.宫颈腺上皮可出现鳞状上皮化生
- 8. 有一长期吸烟的病人,经常咳嗽,现以肺部感染入院,作痰涂片检查,发现脱落的 气管黏膜上皮中有鳞状上皮,但细胞无异型性,此为:
 - A.气管黏膜上皮鳞状化生
 - B. 痰中混有食管上皮
 - C. 痰中混有口腔上皮
 - D.气管黏膜上皮不典型增生
- 9. 肝脂肪沉积比较显著时, 其变化是:

A.肝分叶增多

C.苍白无血色

B.肝增大,包膜紧张

D.暗黑色、质软、光洁

10. 下列哪项为体征:

A.发热

B.胸痛

C.湿啰音

D.恶心

11. 非感染性发热不包括下列哪项:

A.心肌梗死后低热

B. 白血病

C.甲状腺功能亢进

D.流行性出血热

12. 引起出血性疾病较常见的因素是:

A.血小板因素

B.凝血因子缺乏

C.肝素或香豆类药物

D.抗凝血物质活性增加

13. 下列哪类微生物属于非细胞型微生物:

第2页 共15页

A.衣原体


B.立克次体

C.病毒

D. 支原体

- 14. 青霉素抗革兰阳性 (G⁺) 菌作用的机制是:
 - A.干扰细菌蛋白质合成
 - B.抑制细菌核酸代谢
 - C.抑制细菌脂代谢
 - D.抑制细菌细胞壁肽聚糖(黏肽)的合成
- 15. 人们常称医师为"仁者",对此最准确的理解是:
 - A. 医师角色要求道德高尚
 - B.医师应该精通儒学
 - C. 医师应该是伦理学家
 - D.医师应该善于处理人际关系
- 16. 以下哪项不是道德的评价方式:
 - A.社会舆论
 - C.传统习俗

- R内心信念
- D.强制性力量



- A.不因医疗措施不当而给患者造成伤害的不伤害原则
- B.谋求患者利益最大化的有利原则
- C.对患者人格尊严及自主决定的尊重原则
- D. 医疗资源分配的公正原则
- 18. 李某 2007 年 10 月因医疗事故受到吊销医师执业证书的行政处罚, 2008 年 9 月向 当地卫生行政部门申请重新注册,卫生行政部门经过审查决定对其不予注册,理由 是李某的行政处罚于处罚决定之日起至申请注册之日止不满:

A.1 年 B.2 年

	C.3 年	D.4 年
19.	以下不属于医疗事故。	
	A.剖腹产手术时把胎儿的头皮割破	
	B.手术开错部位造成较大创伤	
	C.做子宫切除手术期间把一块纱布遗留在	主腹腔
	D.因体质特殊发生难以预料的后果	
20.	国家实行医疗机构评审制度, 对医疗机构	勾的基本标准、服务质量、、管理
	水平等进行综合评价。	
	A.技术水平	B.基础设施
	C.公众形象	D.资金实力
	二、单选题(20题, 每题1分, 共20分)
21.	传递躯干和四肢深感觉(意识性本体感觉	觉和精细触觉)的径路在何处进行交叉:
	A.脊髓	B.延髓
	C.脑桥	D. 中脑
22.	属于内分泌腺的是:	
	A.腮腺	B.泪腺
	C.肾上腺	D.前列腺
23.	不易于表面形成压痕的骨性结构是:	
	A.髂前上棘	B.股骨小转子
	C.尺骨鹰嘴	D.坐骨结节
24.	合成血红蛋白的基本原料是:	
	A.铁和叶酸	B.钴和维生素 B ₁₂
	C.铁和蛋白质	D.蛋白质
25.	发生巨幼红细胞贫血的原因是:	
	A.缺铁	B.蛋白质摄入不足

第4页 共15页



C.缺乏维生素 B12 和叶酸 D.EPO 生成不足 26. 可导致红细胞沉降速率增快的影响因素是: A.血细胞比容增大 B. 血浆清蛋白含量增多 D. 血浆球蛋白含量增多 C.红细胞脆性增大 27. 潜水员过快地从海底升到水面容易发生: A.肺不张 B.氮气气体栓塞 C.肺气肿 D. 血栓栓塞 28. 下列哪项栓塞能导致弥散性血管内凝血: A.脂肪栓塞 B.羊水栓塞 C.空气栓塞 D.减压病 29. 一患儿,腹部剧烈疼痛,伴恶心、呕吐,以急腹症入院。术中见肠套叠,肠管暗红, 表面无光泽,该处可见纤维素样物附着,该肠管可能发生下列哪种病变: A.静脉淤血 B.动脉充血 D.急性肠炎 C.肠管梗死 30. 下列引起意识障碍的疾病, 其中哪项属颅内感染: A.高血压脑病 B.脑梗塞 C.脑血栓形成 D.脑型疟疾 31. 奇脉常见于: A.右心功能不全 B.二尖瓣狭窄 C.高血压 D.大量心包积液 32. 女性, 63 岁, 帕金森病患者, 行走时小步急速趋行, 身体前倾, 有难以止步之势, 该患者的步态称为: A.蹒跚步态 B.慌张步态

A、鞭毛 B.荚膜

C.共济失调步态

33. 具有抗吞噬作用的细菌特殊结构是:

D.剪刀步态



证的医疗文书。

		C.中介体	D.菌毛	
	34.	幽门螺杆菌是:		
		A.无鞭毛	B.革兰染色阳性	
		C. 营养要求低	D.微需氧	
	35.	社会舆论作为护理道德评价的一种方式,其	特点是:	
		A.广泛性	B.正确性	
		C.持久性	D.深刻性	
	36.	医学人道主义的核心内容是:		
		A.尊重病人	B.同情病人	
		C.医生对病人尽义务	D.病人的自主权利	
	37.	医患双方都具有独立人格,要求医师做到:		
		A.一切尽可能按照患者的要求处理		
		B.从各个细节给予患者关注		
		C.不伤害患者		
		D.平等待患		
	38.	国家实行医师执业注册制度,取得医师资格	的,需要向:	
		A.县级以上人民政府卫生行政部门申请注册		
		B.省级以上人民政府卫生行政部门申请注册		
		C.设区的市级以上人民政府卫生行政部门申请注册		
		D.所在地的县级以上人民政府卫生行政部门	申请注册	
	39.	通常所说的"卫生技术人员"不包括:		
		A.护士	B.医师	
		C.药剂师	D.护工	
	40.	《处方管理办法》所称处方是指由	在诊疗活动中为患者开具的,由取得药	
		学专业技术职务任职资格的药学专业技术人	员审核、调配、核对、并为患者用药凭	



- A.注册的执业医师和执业助理医师
- B.注册的执业医师
- C.执业医师
- D.执业医师和执业助理医师

第二部分 专业知识

- 一、单项选择题(请根据题目要求,在四个选项中选出一个最恰当的答案,共 20 题,每题 1 分,共 20 分。)
- 1. 小高在上夜班巡视时,发现一位二级护理的患者倒在床旁,此时夜班值班人员只有他一人。此时针对患者发生的坠床情况,小高应首先采取的措施是:
 - A.向患者解释和道歉

B.马上通知医生到病房

C.初步检查判定患者伤情

- D.上报不良事件的发生
- 2. 患者, 男性, 72岁, 双下肢瘫痪长期卧床, 在查房时发现其左下肢可见轻微收缩, 但无肢体活动, 右下肢肢体可移动位置但不能抬起, 据此, 可判断该患者:

A.左下肢肌力3级

B.右下肢肌力2级

C.左下肢肌力2级

D.右下肢肌力3级

3. 有关医嘱的种类表述错误的是:

A.临时医嘱一般只执行一次

B.静脉注射的医嘱为长期医嘱

C.长期医嘱需医生注明停止时间

D.必要时要用的医嘱为备用医嘱

4. 行阴道冲洗时病人的正确体位是:

A.膀胱截石位

B.头高足低位

C.侧卧位

D.平卧位

- 5. 王女士,40岁,因畏寒、发热、恶心呕吐、食欲不振、乏力来院就诊。经化验检查,诊断为甲型肝炎,收入治疗。对该病人采取的隔离措施哪项不妥:
 - A.同种病人可同室居住

B.密切接触病人时须穿隔离衣



D.不同病种病人书报可借阅 C.不同病种病人的食物不可交换 6. 大量输入库存血可引起: A.低钠血症和酸中毒 B.高钠血症和碱中毒 C.高钾血症和酸中毒 D.低氯血和酸中毒 下列护理人员为残疾患者擦洗背部的操作中,不正确的是: 7. A.协助患者取侧卧位, 背向护士 B.将浴毯盖于患者胸部和腹部 C.依次擦洗臀部, 背部至颈部 D.为患者穿清洁上衣时, 先穿对侧, 再穿近侧 8. 患者女性,49岁,因严重疾病导致胃肠消化功能丧失,但吸收能力尚好,欲短期 营养疗法,应采用: A.液化饮食 B.要素饮食 C.深静脉营养疗法 D.流食 9. 关于导尿, 下列说法错误的是: A.为女性患者导尿时, 若误插入阴道, 应立拔出用原管重插 B. 留置导尿管患者的集尿袋高度不得超过膀胱高度 C.插尿管时, 动作应轻柔, 切忌用力过快而损伤尿道黏膜 D.留置导尿管有利于保持昏迷患者会阴部清洁干燥 10. 因细支气管、小支气管堵塞,而使得吸气时发出一种高音调的音响,属于: A.潮式呼吸 B.蝉鸣式呼吸 C.鼾式呼吸 D. 叹气式呼吸 11. 下列可并发夜间阵发性呼吸困难的疾病是: A.肺炎 B.右心功能不全 C.呼吸窘迫综合征 D.左心功能不全导致肺淤血 12. COPD 的实验室检查及其他检查, 是判断气管受阻的指标,对 COPD 诊

断、严重程度评价、疾病进展、预防以及治疗反应等有重要意义:

C.膀胱刺激症状



A. 血气检查 B.胸部 X 线检查 C.肺功能检查 D MRI 检查 13. 患者,女,60岁,腰椎穿刺术后。以下针对该患者的护理措施错误的是: A.术后去枕平卧 4~6 小时 B.密切观察有无运动障碍 C.密切观察意识、瞳孔的变化 D. 颅内压较高者宜多饮水 14. 导致肾病综合征复发及疗效不佳的主要原因是: A.肾功能不全 B.动脉粥样硬化 C.感染 D.下肢静脉血栓 15. 患者,女性,32岁,5天前出现发热、乏力、恶心、食欲下降,查巩膜轻度黄染, 肝肋下 1cm, 质软, 血常规示红细胞 4.5×10^{12} /L, 白细胞 6.5×10^{9} /L, 肝功能检查 示谷丙转氨酶 760U/L, 总胆红素 54umol/L。该患者的诊断首先应考虑为: B.急性食物中毒 A.伤寒 D.肝硬化 C.病毒性肝炎 16. 患者女性, 23岁, 甲亢半年, 服用甲基硫氧嘧啶治疗, 此药的作用机制是: A.抑制甲状腺激素合成 B.抑制抗原抗体反应 C.抑制甲状腺激素释放 D.降低外周组织对甲状腺激素反应 17. 对实质性脏器破裂并发休克的处理原则是: A.全力抢救休克 B.立即手术 C.先抢救休克, 待休克好转后再行手术 D.抢救休克的同时进行手术 18. 患者, 男性, 20 岁, 因腹泻入院, 诊断为伤寒, 体温 38℃。不宜食用的食物是: A.豆腐 B.芹菜 C. 鱼汤 D.赤豆粥 19. 膀胱结石的典型症状是: A.肉眼血尿 B.排尿突然中断及伴有会阴部放射疼

D.排尿困难



20. 患者,女性,24岁。因与朋友生气后自服敌敌畏150ml,因未被及时发现,约近2个小时才送医院。来急诊科时,患者出现肺水肿、惊厥、昏迷等严重症状,导致抢救无效死亡,有机磷中毒的死亡原因是:

A.肺部感染

B.脑水肿

C.呼吸衰竭

D.心脏骤停

二、系列单项选择题(请根据题目要求,在四个选项中选出一个最恰当的答案,共 10 题,每题 1.5 分,共 15 分。)

(1~3 题共用题干)

患者,女性,48岁。吞咽困难3个月,现尚能进半流质饮食。查体:锁骨上未触及肿大淋巴结。

1. 对确诊最具价值的辅助检查是

A.食管镜

B.胸部磁共振

C.食管 X 线钡剂透视

- D.血常规
- 2. 患者行部分食管切除术。术后第8天,患者出现呼吸困难、胸腔积液、高热、血白细胞计数升高。护士应首先考虑出现的并发症是:

A.肺不张

B.吻合口狭窄

C.吻合口瘘

D.乳糜胸

3. 该并发症的处理方法应除外:

A.保证胃肠减压管通畅

B.常规胸腔闭式引流

C.抗感染治疗

D.给予流质、半流质饮食

(4~7 题共用题干)

患者,男性,72岁,心前区压榨性疼痛2小时急诊入院。入院后出现呼吸困难、心悸。护士查体血压下降,心率160次/分。心电图示QRS波群宽大畸形,QRS时限>0.12s,R-R间期不绝对相等,刺激迷走神经时心率无变化。

4. 该护士首先考虑患者出现的心律失常是:



A.室上性心动过速

B.室性心动过速

C.心房颤动

D.窦性心动过速

5. 护士如果为患者行心脏电复律,则电极板的位置是:

A.胸骨左缘 2、3 肋间和心尖部

B.胸骨右缘 2、3 肋间和心尖部

C.胸骨右缘 4、5 肋间和心尖部

D.胸骨两侧 2、3 肋间

6. 应首选的药物治疗是:

A.苯妥英钠

B.毛花苷丙

C.利多卡因

D.多巴胺

7. 护士在用药过程中,应注意观察患者:

A.房室传导阻滞、眩晕、色视

B.头晕、黄视、胸闷

C.心动过缓、低血压、房室传导阻滞

D.兴奋、嗜睡、眩晕、抽搐

(8~10 题共用题干)

患者,男性,51岁。1周来晨起眼睑水肿,排尿不适,尿色发红,血压偏高,疑为 急性肾小球肾炎,需留12小时尿液作艾迪计数。

8. 为了防止尿液久放变质,应在尿液中加入:

A.甲醛

B.稀盐酸

C.浓盐酸

D.己烯雌酚

9. 留取尿液的正确方法是:

A. 晨 7 时开始留尿, 至晚 7 时弃去最后一次尿

B. 晨 7 时排空膀胱, 弃去尿液, 开始留尿, 至晚 7 时留取最后一次尿


C.晚7时开始留尿,至晨7时弃去最后一次尿

D.晚7时排空膀胱,弃去尿液,开始留尿,至晨7时留取最后一次尿

10. 留尿过程中患者出现头晕和视物不清,应采取的措施是:

A.协助患者饮水

B.协助患者进食



C.让患者自由活动

D.协助患者休息, 预防摔伤

三、多项选择题(请根据题目要求,在五个选项中选出两个或两个以上恰当的答案,多选和未选均不得分。共 10 题、每题 1.5 分、共 15 分。)

- 1. 关于晕厥,下列说法正确的是:
 - A.一般为突然发作

B.恢复迅速

C.多有后遗症

D.由一过性广泛脑供血不足所致

- E.意识丧失时间较长
- 2. 下列关于使用胰岛素的注意事项,描述正确的是:
 - A.胰岛素针头一天一换
 - B.未开封的胰岛素应置于四到八度冷藏
 - C.正在使用的胰岛素在常温下保存
 - D.混合使用时, 应先抽吸短效, 再抽吸长效, 混匀使用
 - E.使用前观察药物是否变质
- 3. 晚期肝硬化患者出现的并发症有:

A.肝性脑病 B.肝癌

C. 感染 D. 上消化道出血

E.肝肺综合征

4. 急性白血病治疗原则:

A.防治感染 B.纠正贫血

C.防治出血 D.防治高尿酸血症肾病

E.纠正水、电解质及酸碱平衡失调

5. 下列属于等渗溶液的有:

A.5%葡萄糖溶液 B.10%葡萄糖溶液

C.5%碳酸氢钠 D.1.4%碳酸氢钠

E.0.9%NaCl 溶液

6.	可以用于胆石症患者镇痛的药物有:	
	A.阿托品	B.解热镇痛药
	C.吗啡	D.青霉素
	E.多潘立酮	
7.	若不慎将体温计咬破,正确的是:	
	A.立即清除玻璃碎屑	B.口服蛋清液或牛奶
	C.及时洗胃	D.病情允许下服用高纤维素食物
	E.饮大量清水, 卧床休息	
8.	关于血压的描述,正确的是:	
	A.清晨较傍晚低	B.卧位较立位低
	C.左臂较右臂高	D.冬天较夏天高
	E.成人高于儿童	
9.	进行口服给药时,护士应根据药物的特性给	患者进行用药指导。对此,下列说法正
	确的有:	
	A.健胃药应饭后服	B.助消化药应饭前服
	C.止咳糖浆服后不宜立即饮水	D.磺胺类药物服后宜多饮水
	E.驱虫药应在空腹或半空腹服用	
10.	毛细血管采血法的常用采血部位为:	
	A.耳垂	B.手指末梢

C.颈部 D.臀部

E.腰背部

四、系列多项选择题(请根据题目要求,在五个选项中选出两个或两个以上恰当的答案,多选和未选均不得分。共 10 题,每题 2 分,共 20 分。)

(1~4 题共用题干)

男性,40岁,因颅内压增高、脑疝行脑室外引流术。



脑室引流术后患者引流管护理方法正确的是: 1.

A.引流管开口高于侧脑室平面 10~15cm B.定期夹闭导管

C.定时无菌生理盐水冲洗

D.每日引流量不超过 500ml

E.如引流管无脑脊液流出即可拔管

可判断引流管通畅的客观依据有: 2.

A.病人感觉病情缓解

B.不断有脑脊液流出

C. 管内的液面随病人呼吸、脉搏上下波动 D. 导管扭曲、受压

E. 牛命体征平稳

3. 术后 3 小时,护士发现脑室引流管内无脑脊液流出,正确的处理方法有:

A.报告医生

B.将引流袋放低

C将引流管轻轻旋转

D.用生理盐水冲洗

E.必要时换管

4. 术后第二天,病人出现意识障碍,Glasgow 昏迷评分法的依据有:

A.运动反应

C.语言反应

E.大小便是否自理

(5~8 题共用题干)

患者,女性,因发热38.7℃,全身小出血点,头晕乏力,检查血红蛋白85g/L,红 细胞 3.0×10^{12} /L, 白细胞 2.0×10^{9} /L, 血小板 70×10^{9} /L。

5. 目前该患者存在的护理问题有:

A 体温过高

B.潜在并发症: 呼吸衰竭

C.活动无耐力

D.潜在并发症: 颅内出血

E.气体交换受损

6. 引起该疾病常见的因素有:

A.铁摄入不足

B.氯霉素

C. 叶酸及维生素 B 缺乏

D.苯及其衍生物



- E.长期接触各种电离辐射
- 7. 此患者住院后治疗要点有:
 - A.控制感染

B.补铁治疗

C.应用免疫抑制疗法

D. 雄激素及造而生长因子治疗

- E.补充凝血因子
- 8. 几日后,护士在巡视病房过程中发现患者头痛、呕吐、烦躁不安,采取的护理措施 正确的是:
 - A.立即通知值班医师

B.患者平卧位, 头偏一侧

C.给予脱水药

D.输注浓缩红细胞

- E.密切观察患者的病情变化
- (9~10 题共用题干)

患者,女性,28岁。分娩时会阴部侧切,现切口部位出现红、肿、热、痛,给予红外线局部照射。

- 9. 热疗法的作用包括:
 - A.控制炎症的消散
 - C.减轻深部组织充血

- D.减轻疼痛

- E.促进炎症的消散与局限
- 10. 下列注意事项正确的是:
 - A. 照射时间为 20~30min
 - B.若患者有心慌、头昏的不适感觉,可以先继续观察
 - C. 当患者局部皮肤出现红斑,则说明照射剂量合适
 - D.身体各部位照射强度是一致的
 - E.使用时, 灯距一般为 30~50cm, 温热为宜