

## 军队文职人员统一招聘《医基+护理学》

## 全真模拟卷五

## 第一部分 基础综合

## 一、单选题（20 题，每题 0.5 分，共 10 分）

1. 在眼的结构中，感光辨色最敏锐的部位是：  
A.黄斑  
B.视网膜  
C.脉络膜  
D.中央凹
2. 关于泪器的说法正确的是：  
A.泪囊位于眼眶内侧壁的泪囊窝里  
B.泪腺位于眼眶内侧壁的泪囊窝内  
C.鼻泪管开口于中鼻道  
D.泪腺小管有 10~20 条，均开口于巩膜上
3. 在中枢神经系统里，不含胞体只有神经纤维聚集的部分称为：  
A.白质  
B.灰质  
C.黑质  
D.纹状体
4. 血浆渗透压的高低主要决定于：  
A.血浆蛋白总量  
B.白蛋白含量  
C.NaCl 浓度  
D.KCl 浓度
5. 维持血浆 pH 值相对恒定最重要的缓冲对是：  
A. $\text{Na}_2\text{HPO}_4/\text{NaH}_2\text{PO}_4$   
B. $\text{NaHCO}_3/\text{H}_2\text{CO}_3$   
C. $\text{K}_2\text{HPO}_4/\text{KH}_2\text{PO}_4$   
D. $\text{KHCO}_3/\text{H}_2\text{CO}_3$
6. 血液中除去血细胞的液体部分是：

- A. 体液  
B. 细胞内液  
C. 细胞外液  
D. 血浆
7. 心力衰竭细胞是指左心衰竭时:
- A. 肺泡腔内出现的细胞内有含铁血黄素的巨噬细胞  
B. 含脂褐素的心肌细胞  
C. 肺泡腔内吞噬粉尘的巨噬细胞  
D. 吞噬脂质的吞噬细胞
8. 淤血是:
- A. 血液淤积于皮下组织内  
B. 毛细血管和小静脉内血含量增加  
C. 血管扩张所致  
D. 血管腔内充满血液
9. 延续性血栓的形成顺序为:
- A. 白色血栓、混合血栓、红色血栓  
B. 混合血栓、红色血栓、白色血栓  
C. 透明血栓、白色血栓、混合血栓  
D. 混合血栓、白色血栓、红色血栓
10. 便血伴发热常见于以下疾病, 除了:
- A. 败血症  
B. 钩端螺旋体病  
C. 血友病  
D. 肠道淋巴瘤
11. 下列那种疾病所致腹泻可伴重度脱水:
- A. 霍乱  
B. 溃疡性结肠炎  
C. 肠结核  
D. 慢性细菌性痢疾
12. 男性, 26 岁, 系统性红斑狼疮病史 3 年, 2 天前感冒后出现高热、腰痛。查体: 贫血貌, 巩膜轻度黄染, 脾大。该患黄疸的原因可能是:
- A. 药物性黄疸  
B. 肝细胞性黄疸

- C.溶血性黄疸  
D.胆汁淤积性黄疸
13. 测量细菌大小常用的单位是：
- A.cm  
B.mm  
C.nm  
D.μm
14. 注射破伤风抗毒素（TAT）的目的是：
- A.对易感人群进行预防接种  
B.对可疑或确诊的破伤风患者进行紧急预防或治疗  
C.杀灭伤口中繁殖的破伤风梭（杆）菌  
D.主要用于儿童的预防接种
15. 某肝癌患者病情已到晚期，处于极度痛苦之中，自认为是肝硬化，寄希望于治疗，病情进展和疼痛发作时，多次要求医生给予明确说法和采取措施。此时，医生最佳的伦理选择应该是：
- A.恪守保密原则，继续隐瞒病情  
B.正确对待保密与讲真话的关系，经家属同意后告知实情，重点减轻病痛  
C.遵循病人自主原则，全面满足病人要求  
D.依据知情同意原则，应该告知病人所有信息
16. 下列做法中，对病人不一定有益，且可能违背医学伦理学中的有利原则的是：
- A.根据患者的病情作相应的检查及治疗  
B.根据癌症患者的病情给予止痛手段  
C.癌症患者到了晚期时才告知患者本人  
D.患者受益而不给他人太大伤害
17. 评价医德行为的善恶的根本标准是：
- A.病人的意见  
B.病人家属的意见  
C.新闻媒体的认定  
D.有利于病人、有利于医学发展、有利于生存环境的改善

18. 根据《传染病防治法》，下列哪项表述是不正确的：
- A. 国家对传染病防治实行预防为主方针，防治结合、分类管理、依靠科学、依靠群众
  - B. 疾病预防控制中心根据传染病预防、控制的需，制定辖区传染病预防接种规划并组织实施
  - C. 对传染病非典型肺炎、肺炭疽采取甲类传染病的预防控制。
  - D. 国家开展预防传染病的健康教育，新闻媒体应当无偿开展传染病防治和公共卫生教育的公益宣传
19. 未经\_\_\_\_\_的同意，任何单位或者个人不得公开艾滋病感染者的姓名、肖像。
- A. 省级以上人民政府卫生行政部门
  - B. 疾病预防控制中心
  - C. 艾滋病病毒感染者本人或者监护人
  - D. 县级以上人民政府
20. 下列哪种情况除外，医疗机构不承担赔偿责任：
- A. 隐匿或者拒绝提供与纠纷有关的病历资料
  - B. 患者或者其近亲属不配合医疗机构进行符合诊疗规范的诊疗
  - C. 医务人员在抢救生命垂危的患者等紧急情况下已经尽到合理诊疗义务
  - D. 限于当时的医疗水平难以诊疗

## 二、单选题（20 题，每题 1 分，共 20 分）

21. 食管的第二狭窄在：
- A. 与右支气管交叉处
  - B. 穿膈处
  - C. 行经胸廓上口处
  - D. 距中切牙 25cm 处
22. 下消化道是指：
- A. 口腔至十二指肠
  - B. 口腔至胃
  - C. 空肠以下的部分
  - D. 盲肠至直肠

23. 脑脊液主要由\_\_\_\_\_产生。
- A.脉络丛  
B.蛛网膜  
C.蛛网膜粒  
D.软脑膜
24. 老年人的脉压比年轻人大，这主要是由于：
- A.老年人的心输出量较小  
B.老年人的循环血量较少  
C.老年人的主动脉和大动脉弹性降低  
D.老年人的小动脉硬化
25. 可使搏出量增加的因素是：
- A.静脉回心血量增多  
B.大动脉压力增高  
C.静脉回心血量减少  
D.心率加快
26. 反映一次通气最大能力的是：
- A.潮气量  
B.补吸气量  
C.肺活量  
D.时间肺活量
27. 下列大肠病变中癌变率最高的是：
- A.炎性息肉  
B.幼年性息肉  
C.管状腺瘤  
D.绒毛状腺瘤
28. 与 HTLV 感染关系密切的肿瘤是：
- A.鼻咽癌  
B.Kaposi 肉瘤  
C.食管癌  
D.T 细胞白血病
29. 冠状动脉粥样硬化，不引起：
- A.心绞痛  
B.心肌梗死  
C.冠状动脉性猝死  
D.原发性心肌病
30. 患儿，男，4 岁，高热、腹痛腹泻。粪便检查：外观呈脓液黏血状，镜检同时出现红细胞、白细胞、脓细胞。该患儿最可能诊断为：
- A.急性菌痢  
B.溃疡性结肠炎

- C.十二指肠炎  
D.急性胃炎
31. 鉴别良性胃溃疡的重要方法是：  
A.溃疡大小  
B.胃液分析  
C.胃黏膜组织  
D.病理学检查
32. 主动脉瓣关闭不全引起周围血管征是由于：  
A.血压升高  
B.脉压增大  
C.左心室增大  
D.主动脉瓣反流
33. 细菌细胞膜的主要功能不包括：  
A.生物合成  
B.维持细菌的外形  
C.参与物质交换  
D.呼吸作用
34. 脊髓灰质炎典型热型是：  
A.双峰热  
B.弛张热  
C.间歇热  
D.稽留热
35. 医学发展早期医患关系的特征不包括：  
A.平等性  
B.直接性  
C.主动性  
D.契约性
36. 下列关于改善医患关系的方式说法不正确的是：  
A.尊重病人  
B.学会与患者换位思考  
C.提高医护人员的沟通技巧  
D.尽可能给患者使用价格低廉的药物
37. 医患关系是一种：  
A.信托关系  
B.主从关系  
C.商品关系  
D.纯粹的技术关系

38. 传染病暴发流行,必要时当地政府可以采取以下紧急措施,哪一项除外:
- A.临时征用房屋、交通工具
  - B.限制或者停止集市、集会、影剧院演出或者其他人群聚集的活动
  - C.停止一切活动
  - D.封闭被传染病病原污染的公共饮用水
39. \_\_\_\_\_发现传染病病人或者疑似传染病病人时,应当及时向附近的疾病预防控制机构或者医疗机构报告。
- A.医疗机构
  - B.采供血机构
  - C.疾病预防控制机构
  - D.任何单位和个人
40. 属于乙类传染病的是:
- A.鼠疫
  - B.霍乱
  - C.麻疹
  - D.丝虫病

## 第二部分 专业知识

### 一、单项选择题(请根据题目要求,在四个选项中选出一个最恰当的答案,共20题,每题1分,共20分。)

1. 男,28岁,浸润性肺结核,痊愈准备出院,其带来的随身听如何处置:
- A.微波消毒
  - B.高压蒸汽消毒
  - C.日光暴晒
  - D.环氧乙烷消毒
2. 张先生,66岁,车祸撞伤脑部,出血后出现深昏迷,脑干反射消失,脑电波消失,无自主呼吸。病人以上表现应属于:
- A.濒死期
  - B.临床死亡期
  - C.生物学死亡期
  - D.疾病晚期
3. 患者,女,24岁。因受到教师批评后感到压抑,便服用敌敌畏,但被同学及时发现,送医院诊治。最能够反映病情变化的观察指征是:

- A.皮肤与黏膜  
B.面容  
C.瞳孔  
D.呕吐物
4. 注射时减轻疼痛的做法正确的是:  
A.病人注意力要集中  
B.刺激性强的药物先注射  
C.取侧卧位,上腿弯曲,下腿伸直  
D.刺激性强的药物做深部注射
5. 对做隐血试验检查的患者,下列正确的指导是:  
A.实验前1天禁食易造成假阳性的食物或药物  
B.实验前三天禁食易造成假阳性的食物或药物  
C.进食海带、紫菜有影响  
D.口服补铁药物不影响
6. 需要时(限用1次,12小时有效)是:  
A.prn  
B.sos  
C.gtt  
D.pm
7. 对排便异常的描述下列错误的选项是:  
A.阿米巴痢疾时可有果酱样便  
B.痔疮患者排便后有鲜血流出  
C.胆道完全阻塞有白色泔水样便  
D.肠套叠时可有果酱样便
8. 患者男性,应激性溃疡、胃出血、输血过程发生溶血导致急性肾功能衰竭、不可能出现的体征是:  
A.少尿或无尿  
B.尿素氮升高  
C.尿内有脓细胞  
D.高钾血症
9. 某患儿5岁,高热,  $T39.8^{\circ}\text{C}$ ,呼吸急促,哭闹不止,医生外出,此时护士应采取\_\_\_\_\_应急措施:  
A.安乃近肌注退热  
B.氯丙嗪肌注降温  
C.酒精擦身散热  
D.地西泮肌注镇静



10. 热疗可使血管扩张,但持续用热后会血管收缩,出现血管收缩的用热时间是:
- A.15~25 分钟 B.30~45 分钟
- C.45~60 分钟 D.10~30 分钟
11. 某患者,反复呕吐,查电解质血清钠 130mmol/L,则该患者最可能的护理诊断是:
- A.等渗性缺水 B.低渗性缺水
- C.高渗性缺水 D.水中毒
12. 患者,男性,28 岁,因从高空坠落后致骨盆骨折,大量出血,处于休克状态,被送至急诊室,在医生未到达之前,当班护士应立即:
- A.询问坠落原因 B.通知值班医生
- C.迅速给病人建立静脉通路 D.给病人注射止痛剂
13. 陈某,男,30 岁,农民,病人 1 天前曾吃海蟹后出现腹泻,大便水样,难以计数,呕吐,无腹痛及发热。身体评估:脉搏细速,血压测不到,神志淡漠,眼窝内陷,声音嘶哑,无尿。抢救该病人最紧急恰当的措施是:
- A.抗生素 B.升压药
- C.补液 D.止泻、止吐药物
14. 男,5 岁,烧伤总面积为 30% (II 度),其烧伤严重程度为:
- A.轻度 B.中度
- C.重度 D.特重度
15. 患者男,17 岁,右足被玻璃划伤,清创缝合术后 5 天出现高热,伤口处肿胀、发红、剧痛,此时宜:
- A.继续观察 B.加大抗生素的剂量
- C.局部理疗 D.拆除缝线引流
16. 室性早搏 1 分钟内超过\_\_\_\_\_称为频发室性早搏:
- A.2 B.3
- C.4 D.5
17. 高血压脑出血最好发的部位是:

- A.脑叶  
C.内囊及基底节附近
- B.脑干  
D.丘脑
18. 患者，女，29岁。晨醒后脉率100次/分，血压120/75mmHg，其基础代谢率为：  
A.22%  
C.31%
- B.26%  
D.34%
19. 慢性肾衰竭最早出现的表现是：  
A.多尿、尿比重下降  
C.食欲减退、腹部不适
- B.胸痛、胸膜摩擦音  
D.血压升高、心律失常
20. 诊断呼吸衰竭最主要的依据是：  
A.血气分析  
C.缺氧和二氧化碳潴留的体征
- B.呼吸困难的临床症状  
D.排除引起呼吸困难的有关疾病

**二、系列单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案，共10题，每题1.5分，共15分。）**

（1~4题共用题干）

患者，男性，45岁，暴饮暴食后出现上腹阵发性疼痛，并伴有腹胀，恶心呕吐，呕吐物为胃内容物，停止肛门排气，患者半年前曾作阑尾炎切除术。体检：腹胀，见肠型；腹软，轻度压痛，肠鸣音亢进。

1. 首选的检查是：  
A.腹部CT  
C.钡剂灌肠  
E.纤维结肠镜检查
- B.腹部穿刺  
D.腹部X线平片
2. 该患者出现肠梗阻，最可能的原因为：  
A.肠粘连  
C.粪块堵塞  
E.肠麻痹
- B.肿瘤  
D.肠扭转

3. 该患者发生的肠梗阻类型，不可能是：

- A.急性肠梗阻
- B.完全性肠梗阻
- C.绞窄性肠梗阻
- D.单纯性肠梗阻
- E.机械性肠梗阻

4. 对该患者的处理措施错误的有：

- A.纠正水电解质及酸碱失衡
- B.应用抗菌药物
- C.禁食
- D.胃肠减压
- E.吗啡止痛

(5~7 题共用题干)

患儿，女，3 岁。自幼发现心脏杂音，经常患肺炎，查体胸骨左缘第 3~4 肋间 IV 级粗糙收缩期杂音，心电图示左心室及右心室均肥大，X 线片示肺血多。

5. 所患疾病可能是：

- A.室间隔缺损
- B.房间隔缺损
- C.动脉导管未闭
- D.法洛四联症
- E.肺动脉狭窄

6. 最常见的并发症是：

- A.脑出血
- B.脑栓塞
- C.脑脓肿
- D.呼吸衰竭
- E.呼吸道感染

7. 如果患儿服用强心苷，正确的护理是：

- A.服药前数脉搏
- B.服药后数脉搏
- C.药物饭中服用
- D.药物饭后服用
- E.与果汁同时服用

(8~10 题共用题干)

患者，女性，61 岁，持续发热 4 天，每日口腔温度波动范围在 38.5~40℃，并伴有脉搏、呼吸加快，食欲减退等症状。



- B.听诊器放在袖带下面
- C.尽量做到四定
- D.偏瘫病人应在患侧上臂测量
- E.袖带下缘距肘窝 1~2cm, 松紧以能放入 1 指为宜
3. 剪刀步态的特点有:
- A.下肢向前内侧迈出
- B.双膝内侧常互相摩擦碰撞
- C.足尖着地, 呈剪刀布或交叉步
- D.身体摇晃不稳, 如醉汉
- E.以上都正确
4. 以下不需要记录特殊护理记录单的是:
- A.危重、大手术病人
- B.需要严密监护的病人
- C.一般瘫痪病人
- D.骨折生活不能自理的患者
- E.需要记录液体出入量的病人
5. 局部冷疗法的目的是:
- A.减轻疼痛
- B.局部止痛
- C.局部消肿
- D.降温
- E.减轻深部组织的充血
6. 简易人工排痰(胸部叩击)的操作手法正确的是:
- A.叩击者手指指腹并拢
- B.用手腕的力量
- C.从肺底自下而上, 由外向内叩击
- D.从肺底自上而下, 由内向外叩击
- E.每一肺叶叩击 1~3min, 每分钟叩击 120~180 次
7. 与典型室性期前收缩心电图表现符合的是:
- A.提前出现 QRS 波
- B.QRS 波宽大畸形, 时限大于 0.12S
- C.QRS 波前无相关 p 波
- D.T 波与 QRS 波群主波方向相同
- E.期前收缩后没有完全代偿间歇

8. 重症肝炎的主要临床表现有：
- A.黄疸迅速加深  
B.肝脏进行性缩小  
C.腹水  
D.精神神经系统症状  
E.食欲减退
9. 患者男，50岁，诊断为结肠癌，行结肠造口术后10天。对于该患者的饮食指导，下列说法正确的是：
- A.进食易消化的熟食  
B.少吃辛辣食物  
C.多进食粗纤维食物  
D.避免进食过多胀气食物  
E.术后2周左右可进普食
10. 小脑损伤的典型体征包括：
- A.眼球震颤  
B.共济失调  
C.随意运动丧失  
D.语言障碍  
E.意向性震颤

**四、系列多项选择题（请根据题目要求，在五个选项中选出两个或两个以上恰当的答案，多选和未选均不得分。共10题，每题2分，共20分。）**

（1~4题共用题干）

患者，男性，20岁，因“突起高热3天”以“流行性乙型脑膜炎”收治入院。查体：体温39.8℃，脉搏120次/分，节律不齐，对光反射迟钝，肺部可闻及干湿啰音颈强直(+)。

1. 此期患者可出现的三个最主要的凶险症状是：
- A.高热  
B.意识障碍  
C.呼吸衰竭  
D.循环衰竭  
E.惊厥
2. 出现惊厥后的处理措施正确的有：
- A.立即放置患者于仰卧位，头偏向一侧  
B.松解衣服和领口  
C.将包纱布的压舌板置于上下磨牙之间  
D.保持病室安静

- E. 按住患者的上下肢，以免坠床和意外伤害
3. 该疾病常见的护理诊断有：
- A. 体温过高  
B. 躯体活动障碍  
C. 意识障碍  
D. 惊厥  
E. 潜在并发症：支气管肺炎
4. 护士对该疾病预防指导中正确的有：
- A. 加强对家畜管理，尤其幼猪，搞好饲养环境卫生  
B. 避免细菌感染  
C. 开展防蚊、灭蚊工作  
D. 应采用接触性隔离  
E. 易感人群可以接种疫苗

(5~6 题共用题干)

患者，女性，28 岁，7 天前因外伤性十二指肠破裂行剖腹探查术，术中行胃十二指肠修补、十二指肠造瘘减压术，空肠造瘘、放置腹腔引流管。1 天前患者诉腹痛，T39.2℃，见小网膜孔引流出含胆汁样液体，量约 1500ml。

5. 处理方法包括：
- A. 流质饮食  
B. 保持各引流管通畅  
C. 尽早封闭瘘口  
D. 予胃肠外营养  
E. 腹腔灌洗和引流
6. 对该患者的护理，正错的有：
- A. 半坐卧位  
B. 夹闭引流管观察  
C. 引流管予以负压吸引  
D. 予胃肠外营养  
E. 及时清洁瘘口周围皮肤

(7~8 题共用题干)

患者女性，急性阑尾炎合并穿孔，急诊在硬膜外麻醉下行阑尾炎切除术，术中顺利，术后血压稳定，病情平稳，随即将患者送回病房。

7. 术后，患者自觉排尿困难，护士应给与的护理措施：
- A.让患者听流水声  
B.腹部热敷  
C.给予利尿剂  
D.立即给患者导尿  
E.病情允许可协助患者以其习惯姿势进行排尿
8. 术后第二天，患者切口疼痛，体温 38.2℃，将其置于半坐卧位的目的不包括：
- A.可减少局部出血，利于切口愈合  
B.有利于增进食欲，为进食做准备  
C.有利于减少回心血量，减少心脏负担  
D.有利于减轻肺部淤血，减少肺部并发症  
E.可使感染局限，减轻切口缝合处的张力，缓解疼痛

(9~10 题共用题干)

患者，男性，67 岁。1 年前诊断为心绞痛，今日后无明显诱因出现心前区疼痛，服硝酸甘油不能缓解，急诊入院，医嘱要求检查 CPK。

9. 采集血标本时，正确的措施是：
- A.若患者有凝血功能障碍，拔针后按压时间可延长至 10min  
B.采血时避免震荡  
C.采血后更换针头再注入试管内  
D.不可在静脉留置针处取血  
E.快速将血液注入试管内
10. 试管外签注明的内容包括：
- A.科室  
B.床号  
C.姓名  
D.取血量  
E.送检目的