

2020 年全国军队文职招聘考试

《医基+中医》模拟卷-答案及解析

第一部分 基础知识

一、单项选择题

1. 【答案】D。解析：黄体生成素又称促黄体素，该激素含量升高达到高峰是机体排卵的标志。

2. 【答案】B。解析：房室延搁的生理意义是使心房和心室不同时收缩，进而使血液能顺序流动。

3. 【答案】D。解析：肠结核病溃疡型，肠壁淋巴管环肠管走行，病变沿淋巴管扩散，因此典型的肠结核溃疡多呈环形，其长轴与肠腔长轴垂直。溃疡边缘参差不齐，一般较浅，底部有干酪样坏死物，其下为结核性肉芽组织。

4. 【答案】D。解析：细胞坏死镜下主要形态表现是核浓缩、核碎裂、核溶解。

5. 【答案】D。解析：胸锁乳突肌收缩使头向同侧倾斜，脸转向对侧。

6. 【答案】B。解析：胆囊为贮存和浓缩胆汁的器官。胆囊管和肝总管合成胆总管，囊底是胆囊突向前下方的盲端，常在肝前缘的胆囊切迹处露出。当胆汁充满时，胆囊底可贴近腹前壁。胆囊底的体表投影位于右腹直肌外缘或右锁骨中线与右肋弓交点附近。

7. 【答案】A。解析：自前向后分为肺静脉、肺动脉、主支气管。自上而下，左肺根内部结构的排列为左肺动脉、左主支气管和左肺静脉，右肺根为右肺上叶支气管、右肺动脉、右肺中下叶支气管和右肺静脉。

8. 【答案】C。解析：膀胱直肠陷凹属于男性所有。

9. 【答案】D。解析：淋巴管壁平滑肌的收缩活动和淋巴管中的瓣膜共同构成“淋巴管泵”，能推进淋巴液流动。淋巴管周围组织对淋巴管的压迫也能推动淋巴液的流动。在部分淋巴管中，淋巴的流动是单向的，最终流入静脉角。

10. 【答案】C。解析：下斜肌收缩时瞳孔转向上外，上斜肌收缩时瞳孔转向下外。

11. 【答案】B。解析：肺气肿的基本病理：慢性炎症改变导致远端细支气管及肺泡管等肺支架结构破坏，从而导致气流受限。机理：吸气时胸廓扩张，胸腔负压增高，肺被动扩张，气体进入肺泡；当呼气时胸廓及肺脏弹性回缩，胸腔内压增高导致远端已被炎症破坏的细支气管及肺泡管塌陷，而肺泡内气体排出障碍，肺泡内压增高；长期发展

导致肺泡扩大，肺容积扩大，即肺气肿；肺泡破裂、融合则形成肺大疱，肺脏容积的扩大导致肺下界下移，膈肌下移，相对肝浊音界及肝浊音界均相应下移。

12.【答案】C。解析：潜伏性感染是指病原体寄生在机体中某些部位机体免疫功能足以将病原体局限化不引起显性感染，病原体长期潜伏下来，待机体免疫功能下降时，才引起显性感染。潜伏性感染期间，病原体一般不排出体外，因而不具有传染源作用。这是与病原携带状态不同之处。

13.【答案】C。解析：心包摩擦音是急性心包炎典型的体征，呈抓刮样粗糙音，多位于心前区，以胸骨左缘第3~4肋间最为明显，坐位时身体前倾，深吸气或将听诊器加压更易听到。

14.【答案】D。解析：II型呼吸衰竭不能用高流量吸氧，以防呼吸抑制。患者呼酸合并代酸，pH值<7.15需要补碱治疗，边治疗边观察。逐步纠正酸中毒是治疗的基本原则，不能迅速将pH值迅速升至正常，过快的纠正会出现低钙低钾及红细胞氧合功能降低。

15.【答案】D。解析：骨盆骨折多有强大暴力外伤史，主要是车祸、高空坠落和工业意外。多存在严重的多发伤，休克常见。骨盆骨折可发现下列体征：①骨盆分离试验与挤压试验阳性；②肢体长度不对称；③会阴部瘀斑是耻骨和坐骨骨折的特有体征。

16.【答案】D。解析：药品监督管理部门进行监督检查时，必须出示证明文件，对监督检查中知悉的被检查人的技术秘密和业务秘密应当保密。

17.【答案】B。解析：《医疗事故处理条例》第16条规定：发生医疗事故争议时，死亡病例讨论记录、疑难病例讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录应当在医患双方在场的情况下封存和启封。封存的病历资料可以是复印件，由医疗机构保管。

18.【答案】D。

19.【答案】C。解析：共同参与型：医生和病人有近似相等的权利和地位。病人的地位进入伙伴关系，适用于成年人之间。

20.【答案】B。解析：不可强制病人进行必要的治疗，不符合医师的道德义务。

二、单项选择题

21.【答案】A。解析：小肠上皮、肾小管上皮通过继发性主动转运吸收葡萄糖、氨基酸。

22.【答案】D。解析：兴奋性突触后电位是一种局部性的去极化电位。

23.【答案】A。解析：肌肉活动对能量代谢的影响最为显著，主要以增加肌肉耗氧量而做外功，使能量代谢率升高。

24.【答案】B。解析：肺腺癌多为周围型，与吸烟关系不密切。腺癌可分为高、中、低分化，细支气管肺泡细胞癌也是肺腺癌的一个亚型。癌组织可形成腺腔乳头，可伴有黏液分泌。常有肺门淋巴结转移。

25.【答案】D。解析：根据水肿波及的范围分为全身性水肿和局部性水肿。

26.【答案】D。解析：脊柱由 24 块椎骨、1 块骶骨、1 块尾骨构成，颈曲、腰曲凸向前，胸曲、骶曲凸向后，后纵韧带位于椎管内椎体的后面，而非脊柱后方。腰大肌能使髋关节前屈和旋外，腰方肌能使脊柱侧屈。

27.【答案】A。解析：肩关节活动度大，是最常发生习惯性脱位的关节。

28.【答案】D。解析：胸膜腔、腹膜腔、心包腔均为男性、女性共有的浆膜腔。

29.【答案】A。解析：肺循环过程为右心室→肺动脉→肺泡毛细血管网→氧合→肺静脉→左心房。其中无主动脉。

30.【答案】A。解析：冠状动脉是心脏的主要供血动脉。前降支为左冠状动脉主干的延续，后降支又称后室间支，为右冠状动脉行走至后十字交叉处分出的一较大分支。由于冠状动脉在心肌内行走，显然会受制于心肌收缩挤压的影响，因此，心脏收缩时，血液不易通过，只有当其舒张时，心脏方能得到足够的血流。

31.【答案】A。解析：血清淀粉酶（AMS）高于 500IU/L 有诊断意义，达到 350IU/L 应怀疑此病。

32.【答案】A。解析：肝细胞性黄疸血清总胆红素升高，其中以结合胆红素升高为主。尿中胆红素阳性，尿胆原常增加，根据题干可考虑为肝细胞性黄疸。

33.【答案】A。解析：省、自治区、直辖市人民政府可以决定对本行政区域内的甲类传染病疫区实施封锁；但是，封锁大、中城市的疫区或者封锁跨省、自治区、直辖市的疫区，以及封锁疫区导致中断干线交通或者封锁国境的，由国务院决定。疫区封锁的解除，由原决定机关决定并宣布。

34.【答案】B。解析：正常菌群作为抗原可促进宿主器官的发育，刺激免疫系统的成熟与免疫应答。产生的免疫物质对具有交叉抗原组分的致病菌有一定程度的抑制或杀灭作用。

35.【答案】A。解析：出现心室夺获及室性融合波是室性心动过速的特征性表现。

36.【答案】C。解析：患者胸痛、咳铁锈色痰，X 片显示右肺中叶大片密度增高阴影，痰培养 G⁺双球菌，菊糖发酵试验可分离出肺炎链球菌，故可判断为大叶性肺炎。肺结核患者多为低热。

37.【答案】D。解析：脑血管意外是我国高血压病的最见死亡原因。

38.【答案】C。解析：乳房囊性增生疼痛与月经周期有关，在月经前后出现胀痛。

39.【答案】A。解析：开放性气胸患者的抢救措施最重要的是变开放为闭合，所以要迅速封闭胸部伤口。

40.【答案】C。解析：根据突发卫生事件性质、危害程度、涉及范围，《国家突发公共卫生事件应急预案》将突发公共卫生事件划分为特别重大（Ⅰ）、重大（Ⅱ）、较大（Ⅲ）和一般（Ⅳ）四级，依次用红色、橙色、黄色、蓝色进行预警。

第二部分 中医专业知识

一、单项选择题

41.【答案】A。解析：心悸邪毒犯心证表现为心悸，胸闷，气短，左胸隐痛，发热，恶寒，咳嗽，神疲乏力，口干渴，舌质红，少津，苔薄黄，脉细数或结代。故选A。

42.【答案】D。解析：若噤腐吞酸，恶心厌食者属食积。

43.【答案】A。解析：眩晕气血亏虚证、失眠心脾两虚证兼因脾为气血生化之源，又具统血功能。脾气虚弱，生血不足，或统摄无权，血溢脉外，均可导致心血亏虚。心主血，血充则气足，血虚则气弱。心血不足，无以化气，则脾气亦虚。心血不足，心失所养，则心悸怔忡；心神不宁，故失眠多梦，头目失养，则眩晕健忘；肌肤失荣，故面色萎黄无华。脾气不足，运化失健，故食欲不振，腹胀便溏；气虚机能活动减退，故神倦乏力，脾虚不能摄血，可见皮下出血，妇女经量减少，色淡质稀，淋漓不尽。舌质淡嫩，脉细弱，皆为气血不足之征。治宜补益心脾，故二者兼可用归脾汤。

44.【答案】B。解析：B选项为水肿的常见证型，其余四项为其变证类型。

45.【答案】A。解析：郁证多与情志不舒、思虑过度、饮食不节等因素有关，病位在肝，可涉及心、脾、肾，多发于中青年女性。

46.【答案】A。解析：辨证要点：小疔肿，发热、口渴、便秘，舌红苔薄黄，脉数。

47.【答案】C。解析：本病开始有粟米样小脓头，发病迅速，根深坚硬如钉为特征。因发病部位和形状不同，而有“人中疔”、“虎口疔”、“红丝疔”等名称。

48.【答案】C。解析：患儿颈部结块，形如鸡卵，皮色不变，灼热疼痛，边界清楚判断为颈痈，治法散风清热，化痰消肿，选方牛蒡解肌汤或者银翘散。

49.【答案】A。解析：失荣是以颈部肿块坚硬如石，推之不移，皮色不变，面容憔悴，形体消瘦，状如树木失去荣华为主要表现的肿瘤性疾病。

50.【答案】C。解析：尿路结石是最常见的泌尿外科疾病之一，男性多于女性，约3：1，近30多年来，我国上尿路（肾、输尿管）结石发病率较高。

51.【答案】A。解析：根据题干可判断患者为粉刺，证属于肺经风热，治疗首选：枇杷清肺饮加减，疏风清肺。

52.【答案】B。解析：苍附导痰丸治疗经水逐渐减少，以致经闭，形体日渐肥胖，腰酸浮肿，胸闷恶心，心悸气短，纳谷少馨，乏力倦怠，舌苔白腻，脉滑。

53.【答案】A。解析：带下过多湿热下注证临床表现为带下量多，色白，质黏腻，呈豆腐渣样，外阴瘙痒，胸闷口苦，小便短赤，舌红，苔黄腻，脉滑数。故选止带方。

54.【答案】B。解析：产后“三冲”为：冲心，心中烦躁，卧起不安，甚则神志不清，语言颠倒；冲肺，气急，喘满，汗出，甚则咯血；冲胃，腹满胀痛，呕吐，烦乱。

55.【答案】B。解析：急性盆腔炎是感染性疾病。多有明显的致病因素，一般不会突然腹痛，并伴有恶心呕吐，如出现，多见于卵巢瘤蒂扭转、肠梗阻等。

56.【答案】B。解析：本证多由孕母体弱多病，气血素亏，胎儿禀赋不足而致；多起病缓，病程长，预后较差，临床表现为阴黄，虚寒之象明显。乃寒湿阻滞之证，治宜温中化湿。

57.【答案】B。解析：小儿肺炎喘嗽和咳嗽都可见咳嗽剧烈、高热不退、痰涎壅盛、呼吸浅促等症状，气急鼻煽是两者的鉴别要点。

58.【答案】C。解析：疳证，中医病名。疳证是由于喂养不当，或因多种疾病的影响，导致脾胃受损，气液耗伤而形成的一种小儿慢性病症。临床以形体消瘦，面黄发枯，精神萎靡或烦躁，饮食异常，大便不调为特征。本病相当于西医学营养不良。

59.【答案】A。解析：中医认为流行性腮腺炎的主要病机为邪毒壅阻少阳经脉，与气血相搏，凝滞于耳下腮部。故而主要在少阳经。

60.【答案】C。解析：本病表现符合过敏性紫癜的诊断要点。

二、系列单项选择题

61.【答案】A。解析：此证主要病机为感受湿热，肠腑传化失常。

62.【答案】D。解析：主要病机为感受湿热，肠腑传化失常，治法宜：清热利湿。

63.【答案】B。解析：湿热泄泻选方葛根芩连汤。

64.【答案】B。解析：吴茱萸助阳止泻，散寒止痛，降逆止呕，与本证不符。

诊断：泄泻（湿热伤中证）

分析：根据患者由于食用过多辛辣之物及喝白酒后，继而出解稀烂黄褐色大便，日解三次，故诊断为泄泻。而患者出现泻下急迫，泻而不爽，粪色黄褐，气味臭秽，肛门灼热，腹痛拒按，烦热口渴，小便短赤，舌质红，苔黄腻，脉滑数。此乃属湿热泄泻之证候。因湿热蕴结，下迫大肠，大肠传导失常，故泻下急迫。肠道气机不利，泻而不爽，故腹痛拒按。湿热下注，则肛门灼热，粪色黄褐，气味臭秽，小便短赤。湿热上扰则烦热口渴。舌质红，苔黄腻，脉滑数均为湿热内盛之象。

治法：清肠利湿。

方药：葛根芩连汤加味：葛根 15g 黄芩 10g 黄连 10g 甘草 6g 白芍 15g 木香 5g（后下）茯苓 15g 车前草 10g 日一剂，水煎服。

65.【答案】C。解析：疔是指发生在肌肤浅表部位范围较小的急性化脓性疾病。根据病因、证候不同，又可分有头疔、无头疔、蝼蛄疔、疔病等。其特点是肿势局限，范围多在3cm左右，突起根浅，色红、灼热、疼痛，易脓、易溃、易敛。

66.【答案】B。解析：暑热浸淫证辨证要点：发于夏秋季节，以小儿及产妇多见。局部皮肤红肿结块，灼热疼痛，根脚很浅，范围局限。伴发热、口干、便秘、溲赤。舌苔薄腻，脉滑数。

67.【答案】A。解析：暑热浸淫证治法：清暑化湿解毒。代表方剂：清暑汤加减。

68.【答案】A。解析：月经提前7天以上，甚至十余日一行，连续两个周期以上者，称为月经先期。

69.【答案】A。解析：该患者近3个月提前月经，且量多，色深红，质稠黏；伴心烦，面红，口干，小便短黄，大便干；舌质红，苔黄，脉滑数，故判断为阳盛血热。

70.【答案】D。解析：辨证为阳盛血热证的月经先期，最佳治法是清热凉血调经。

三、多项选择题

71.【答案】ABCD。解析：哮病和喘证都有呼吸急促、困难的表现。哮必兼喘，但喘未必兼哮。哮指声响言，喉中哮鸣有声，是一种反复发作的独立性疾病；喘指气息言，为呼吸气促困难，是多种肺系急慢性疾病的一个症状。

72.【答案】ABCE。解析：阴寒痰浊血瘀均可以痹阻经脉不通则痛引起胸痹。食滞很少会引起胸痹。

73.【答案】ACDE。解析：水肿的严重变证主要有：①水毒内阻，胃失和降：症见神昏嗜睡，泛恶呕吐，口有尿味，不思纳食，小便短少，甚或二便不通，舌苔浊腻，脉细数。②水凌心肺，阳气衰微：症见心悸胸闷，喘促难卧，咳吐清涎，手足肿甚，舌淡胖，脉沉细而数。治宜通阳泄浊，温振心阳，方用真武汤合黑锡丹。③虚风扰动，神明不守：症见头绿头痛，步履飘浮，肢体微颤，舌质红，少苔，脉细数。治宜息风潜阳，补元固本，方用大补元取合羚角的藤汤。④邪毒内闭，元神涣散：症见神昏肢冷，面色晦滞，泛恶口臭，二便不通，肌衄牙宣，舌红体、苔焦黄，脉细数。

74.【答案】ABCDE。解析：消渴病常病及多个脏腑，病变影响广泛，未及时医治以及病情严重的患者，常可并发多种病证，如肺失滋养，日久可并发肺癆；肾阴亏损，肝失濡养，肝肾精血不能上承于耳目，则可并发白内障、雀目、耳聋；燥热内结，营阴被灼，脉络瘀阻，蕴毒成脓，则发为疮疖痈疽；阴虚燥热，炼液成痰，以及血脉瘀滞，痰瘀阻络，蒙蔽心窍，则发为中风偏瘫；阴损及阳，脾肾衰败，水湿潴留，泛滥肌肤，则发为水肿。综观消渴病的自然发病过程，常以阴虚燥热为始，病程日久，可导致阴损及阳，血行瘀滞，而形成阴阳两虚，或以阳虚为主，并伴血脉瘀阻的重证，且常出现各种严重的并发症。

- 75.【答案】BCDE。解析：蛇串疮又名缠腰火丹、火带疮、蛇丹、蜘蛛疮。
- 76.【答案】BE。解析：肛痈一般 5~7 天成脓。单纯切开引流适用于体质虚弱或不愿住院治疗的深部脓肿。故答案选 BE。
- 77.【答案】BCD。解析：治崩三法是指塞流、澄源、复旧。
- 78.【答案】ABCD。解析：代谢性酸中毒产物损伤了脑、心、肝、肾功能，病情严重，故应下胎益母。
- 79.【答案】ABD。解析：孕妇胎热内蕴遗患胎儿；口腔不洁，则易为秽毒之邪所侵；感染秽毒之邪，积热蕴于心脾，熏灼口舌，均易产生鹅口疮心脾积热证。
- 80.【答案】AC。解析：小儿服药可采取少量多次喂服的方法，不必限制于 1 日 2~3 次服。对抗拒服药的小孩，可固定小儿头部，用小匙将药汁送至舌根部，将小匙竖起，使之自然吞下，切勿捏鼻灌服，以防呛入气管。

四、系列多项选择题

- 81.【答案】AC。解析：根据题干可判断患者为产后失血过多导致的厥证，为血厥虚证，涉及的脏腑有心、脾。
- 82.【答案】CD。解析：患者此时病证的主要病机气随血脱、心神失养。
- 83.【答案】AD。解析：厥证，血厥虚证。中医治法：补益气血。主方：独参汤合人参养营汤加减。
- 84.【答案】ABDE。解析：口腔舌上蔓生白屑，状如鹅口，诊断为鹅口疮。初生儿肌肤娇嫩，早产儿胎禀不足，久病体虚婴儿气阴内耗，长期使用抗生素或激素者损伤正气，均易患鹅口疮。
- 85.【答案】ABD。解析：根据满布白屑，面赤唇红，大便干结，小便黄赤，舌红，诊断为鹅口疮心脾积热证。孕妇胎热内蕴遗患胎儿；口腔不洁，则易为秽毒之邪所侵；感染秽毒之邪均易产生积热蕴于心脾，熏灼口舌。
- 86.【答案】ABCD。解析：根据题干分析可知，该患者为乳痈。乳痈是由热毒入侵乳房而引起的急性化脓性疾病。相当于西医的急性化脓性乳腺炎。常发生于产后哺乳妇女，尤以初产妇多见。其特点是乳房局部结块，红肿热痛，伴有恶寒发热等全身症状。其病机包括：（1）乳汁郁积：乳汁郁积是最常见的原因。（乳头破碎、乳头畸形、哺乳方法不当、乳汁多而少饮、断乳不当）（2）肝郁胃热：情志不畅，肝气郁结，厥阴之气失于疏泄；产后饮食不节，脾胃运化失司，阳明胃热壅滞，均可使乳络闭阻不畅，郁而化热，形成乳痈。（3）感受外邪：产妇体虚汗出受风，或露胸哺乳外感风邪。
- 87.【答案】ABCDE。解析：乳汁郁积的原因包括：初产妇乳头破碎、乳头畸形，影响充分哺乳；或哺乳方法不当，或乳汁多而少饮，或断乳不当。

88.【答案】AB。解析：该患肝硬化病史 10 年，腹部结块，按之略痛，面色萎黄，肌肉瘦削，神疲乏力，脘痞食少，舌质淡紫少苔，脉弦细，诊断为：积证，正虚瘀结证。

89.【答案】ABC。解析：此证主要病机为：癥积日久、中虚失运、气血衰少。

90.【答案】BC。解析：主要病机为：癥积日久、中虚失运、气血衰少。治法宜：补益气血、化瘀消积。