

2020 军队文职医学类招聘考试模拟卷二

第一部分 医学基础知识

一、单项选择题

1. 心动周期中，心室血液的充盈主要取决于：
A.心房收缩期
B.减慢射血期
C.等容舒张期
D.快速充盈期
2. 下列关于抑制性突触后电位的叙述，正确的是：
A.是局部去极化电位
B.具有“全或无”性质
C.是局部超极化电位
D.由突触前膜递质释放量减少所致
3. 肾小球滤过率是指单位时间内：
A.每侧肾脏生成的滤液量
B.每侧肾脏通过的血浆总量
C.两肾生成的滤液的总量
D.生成的尿总量
4. 关节的辅助结构不包括：
A.椎间盘
B.黄韧带
C.关节突关节
D.棘间韧带

5. 上下消化道分界的标志是：
 - A.十二指肠
 - B.幽门窦
 - C.胰管开口
 - D.Treitz 韧带
6. 与空肠相比较，关于回肠的表述正确的是：
 - A.环形皱襞高而密
 - B.管径大、管壁厚
 - C.血管丰富
 - D.有集合淋巴滤泡
7. 颞横回是：
 - A.视觉中枢
 - B.听觉中枢
 - C.感觉性语言中枢
 - D.运动性语言中枢
8. 支配三角肌的神经是：
 - A.腋神经
 - B.肌皮神经
 - C.桡神经
 - D.尺神经
9. 关于膝关节半月板的描述正确的是：
 - A.半月板外缘较薄、内缘厚
 - B.内侧半月板呈“O”形
 - C.外侧半月板较小
 - D.半月板周围附着于胫骨上

10. 视交叉中心部损伤可引起:
- A.双眼颞侧视野偏盲
 - B.双眼鼻侧视野偏盲
 - C.双眼内上象限视野偏盲
 - D.双眼外上象限视野偏盲
11. 下列不属于腹膜间位器官的是:
- A.子宫
 - B.肝脏
 - C.升结肠
 - D.横结肠
12. 占眼球纤维膜的 $\frac{5}{6}$ 为乳白色不透明的纤维组织,厚而坚韧,有保护眼球内容物和维持眼球形态的作用的是:
- A.角膜
 - B.巩膜
 - C.虹膜
 - D.视网膜
13. 一种成熟的组织被另一种成熟的组织取代的现象称为:
- A.化生
 - B.间变
 - C.再生
 - D.机化
14. 槟榔肝的主要病理变化是:
- A.细胞广泛萎缩
 - B.肝细胞广泛脂变
 - C.肝内广泛淤血、水肿

- D.肝内淤血、肝细胞脂变及萎缩
15. 关于恶性肿瘤的血道转移不恰当的为:
- A.血道转移形成的转移瘤常为多发性
- B.可发生于癌的晚期
- C.形成的转移瘤多位于器官的表面,呈圆球形结节
- D.在发生血道转移前均已发生淋巴道转移
16. 左心衰竭时发生淤血的器官是:
- A.肝
- B.肺
- C.肾
- D.脑
17. 急性细菌性痢疾的典型肠道病变为:
- A.化脓性炎
- B.卡他性炎
- C.伪膜性炎
- D.出血性炎
18. 霍奇金病最重要和最具有诊断意义的细胞是:
- A.小核裂细胞
- B.大核裂细胞
- C.陷窝细胞
- D.R-S 细胞
19. 肾盂肾炎的主要病变特点是:
- A.确诊主要靠肾穿刺活体组织检查
- B.肉眼观表现为颗粒性固缩肾,瘢痕分布均匀,两肾对称
- C.肾小血管常有纤维蛋白样坏死

- D.肾间质炎症，肾脏有凹陷性瘢痕，肾盂肾盏变形
20. 不符合慢性炎症的病变是：
- A.浸润的细胞主要是中性粒细胞
- B.在黏膜可形成炎性息肉
- C.在肺可形成炎性假瘤
- D.纤维结缔组织增生常伴有瘢痕形成

二、单项选择题

21. 女性，着凉后出现尿频、尿急、尿痛、发热，该患者因为延误治疗发展为急性肾盂肾炎，患者的热型为：
- A.稽留热
- B.弛张热
- C.间歇热
- D.波状热
22. 了解腹泻的伴随症状，对作出临床诊断具有重要价值，若腹泻伴有明显消瘦，多提示病变位于：
- A.直肠
- B.乙状结肠
- C.小肠
- D.盲肠
23. 急性上消化道出血最常见的原因是：
- A.急性胃黏膜损伤
- B.消化性溃疡
- C.胃癌
- D.食管胃底静脉曲张

24. 下列属于浅反射的是：
- A.角膜反射
 - B.肱二头肌反射
 - C.膝反射
 - D.Hoffmann 征
25. 先昏迷后发热可见于：
- A.肝性脑病
 - B.流行性乙型脑炎
 - C.脑出血
 - D.癫痫
26. 下列不属于产生少尿的肾前性因素的是：
- A.心脏排血功能下降
 - B.有效血流量减少
 - C.急进性肾炎
 - D.肾血管狭窄
27. 意识障碍伴瞳孔缩小可见于：
- A.颠茄类中毒
 - B.有机磷农药中毒
 - C.酒精中毒
 - D.氰化物中毒
28. 4 个月的脑积水婴儿，查体可见落日现象，该患者的头颅为：
- A.尖颅
 - B.方颅
 - C.长颅
 - D.巨颅

29. 男, 30 岁, 近 4 年来经常间发四肢关节疼痛, 近来感乏力、纳差、心悸、气促, 肝在肋下 2.5cm 触及, 轻触痛。查血红蛋白 97g/L, 尿蛋白 (+); 双下肢轻度浮肿。其原因最可能为:
- A.肝硬化
 - B.急性肾炎
 - C.主动脉瓣狭窄致左心衰
 - D.二尖瓣狭窄致右心衰
30. GPT (ALT) 活性最高的组织是:
- A.心肌
 - B.脑
 - C.骨骼肌
 - D.肝
31. 女性, 26 岁。2 个月前出现左下腹痛、腹泻, 排黏液脓血便, 每日 4~6 次, 排便后腹痛缓解。四肢关节疼痛。查体: 腹软, 腹部未触及包块, 左下腹压痛, 可能的诊断是:
- A.溃疡性结肠炎
 - B.肠结核
 - C.肠阿米巴病
 - D.慢性阑尾炎
32. 治疗金黄色葡萄球菌引起的急慢性骨髓炎最佳选用:
- A.阿莫西林
 - B.克林霉素
 - C.头孢曲松
 - D.克拉霉素

33. 男，40岁，农民。因发热伴全身不适、头痛4d，少尿半天，于1月10日来诊。家中卫生条件差，有鼠。查体：高热，P120次/分，BP80/50mmHg，神志清楚，腋下皮肤散在出血点，面颈部充血，眼睑水肿，颈无抵抗，Kerning征（-）。实验室检查：血WBC $21 \times 10^9/L$ ，N0.7，异型淋巴细胞0.15，Hb160g/L，尿蛋白（+++），镜检有红细胞及管型，最可能的诊断是：
- A.流行性脑脊髓炎
 - B.钩端螺旋体病
 - C.流行性感冒
 - D.肾综合征出血热
34. 钱某因胃癌去某三甲医院就诊，期望“重获新生”，接诊医生在仔细了解钱某的病情和想法后，客观地说明了胃癌目前临床治疗的现状，并告知其手术治疗过程中可能出现的风险及术后并发症，根据医患关系模式伦理，医生和钱某的上述沟通属于：
- A.医患认知互动
 - B.医患情感互动
 - C.医患意志互动
 - D.医患行为互动
35. 撤除患者赖以维持生命的医疗辅助设施或放弃必要的医疗措施，使患者等待死神降临、自然逝去的方式属于：
- A.主动安乐死
 - B.被动安乐死
 - C.非自愿安乐死
 - D.上述都不对
36. 患者，男，71岁。患癌症三年，晚期，已失去手术治疗价值，生命垂危。家属再三恳求医生，希望能满足病人心理上的渴求，收他入院，医生出于“人道”，将他破格收入院。按医院的职能和任务要求，下列说法错误的是：

- A.医院担负治病救人的任务，应该收治这个病人
 - B.医院治病救人对所有的病人都应一视同仁
 - C.治愈率、床位周转率是考核医院效益的指标，因而不能收治晚期癌症病人
 - D.病人家属已同意支付医药费，对医院经济管理无影响
37. 某乡卫生院医生甲在施行阑尾炎手术时，误将结肠切断，因条件差，立即将患者送往县医院，因延误了时机，县医院乙在助手配合下，也没有处理好，最终造成永久造瘘，该结果是：
- A.医生甲的医疗差错
 - B.医生甲的医疗事故
 - C.医生乙的医疗差错
 - D.医生乙的医疗事故
38. 根据《传染病防治法》，下列哪项表述是不正确的：
- A.国家对传染病防治实行预防为主的方针，防治结合、分类管理、依靠科学、依靠群众
 - B.疾病预防控制机构根据传染病预防、控制的需耍，制定辖区传染病预防接种规划并组织实施
 - C.对传染性非典型肺炎、肺炭疽患者采取甲类传染病的预防、控制措施
 - D.国家开展预防传染病的健康教育，新闻媒体应当无偿开展传染病防治和公共卫生教育的公益宣传
39. 关于麻醉药品的使用规定，错误的是：
- A.医疗机构应当凭印鉴卡向本省、自治区、直辖市行政区域内的定点批发企业购买麻醉药品
 - B.执业医师取得麻醉药品处方资格后，方可在本医疗机构开具麻醉药品处方
 - C.执业医师可以使用普通处方开具麻醉药品和精神药品
 - D.麻醉药品处方至少保存 3 年

40. 医疗保健机构提供的母婴保健指导的内容包括：
- A.对孕妇提供心理方面的指导
 - B.对孕妇提供营养方面的指导
 - C.对指定传染病的发病、治疗和预防方法提供医学意见
 - D.对碘缺乏症等地方病的发病原因，治疗和预防提供医学意见

第二部分 中药学专业知识

一、单选题

1. 辛味药所含的主要成分是：
 - A.氨基酸
 - B.有机酸
 - C.皂苷
 - D.挥发油
2. 具有抗惊厥作用的中药主要归经是：
 - A.大肠经
 - B.肺经
 - C.肝经
 - D.心经
3. 祛风湿药的代表药理作用是：
 - A.发汗
 - B.降压
 - C.抗炎镇痛
 - D.调节胃肠运动
4. 理气药治疗气滞、气逆证的代表药理作用基础是：
 - A.利胆
 - B.降压
 - C.抗溃疡
 - D.调节胃肠运动
5. 活血化瘀药的主要药理作用不正确的是：
 - A.抗惊厥
 - B.改善血液流变学
 - C.抗血栓
 - D.改善微血流
6. 《中国药典》一部规定细辛的入药部位是：

- A.全草
C.根茎
- B.根
D.根及根茎
7. 呈圆柱形，根头略膨大，可见暗绿色或暗棕色轮状排列的叶柄残基和密集的疣状突起的药材是：
- A.乌头
C.延胡索
- B.地榆
D.板蓝根
8. 玄参的气味是：
- A.气微，味微甜
C.气微，味甜而特殊
- B.气特异似焦糖，味甘、微苦
D.气微，味微苦
9. 药材横切面上具有同心性异型维管束的药材是：
- A.人参
C.太子参
- B.商陆
D.白芍
10. 白芍的主产地是：
- A.山东
C.浙江
- B.河北
D.湖南
11. 不经胃肠道给药的剂型是：
- A.汤剂
C.软膏剂
- B.酒剂
D.片剂
12. 不属于黏膜给药剂型的是：
- A.舌下片剂
C.滴眼剂
- B.含漱剂
D.贴膏剂
13. 属于液体剂型的是：
- A.糖浆剂
C.颗粒剂
- B.散剂
D.软膏剂
14. 属于无菌制剂的是：

27. 处方中葛根解肌退热，其主要成分葛根素的结构是：
- A. 萜类
B. 异黄酮
C. 皂苷
D. 香豆素
28. 处方中含有三萜皂苷类成分，且具有解热、抗炎、抗病毒和保肝作用的饮片是：
- A. 柴胡
B. 葛根
C. 桔梗
D. 羌活
29. 甘草的气味是：
- A. 气微，味甜而特殊
B. 气微，味微甜，嚼之微有豆腥气
C. 气辛香，味辛辣、麻舌
D. 气微，味微苦而酸
30. “疙瘩丁”是形容以下哪种药材的性状特征：
- A. 白芷
B. 白芍
C. 甘草
D. 柴胡

三、多选题

31. 关于皂苷性质的说法, 正确的有:
- A. 气味芳香
B. 易溶于水
C. 对黏膜有强烈的刺激性
D. 多数具有苦而辛辣味
E. 水溶液强烈振荡产生持久性泡沫
32. 主要化学成分为三萜皂苷的中药有:
- A. 甘草
B. 黄芪
C. 人参
D. 三七
E. 合欢皮
33. 因含有强心苷, 若使用不慎, 容易引起不良反应的中药有:
- A. 麦冬
B. 罗布麻叶
C. 香加皮
D. 麝香

- E.地骨皮
34. 中药药理作用的特点是:
- A.研究结果与传统功效的一致性 B.量效关系的复杂性
- C.药理作用的多样性 D.药理作用的双向性
- E.研究结果与传统功效的差异性
35. 质地坚实、断面角质样的药材有:
- A.郁金 B.延胡索
- C.葛根 D.黄芪
- E.天麻
36. 给大鼠灌胃温热药可造成热证模型, 其表现有:
- A.痛阈值降低 B.惊厥阈值降低
- C.多巴胺 β -羟化酶活性升高 D.脑内 NA、DA 含量升高
- E.脑内 5-HT 含量降低
37. 除另有规定外, 应检查崩解时限的片剂有:
- A.肠溶片 B.可溶片
- C.缓释片 D.舌下片
- E.咀嚼片
38. 关于直肠给药栓剂中药吸收途径及其影响因素的说法, 正确的有:
- A.直肠给药的脂溶性、非解离型的药物易吸收
- B.经直肠上静脉吸收的药物可产生肝脏首过效应
- C.经肛门静脉吸收的药物可绕过肝脏进入大循环
- D.经肛门淋巴系统吸收的药物不产生肝脏首过效应
- E.油脂性基质栓剂中的水溶性药物释放快、易吸收
39. 关于气雾剂、喷雾剂质量检查项目的说法, 正确的有:
- A.定量气雾剂应检查每揿主药含量

- B.非定量气雾剂应检查每瓶总喷次
- C.定量喷雾剂应检查每喷主药含量
- D.非定量气雾剂应检查每瓶的喷射速率
- E.定量气雾剂应检查递送剂量均一性

40. 有中枢兴奋作用的药物有：

- | | |
|------|-------|
| A.麻黄 | B.板蓝根 |
| C.钩藤 | D.麝香 |
| E.黄芩 | |

四、系列多选题

(三)

六味地黄丸是临床常见的补阴药，其处方由熟地黄、酒萸肉、牡丹皮、山药、茯苓、泽泻组成。具有之滋阴补肾功效。头晕耳鸣.腰膝酸软.骨蒸潮热.盗汗遗精。

41. 六味地黄丸具有三补三泻的特点，其中具有三泻作用的是：

- | | |
|-------|------|
| A.熟地黄 | B.泽泻 |
| C.牡丹皮 | D.山药 |
| E.茯苓 | |

42. 以下不属于菌核入药的是：

- | | |
|-------|------|
| A.熟地黄 | B.泽泻 |
| C.牡丹皮 | D.山药 |
| E.茯苓 | |

43. 以下道地产区属于河南的是：

- | | |
|-------|------|
| A.熟地黄 | B.泽泻 |
| C.牡丹皮 | D.山药 |
| E.茯苓 | |

44. 以下不含有环烯醚萜苷的是:

- A.熟地黄
- B.泽泻
- C.牡丹皮
- D.山药
- E.茯苓

45. 以下属于丸剂的检查项目的是:

- A.水分检查
- B.溶化性
- C.融变时限
- D.崩解时限
- E.溶散时限

(四)

硫酸阿托品散常用于胃肠痉挛疼痛的治疗,其处方为硫酸阿托品 1.0g,胭脂红、乳糖(1.0%)1.0g,乳糖 98.0g。

46. 根据处方,硫酸阿托品散不属于:

- A.普通散剂
- B.复方散
- C.含低共熔成分的散剂
- D.倍散
- E.溶液散剂

47. 硫酸阿托品散中不属于加入胭脂红的目的是:

- A.作为稀释剂
- B.作为矫味剂
- C.作为着色剂
- D.产生一定的药效
- E.改善外观性状

48. 以下药材中含有阿托品的是:

- A.洋金花
- B.天仙子
- C.麻黄
- D.川乌
- E.雷公藤

49. 以下散剂要求最细粉的是:

- A.内服
- B.外用

C.眼用

D.儿科

E.易吸湿的

50. 阿托品的生物活性包括：

A.解痉

B.镇痛

C.散瞳

D.解有机磷中毒

E.抗癌