

军队文职人员统一招聘《医基+护理学》

全真模拟卷二

第一部分 基础综合

一、单选题（20 题，每题 0.5 分，共 10 分）

1. 关于胃的描述错误的是：
 - A.入口为贲门
 - B.出口为幽门
 - C.幽门处有幽门瓣
 - D.胃壁平滑肌分为内环，外纵两层
2. 消化腺包括：
 - A.肝，脾，大唾液腺
 - B.肝，胰，胆囊
 - C.肝，胰，脾，消化管壁的小腺体
 - D.肝，胰，大唾液腺，消化管壁的小腺体
3. 下列关于胸膜腔的描述，错误的是：
 - A.是由脏、壁胸膜围成
 - B.是封闭的腔隙
 - C.腔内气压较大气压力低
 - D.腔内有肺和少量浆液
4. CO_2 和 NH_3 在体内跨细胞膜转运属于：
 - A.单纯扩散
 - B.易化扩散
 - C.出胞或入胞
 - D.原发性主动转运
5. 关于易化扩散的叙述，错误的是：
 - A.以载体为中介的易化扩散，如葡萄糖通过细胞膜进入细胞内的过程

- A.定位准确
- B.常伴自主神经兴奋症状
- C.疼痛较强
- D.有反跳痛，肌紧张
13. 下列微生物除了哪种以外，均属于原核细胞型微生物：
- A.螺旋体 B.真菌
- C.放线菌 D.支原体
14. 溶菌酶的溶菌作用机制是：
- A.裂解细胞壁聚糖骨架上的 β -1, 4 糖苷键
- B.抑制细胞壁肽聚糖上四肽侧链与五肽桥的交联
- C.抑制细菌 mRNA 表达
- D.抑制细菌 DNA 转录
15. 得知明天须作腹腔穿透术后，患者紧张，焦虑且恐惧，不愿签字，医生错误的做法是：
- A.强调腹穿诊断价值不可替代
- B.告诉患者技术已经成熟，风险小
- C.告诉患者对可能出现的风险已有防范措施
- D.请患者家属代为签字
16. 对白求恩医德境界的最佳概括是：
- A.对技术精益求精，毫不利己，专门利人
- B.对工作的极端的负责任
- C.对同志对人民的极端的热忱
- D.毫无自私自利之心
17. 对于切除阑尾炎的术后患者，宜采取的医患模式是：
- A.主动-被动型 B.被动-主动型
- C.指导-合作型 D.共同参与型

18. 以下说法错误的是:
- A. 每张处方限于一名患者的用药
 - B. 经注册的执业医师在执业地点取得相应的处方权
 - C. 处方药应当凭医师处方销售、调剂和使用
 - D. 被取消处方权的医师 3 个月后可自动恢复处方权
19. 对已确认发生严重不良反应的药品, 国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的 _____ 部门可以采取停止生产, 销售, 使用的紧急控制措施。
- A. 卫生行政
 - B. 质量监督检验
 - C. 药品监督管理
 - D. 工商管理
20. 医生赵某, 在门诊值班时发现一患有霍乱病人, 但未予以隔离治疗, 经诊治后让患者回家, 结果使患者家人都患上该病, 有关卫生行政部门对其进行行政处分。医生对处分不满, 他应该在多长时间内向上一级卫生行政部门申请复议:
- A. 一个月内
 - B. 十五日内
 - C. 十日内
 - D. 六十日内

二、单选题 (20 题, 每题 1 分, 共 20 分)

21. 对骨的营养生长和骨折后的修复都有十分重要作用的结构是:
- A. 骨密质
 - B. 骨松质
 - C. 骨髓
 - D. 骨膜
22. 黄骨髓存在于:
- A. 所有骨的内部
 - B. 幼儿长骨干内部
 - C. 成人长骨干内部
 - D. 幼儿长骨髓内部
23. 与计数肋骨无关的体表标志是:
- A. 胸骨柄
 - B. 胸骨角
 - C. 肩胛上角
 - D. 男性乳头
24. 下列凝血因子中, 最不稳定的是:

- A.因子V
B.因子VII
C.因子X
D.因子XII
25. 关于输血的原则, 错误的是:
- A.必须保证 ABO 血型相合
B.输同型血经交叉配血试验主、次测均不凝集为首选
C.紧急情况下 O 型血可少量缓慢接受其他型血液
D.AB 型的人可少量缓慢接受其他型血液
26. 通常所说的血型是指:
- A.红细胞上受体的类型
B.红细胞上特异凝集原的类型
C.红细胞膜上特异凝集素类型
D.血浆中特异凝集原的类型
27. 炎症间质细胞的变质性变化为:
- A.黏液变性和纤维素性坏死
B.凝固性坏死和液化性坏死
C.细胞水肿和凝固性坏死
D.脂肪变性和液化性坏死
28. 破伤风:
- A.败血症
B.毒血症
C.菌血症
D.脓毒血症
29. 大叶性肺炎的病变特征是:
- A.浆液性炎
B.纤维素性炎
C.化脓性炎
D.出血性炎
30. 一发热患者, 近 5 天来体温维持在 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$, 24 小时内体温波动相差不超过 1°C 。
查体: 腹部玫瑰疹, 肝脾肿大, 该患者最可能的诊断是:
- A.大叶肺炎
B.疟疾

- C.伤寒
D.流行性出血热
31. 男性, 63 岁, 吸烟史 32 年, 近半年咳嗽, 咳痰带血, 右胸痛, 消瘦。胸片见右肺癌。该患者可能先出现哪组淋巴结肿大:
A.颈深下群
B.左侧锁骨上群
C.腋窝组群
D.右侧锁骨上群
32. 关于 Horner' s 综合症, 错误的描述是患侧:
A.上眼睑下垂
B.眼裂变小
C.眼球塌陷
D.瞳孔放大
33. 下列原核微生物中, 没有细胞壁结构的是:
A.细菌
B.立克次体
C.衣原体
D.支原体
34. 脊髓灰质炎、甲型肝炎等病毒的病毒体结构组成是:
A.核酸和刺突
B.衣壳和包膜
C.基质蛋白和衣壳
D.核酸和衣壳
35. 在高干病房, 一些医护人员称呼病人总是用“赵书记”“任局长”等称呼, 而到了一般病房, 称呼就换成了“3 床”等, 话语十分冷淡, 深层次上说, 此类现象的本质解决措施是:
A.语言不文明, 应加强培训
B.公正意识差, 应加强教育
C.服务意识差, 应加强教育
D.尊重意识差, 应加强教育
36. 现在有些医院已采取了一些隔离措施, 使体格检查置于一个相对封闭的环境中, 以免受检病人曝光于众人面前。更确切的说, 这些措施反映了医院和医生的哪一种意识:
A.服务意识
B.管理意识
C.保护病人隐私意识
D.有利于病人的意识

37. 患者王某,男 28 岁,农民工,因病急诊需住院治疗,住院押金为 8000 元。王某只有 3000 元,在当地无亲戚和朋友,无法凑齐押金。此时院方最合乎道德的做法是:
- A.不收入院,只在急诊进行必要治疗
- B.先收入院,然后本着最优化原则,在 3000 元范围内拟定最佳治疗方案
- C.救死扶伤,不应掺入金钱成分,即免费为病人治疗
- D.根据病情需要和最优化原则拟定最佳治疗方案
38. 现行《中华人民共和国传染病防治法》修订时间为:
- A.2004 年 2 月 28 日 B.1989 年 2 月 21 日
- C.1989 年 9 月 1 日 D.2004 年 8 月 28 日
39. 根据《传染病防治法》的规定,以下哪项不属于医疗机构的职责:
- A.传染病病例报告
- B.传染病医疗救治
- C.无偿开展传染病防治和公共卫生教育的公益宣传
- D.防止医源性感染
40. 卫生行政部门工作人员依法执行职务时,应当不少于_____人。
- A.3 个 B.4 个
- C.2 个 D.1 个

第二部分 专业知识

一、单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案，共 20 题，每题 1 分，共 20 分。）

1. _____ 构成了护理程序的基本结构框架,并解释了护理程序的功能与过程:
- A.压力理论 B.需要理论
- C.一般系统理论 D.沟通理论
2. 为患者采血进行哪项检查时,需用抗凝管采血:

9. 患者李某, 胆囊炎, 需进行胆囊造影试验。胆囊造影第一次摄片后, 显影良好, 可进食下列哪种饮食:
- A. 水 500ml
B. 馒头 1 个
C. 油煎荷包蛋 2 个
D. 面条 1 碗
10. 对于吸痰操作的描述正确的是:
- A. 痰液粘稠时, 可加大负压进行吸引
B. 每次吸痰时间小于 10 秒
C. 两次吸痰间隔时间大于 1min 即可
D. 吸痰前后应给予高浓度吸氧
11. 消化性溃疡最常见的并发症是:
- A. 幽门梗阻
B. 急性穿孔
C. 上消化道大出血
D. 慢性穿孔
12. 男性, 38 岁, 肾移植术后第 1 天, 尿量在 800ml/h 以上, 其最可能的原因是:
- A. 急性肾小管坏死
B. 术前尿毒症致水钠潴留
C. 超急性排斥反应
D. 术前输液过量
13. 环孢素 A 的主要毒副作用是:
- A. 脱发
B. 血压升高
C. 高血钾
D. 肾毒性
14. 斜疝修补术后早期, 最适宜的卧位是:
- A. 平卧位
B. 仰卧位膝部垫枕
C. 俯卧位
D. 斜坡卧位
15. 患者, 男性, 42 岁。突感心慌、气短, 伴有濒死感, 被“120”送入急诊。心电图及其他检查均正常。该患者的症状为:
- A. 焦虑
B. 抑郁
C. 惊恐发作
D. 恐惧
16. 为休克病人补充血容量应首选:
- A. 全血
B. 血浆
C. 低分子右旋糖酐
D. 平衡盐溶液

17. 硬膜外麻醉最严重的并发症是：
- A.全脊椎麻醉
B.麻药毒反应
C.呼吸抑制
D.硬膜外血肿反应
18. 患者，女性，35岁。双上肢烧伤患处疼痛较为迟钝。体检：双上肢布满小水疱，疱皮较厚。估计烧伤深度和预后正确的是：
- A.I度烧伤，愈后无瘢痕
B.III度烧伤，愈合后有挛缩
C.浅II度烧伤，如无感染不留瘢痕
D.深II度烧伤，可产生瘢痕
19. 关于肝性脑病患者饮食护理的叙述，正确的是：
- A.每日总热量以脂肪为主
B.血氨偏高者限制蛋白质摄入
C.病情好转后主要选择动物蛋白
D.病情好转后可不限制蛋白的摄入
20. 糖尿病神经性病变最常见的是：
- A.周围神经病变
B.颅神经病变
C.植物神经病变
D.中枢神经病变

二、系列单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案，共 10 题，每题 1.5 分，共 15 分。）

(1~3 题共用题干)

患者女性，47岁。发现右侧乳房内无痛性肿块2个月。体检：右侧乳房外上象限可扪及一直径约为4cm的肿块，表面不光滑，边界不清，质地硬；局部乳房皮肤凹陷呈“酒窝征”；同侧腋窝可扪及2个肿大的淋巴结，可被推动。经活组织病理学检查证实为乳癌，拟行乳癌改良根治术。

1. 乳癌根治术后，预防皮下积液的主要措施是：
A. 半卧位
B. 皮瓣下置管引流
C. 患肢制动
D. 切口用沙袋压迫
2. 若该患者为乳癌根治术后第 2 天，下列护理措施中不正确的是：
A. 患侧垫枕，抬高患肢
B. 保持伤口引流管通畅

- C.观察患侧肢端的血液循环 D.指导肩关节的活动
3. 若该患者为乳癌根治术后第3天,右侧手臂出现皮肤发绀、手指发麻、皮温下降,脉搏不能扪及。正确的处理是:
- A.继续观察,不需特殊处理 B.及时调整包扎胸带的松紧度
- C.立即拆除患处包扎胸带 D.给予吸氧

(4~5 题共用题干)

患者,男性,67岁。因劳累性心绞痛发作持续1小时,含硝酸甘油无效。心电图提示II、III、aVF导联呈弓背抬高,V₁~V₃导联ST-T段压低,诊断为急性心肌梗死。

4. 发生心肌梗死的主要病理基础是:
- A.心肌需血量增加 B.冠状动脉供血不足
- C.冠状动脉严重狭窄 D.血氧供给不足
5. 本患者需要卧床休息,但患者不予配合,护士应解释卧床休息的目的是:
- A.可增加心肌收缩力 B.可降低心肌耗氧量
- C.可减少进食量 D.防止意外发生
6. 目前该患者最重要的护理问题是:

- A.疼痛 B.有受伤的危险
- C.气体交换受损 D.意识障碍

(7~8 题共用题干)

患者,男,44岁。发现肝硬化已5年,3天前与朋友聚餐时出现呕血,鲜红色,量约1000ml。患者出现头晕、心慌、出冷汗等,经输血、补液和应用止血药物治疗后病情好转,血压和心率恢复正常。一天前起出现睡眠障碍,并出现幻和言语不清。化验检查:血氨130g/dl,血糖5.6mmol/L,尿素氮7.2mmol/L。

7. 该患者消化道出血最可能的原因是:
- A.胃癌 B.胃溃疡
- C.十二指肠溃疡 D.食管静脉曲张破裂
8. 患者近一天出现的情况最可能的诊断是:

A.尿毒症

B.脑血管意外

C.肝性脑病

D.糖尿病酮症酸中毒

(9~10 题共用题干)

患者，男性，25 岁。当得知自己被确诊为甲状腺癌早期时，情绪失控，放声痛哭。护士关心地问：“有什么跟我说说好吗？我帮你开导开导。”但患者表示不愿与人交流，之后几天患者非常消沉，常独自落泪。

9. 护士看到患者伤心落泪，采取的沟通行为不恰当的是：

A.安慰患者，因得病而伤心是正常的情绪

B.坐在患者身边，轻轻递给他纸巾

C.制止患者哭泣，告诉他这只是早期，没什么大不了的

D.在他停止哭泣时，鼓励他说出悲伤的原因

10. 护士不能与患者进行深入交流，目前影响护患沟通的核心问题是患者的：

A.个性

B.家庭关系

C.情绪

D.对护士的信任程度

三、多项选择题（请根据题目要求，在五个选项中选出两个或两个以上恰当的答案，多选和未选均不得分。共 10 题，每题 1.5 分，共 15 分。）

1. 患者李某，男，65 岁，因再生障碍性贫血入院，根据医嘱需要进行输血，输血过程中出现头部胀痛，恶心呕吐，心前区压迫感，四肢麻木，休克等症状，护士对其进行紧急处理。以下正确的有：

A.立即停止输血，报告医生

B.双侧腰部封闭

C.酸化尿液

D.抗休克治疗

E.测量血压、尿量

2. 正确的取药方法是：

A.取固体药物时用药匙取

B.水剂药摇匀后用量杯取

C.液体药物药量不足 1ml 时用滴管吸取

D.油剂用温开水稀释后取

9. 导致气道峰值压增高的原因包括：

- A.分泌物过多
- B.管道堵塞
- C.气管导管气囊漏气
- D.气管插管进入一侧支气管
- E.气管插管斜面贴壁

10. 伤寒常见的肠道并发症有：

- A.坏死性肠炎
- B.肠穿孔
- C.肠套叠
- D.肠出血
- E.肠梗阻

四、系列多项选择题（请根据题目要求，在五个选项中选出两个或两个以上恰当的答案，多选和未选均不得分。共 10 题，每题 2 分，共 20 分。）

（1~3 题共用题干）

刘先生，56 岁，因脑血栓昏迷 2 天，病情稳定后给予鼻饲。

1. 下列有关鼻饲管留置期间的护理措施正确的是：

- A.每日做口腔护理
- B.每次喂食间隔时间不少于 2h
- C.灌流质前后注入少量温开水
- D.每日晚上拔出胃管，次晨换管插入
- E.每次鼻饲前应先用水温计测试温度，以 38℃~40℃为宜

2. 有关鼻饲护理操作正确的是：

- A.喂食前注入少量温开水判断胃管位置
- B.每次鼻饲量不超过 200ml
- C.灌注药物先将药片研碎，溶解
- D.每次喂食间隔不少于 2h
- E.每日做口腔护理

3. 肠内营养常见并发症有：

- A.高糖高渗性非酮性昏迷
- B.空气栓塞
- C.吸入性肺炎
- D.急性腹膜炎
- E.气胸

（4~7 题共用题干）

患者，男性，40岁，患慢性肾炎多年，近日因头痛头晕、视力障碍、恶心、呕吐来院就诊，体检：血压 210/120mmHg，心界向左下扩大，血红蛋白 65g/L，蛋白尿 (+++)，红细胞 5~10 个/HP，血 Gr560 μ mol/L，B 超显示双肾缩小，诊断慢性肾衰竭。

4. 患者贫血的可能原因有：

- A. EPO 生成减少
- B. 红细胞寿命缩短
- C. 水、电解质紊乱
- D. 造血原料不足
- E. 慢性失血

5. 患者正确的饮食的饮食指导包括：

- A. 多食花生、豆类及豆制品
- B. 富含维生素
- C. 蛋白以优质蛋白为主
- D. 减少钙的摄入
- E. 高热量、少量多餐

6. 针对该患者，以下哪些预防感染的措施是正确的：

- A. 关闭门窗，防止交叉感染
- B. 严格无菌操作
- C. 注意保持口腔、会阴部的卫生
- D. 避免去人多的公共场所
- E. 尽量多输注血液制品

7. 后期患者进行腹膜透析，针对导管出口和隧道感染正确的预防和处理方法有：

- A. 出口处局部使用抗生素软膏或清创处理，每天换药
- B. 继发性腹膜炎等局部或全身治疗用药 4 周后仍难以控制感染时考虑拔管
- C. 长期口服抗生素预防感染
- D. 严重时可静脉输注抗生素
- E. 腹透管置入 6 周内暂不沐浴，可改为擦身

(8~10 题共用题干)

患者，女性，31 岁，2 个月来出现午后低热、盗汗、乏力、消瘦、食欲缺乏，近 1 周高热、咳嗽、咳痰，痰中带血。结核分枝杆菌阳性。

8. 患者现遵医嘱进行化学治疗，应遵循：

- A. 联合
- B. 全程

- C.足量
D.规律
E.早期
9. 使用链霉素时，主要不良反应有：
A.听力损伤
B.肾损害
C.周围神经炎
D.眩晕
E.高尿酸血症
10. 患者出院时，健康宣教正确的有：
A.接种卡介苗
B.加强营养
C.同桌共餐时使用公筷，以防传染
D.避免情绪波动及呼吸道感染
E.与涂阳肺结核病人密切接触的家属必要时可服用化学药物进行预防