

军队文职人员统一招聘《医基+护理学》

全真模拟卷三

第一部分 基础综合

一、单选题（20 题，每题 0.5 分，共 10 分）

1. 肾蒂中位于最前方的是：
A.肾盂
B.肾静脉
C.肾动脉
D.肾乳头
2. 关于腹股沟管的描述正确的是：
A.位于腹股沟韧带的下方
B.深环是腹横肌向外的突口
C.经它下降入阴囊内的疝为腹股沟直疝
D.男性有精索通过
3. 防止血液逆流回左心室的结构是：
A.二尖瓣复合体
B.主动脉瓣
C.三尖瓣复合体
D.肺动脉瓣
4. 细胞内外正常的 Na^+ 和 K^+ 浓度差的形成和维持是由于：
A.膜在安静时对 K^+ 通透性大
B.膜在兴奋时 Na^+ 的通透性增大
C.膜上 ATP 的作用
D.膜上钠泵的作用
5. 可兴奋细胞受刺激后，首先出现：
A.峰电位
B.阈电位

- C.负后电位 D.局部电位
6. 组织兴奋后处于绝对不应期时，其兴奋性为：
- A.无限大 B.大于正常
C.等于正常 D.零
7. 患者，男，32岁。因肝损伤急症手术。曾患甲型肝炎已治愈。术中见肝右叶外侧有5cm裂口，深3cm。术后肝肾功能检查正常，食欲、体力恢复正常，肝脏损伤得以顺利修复。从内环境分析，主要起再生作用的是：
- A.不稳定细胞 B.肥大细胞
C.纤维细胞 D.稳定细胞
8. 组织和细胞损伤后，周围细胞增殖、修复的过程是：
- A.增生 B.再生
C.化生 D.肥大
9. 常发生机化的病灶，下列哪项除外：
- A.风湿性小体 B.心肌梗死
C.脑梗 D.肠上皮细胞化生
10. 慢性咳嗽伴大量脓痰，常见于：
- A.百日咳 B.胸膜炎
C.肺炎 D.肺脓肿
11. 咯血不见于：
- A.支气管内膜结核 B.支气管肺癌
C.支气管哮喘 D.慢性支气管炎
12. 关于呕血，下列哪项不正确：
- A.病因最多见于消化性溃疡 B.出血方式为呕出
C.血中混有食物残渣、胃液 D.酸碱反应为碱性
13. 下述哪种微生物属于真核细胞型微生物：
- A.蓝细菌 B.朊病毒

- C.类病毒
D.真菌
14. 使细菌具有侵袭力的结构成分是:
A.芽孢
B.肽聚糖 (黏肽)
C.荚膜
D.核糖体
15. 下列权利中,能够体现患者自主权的是:
A.基本的医疗权
B.因病获得休息权
C.知情同意权
D.因病免除社会责任
16. 当病人对诊治手段有质疑时,医生必须给予详细解释,在病人同意后才能实施诊治,这属于尊重患者的:
A.平等医疗权
B.疾病认知权
C.免除社会责任权
D.知情同意权
17. 医师的下列行为中,不符合道德要求的是:
A.尽量为患者选择安全有效的药物
B.尽可能开患者要求的好药、贵重药物
C.严格遵守各种抗生素的用药规则
D.对婴幼儿、老年患者谨慎用药,防止肾功能损害
18. 国家对病原微生物实行分类管理,将病原微生物分为_____类。
A.4
B.3
C.5
D.6
19. 医疗机构对其医疗废物暂时储存时间不得超过:
A.1 天
B.2 天
C.3 天
D.4 天
20. 下列传染病中不属于甲类传染病管理的是:
A.艾滋病
B.非典
C.鼠疫
D.肺炎疽

二、单选题（20 题，每题 1 分，共 20 分）

21. 下列描述中，符合胸椎特征的是：
 - A.椎体和横突有肋凹
 - B.横突上有横突孔
 - C.棘突水平，末端分叉
 - D.椎体最小
22. 有关节盘的关节是：
 - A.肘关节
 - B.髋关节
 - C.膝关节
 - D.肩关节
23. 有关脊柱生理弯曲的描述，正确的是：
 - A.胸曲前凸，腰曲后凸
 - B.颈曲前凸，胸曲后凸
 - C.颈曲前凸，胸曲前凸
 - D.骶曲前凸，腰曲前凸
24. 心动周期中，主动脉瓣开放，房室瓣关闭的时期是：
 - A.等容收缩期
 - B.心室射血期
 - C.心室充盈期
 - D.房缩期
25. 第一心音标志着：
 - A.心室收缩结束
 - B.心室舒张结束
 - C.心室舒张开始
 - D.心室收缩开始
26. 反映心脏健康程度最好指标是：
 - A.每分输出量
 - B.心指数
 - C.射血分数
 - D.心力储备
27. 金黄色葡萄球菌感染最常引起：
 - A.蜂窝织炎
 - B.脓肿
 - C.纤维素性炎
 - D.伪膜性炎
28. 患者，女，40 岁，体检时发现右肺上叶有直径 3cm 的结节。手术切除后，病理诊断为肺的炎性假瘤，不符合炎性假瘤的病变是：
 - A.纤维组织增生
 - B.肉芽肿形成

- C.小血管增生
D.单核、淋巴细胞浸润
29. 恶性肿瘤的最主要诊断依据是：
A.肿瘤边界不清
B.肿瘤切除后复发
C.肿瘤发生转移
D.肿瘤出血坏死
30. 属于湿性啰音的是：
A.哨笛音
B.鼾音
C.过清音
D.捻发音
31. 正常人胸部触诊检查语音震颤，下列哪一部位最弱：
A.左胸上部
B.肺底
C.乳房下部
D.肩胛间区
32. 肺部叩诊为过清音的是：
A.肺硬化
B.气胸
C.肺不张
D.肺气肿
33. 青霉素的抗菌机制是：
A.切断肽聚糖的聚糖支架
B.抑制四肽侧链与五肽交联桥的连接
C.干扰细菌 DNA 的复制
D.干扰细菌蛋白质的合成
34. 输血不是作为主要传播途径的病毒性疾病为：
A.乙型肝炎
B.丙型肝炎
C.丁型肝炎
D.戊型肝炎
35. 医疗资源的微观分配发生矛盾时，应优先把有限的卫生资源分配给：
A.病情严重的人
B.年龄大的患者
C.经济条件好的人
D.生命质量高、价值大的人

36. 医学上的死亡分期不包括:
- A.濒死期 B.脑死亡
- C.临床死亡期 D.生物学死亡期
37. 道德的评价标准是:
- A.美与丑 B.虚与实
- C.公与私 D.善与恶
38. 医师王某,在去年4月至今年2月的执业活动中,为了从个体推销商手中得到好处,多次使用未经批准的药品和消毒剂,累计获得回扣8205元,依据《执业医师法》的规定,情节严重的,应当依法给予该医师的行政处罚是:
- A.警告 B.没收违法所得
- C.罚款一万元 D.吊销执业证书
39. 下列哪项职责不属于县级疾病预防控制机构的职责:
- A.负责传染病预防控制规划、方案的落实
- B.组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害,普及传染病防治知识
- C.负责本地区疫情和突发公共卫生事件监测、报告、流行病学调查
- D.对病人、病原携带者,予以隔离治疗
40. 医疗机构对临床用血必须进行_____,不得将不符合国家规定标准的血液用于临床。
- A.核查 B.检验
- C.复查 D.检测

第二部分 专业知识

一、单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案，共20题，每题1分，共20分。）

1. 护理的对象是:

- A.所有的人
B.患病的人及弱势群体
C.患病的人
D.有残疾的人
2. 小儿被猫、狗咬伤后两天内须注射狂犬疫苗，注射部位是：
A.上臂三角肌
B.大腿前外侧
C.前臂内侧
D.臀部
3. 判断患者临床死亡期的主要指标是：
A.肌张力减退
B.瞳孔对光反射消失
C.桡动脉搏动不可触及
D.机体新陈代谢障碍
4. 新鲜血主要适用于：
A.休克患者
B.血液病患者
C.慢性消耗性疾病患者
D.低蛋白血症患者
5. 对铜绿假单胞菌感染病人用过的剪刀，其消毒灭菌的步骤是：
A.灭菌后清洁，再灭菌
B.清洁后压力蒸汽灭菌
C.彻底清洗后，用化学消毒剂浸泡消毒
D.直接采取燃烧法达到灭菌
6. 灌肠的注意事项中，正确的是：
A.伤寒患者灌肠液量不得超过 600ml
B.水钠潴留患者可用生理盐水灌肠
C.肝昏迷患者可用肥皂水灌肠
D.对顽固性失眠者可给保留灌肠进行催眠
7. 测尿中肌酐时应加的防腐剂是：
A.甲苯 5ml
B.稀盐酸 5ml
C.甲醛 5ml
D.碳酸 5ml
8. 化学消毒剂使用的方法不包括：
A.擦拭法
B.煮沸法

- C.浸泡法 D.熏蒸法
9. 患者男性, 66 岁, 因心房纤维颤动入院, 护士在测脉搏前推断患者的脉搏最可能为:
- A.间歇脉 B.二联律
C.水冲脉 D.绌脉
10. 患者男性, 32 岁, 持续高热 2 周, 体温 40°C 左右, 日差超过 1°C 。脉搏 108 次/分, 呼吸 26 次/分, 患者神志不清, 精神萎靡, 食欲差。此患者体温热型为:
- A.不规则热 B.间歇热
C.弛张热 D.稽留热
11. 患者, 男性, 55 岁。1 年内出现 3 次突然说话不流利, 每次持续 30 分钟左右, 第 3 次发作时伴右侧肢体麻木, 神经系统检查正常, 动脉硬化病史 2 年。最可能的诊断是:
- A.癫痫部分性发作 B.偏头痛
C.短暂性脑缺血发作 D.顶叶肿瘤
12. 孙某在近 7 天排便时常发现肛门无故滴血, 未在意, 5 天后排便时发现痔块从肛门脱出, 排便后可自行回纳, 入院医生诊断为内痔, 根据症状判断属于:
- A.I 度内痔 B.II 度内痔
C.III 度内痔 D.IV 度内痔
13. 患者男, 36 岁, 因车祸致肋骨骨折, 发生张力性气胸, 为患者抽气减压时, 首次抽气量不宜超过:
- A.500ml B.700ml
C.1000ml D.1200ml
14. 患者李先生, 55 岁, 修理工工人, 有颈椎病病史 20 年, 近期出现眩晕、复视、恶心呕吐, 昨日无明显诱因出现猝倒入院就诊, 主诉头痛、憋闷。该患者可能患有的颈椎病类型为:
- A.神经根型颈椎病 B.脊髓型颈椎病

- C.椎动脉型颈椎病 D.交感神经型颈椎病
15. 男, 20 岁, 鼻部疖有挤压后出现寒战, 发热, 头痛, 昏迷应首先考虑:
- A.颅内海绵状静脉窦炎 B.蜂窝织炎
- C.菌血症 D.脓毒症
16. 王先生, 因外伤需注射破伤风抗毒素, 皮试结果局部皮丘红肿, 硬结 17cm, 痒感, 其正确处理方法是:
- A.禁用破伤风抗毒素 B.将全量分三次肌肉注射
- C.将全量平均分成四次注射 D.将全量分四次注射, 剂量递增
17. 患者女性, 50 岁, 因咳嗽, 咳痰, 尿少, 导致呼吸困难加重, 既往有风湿性心脏病二尖瓣狭窄, 心力衰竭。医生考虑患者有急性左心衰, 其咳嗽, 咳痰的性质是:
- A.白色浆液样痰
- B.偶尔咳嗽, 咳粉红色泡沫样痰
- C.频繁咳嗽, 咳大量粉红色泡沫样痰
- D.偶尔咳嗽, 咳白色泡沫样痰, 痰中带血丝
18. 患者, 男, 62 岁, 好抽烟, 肥胖, 喜食油腻性食物, 运动不足, 脾气暴躁, 来医院检查, 收缩压为 165mmHg, 舒张压为 80mmHg, 该患者最有可能的诊断是:
- A.动脉硬化 B.休克
- C.心动过速 D.心包积液
19. 吴女士, 20 岁, 反复上腹疼痛, 夜间明显, 伴反酸 2 个月, 2 日来大便呈黑色, 体检: 血压 140/80mmHg, 腹软, 右上腹压痛, 无反跳痛, 肝脾未及, 最可能的病因诊断是:
- A.十二指肠溃疡 B.胆囊炎
- C.肝硬化 D.胰腺炎
20. 男, 76 岁, 因肾源性水肿入院治疗, 责任护士在入院做健康宣教时对其饮食护理的解释中, 不妥当的一项是:
- A.限制钠的摄入, 每天以 5~6g 为宜

- B.液体的入量视水肿的程度和尿量而定
- C.不宜给予高蛋白饮食
- D.注意补给各种维生素

二、系列单项选择题（请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案，共10题，每题1.5分，共15分。）

（1~3题共用题干）

患者，男，30岁。体重60kg，不慎被开水烫伤，自觉剧痛，头面部、颈部及双上肢均为水泡。

1. 此病人的烧伤程度为：

- A.中度烧伤
- B.轻度烧伤
- C.重度烧伤
- D.特重度烧伤
- E.轻中度烧伤

2. 伤后3小时，患者主诉口渴。体检：脉搏100次/分，血压80/60mmHg，尿量15ml/h。病人血容量减少的原因中，以下哪项错误：

- A.血浆自创面渗出
- B.血浆渗出到组织间隙
- C.心排出量减少
- D.末梢血管扩张
- E.输液量不足

3. 若对该病人实施补液治疗，伤后第一个8小时输入的电解质溶液量为：

- A.810ml
- B.910ml
- C.1620ml
- D.1215ml
- E.8100ml

（4~6题共用题干）

患者，男性，32岁，车祸造成左胫骨骨折，手法复位行石膏固定术。

4. 护士向患者介绍其功能锻炼开始的时间应为：

- A.石膏固定当日
- B.石膏固定后3天

- C.石膏固定后 3 周
D.石膏固定后 5 周
5. 护士对患者进行的骨折后功能锻炼康复指导，内容应除外：
A.锻炼应贯穿骨折愈合的全过程
B.受伤肢体制动
C.包括固定范围内肌肉的原位收缩
D.患肢肌肉舒缩运动为主
6. 护士采取的反映患肢血运情况的主要指标是：
A.定时测量血压
B.观察神志变化
C.有无疼痛
D.观察患肢肢体远端皮肤色泽、温度
- (7~8 题共用题干)

患者，女性，72 岁。因间歇、无痛性肉眼血尿前来就诊，经进一步检查诊断为膀胱癌入院。

7. 确诊膀胱癌最可靠的检查方法是：
A.B 超
B.膀胱镜和活组织检查
C.CT
D.尿脱落细胞学检查
8. 此患者入院后行保留膀胱的手术治疗，术后留置导尿管，下列关于导尿管的护理措施错误的是：
A.保持尿管通畅，防止尿管受压或扭曲
B.每日更换导尿管
C.尿袋位置不可过高，防止返流
D.定期膀胱灌注
- (9~10 题共用题干)

患者，男，45 岁。食欲不振，尿色深两周。查体：皮肤、巩膜均黄染，肝大，肋下 2cm，轻度触痛，脾肋下未触及；实验室检查：总胆红素 $120 \mu\text{mol/L}$ ，直接胆红素 $60 \mu\text{mol/L}$ ，ALT200U/L，ALP100U/L，GGT100U/L，尿胆红素及尿胆原均呈阳性，彩超检查未见胆囊肿大及胆总管扩大。

9. 考虑其黄疸属于：
A.肝细胞性黄疸
B.溶血性黄疸
C.多吃胡萝卜引起
D.胰头癌肝外胆管受压所致
10. 该患者可能出现异常的检查是：

A.AFP

B.凝血酶原时间

C.网织红细胞计数

D.游离血红蛋白

三、多项选择题（请根据题目要求，在五个选项中选出两个或两个以上恰当的答案，多选和未选均不得分。共 10 题，每题 1.5 分，共 15 分。）

1. 氧疗的作用有：

A.纠正缺氧状态

B.维持机体生命活动

C.提高动脉血氧分压和血氧饱和度

D.促进组织的新陈代谢

E.置换出肺中的氮气，提高含氧量

2. 输液中患者突发呼吸困难、气促，咳粉红色泡沫痰时应：

A.停止输液

B.给与 20%~30%乙醇溶液湿化吸氧

C.采取右侧卧位

D.遵医嘱给与血管扩张药、强心药

E.给予低流量吸氧

3. 为男患者导尿时正确的是：

A.提起阴茎与腹壁成 60° 使耻骨前弯消失

B.提起阴茎与腹壁成 60° 使耻骨下弯消失

C.用消毒棉球消毒尿道口、龟头和冠状沟

D.插入导尿管 20~22 厘米、见尿后再插入 2 厘米

E.插管遇到阻力时，可用力以便插入

4. 证实胃管插入胃内可采取以下几种方法：

A.连接注射器抽吸出胃液

B.听诊腹部有肠鸣声

C.听诊胃区同时向胃内快速注入空气，听到气过水声

D.将胃管末端置于液面下，无气泡溢出

E.将胃管末端置于液面下，有气泡溢出

5. 护理意识不清并有谵妄的患者时，下列_____是正确的。

- A.用保护具以防摔伤
- B.输液时需用夹板固定
- C.牙关紧闭者用压舌板裹纱布放于上下门齿之间
- D.抽搐者将室内光线调暗
- E.使用保护具可不用告知家属
6. 流行性乙型脑炎患者惊厥和抽搐的原因是：
- A.脑实质炎症
- B.脑疝
- C.脑水肿
- D.高热
- E.颅内压增高
7. 脑膜刺激征包括：
- A.颈项强直
- B.巴宾斯基征
- C.膝腱反射
- D.布鲁津斯基
- E.科尼格征
8. 单独使用也会导致低血糖反应的药物是：
- A.格列吡嗪
- B.优降糖
- C.胰岛素
- D.二甲双胍
- E.阿卡波糖
9. 颅内压增高病人，应禁忌：
- A.剧烈咳嗽
- B.用力排便
- C.腰椎穿刺
- D.高压灌肠
- E.卧床休息
10. 静脉输液时，输入溶液的种类和量应根据患者体内的具体状况来确定通常遵循_____的原则。
- A.先胶后晶
- B.先盐后糖
- C.宁酸勿碱
- D.宁多勿少
- E.见尿补钾

四、系列多项选择题（请根据题目要求，在五个选项中选出两个或两个以上恰当的答案，多选和未选均不得分。共 10 题，每题 2 分，共 20 分。）

（1~4 题共用题干）

患者，女性，66 岁，高血压史 30 年，家中入厕时突感头晕、头痛，当时意识不清，左侧肢体无力再次跌倒，随后出现大小便失禁，意识丧失，护理体检发现：昏迷，血压 190/110mmHg，瘫痪肢体肌张力降低，腱反射消失。

1. 护士记录患者资料时，属于客观资料的有：

- A. 头晕
- B. 头痛
- C. 血压 190/110mmHg
- D. 三偏征
- E. 腱反射消失

2. 为患者做口腔护理的注意事项有：

- A. 侧卧位，头转向一侧
- B. 止血钳夹紧棉球
- C. 帮助患者漱口
- D. 如有义齿，取下，用牙刷刷洗
- E. 使用开口器协助张口

3. 为预防患者发生压疮，护士应实施的护理措施为：

- A. 每 2 小时翻身一次
- B. 定期用肥皂水或含乙醇的用品清洁皮肤
- C. 局部使用热水袋，促进血液循环
- D. 卧气垫床或按摩床
- E. 受压局部用气圈保护

4. 护士观察皮肤时，提示出现压疮 I 期表现的有：

- A. 皮肤表面完整，局部出现疼痛、硬块
- B. 损伤仅限于表皮，骨隆突部位呈现压制不褪色的红斑
- C. 皮肤表皮形成完整的血性水泡
- D. 皮肤真皮层有黄色渗液

E.部分皮肤真皮层缺损，形成表浅的开放性溃疡

(5~6 题共用题干)

患者，女性，61 岁，持续发热已 4 天，每日口腔温度波动范围在 $38.5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ，并伴有脉搏、呼吸加快，食欲减退等症状。

5. 当给患者进行温水擦浴时，不需禁忌的部位有：

A.面部、腹部、足部

B.胸前区、腹部、足底

C.面部、背部、腋窝

D.腘窝、腋窝、腹股沟

E.肘窝、手心、腹股沟

6. 某日，患者大量出汗、血压下降、脉搏细速，针对患者问题，下列护理措施正确的是：

A.给予高热量、高蛋白、高维生素、高脂饮食

B.鼓励多饮水

C.随时擦干汗液，更换衣服和床单

D.注意保暖

E.心理护理，尽量满足患者的需要

(7~10 题共用题干)

患者，男性，65 岁，胃溃疡病史 20 年，常于餐后出现中上腹疼痛，服氢氧化铝可缓解。近一年疼痛不似从前有规律，且服氢氧化铝也难缓解，伴消瘦，来诊。

7. 患者需进行大便潜血试验，正确的有：

A.实验期间应多进食绿色蔬菜

B.主食可选择米饭、面条

C.避免进食肉类、动物肝脏等

D.试验阳性，提示出血量在 50ml 以上

E.次实验可协助诊断有无消化道出血

8. 患者目前存在的护理诊断有：

A.营养失调：低于机体需要量

B.疼痛

- C.体温过高
 - D.清理呼吸道无效
 - E.潜在并发症：呼吸衰竭
9. 患者行胃大部分切除术后，出血的原因可能为：
- A.吻合口黏膜坏死脱落
 - B.胃排空障碍
 - C.术中止血不确切
 - D.术后梗阻
 - E.吻合口缝线处感染
10. 术后2周出现倾倒综合征，有关护理正确的有：
- A.少量多餐
 - B.高热量饮食
 - C.限制饮水喝汤
 - D.高蛋白饮食
 - E.进餐后平卧20分钟