


全球看武汉 | 疫情之下企业如何开工：来自德国法兰克福的预案

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

“

此预案适用于与大众人群面临相同程度的感染流感风险的企业及业务活动。因此，预案的目的不在于为企业提供劳动保护方面的建议措施，而是提供组织、预防与卫生防护方面的建议措施，以避免流感在企业职员中的快速传播。


大流行性流感疫情区别于每年的流感季。大流行性流感由流感病毒引发，其特点在于传播速度更快、传染性更强，而且通常缺少能够抵抗此类病毒的疫苗。




德国每年流感季感染人数约为总人口的5%。当出现大流行性流感疫情时，该比例可能会增至25%或以上。



大流行性流感疫情可周期性出现，每次约持续八周。鉴于此，企业应考虑到：大流行性流感疫情爆发期间，会出现职员大面积患病情况。每个病例需要约1周时间。



病毒通过患病者呼吸、说话，尤其是咳嗽或打喷嚏时产生的飞沫（近距离范围：约1.5米）进行传播。在硬质表面，飞沫的传染性可长达48小时或更长时间。



感染者的手部往往会因打喷嚏或咳嗽存有病毒。感染者会在自身出现38度以上的发热症状以及头部、关节部位或喉咙等疼痛症状前一天传染其他人。

”

企业可做好以下准备工作：

- 请即刻考虑疫情期间企业的运营工作，与管理层共同制定应对预案；
- 请让企业职员了解疫情预案中的措施。

为遏制疫情期间病毒在职员间的传播，企业可采取下列措施：

- 有发热症状的职员应避免带病上班。
- 职员在咳嗽或打喷嚏时，应使用一次性纸巾遮挡口鼻。使用过的纸巾应立即扔进垃圾桶。
- 职员应避免不必要的差旅或聚集性活动，优先选择以私家车或小规模拼车的方式前往工作地点，尽量避免乘坐公共交通。
- 职员在乘坐公共交通、与人交谈、与客户直接接触或采购时，应佩戴厚度至少为三层的、带有鼻托垫的口罩，或过滤等级为FFP1的防护口罩。佩戴面罩时应注意尽可能戴紧口罩。口罩使用后应至少每天更换。同上述提到的纸巾一样，使用过的口罩应扔到垃圾桶。疫情期间，可能出现防护口罩供应紧张的情况，企业可考虑置备口罩。
- 职员应勤用肥皂洗手，防止病毒从双手传播到脸上，尤其是防止传播到口中或眼中，或传播给其他人。洗手后可再用酒精消毒液对双手进行消毒。
- 企业应加强对办公环境的清洁工作，使用清洁剂定期清洁写字台、门把手、键盘等硬质表面。
- 办公场所应保持良好通风。
- 疫情期间，企业食堂应关闭。作为替代性措施，可考虑允许职员带餐食至办公场所。
- 企业可安排从事特定工作的职员（特别是开放式办公室中的职员）在家办公。
- 通常不建议企业储备抗流感病毒的特殊药物。此类药物需医生开具处方，以保证个性化的诊疗方案。
- 企业可通过向职员提供相关信息来支持与促进公共疫苗接种工作，如：在企业内提供疫苗接种服务。

icon/
image
of mask

减少企业内社交活动的措施

- 考虑是否引入弹性工作时间，并支持职员私家车出行
- 考虑是否实施在家办公；考虑企业各项服务可在多大程度上分散式开展。
- 组织分散式就餐。
- 为商务会面及差旅提供充足的替代方案，如：电话及视频会议、使用新媒体。
- 取消所有非必要会议。
- 立即检测现有的通讯及信息技术，以在疫情期能及时向职员和客户传达信息。
- 加强对电梯的清洁与消毒工作。鉴于电梯空间有限，在疫情期间仅供有需要者使用。
- 增设透明隔离墙，在接待客户等情况下可以使用。

疫情期工作场所的医疗物资

- ☒ 确保提供及时的医疗咨询和照护。
- ☒ 提供充足的洗手液和消毒剂。
- ☒ 提供充足的乙烯基手套、防护面罩（最好是带有呼气阀的FFP2口罩）。
- ☒ 确保合理处理传染性物质（检测、拓宽处理程序）
- ☒ 检查企业医务室，明确是否有相关药物、哪里有相关药物、哪位医师可开处方（如：退烧药、抗生素、抗病毒药）。
- ☒ 明确企业医务室在出现疫情时能为职员提供的医疗服务。
- ☒ 与企业医务室协商制定疫情期的医疗流程。
- ☒ 组织培训，指导职员正确使用医疗设备（如：个人防护设备PSA），企业提供日常使用PSA设备的说明。