Section 5.6 Data & descriptive statistics

数据与描述统计

[AIME-2001-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

A finite set of distinct real numbers has mean M. Adjoining 1 lowers the mean by 13, while adjoining 2001 raises it by 27. Find M.

一个有限且元素互异的实数集合均值为 M。加入 1 后均值降低 13，加入 2001 后提高 27。求 M。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 5.6 Data & descriptive statistics

数据与描述统计

[AIME-2021-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

What is the mean of all three-digit decimal palindromes?

所有三位十进制回文数的算术平均数是多少?

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 5.6 Data & descriptive statistics

数据与描述统计

[AIME-2024-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

A finite list of positive integers sums to 30, has unique mode 9, and has an integer median absent from the list. Find the sum of its squared entries.

一列正整数的和为 30，唯一众数为 9，中位数为不在该列中的整数。求所有项的平方和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 5.6 Data & descriptive statistics

数据与描述统计

[AIME-2017-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

Arrange digits1 through9 bijectively in a 3×3 array. Take the median in each row and then the median of those three medians. If Q arrays give final median5, find $Q \bmod 1000$.

将数字1至9各用一次填入 3×3 数组，先取每行中位数，再取三个中位数的中位数。若最终为5的数组有 Q 个，求 Q 模1000的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程