

Projet de Sciences des Données
Exploitation d'images satellites haute-résolution
pour la prévision d'indicateurs socio-économiques

YOUSSEF - KACER

22 Septembre 2016

Table des matières

Introduction	i
1 Calcul de l'indice de végétation par différence normalisée (NDVI)	1
2 Evolution du NDVI au cours d'une année	7
2.1 Pour une commune urbaine (Paris)	7
2.2 Pour une commune plainière (Fontainebleau)	9
2.3 Pour une commune montagneuse (Annecy)	11
2.4 Pour une commune littorale (Montpellier)	13
3 Evolution du NDVI en fonction de la densité de population	15

Introduction

Dans ce document, nous présentons le calcul d'indice végétale par différence normalisée (*NDVI*) lié à une zone géographique. Il est censé renseigner sur la présence de végétaux : on pense pouvoir utiliser par la suite un tel indicateur afin de prédire et quantifier la densité de population.

Chapitre 1

Calcul de l'indice de végétation par différence normalisée (NDVI)

Cet indice est calculé à partir des canaux rouge (R) et proche-infrarouge (PIR) via la formule :

$$NDVI = \frac{PIR - R}{PIR + R}$$

Typiquement, l'eau, la neige et les nuages refléchissent plus dans le rouge que le proche-infrarouge, soit un $NDVI$ négatif

Les sols nus réfléchissent tout autant dans les deux bandes d'où un $NDVI$ nul

En revanche, les sols revêtus de végétaux réfléchissent bien plus dans le proche infra-rouge, ce qui donne un $NDVI$ positif, et d'autant plus positif que la végétation est dense.

Afin de calculer un tel indice sur les images *Landsat-8*, nous utilisons les bandes géoréférencées 4 et 5 qui jouent respectivement les rôles du rouge ($0.85\text{-}0.88nm$) et du proche-infrarouge ($0.64\text{-}0.67nm$). La librairie *gdal* sur *python* nous permet d'effectuer l'opération de différence normalisée sur des rasters pour produire une image de $NDVI$ géoréférencée (*GeoTIFF*).

La figure 1.1 montre un $NDVI$ négatif au sud de la commune de Chamonix, ce qui correspond aux glaciers du *Mont-Blanc*

2CHAPITRE 1. CALCUL DE L'INDICE DE VÉGÉTATION PAR DIFFÉRENCE NORMALISÉE (NDVI)




FIGURE 1.1 – Image couleur, image $NDVI$ et histogramme de $NDVI$ pour la commune de *Chamonix-Mont-Blanc* sur un périmètre de 116km^2 au mois d'*Aout*

La figure 1.2 montre un *NDVI* supérieur à 0.5 autour de la ville de Manaus au Brésil, ce qui correspond à la végétation dense de la forêt amazonienne. Le fleuve du *Rio Negro* apparaît lui en négatif




FIGURE 1.2 – Image couleur, image $NDVI$ et histogramme de $NDVI$ pour la ville de *Manaus* (*Bresil*) sur un périmètre de 11000km^2 au mois de *Juillet*

La figure 1.3 montre un *NDVI* quasi nulle donc sans végétation, comme on peut s'y attendre dans une commune urbaine telle que Paris en période hivernale




FIGURE 1.3 – Image couleur, image $NDVI$ et histogramme de $NDVI$ pour la ville de *Paris* sur un périmètre de 105km^2 au mois de *Décembre*

Chapitre 2

Evolution du NDVI au cours d'une année

Comme vu au chapitre précédent, la distribution du *NDVI* dépend beaucoup du relief paysager (végétaux, montagnes, eau). Ainsi, on peut légitimement se demander comment évolue cet indice en fonction des saisons.

Pour cela, nous allons étudier quatre types de communes selon leur paysage : urbain, plainier, montagneux, littoral.

2.1 Pour une commune urbaine (Paris)

La figure 2.1 montre l'évolution du *NDVI* sur 10 mois pour la ville de *Paris*. On note un étalement de la distribution dans les mois chauds dû à la vigueur des espaces verts à cette époque de l'année. Cependant, même s'il s'éloigne de 0, le mode principal demeure toujours à basse fréquence.




FIGURE 2.1 – De la gauche vers la droite sur la première ligne, évolution du *NDVI* entre *Mars* et *Juillet* pour la ville de *Paris* sur un périmètre de 105km². De la gauche vers la droite sur la seconde ligne, évolution du *NDVI* entre *Aout* et *Décembre* pour la ville de *Paris* sur un périmètre de 105km². En bas, superposition des histogrammes de *NDVI* pour les mois de *Mars* à *Décembre* et image couleur

2.2 Pour une commune plainière (Fontainebleau)

Pour une commune plaine comme *Fontainebleau* 2.3, l'étalement de la distribution est beaucoup plus franc et déplace même le mode principale vers les hautes fréquences (0.5).




FIGURE 2.2 – De la gauche vers la droite sur la première ligne, évolution du *NDVI* entre *Mars* et *Juillet* pour la ville de *Fontainebleau* sur un périmètre de 172km^2 . De la gauche vers la droite sur la seconde ligne, évolution du *NDVI* entre *Aout* et *Décembre* pour la ville de *Fontainebleau* sur un périmètre de 172km^2 . En bas, supersposition des histogrammes de *NDVI* pour les mois de *Mars* à *Décembre* et image couleur

2.3 Pour une commune montagneuse (Annecy)

Pour une commune montagneuse comme Annecy, le déplacement du mode principal en saison chaude se situe à une fréquence intermédiaire (0.2).




FIGURE 2.3 – De la gauche vers la droite sur la première ligne, évolution du *NDVI* entre *Mars* et *Juillet* pour la ville de *Annecy* sur un périmètre de 13.65km^2 . De la gauche vers la droite sur la seconde ligne, évolution du *NDVI* entre *Aout* et *Décembre* pour la ville de *Annecy* sur un périmètre de 13.65km^2 . En bas, superposition des histogrammes de *NDVI* pour les mois de *Mars* à *Décembre*

2.4 Pour une commune littorale (Montpellier)

Ainsi, nous avons...

Chapitre 3

Evolution du NDVI en fonction de la densité de population

L'INSEE définit quatre types de communes en fonction de la densité de population. Nous reprenons ci-après la nomenclature telle que définie sur le site de l'organisme public :

La nouvelle typologie de l'Insee s'inspire de la classification européenne urbain-rural conçue à partir des données carroyées de population. Elle permet de définir 3 types d'espace :

- *les communes densément peuplées* : dont la densité de population au carreau est d'au moins 1 500 habitants par km² et qui comptabilisent un minimum de 50 000 habitants ;
- *les communes de densité intermédiaire* : les carreaux contigus ayant une densité de population d'au moins 300 habitants par km² et un minimum de 5 000 habitants ;
- *Les communes peu denses* : les carreaux contigus ayant une densité de population de moins de 300 habitants par km² et moins de 5 000 habitants. Avec cette typologie, 90 % des communes françaises sont « rurales ». L'Insee rajoute alors un 4e degré en partant de la « maille rurale » (peu dense) :
- *les communes très peu denses* : carreaux de densité de population d'au moins 25 habitants par km² et moins de 300 habitants

Liste des tableaux

Table des figures

1.1	Image couleur, image <i>NDVI</i> et histogramme de <i>NDVI</i> pour la commune de <i>Chamonix-Mont – Blanc</i> sur un périmètre de 116km ² au mois d' <i>Aout</i>	2
1.2	Image couleur, image <i>NDVI</i> et histogramme de <i>NDVI</i> pour la ville de <i>Manaus (Bresil)</i> sur un périmètre de 11000km ² au mois de <i>Juillet</i>	4
1.3	Image couleur, image <i>NDVI</i> et histogramme de <i>NDVI</i> pour la ville de <i>Paris</i> sur un périmètre de 105km ² au mois de <i>Décembre</i>	6
2.1	De la gauche vers la droite sur la première ligne, évolution du <i>NDVI</i> entre <i>Mars</i> et <i>Juillet</i> pour la ville de <i>Paris</i> sur un périmètre de 105km ² . De la gauche vers la droite sur la seconde ligne, évolution du <i>NDVI</i> entre <i>Aout</i> et <i>Décembre</i> pour la ville de <i>Paris</i> sur un périmètre de 105km ² . En bas, supersposition des histogrammes de <i>NDVI</i> pour les mois de <i>Mars</i> à <i>Décembre</i> et image couleur	8
2.2	De la gauche vers la droite sur la première ligne, évolution du <i>NDVI</i> entre <i>Mars</i> et <i>Juillet</i> pour la ville de <i>Fontainebleau</i> sur un périmètre de 172km ² . De la gauche vers la droite sur la seconde ligne, évolution du <i>NDVI</i> entre <i>Aout</i> et <i>Décembre</i> pour la ville de <i>Fontainebleau</i> sur un périmètre de 172km ² . En bas, supersposition des histogrammes de <i>NDVI</i> pour les mois de <i>Mars</i> à <i>Décembre</i> et image couleur	10
2.3	De la gauche vers la droite sur la première ligne, évolution du <i>NDVI</i> entre <i>Mars</i> et <i>Juillet</i> pour la ville de <i>Annecy</i> sur un périmètre de 13.65km ² . De la gauche vers la droite sur la seconde ligne, évolution du <i>NDVI</i> entre <i>Aout</i> et <i>Décembre</i> pour la ville de <i>Annecy</i> sur un périmètre de 13.65km ² . En bas, supersposition des histogrammes de <i>NDVI</i> pour les mois de <i>Mars</i> à <i>Décembre</i>	12

Bibliographie