

Algorytmy i struktury danych

Lista zadań 4

Zadanie 1

Skorzystaj z metody rekurencji uniwersalnej i podaj dokładne asymptotyczne oszacowania dla następujących rekurencji:

- (a) $n^{1/2} = \Theta(n^{\log_4 2}) \implies T(n) = 2T(n/4) + \sqrt{n} = \Theta(n^{1/2} \log n)$
- (b) $n = \Omega(n^{\log_4 3 + \epsilon})$ dla $\epsilon < 0.2 \implies T(n) = 3T(n/4) + n = \Theta(n)$
- (c) $n^{3/2} = \Theta(n^{\log_4 8}) \implies T(n) = 8T(n/4) + n\sqrt{n} = \Theta(n^{3/2} \log n)$
- (d)

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T\left(n^{\frac{1}{2}}\right) + 1 \\ m &= \log n, U(m) = T(e^m) = T(e^{\log n}) = T(n) \\ U(m) &= 2T\left(e^{\log n^{\frac{1}{2}}}\right) + 1 = 2T\left(e^{\frac{1}{2} \log n}\right) + 1 = 2T\left(e^{\frac{m}{2}}\right) + 1 = 2U\left(\frac{m}{2}\right) + 1 \\ 1 &= O\left(m^{\log_2 2 - \epsilon}\right) \text{ dla } \epsilon \leq 1 \implies U(m) = \Theta(m) \\ T(n) &= U(m) = U(\log n) = \Theta(m) = \Theta(\log n) \end{aligned}$$

Zadanie 2

Czas działania algorytmu A opisany jest przez rekurencję $T(n) = 7T(n/2) + n^2$. Algorytm konkurencyjny A' ma czas działania $T'(n) = aT'(n/4) + n^2$. Jaka jest największa liczba całkowita a , przy której A' jest asymptotycznie szybszy niż A ?

$$\begin{aligned} n^2 &= O\left(n^{\log_2 7 - \epsilon}\right) \text{ dla } \epsilon \leq 0.80 \implies T(n) = 7T(n/2) + n^2 = \Theta\left(n^{\log_2 7}\right) \\ n^2 &= O\left(n^{\log_4 a - \epsilon}\right) \implies T'(n) = aT'(n/4) + n^2 = \Theta\left(n^{\log_4 a}\right) \\ n^{\log_4 a} &< n^{\log_2 7} \\ n^{\frac{1}{2} \log_2 a} &< n^{\log_2 7} \end{aligned}$$

$$T'(n) = \begin{cases} \Theta(n^2) & \text{dla } a \in [1, 15] \\ \Theta(n^2 \log n) & \text{dla } a = 16 \\ \Theta(n^{\log_4 a}) & \text{dla } a \in [17, \infty) \\ \Theta(n^{\log_4 49}) = \Theta(n^{\log_2 7}) & \text{dla } a = 49 \end{cases}$$

Zadanie 3

Rozważmy warunek regularności $af(n/b) \leq cf(n)$ dla pewnej stałej $c \leq 1$, który jest częścią przypadku 3 twierdzenia o rekurencji uniwersalnej. Podaj przykład prostej funkcji $f(n)$, które spełnia wszystkie warunki twierdzenia o rekurencji uniwersalnej z wyjątkiem warunku regularności.

$$af(n/b) \leq cf(n), a \geq 1, b > 1, c \leq 1$$

$$T(n) = T(n/2) + \sin n$$

$$\sin\left(\frac{n}{2}\right) \leq \sin n$$

$$\text{dla } n = \frac{7\pi}{2}, \sin\left(\frac{7\pi}{4}\right) \leq \sin \frac{7\pi}{2} \implies \leq -1$$

Zadanie 4

Zasymuluj działanie polifazowego mergesorta dla tablicy:


{9, 22, 6, 19, 21, 14, 10, 17, 3, 5, 60, 30, 29, 1, 8, 7, 6, 15, 12}.

W sortowaniu polifazowym na każdym etapie sortowania scala się sąsiadujące podciągi rosnące, to znaczy: w pierwszym przebiegu {9, 22} z {6, 19, 21}, {14} z {10, 17} itd..


{9, 22|6, 19, 21|14|10, 17|3, 5, 60|30|29|1, 8|7|6, 15|12}
 {6, 9, 19, 21, 22|10, 14, 17|3, 5, 30, 60|1, 8, 29|6, 7, 15|12}
 {6, 9, 10, 14, 17, 19, 21, 22|1, 3, 5, 8, 29, 30, 60|6, 7, 12, 15}
 {1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 17, 19, 21, 22, 29, 30, 60|6, 7, 12, 15}
 {1, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 29, 30, 60}

Zadanie 5

(a) Czy tablica posortowana malejąco jest kopcem?




(b) Czy ciąg {23, 17, 14, 6, 13, 10, 1, 5, 7, 12} jest kopcem?



Zadanie 6


Zilustruj działanie procedury buildheap dla ciągu $\{5, 3, 17, 10, 84, 19, 6, 22, 9, 14, 3\}$. Narysuj na kartce wygląd tablicy i kopca po każdym wywołaniu procedury przesiej.

$\{5, 3, 17, 10, 84, 19, 6, 22, 9, 14, 3\}$




$\{5, 3, 17, 22, 84, 19, 6, 10, 9, 14, 3\}$

$\{5, 3, 17, 22, 84, 19, 6, 10, 9, 14, 3\}$



$\{5, 3, 19, 22, 84, 17, 6, 10, 9, 14, 3\}$



$\{5, 3, 19, 22, 84, 17, 6, 10, 9, 14, 3\}$



$\{5, 84, 19, 22, 3, 17, 6, 10, 9, 14, 3\}$

$\{5, 84, 19, 22, 14, 17, 6, 10, 9, 3, 3\}$

$\{5, 84, 19, 22, 14, 17, 6, 10, 9, 3, 3\}$



$\{84, 5, 19, 22, 14, 17, 6, 10, 9, 3, 3\}$

$\{84, 22, 19, 5, 14, 17, 6, 10, 9, 3, 3\}$

$\{84, 22, 19, 10, 14, 17, 6, 5, 9, 3, 3\}$

$\{84, 22, 19, 10, 14, 17, 6, 5, 9, 3, 3\}$

