

Jon Allen
October 23, 2013

4.3

only need the "form" of the particular solution for 14,20,24. Need the particular solution for 30. Don't forget we need the homogeneous solution too for form of solution.

#14

$$y'' - 4y' + 3y = -e^{-9t}$$

solution

$$\begin{array}{lll} r^2 - 4r + 3 = 0 = (r - 3)(r - 1) & r = 1, 3 & y_h = c_1 e^t + c_2 e^{3t} \\ f(t) = -e^{-9t} & S_p = \{e^{-9t}\} & y_p = A e^{-9t} \end{array}$$

#20

$$y'' + 4y = 4 \cos t - \sin t$$

solution

$$\begin{array}{lll} r^2 + 4 = 0 & r = \frac{-0 \pm \sqrt{0^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4}}{2 \cdot 1} = \frac{\pm 4i}{2} = \pm 2i & y_h = c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t \\ f(t) = 4 \cos t - \sin t & S = \{\cos t, \sin t\} \cup \{\cos t, \sin t\} = \{\cos t, \sin t\} & y_p = A \cos t + B \sin t \end{array}$$

#24

$$y'' - 4y' + 13y = 2te^{-2t} \sin 3t$$

solution

$$\begin{array}{lll} r^2 - 4r + 13 = 0 & r = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 1 \cdot 13}}{2} = 2 \pm 3i & y_h = e^{2t} (c_1 \cos 3t + c_2 \sin 3t) \\ f(t) = 2te^{-2t} \sin 3t & S = \{e^{-2t} \sin 3t, e^{-2t} \cos 3t, te^{-2t} \sin 3t, te^{-2t} \cos 3t\} & \\ & y_p = Ae^{-2t} \sin 3t + Be^{-2t} \cos 3t + Cte^{-2t} \sin 3t + Dte^{-2t} \cos 3t & \end{array}$$

#30

find a general solution to $y'' + 3y' - 4y = -32t^2$

solution

$$\begin{aligned}
 r^2 + 3r - 4 = 0 &= (r - 1)(r + 4) & r &= 1, -4 & y_h &= c_1 e^t + c_2 e^{-4t} \\
 f(t) &= -32t^2 & y_p &= A + Bt + Ct^2 & y_p' &= B + 2Ct \quad y_p'' = 2C \\
 2C + 3B + 6Ct - 4A - 4Bt - 4Ct^2 &= (2C + 3B - 4A) + t(6C - 4B) - 4Ct^2 = -32t^2 \\
 -4C &= -32 & C &= 8 & 6C - 4B &= 0 & B &= 12 & 2C + 3B - 4A &= 0 & \frac{52}{4} &= A = 13 \\
 y &= c_1 e^t + c_2 e^{-4t} + 8t^2 + 12t + 13
 \end{aligned}$$

4.4

#23

find a general solution to $y'' + 6y' + 9y = t^{-1}e^{-3t}, t > 0$

solution

$$\begin{aligned}
 r^2 + 6r + 9 = 0 &= (r + 3)^2 & r &= -3 & y_h &= c_1 e^{-3t} + c_2 t e^{-3t} \\
 W &= e^{-3t}(e^{-3t} - 3te^{-3t}) + te^{-3t}3e^{-3t} & W &= e^{-6t} & u_1' &= -\frac{te^{-3t}}{te^{3t}e^{-6t}} = -1 \\
 u_2' &= \frac{e^{-3t}}{te^{3t}e^{-6t}} = t^{-1} & \int u_1' dt &= -t & \int \frac{1}{t} dt &= \ln |t|, t > 0 \rightarrow \ln t \\
 y &= e^{-3t}(c_1 + c_2 t - t + t \ln t) = e^{-3t}(c_1 + c_3 t + t \ln t)
 \end{aligned}$$

#28

find a general solution to $y'' - 10y' + 25y = e^{5t} \ln 2t, t > 0$

solution

$$\begin{aligned}
 r^2 - 10r + 25 = 0 &= (r - 5)^2 & r &= 5 & y_h &= c_1 e^{5t} + c_2 t e^{5t} \\
 W &= e^{5t}(5te^{5t} + e^{5t}) - te^{5t}5e^{5t} & W &= e^{10t} & u_1' &= -\frac{te^{5t}e^{5t} \ln 2t}{e^{10t}} = -t \ln 2t \\
 u_2' &= \frac{e^{5t}e^{5t} \ln 2t}{e^{10t}} = \ln 2t & -\int t \ln 2t dt &= -z_1 w_1 + \int w_1 dz_1 & z_1 &= \ln 2t \quad dw_1 = t dt \\
 & & & & dz_1 &= \frac{1}{t} dt \quad w_1 = \frac{1}{2} t^2 \\
 u_1 &= -\frac{1}{2} t^2 \ln 2t + \frac{1}{2} \int t dt & u_1 &= \frac{1}{2} t^2 \left(\frac{1}{2} - \ln 2t \right) & \int \ln 2t dt &= z_2 w_2 - \int w_2 dz_2 \\
 z_2 &= \ln 2t \quad dw_2 = dt & u_2 &= t \ln 2t - \int dt & u_2 &= t \ln 2t - t \\
 dz_2 &= \frac{1}{t} dt \quad w_2 = t
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 y &= e^{5t} \left(c_1 + c_2 t + \frac{1}{2} t^2 \left(\frac{1}{2} - \ln 2t \right) + t^2 \ln 2t - t^2 \right) \\
 y &= e^{5t} \left(c_1 + c_2 t + \frac{1}{2} t^2 \ln 2t - \frac{3}{4} t^2 \right)
 \end{aligned}$$